

Academic Reference Dictionaries




DICTIONARY OF NEUROLOGY

مکتبہ اِقرأ

www.iqra.ahlamontada.com

English - Arabic

Dr. Sadek Al-Hilali



World Health Organization
Eastern Mediterranean Regional Office

ACADEMIA

لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ الثَّقَافِي)

پدای داتلود کتابهای مختلف مراجعه: (مُنْتَدَى اقرا الثقافی)

پۆدابهزانانی چۆرهها کتیب:سەردانی: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ الثَّقَافِي)

www.Iqra.ahlamontada.com



www.Iqra.ahlamontada.com

للكتيب (كوردی , عربي , فارسي)

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF NEUROLOGY

English-Arabic

Dr. Sadek Al-Hilali



World Health Organization
Eastern Mediterranean
Regional Office

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

معجم طب الأعصاب

انكليزي - عربي

الاسناد الدكتور صادق الهلالي



مَنْظَرُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ

المكتب الاقليمي لشرق المتوسط



أكاديمية

أكاديميا هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال للنشر والطباعة

ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International for
Publishing and Printing

معجم طب الأعصاب
Dictionary of Neurology

ISBN: 9953-3-0061-5

حقوق الطبعة العربية © أكاديميا إنترناشيونال 2002

تم التأليف تحت رعاية وإشراف
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

أكاديميا إنترناشيونال Academia International

ص.ب. P.O.Box 113-6669

بيروت، لبنان Beirut, 1103 2140 Lebanon

هاتف Tel 800811-862905

فاكس Fax 961 1 805478

بريد إلكتروني E-mail academia@dm.net.lb

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب،
أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو،
وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك،
إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما.

المحتويات

6	تقديم الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري ...
8	مقدمة المؤلف
10	مقدمة الناشر
11	كيفية استخدام المعجم
13	المعجم A-Z
631	مسرد عربي - إنكليزي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

هذه خطوة أخرى على درب تعريب العلوم الطبية والصحية، غايتها الخلاص من واقع مؤلم في المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان العربية، يتمثل في اتخاذها من اللغات الأجنبية وسيلة للتدريس والتدريب، في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى التزام اللغة الوطنية في نقل المعلومات ضماناً لحسن الاستيعاب لدى المتلقي، وتوفيراً لوقت المعلم والمتعلم، وتيسيراً لمشاركة المجتمع الذي لا بد من مشاركته إذا أريد تحقيق الصحة للجميع.

ولقد اضطلع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - إيماناً منه بضرورة وحتمية التدريس باللغة الوطنية - ببعض الواجب في هذا الشأن، فأصدر الطبعة الثالثة للمعجم الطبي الموحد، بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكان لهذا المعجم كبير فائدة في توحيد المصطلح المستعمل في مشارق الأقطار العربية ومغاربها وفي تيسير التأليف والتدريس بالعربية من خلال توفير التعابير العلمية التي تفي بحاجة المعنى وتكون في الوقت نفسه مقبولة سهلة الاستعمال. والمكتب الآن على وشك إصدار الطبعة الرابعة لهذا المعجم بعد تنقيحه وتوسيعه أضعافاً مضاعفة، بحيث يستوعب كل ما يحتاج إليه الدارس والباحث والمعلم والمتعلم.

غير أن المكتب قد رأى من البداية أن يواكب إصدار المعجم الطبي الموحد، وهو مسرد للمصطلحات باللغة الأجنبية مشفوعة بما يقابلها باللغة العربية، إصدار عدد من المعجمات التي تشمل على شرح وافٍ ومختصر في الوقت نفسه لكل مصطلح، وبذلك لا تقتصر مهمة المعجم على مجرد تسجيل التعبير المستعمل، وإنما تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير مُخلٍ، تعريفاً يسهل على القارئ تكوين فكرة واضحة عن المعنى المراد، ولو أنه لا يغني المختص عن الرجوع إلى أمهات كتب الاختصاص للتعلم في الموضوع العلمي.

و«معجم الأعصاب» هذا هو الحلقة الثالثة - بعد «معجم العين وأمراضها» و«معجم الوراثة» والعلوم البيولوجية والجزيئية - في سلسلة من المعاجم التخصصية في مختلف العلوم الصحية باللغة العربية، يصدرها المكتب الإقليمي أو يساعد على إصدارها، راجياً بذلك أن يسهم في سد الثغرة المحسوسة في الوقت الحاضر، من جراء حقبة من الركود الفكري الذي أدى إليه ذلك الفصام بين لغة التفكير ولغة التعبير.

وقد قام بإعداد هذا المعجم عالم فاضل استفرغ الجهد في التنقيب عن التعبير الصحيح السهل، والعمل على وضع التعريف الواضح الموجز، مع الالتزام بما تم توقيده من المصطلحات وشفع النص المكتوب بعدد من الصور الإيضاحية التي زادت في نفع المعجم.

وإننا لنأمل أن يلقى هذا المعجم ما يستحقه من اهتمام ونقد، وأن يؤلف لبنة مباركة في بنيان
الصرح الصحي الجديد الذي نأمل أن نراه شامخاً في هذا الإقليم، وأن يكون عاملاً من العوامل التي تدفع
الباحثين والدراسين إلى التشمير عن ساعد الجدّ، والإقبال على التأليف والتدريس والكتابة باللغة العلمية
العربية.

والله من وراء القصد..



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

بدأ التعليم الطبي الحديث في العالم العربي في أوائل القرن الماضي في مصر باللغة العربية وتقدّم تقدّمًا ملحوظاً أشادت به المعاهد العلمية العربية والأجنبية وساهم فيه الرعيل الأول من أعلام الطب المصري الحديث. ودام ذلك لمدة ناهزت الستين عاماً. ثم بدأ التعليم الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت في النصف الثاني من القرن الماضي باللغة العربية أيضاً ودام ذلك حوالي عشرين عاماً قبل أن تغيّر لغة التعليم في هذين المعهدين إلى اللغة الإنكليزية بتأثير التدخل الأجنبي. وعندما بدأت الكليات الطبية الحديثة في دول العالم العربي في أوائل هذا القرن كان التعليم فيها بلغة المستعمر فاستعملت اللغات الفرنسية والإنكليزية وحتى الإيطالية ولم تنج من ذلك إلا كلية الطب في دمشق التي راحت تعلم بالعربية بكل كفاءة وإقدام وإصرار ونجاح حتى يومنا هذا.

وقد أُلّف خلال هذه الفترات التعليمية الأولى العديد من الكتب والمراجع الطبية الموثوقة واستُحدث الكثير من المصطلحات الطبية وعُرّب العديد منها حتى غطت الساحة العلمية بل فاضت عن ذلك وتعددت مما استوجب توحيدها فجاءت طبقات المعجم الطبي الموحد بجهد كبير في ذلك وقامت به بكفاءة مرموقة.

وقد جلب انتباهي بعد إتمام مرحلة الدراسات العليا في اللغة الإنكليزية والتي سبقها دراساتي الطبية الأولية في مرحلة ما قبل التخرّج، والتي كانت في الإنكليزية، ثم دراستي ما بعد التخرّج في إنكلترا أن تمكّني من هذه اللغة كان دائماً أضعف من تمكّن أصحابها منها. وعند إجراء تجاربي الدقيقة وجدت أن سرعة قراءتي لها حتى في مواضيع اختصاصي لا تزيد على نصف سرعة قراءة الطلاب الإنكليز لها وربما بمفهوم أقلّ منهم. وبالمقارنة مع ذلك، ما هو حال الطالب خريج مدارسنا الثانوية مع ضعف تعليم اللغة الأجنبية فيها؟

ولما مارست تعليم مادتي في كليّاتنا الطبية باللغة الأجنبية كنت ألاحظ أحياناً صعوبة استيعاب الطلاب لبعض فقرات المحاضرة فاضطر إلى إعادتها بأسلوب أبسط وبالرغم من ذلك كان بعضهم يسألني عنها بعد المحاضرة وخارج قاعاتها فابادر بشرح الموضوع لهم باللغة العربية ببعض الجمل البسيطة فيستوعبون بها بكل سهولة. وكان الكثير من طلابنا يطلبون الإجابة في الامتحانات الشفوية باللغة العربية لسهولة التعبير والتفكير بها.

دفعتني كل هذه التجارب إلى كتابة مواضيع محاضراتي عن الجهاز العصبي في كتاب «فلسجة الجهاز العصبي» بالعربية الذي وضعته في متناول الطلاب فتلقفوه بشوق وزادت رغبتهم في تعلّم هذا الموضوع وتضاعفت نسبة نجاحهم فيه أضعاف زلائهم السابقين الذين لم يستعملوا هذا الكتاب، حتى إن الطالب الأول المتميز بينهم قال بعد مطالعته له «كنت أتصور بأنني كنت قد فهمت هذا الموضوع فهماً جيداً ولكنني في الواقع لم أفهمه وأستوعبه إلا بعد قراءتي له بالعربية» وصار البعض من خريجينا الذين يواصلون دراساتهم العليا باللغة الإنكليزية في الخارج يرجعون إلى هذا الكتاب لدراسة موضوعه بالعربية بطريقة سهلة وسريعة وبمستوى أعمق يساعدهم في تأدية امتحاناتهم.

وقد جلب انتباهي مؤخراً أن الأطباء خريجي الكليات الطبية التي تعلّم بالعربية أحرزوا نتائج أفضل من الكثير من زملائهم الذين تعلموا علومهم بغير العربية في امتحانات الدراسات العليا في الغرب لعمق فهمهم لمعلوماتهم الطبية.

وبعد كل هذا فلماذا نعلم علومنا الطبية بغير لغتنا ولماذا لا نعلمها بلغتنا العربية القويمة لغة الآباء والأجداد واللغة التي درجنا عليها؟

وقد قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مشكوراً وعلى رأسه قادة أكفاء مؤمنون بأهمية التعليم والتعلم باللغات الوطنية، بجهود كبيرة في سبيل العمل الجاد لتحقيق ذلك فسعوا إلى إصدار الطبعة الرابعة للمعجم الطبي الموحد (التي تضم قرابة حوالي 150 ألف مصطلح)، والعديد من المعاجم التخصصية، والكتب الطبية الدراسية والمرجعية، وكل ذلك إيماناً منهم بأن هذا سيرفع المستوى الصحي في المنطقة.

ولما كان المعجم الطبي الموحد في وضعه الراهن يقدم المصطلحات الأجنبية ومقابلاتها العربية مجردة عن أي شرح أو تعريف، فقد لوحظ بأن ذلك لا يكفي أحياناً بل يحتاج المصطلح أيضاً إلى شرح وافٍ ودقيق لإيضاح مدلوله العلمي الخاص واستعمالاته المتعددة أحياناً في الفروع العلمية المختلفة. والنية أن تعمل المنظمة في المستقبل القريب على إضافة شرح بسيط لكل مصطلح ليبدل على معانيه المختلفة كخواصه التشريحية أو الوظيفية أو المرضية أو العلاجية أو غير ذلك.

والجهاز العصبي أوسع أجهزة الجسم كافة ولقد لاحظت خلال عملي في تعليم وظائفه أن مصطلحاته معقدة ويستعمل الكثير منها بمعانٍ غير دقيقة شائعة فتستعمل كلمة cerebrum مثلاً أحياناً للدلالة على الدماغ كله وأحياناً أخرى على المخ فقط وهناك اختلاف كبير بين المعنيين فلا بد من شرح كل ذلك وتوضيحه. كما أن مصطلحات هذا الجهاز كثيرة جداً وللكتير منها مقابلات متعددة ترد في مواضيع متفرقة مثل استعمال «البصلة» أو «المنخ» أو «النخاع المستطيل» مقابل medulla oblongata فلا بد من استعمال مقابل واحد يوحدنا ويحتاج كل ذلك لشرح بسيط لها. وعسى أن يساعد هذا المعجم في ذلك وأن يقرّبنا من هدفنا في تعريب التعليم الطبي.

وهذا المعجم الذي بين يديك هو واحد من سلسلة المعاجم التخصصية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وقد استعملت في تأليفه مصطلحات المعجم الطبي الموحد فقط، وبهذا نكون قد خطونا خطوة أخرى نحو تعريب التعليم الطبي في بلداننا العربية. وبهذه الجهود الخيرة للمنظمة التي وفرت المصطلح والكتب الدراسية والمرجعية، نكون قد اقتربنا من هدفنا الخير هذا، فعسى أن يوفقنا الله ويهديننا إلى ذلك مع بداية القرن القادم.

وفي الختام لا بد لي من تقديم أخلص آيات الشكر إلى معالي الدكتور حسين الجزائري لاهتمامه المتواصل بمشاريع التعريب وتشجيعه الدائم للعاملين في حقله. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور محمد هيثم الخياط لإرشاداته الدائمة ولملاحظاته القيمة ومتابعاته المستمرة للجهود المبذولة في هذا الحقل. مع أخلص الشكر والتقدير لكافة الإخوة الذين ساعدوا في إخراج هذا المعجم. والله ولي التوفيق.

صادق الهلالي

مقدمة الناشر

المعاجم العلمية والتكنولوجية من مقتضيات العصر الحديث. الدافع الأساسي لها هو الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا. المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها. فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم «شامل» واحد، لا بد أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بد أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة وكافة المشتغلين بالعلم.

لذلك عمد قسم المعاجم في «أكاديمية» - بعد دراسة متأنية لحاجات المشتغلين بالعلم في الوطن العربي - إلى وضع خطة لإصدار سلسلة من «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» تقوم على الأسس التالية.

1 - إصدار حوالي 24 معجماً متخصصاً في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية: الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية.

2 - أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكّل الجسم الأساسي للغة التخصص العلمي الذي يغطيه المعجم، ويُجمع عليها أهل الاختصاص فيه، وتستوفي شروط التمايز قدر الإمكان، مع تعريف علمي دقيق وموجز لكل مصطلح.

3 - أن تكون هذه المعاجم بالإنكليزية والفرنسية والعربية ما أمكن ذلك، وذلك وفقاً لمتطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي. وأن يضاف إلى كل معجم مسردان [كشافان]: فرنسي - إنكليزي، وعربي - إنكليزي.

4 - أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشتى فروع العلوم الحديثة، كل في مجال تخصصه.

5 - التقيد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، ومراعاة ما رشحته مؤتمرات التعريب واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

انطلاقاً من ذلك جاءت سلسلة «المعاجم الأكاديمية المتخصصة، فريدة من نوعها وتضمنت أحدث المصطلحات المستخدمة في العلوم. وربما كان أهم ما فيها أنها تخاطب القطاع العريض من الأساتذة والطلاب والفنيين، وتستجيب لأهمية العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث، وتعتبر مصدراً للمعلومات التي تهمهم، وعوناً لهم لفهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

وهذا المعجم هو ثمرة من ثمار التعاون بين أكاديمية انترناشيونال والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تضاف إلى سلسلة الكتاب الطبي الجامعي التي تضم: «المرجع في الفيزيولوجيا الطبية»، «الغذاء والتغذية»، «وطب المجتمع»، «وأساسيات الباثيات»، «والتعليم من أجل تعلم أفضل»، «والمارشِد في الطب النفسي». والأمل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية العلم والمعرفة في وطننا العربي المتطلع إلى موطئ قدم في عصر تحديات العلم والتكنولوجيا.

وقد قام السيد محمد حسان ملص بالتحضير العلمي لهذا المعجم وتصحيحه وتنسيق جميع مداخله، ثم قام السيد الدكتور محمد دبس بالإشراف على هذا المعجم ومراجعته مراجعة شاملة من الوجهتين العلمية واللغوية.

كيفية استخدام المعجم

1 - رُتبت مداخل هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الإنكليزي للمداخل البسيطة، أي المؤلفة من كلمة واحدة. وإذا كان المدخل مركباً، أي مكوناً من كلمتين أو أكثر، اعتبر مدخلاً فرعياً ووضع تحت الكلمة الأساسية مسبقاً بشرطة وبحرف أصغر من حجم حرف المدخل الأساسي، واقتصرت الكلمة الأساسية على الحرف الأول، مثل:

غِيَاب، غَيْبُوبَة. فقدان الوعي لفترة **absence**
قصيرة كما يحدث في نوبة الصرع الصغير.

غِيَاب سَلْسِي. نوبة صرع صغير **a. enuretic** -
يرافقها سلس البول وفقدان الوعي.

غِيَاب رَمْعِي عَضَلِي. نوبة صرع **a. myoclonic** -
صغير تترافق مع رَمْع عضلي بالجانبين وفقدان الوعي.

وإذا اجتمع تحت الكلمة الأساسية غير مدخل فرعي واحد، رُتبت تلك المداخل بترتيب الفبائي وفقاً للكلمة الأولى.

- 2 - في بعض المداخل، كتبت المرادافات بين هلالين بعد المدخل وضعت أمامها علامة «يساوي».
- 3 - إذا كان المدخل مركباً ووجدت فاصلة بين الكلمتين، تكون الكلمة الأساسية مقدمة على الصفة ويقرأ على أساس أن الصفة تسبق الموصوف.
- 4 - وإذا كان للمدخل الإنكليزي غير معنى واحد، أعطي لكن معنى رقم متسلسل.
- 5 - **الإحالات:** تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرف في مكان آخر.
- 6 - **الأشكال والصور:** ورد في المعجم عدد من الرسوم والصور التي تكمل التعريفات وتوضحها.
- 7 - أضيف إلى المعجم مسرد عربي - إنكليزي مرتب وفقاً لحروف الهجاء العربي. وقد أهملت في هذا الترتيب لام التعريف وعُدَّت الهمزة ألفاً كيفما وردت في الكلمة.

abatement / خَفَّةُ الأَعْرَاضِ. نقصان حدة

1. خُبَال 2. شُدُوذْ عَقْلِي.

1. فقدان أو نقصان القوى العقلية 2. أي شذوذ عقلي (1) شبهة (2) تكذيب (3) مانع (4) مانع (5) مانع

مِثْقَبٌ لَمْ يُخْتَرِقْ. مِثْقَبُ الْقَحْفَلِ كَوْنُهُ كَوْنُ الْكُوفَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ
الَّذِي لَا يَنْفِذُ إِلَى الدِّمَاغِ عِنْدَ ثَقْبِ الْقَحْفَلِ بَعْدَ زَلْزَلَةِ عِصَةِ

abarnognosis (= barnagnosis) عَمَةُ الْوَزْنِ. فقدان حسّ الوزن.

abasia تَعَذُّرُ الْمَشْيِ. عدم المقدرة على المشي. أو الخطو. رُؤْيَا مَشْيِي، تَوَاسِي (مَرْكَاة)

a. astasia (= astasia-abasia) تعذر المشي
والوقوف، زلزالها الحركي وانوارا، سنان له

تَعَذُّرُ المَشْيِ الرَّحِي. حالة من تعذر
المشي. يتصف بعدم تناسق حركات الأطراف

تَعَذُّرُ الْمَشْيِ الرَّقْصِيّ. حالة من تعذر - choreic a. -
المشي تتأفة مع قص الساقين

تعذر المشي الشللي. حالة من
تعذر المشي تنتج عن شلل عضلات

- paroxysmal a.(= trepidant a., = spastic a.)
تَعْدُّرُ الْمَشْرِجِ (التَّشْنُجُ) حالة من تعذر

المشي والوقوف تنتج من تيبس تشنجي في عضلات الساقين عند محاولة المصاب الوقوف **ناله من الألم** والى صورته

تعذر المشي التشنجي. انظر
paroxysmal a. نام نكاوای گزانه

تَعَذُّرُ الْمَشْيِ الْإِرْتَعَاشِي. حالة
من تعذر المشي سببها ارتعاش الساقين. - trembling a.

تعذر المشي الارتعاشي - انظر
abasia, trembling

abasic متعلق بتعذر المشي. يتصف بتعذر المشي، أو متعلق به، أو يعاني من صعوبة المشي.

[illegible]

abatement / خفّة الأعراض. نقصان حدة

الآلم، أو خفة أعراض المرض
يأتى سوو كسبوى كد رده كله وانه يهكى نه شو شريان
مصاب بتعذر المشي. أنظر

abatic

abasia, trembling . سقوط بی‌رویه ناعزم و ناپایدار


abdomen بَطْنٌ، قسم الجسم الذي يقع بين الصدر والحوض (البرزخ)

abdominal

مُنْقِد. ما سَعَدَ الحِزءَ

عن العضو أو عن الجسم
العصب المتغصن العصب الذي يؤدي - nervous a.

تنبيهه إلى إبعاد المقلّة. **مؤرخة روى** **دعاري**

مُبَعَّدَةُ الْمُقْلَةِ. اسم قديم للعضلة مبعدة
- a. oculi المقلّة عن وضعها المركزي.  دَوْرَةُ رَوْدِي جَار: نَاسِي كَر

المُغْتَدِقُ: العُضَاةُ الْمُبْدِئَةُ الْمَقَالَةَ

انظر جدول العضلات muscles مورخه ٢٠٢٠

aberrhythmia شَلَلُ الْخَفِيفَةِ الشُّعْبِيَّةِ

درو لپچی تو ری خوری

رابع. متحرک عن مولدہ او متجول۔
 خامرو، ونبوم

جذر رابع. جذر بحافي منحرف عن

موضوع: ریاضی

aberration زِيْع. ١. انحراف عن الموقع أو

المجرى أو الحالة الطبيعية ٢. انحسار الضوء غير

صحة مشهورة : يا وارثي ، كن كرمي و صبور

-chromatic a - كروماتي

الضوئية المختلفة عند مرورها خلال العدسة فتولد

هالات ملونة على حواف الصورة المولدة بواسطة مسووني برنامج

- chromosome a. **بَیْنُ صِنْفِ: شَدُوْزِ فِ عِدَدِ اَوْ**

بنات الصغيات مما يولد تشوهاً خلقياً في الجنين.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

ناوردی ہوئے جو یہ سیاہ

abstinence syndrome مُتَلَاَزِمَةُ الإِمْتِنَاع. انظر syndrome. كَوْنُ نِشَانٍ مِنْ خَوْفٍ كَرِينٍ

abstract 1. مُجَرَّد؛ تَجْرِيدِي 2. مُلَخَّص. 1. مجرد عن كل الاعتبارات أو التقاليد 2. ملخص بحث علمي أو مقالة أو كتاب (دأما لين) هو ضمة تفكير مُجَرَّد. تفكير مجرد عن الاعتبارات التقليدية. يكرر منه وهو دأما لين

a. thinking - **a. thought** فِكْرَةٌ مُجَرَّدَةٌ. فكرة مجردة عن الاعتبارات التقليدية. يكرر من هو ضمة

abulia فَقْدُ الإِرَادَةِ. فقد الإرادة على القيام بعمل أو اتخاذ قرار مناسب. يكرر من هو ضمة

social a. فَقْدُ المَبَادِرَةِ الإِجْتِمَاعِيَّة. فقدان القدرة على المشاركة في أية مبادرة أو عمل اجتماعي كَوْنُ دُرُوبٍ **acalculia** تَعَدُّرُ الحِسَاب. عدم المقدرة على القيام بالعمليات الحسابية حتى البسيطة منها. يكرر من هو ضمة

acanthesthesia حِسُّ التَشْوُك. حس شاذ بالشعور بالوخز بآلة حادة. يكرر من هو ضمة

acarophobia رُهَابُ الخَلَم. الخوف من السُّوس والعث أو الأدوات المسننة أو الواخزة كالدبابيس والإبر. يكرر من هو ضمة

acatalepsia قَلَّةُ الفَهِم. قلة الفهم والإدراك أو ضعف التفكير. يكرر من هو ضمة

acatalepsy قَلَّةُ الفَهِم. انظر acatalepsia **acataleptic** 1. قَلِيلُ الفَهِم؛ يَلِيد 2. مُتَرَدِّد؛ مُتَشَكِّك. مَنْ يَتَصَفُّ بِقَلَّةِ الفَهِم أو من يكون متردداً في أعماله أو متشككاً من نتائجها يكرر من هو ضمة

acatamathesia 1. عَجْزٌ لُغَوِي 2. عَجْزٌ إِدْرَاقِي. 1. فقدان أو ضعف في فهم أو إدراك معنى الكلام المسموع 2. فقدان أو ضعف المدركات العامة بسبب آفة مركزية يكرر من هو ضمة

acataphasia حُبْسَةٌ نُطْقِيَّة. حبسة تعبيرية حيث لا يتمكن المصاب بها من التعبير عن أفكاره. يكرر من هو ضمة

acatastasia شَذُوذ. انحراف عن ما هو سوي وطبيعي، أو عدم انتظام الشكل أو الوظيفة. يكرر من هو ضمة

acatastatic شَاذٌ. غير منتظم ومنحرف عن السوي. يكرر من هو ضمة

acathexis فَقْدُ الإِهْتِمَام؛ تَشَتَّتُ الطاقة

الفكرية. انفصام بين الأفكار والعواطف وعدم الاهتمام بها.

acathisia قَمَاص؛ تَعَدُّرُ الجُلُوس. انظر akathisia. يكرر من هو ضمة

acceleration تَعْجِيل؛ تَسَارُع. ازدياد السرعة كسرعة النبض أو التنفس. يكرر من هو ضمة

angular a. تَسَارُعٌ رَاقِي. تسارع دوراني يكرر من هو ضمة

linear a. تَسَارُعٌ خَطِّي. تسارع في خط مستقيم. يكرر من هو ضمة

accessory إِضَافِي؛ مُسَاعِد. عضو أو عامل إضافي لآخر أو مساعد أو مكمل له. يكرر من هو ضمة

accident طَارِئ؛ خَادِفَةٌ. حادثة غير متوقعة أو غير مقصودة تؤدي إلى إصابة جسمية أو إلى الموت. يكرر من هو ضمة

cerebrovascular a. (= stroke) طَارِئٌ وَعَاقِي دِمَاقِي؛ سَكَّتَةٌ. اضطراب دماغي مفاجيء ينتج عن خلل وعائي كاحتشاء الوعاء أو عن خثار شرياني أو وريدي أو نزف في المخ أو المخيخ أو جذع الدماغ أو في الحيز تحت العنكبوتية. يكرر من هو ضمة

a. neurosis عَضَابُ الطَّوَارِيء. عَضَابٌ يَتَلَوُّ الإِصَابَةَ بِطَارِئٍ. يكرر من هو ضمة

accommodation تَكْنِيف. إحكام يناسب التغيرات الطارئة، مثل تكيف العين للإبصار للمسافات المختلفة. يكرر من هو ضمة

ocular a. تَكْنِيفُ العَيْن. تكيف العين للرؤية للمسافات المختلفة. يكرر من هو ضمة

acedia سَوْدَاوِيَّةٌ خُمُولِيَّة. حالة الخمول والاكتئاب. يكرر من هو ضمة

acenesthesia فَقْدُ حِسِّ الوجود؛ فَقْدُ حِسِّ الراحة. عدم الشعور الطبيعي بالصحة والراحة والسعادة. يكرر من هو ضمة

acephalia انْعِدَامُ الرَّاس. عدم وجود الرأس خلقياً. يكرر من هو ضمة

acephalobrachia انْعِدَامُ الرَّاسِ وَالذَّرَاعَيْن. عدم وجود الرأس والذراعين خلقياً. يكرر من هو ضمة

acephalobranchius عَدِيمُ الرَّاسِ وَالذَّرَاعَيْن. يكرر من هو ضمة

acephalochiria انْعِدَامُ الرَّاسِ وَالْيَدَيْن. عدم وجود الرأس واليدين خلقياً. يكرر من هو ضمة

- acephalochirus** عديمُ الرأسِ واليدين. مسيخ من دون رأس ويدين. **acephalopodia** إنعدامُ الرأسِ والقَدمين. عدم وجود الرأس والقَدمين خلقياً. **acephalopodius** عديمُ الرأسِ والقَدمين. مسيخ معدوم الرأس والقَدمين. **acephalus** عديمُ الرأس. مسيخ معدوم الرأس خلقياً. **acervulus** زُفْلُ الدَماغ. حُصَيَات كَلَسِيَّة تتولد في الأعمار المتقدمة في الجسم الصنوبري أو بالقرب منه وفي الضفيرة المشيمية وبعض الأقسام الأخرى من الدماغ. **acetylcholine** أسيتيل كولين. ناقلة كيميائية كولينية الفعل تعمل كناقلة عصبية في التشابكات العصبية الذاتية (الودية واللاودية). وبعض التشابكات المركزية، وعند الموصل العصبي العضلي، وفي نهايات الأعصاب اللاودية وبعض الأعصاب الودية. **acetylcholinesterase** أستيلراز الأسيتيل كولين. أنزيم يوجد في المادة السنجابية للأنسجة العصبية وفي التشابكات الكولينية وفي كريات الدم الحمراء وفي الموصل العصبي العضلي ويعمل على تحطيم الأسيتيل كولين. **achalasia** تَعَذُّرُ الاِرْتِخَاء. فشل ارتخاء ألياف العضلات الملساء في الجهاز الهضمي عند مصَرَات أقسامه المختلفة وخصوصاً المصرة المريئية المعدية عند بلع الطعام، وينتج ذلك عن تنكس العصبونات العقدية الموجودة في جدران العضو. **ache** 1. وَجَع. 2. تَوَجُّع. 1. ألم ثابت مستمر. 2. يعاني من ألم مستمر. **achillodynia** وَجَعُ العُرْقُوب. وجع في عرقوب القدم خصوصاً في منطقة جرابه الأمامي. **achluophobia** رُهابُ الظلام. خوف غير طبيعي من الظلام أو الليل. **acid taste** طَعْمٌ حَامِضٌ. مذاق المواد الحامضة التي توضع في الفم. **acinesia (= akinesia)** تَعَذُّرُ الحَرَكَةِ. **acoasma (= acousma)** هَلَسٌ سَمْعِيّ. تولُّم سماع الأصوات كالرنين أو القرع. **acoenesthesia** فَقْدُ حِسِّ العافية. **acenesthesia** انظر حسَّية تدور فوق كروان. **aconative** عديم العَزم. عديم الرغبة في العمل. **acorea** إنعدام الحَذَقَة. انعدام حدة العين. **acoria** نُهام؛ تَعَذُّرُ الشَّبْع. نوع من النهم ينتج عن انعدام حس الشبغ فيستمر المصاب بتناول الطعام ويحصل ذلك بالرغم من عدم زيادة شهيته للأكل. **acousmatamnesia** فَقْدُ ذاكرة المسموعات؛ نَسَاوَة صَوْتِيَّة. فشل الشخص في تذكر الأصوات. **acoustic** صَوْتِيّ. نسبة للصوت أو متعلق به. **acousticophobia** رُهابُ الصَّوت. الخوف من سماع الأصوات. **acquired** مُكتَسَب. ما يكتسب من المحيط وهو غير الذي يكتسب بالوراثة. **acrasia** تَعَذُّرُ ضَبْطِ النَّفْس. عدم المقدرة على السيطرة على النفس. **acroagnosis (= acragnosis, = acroagnosia)** غَمَّةُ الأطراف. عدم إدراك حس الأطراف. **acroanesthesia** خَذَرُ الأطراف. فقدان الحس بالأطراف. **acrocephalia** تَسَنُّمُ الرَّاس. انظر oxycephaly. **acrocephalic** مُسَنَّمُ الرَّاس. انظر oxycephalic. **acrocephalography** تَصَوِيرُ سِنَامِ الرَّاس. تصوير القسم العلوي من الرأس. **acrocephalosyndactyly** تَسَنُّمُ الرَّاس وإرتفاق الأصابع. تشوّه خلقي يتصف بتضيق الرأس وبروز قمته للأعلى وإرتفاق الأصابع. **acrocephalous** مُسَنَّمُ الرَّاس. انظر oxycephalic.

acrocephaly (= oxycephaly) تَسَنُّمُ
الرَّاسِ.

acrocinesis فَرْطُ الحَرَكَةِ. فرط حركة
أقسام الجسم.

acrocinetic مُفْرِطُ الحَرَكَةِ. مصاب بفرط
الحركة.

acrocontracture تَقَفُّعُ الطَّرَفِ. تقفع
عضلات اليد أو القدم ومقاومتها للتمديد.

acrodynia وَجَعُ النِّهَائِيَّاتِ. مرض يصيب
الأطفال ويتصف بآلم وتورم أصابع اليدين
والقدمين مع احمرارها.

acroesthesia 1. تَحَسُّسُ الأَطْرَافِ 2. ألم
الأطراف. 1. فرط تحسس الأطراف. 2. وجع في
الأطراف.

acrognosis مَعْرِفَةُ الأَطْرَافِ. إدراك وجود
الأطراف ومعرفة أقسامها وعلاقات بعضها ببعض.

acrognosis مَعْرِفَةُ الأَطْرَافِ.
انظر acrognosis.

acrokinesis فَرْطُ الحَرَكَةِ. انظر
acrocinesis.

acromegaly ضَخَامَةُ النِّهَائِيَّاتِ؛ عَرُظْلَةٌ.
مرض ينتج عن فرط إنتاج النخاسي لهرمون النمو
فيسبب ضخامة نهايات الجسم كأصابع اليدين
والقدمين والأنف والأذن والفك السفلي.

acromion الأَخْرَمُ. امتداد شوكة عظم
الكتف حتى مفصل المنكب مكونة أعلى نقطة في
المنكب.

acromyotonia تَقَفُّعُ نِهَايَاتِ الأَطْرَافِ.
توتر عضلات اليدين والقدمين مما يولد فيها تشوهاً
تشنجياً لعدم إمكان تمديدتها.

acromyotonus (= acromyotonia) تَقَفُّعُ
نِهَايَاتِ الأَطْرَافِ.

acroneurosis عُصَابُ الأَطْرَافِ. اعتلال
عصبي في الأطراف.

acroparalysis شَلْلُ الأَطْرَافِ. شلل يصيب
الأطراف.



acromegaly

ضخامة النهايات كما تظهر في مريض مصاب بضخامة الغدة
النخامية مظهراً ضخامة الأصابع والأنف والفك السفلي.

1. مَدَلُ الْأَطْرَافِ acroparesthesia

2. تَتَمَلُّ الْأَطْرَافُ الْمُؤَلِمُ. 1. شذوذ حسي مؤلم أو محرق أو واخز في نهايات الأطراف ينتج من انضغاط الأعصاب أو التهابها 2. مرض يصيب الأطراف يتصف بنوبات تنمل أو نخز مع تشنج أقسامها وأحياناً مع ألم فيها وشحوب الجلد الذي يغطيها أو ازرقاقه.

acropathy إعتلال الأطراف. أي مرض يصيب الأطراف.

acrophobia رُهابُ المرتفعات. الخوف من البقاء في المرتفعات كالجبال أو البنايات المرتفعة.

acrosclerosis تَصَلُّبُ الْبِنَائِيَّات. تصلب نهايات الأطراف والأصابع والرقبة والوجه.

acrostealgia التهاب نُتُوَّاتِ الْأَطْرَافِ المؤلم. ألم نتوءات عظام الأطراف الالتهابي.

acrotrophodynia وَجَعُ الْأَطْرَافِ الْإِغْتِزَائِي. اضطراب تغذوي مع التهاب الأعصاب يولد إحساسات غير طبيعية في الأطراف بسبب تعرضها للبرد والرطوبة اللذين يسببان خللاً تغذوياً فيها.

1. فِعْلٌ 2. قَانُونٌ. 1. عمل يقتضي فعالية act

حركية أو بدونها 2. قانون تصدره سلطة تشريعية.

فِعْلٌ إِنْعَكَاسِي. استجابة نمطية معينة - reflex a.

تتولد عن تنبيه قوس منعكسي معين بمنبه خاص ومن دون تأثير من المراكز العصبية العليا.

فِعْلٌ. القيام بوظيفة أو بتحريك الجسم action

أو أي عضو من أعضائه.

فِعْلٌ تَرَاكُمِي. فعل يزداد شدة، - cumulative a.

كالذي يشاهد عند إعطاء عدة جرعات من دواء معين فيزداد تأثيره تدريجياً بسبب تراكم كميات قليلة من الجرعات الأولية من الدواء.

فِعْلٌ مُسْكَارِي. مادة أو تنبيه - muscarine a.

له نفس تأثير المسكارين.


فِعْلٌ نِيكُوتِينِي. مادة لها نفس تأثير - nicotinic a.

النيكوتين.

جُهِدُ الْفِعْلِ. الفعالية الكهربائية التي - a. potential



تتولد في العصب أو العضلة عند فعاليتها ومن الممكن إثارتها بتنبيه العصب أو العضل بأي من المنبهات الوظيفية أو بمنبه كهربائي، ويتكون من الاستجابة الموضعية والجهد السفاتي على مخطط كهربية العصب

والجهد التلوي السالب والجهد التلوي الموجب.



action potential

جهد فعل مركب لعصب جلدي في الجسم يبين ارتفاعات جهود مختلف أنواع أليافه العصبية المختلفة.



ب

action potential

جهد الفعل. (أ) تسجيل جهد الفعل من ليف عصبي بواسطة مقياس العصب بوضع المسرى الكهربائي G1 على قسمه الفعال السليم ووضع المسرى G2 على قسمه المخرب المصاب فيولد جهد فعل أحادي الطور عند مرور نبضة زوال الاستقطاب تحت المسرى G1 المنبهة. (ب) مراحل تسجيل جهد فعل ثنائي الطور عند وضع المسرين على منطقتين سليمتين وعند تنبيه الليف العصبي بمنبه كاف.

- جَهْدُ الْفِعْلِ** **compound a. potential** **المُرْكَب**. جهد الفعل الذي يسجل من مجموعة من الألياف العصبية في أحد الأعصاب أثناء فعاليته.
- جَهْدُ الْفِعْلِ ثَنَائِي** **diphasic a. potential** **الطُّور**. جهد الفعل ثنائي الطور الذي يسجل من ليف عصبي بوضع مسارين كهربائيين على قسمين سليمين متقاربين منه عند مرور نبضة عصبية فيه.
- جَهْدُ الْفِعْلِ الْمُسْتَنَار** **evoked a. potential**. جهد الفعل الذي يتولد في العصب أو العضلة عند تنبيههما.
- جَهْدُ الْفِعْلِ** **monophasic a. potential** **أَحَادِي الطُّور**. جهد الفعل أحادي الطور الذي يسجل من ليف عصبي بوضع مسار كهربائي على قسم سليم منه وآخر على نهايته المقطوعة عند مرور نبضة عصبية فيه.
- فِعْلٌ مُنْعَكِسٌ** **reflex a.** **فِعْلٌ إِنْعِكَاسِي**. استجابة تنتج من مرور جهد الإثارة من المستقبل إلى العضلة أو الغدة خلال سلسلة عصبية وعادة خلال الجهاز العصبي المركزي ومن دون ضرورة للإرادة في توليدها.
- فِعْلٌ مُؤَلَّدٌ لِلْحَرَارَةِ** **thermogenic a.** **فِعْلٌ**. فعل الغذاء أو الدواء الذي يحفز توليد الحرارة في الجسم أو يرفع درجتها فيه.
- رُعَاشُ الْحَرَكَةِ** **a. tremor (= kinetic tremor)**. **انظر** tremor.
- فِعْلٌ الزِّنَاد** **trigger a.** **فِعْلٌ**. فعل يطلق طاقة في الجسم لا علاقة لها بالعملية التي حفزت توليدها فيه.
- نَشِطٌ** **activate**. ما يحفز الفعل أو ينشطه.
- تَفْعِيلٌ** **activation** **تَنْشِيطٌ**. عملية تحفيز الفعل أو تنشيطه.
- مُنَشِطٌ** **activator**. عامل يحفز الفعل أو ينشطه.
- 1. فَاعِلٌ؛ فَعَالٌ 2. نَشِيطٌ** **active**. يتصف بالفعالية والنشاط وهو عكس المنفعل.
- تَعْبِيرٌ فَعَالٌ** **a. expression**. تعبير إرادي يظهر لدى الشخص نتيجة فعاليته، أو تعبير يرافق بعض الفعاليات الجسمية.
- حَرَكَةٌ نَشِيطَةٌ** **a. movement**. **انظر** movement.
- عُصَابٌ حَقِيقِي** **actual neurosis**. **انظر** neurosis.
- إِبْرِي** **acu-** (سابقة).
- حُبْسَةٌ عِبَارِيَّةٌ** **aculalia (= syntactical aphasia)**. **انظر** aphasia.
- الْوَحْزُ الْإِبْرِي** **acupuncture**. أسلوب علاجي صيني تفرز فيه إبر في مواضع معينة من سطح الجسم لأغراض علاجية أو لإزالة الألم أو للتخدير الجراحي الموضعي.
- حَادٌ** **acute**. مرض أو اعتلال شديد يبدأ سريعاً ويدوم لفترة قصيرة نسبياً.
- تَلَاوُمٌ** **adaptation** **1. تكيف الكائن الحي للتغيرات التي تطرأ في محيطه 2. تناقص الدفعات العصبية التي يولدها العصبون أو المستقبل عند استمرار تنبيههما**.
- تَلَاوُمٌ سَمْعِي** **auditory a.**. تناقص حدة السمع عند استمرار الغنبة السمعي.
- تَلَاوُمٌ لَوْنِي** **color a.**. تناوُل شدة لون المرئيات عند استمرار النظر إليها.
- التَلَاوُمُ لِلظَّلَامِ** **dark a.**. تلاوُم العين للإبصار في الظلام.
- التَلَاوُمُ لِلضَّوْءِ** **light a.**. تلاوُم العين للإبصار في الضوء الشديد أو لضوء الشمس.
- تَلَاوُمُ الشَّبَكِيَّةِ** **retinal a.**. تلاوُم مستقبلات الشبكية لمختلف شدّات الضوء.
- مُدْمِنٌ** **addict**. شخص اعتاد تناول المخدرات أو الكحول أو العقاقير ولا يمكنه الامتناع عن استعمالها لأسباب فيزيولوجية أو نفسية.
- إِدْمَانٌ** **addiction**. حالة التعوّد على استعمال المخدرات أو العقاقير وصعوبة الانقطاع عنها.
- إِدْمَانُ الْكُحُولِ** **alcohol a.**. الكحولية التي تؤدي إلى زيادة تحمل المصاب للكحول وظهور الأعراض الخاصة عند الانقطاع عنه.
- إِدْمَانُ الْأَدْوِيَّةِ** **drug a.**. حالة التعوّد والاعتماد على استعمال العقار للحد الذي يزيد من تحمله له وظهور أعراض عضوية أو نفسية شديدة عند الانقطاع عنه.
- الْإِدِيسُونِيَّةُ** **addisonism**. مجموعة أعراض وعلامات تترافق مع داء السلّ تتصف بانصبغ

الجلد والضعف وهي حالة تشابه مرض أديسون.

ademanian إِكْتِنَابٌ هَيَّاجِيّ، انظر
depression, agitated.

adenalgia (= adenodynia) ألمُ الغُدَّة.
الم في إحدى الغدد.

adenohypophysis النُخَامِي الغُدِّيَّة.
النخامى الامامية وهي القسم الامامي للغدة
النخامية.

adenoma وَرَمٌ غُدِّيّ، ورم حميد، له شكل
غدي، يتكون من الظهارة الغدية او من خلايا غدية
أساسية.

adenosine اَدِينُوزِين، نوويد دوري يعمل
كناقل وسيط داخل الخلايا لعمل العديد من
الهرمونات المولدة من البيبتيدات أو الحموض
الامينية مثل الكاتيكولامين.

adequate stimulus مُثَبِّةٌ وَافٍ، منه
كافٍ لتوليد استجابة العضو أو المستقبل.

adhesio interthalamica الْإِلْتِصَاقُ
بَيْنَ الْمِهَادَيْنِ، كتلة من المادة السنجابية تربط
المهادين عبر الخط الوسطي للبطين الثالث.

adiadochocinesia تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ.
انظر adiadochokinesia.

adiadochocinesis تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ.
انظر adiadochokinesia.

adiadochokinesia تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ.
عدم المقدرة على القيام بحركات تناوبية سريعة.

adiadochokinesis تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ.
انظر adiadochokinesia.

adiaphoria تَعَدُّرُ الاستجابة، عدم الاستجابة
للمنبه بسبب التعرض السابق لمنبهات مماثلة.

adient مُنَاحِي الْمُنْبَه؛ مُتَجَذِبٌ لِلْمُنْبَه، منجذب
نحو مصدر التنبيه.

adiposalgia أَلَمٌ شَحْمِيّ، حالة اعتلال عصبي
تتصف بانتشار مناطق مؤلمة تحت الجلد.

adiposis (= obesity) سَمْنَةٌ؛ شَحَامَةٌ.
زيادة وزن الجسم بسبب تراكم الشحم فيه أكثر من
حاجة الجسم أو أكثر مما يتحمّله هيكله العظمي.

a. cerebialis (= cerebral adiposity)
شَحَامَةٌ مُخَيَّة.

a. dolorosa شَحَامَةٌ مُؤَلِّمَةٌ، مرض يتصف
بتراكم كتل شحمية موضعية مؤلمة مع آفات عصبية،
وغالباً ما يصيب النساء ويؤدي إلى الموت.

adiposity (= adiposis, obesity)
سَمْنَةٌ؛ شَحَامَةٌ.

cerebral a. الشَحَامَةُ المُخَيَّةُ المنشأ. شحامة
جسمية بسبب داء مخي كالإصابة بأفة في الوطاء، مثل
الحثل الشحامي أو التناسلي.

pituitary a. الشَحَامَةُ النُخَامِيَّةُ المنشأ. شحامة
عامة كان يعتقد بأنها تتولد عن عدم كفاءة النخامى
ولكن المعروف حالياً أنها تتسبب عن داء في الدماغ
المتوسط.

adiposogenital syndrome الْمُتَلَازِمَةُ
الشَحَامِيَّةُ التَّنَاسِلِيَّةُ، انظر syndrome.

adjustment إِحْكَامٌ؛ تَعْدِيلٌ، 1. عملية تحويل
شكل جزء أو بعض منه استجابة للتغيرات التي
تحدث في محيطه، 2. عملية تكيف الشخص
لاحتياجاته حسب ظروف محيطه.

adolescence يَفْعٌ؛ مُرَافَقَةٌ، فترة حياة
الشخص التي تبدأ منذ ظهور الخواص الجنسية
الثانوية والتي تدوم حتى تكامل نموه الجسمي،
وهي تمتد عادة بين سن 11-19 سنة من العمر.

adolescent يَافِعٌ؛ مُرَافِقٌ، فرد في سن
المراهقة.

adrenaline أَدْرِينَالِين، انظر epinephrine.

adrenergic أَدْرِينَالِينِيّ الْفِعْل، 1. عضو أو
نسيج ينشط أو ينبّه بالأدرينالين أو يولده ويفرز.
2. عامل أو مادة تعمل عمل الأدرينالين
(الأبينيفرين).

adrenin, adrenine (= adrenaline)
أَدْرِينَالِين.

adrenoceptor مُسْتَقْبَلَةٌ أَدْرِينَالِينِيَّة.
انظر receptor, adrenergic.

adrenolytic مُخَصِّرُ الأَدْرِينَالِين، مادة تثبط
عمل الأعصاب الأدرينالينية الفعل أو تثبط
الاستجابة للأدرينالين.

adrenoreceptor مُسْتَقْبَلَةُ أَدْرِينَالِينِيَّة. انظر receptor, adrenergic.

adversive عَكْسِيّ الْإِتِّفَات؛ ابْتَعَادِيّ التَّدْوِير. يتصف بدوران الرأس والعينين إلى الجهة المعاكسة للإصابة المخية المهيبة للمنطقة الحركية البصرية (8).

adynamia (= asthenia) وَهْن. نقص أو فقدان الفعالية الحيوية.

a. episodica hereditaria (= periodic paralysis) وَهْنٌ وَرَثَائِيّ نَوْبِيّ. شلل دوري.

adynamic (= asthenic) وَاهِن. المصاب بالوهن.

aelurophobia رُهَابُ الْهَرَّة. انظر ailurophobia.

aerasthenia وَهْنُ الطَّيَارِين؛ عُصَابُ الطَّيَارِين. انظر aeroasthenia.

aeroasthenia (= aeroneurosis) عُصَابُ الطَّيَارِين. عصاب أو وهن عصبي يصيب الطيارين عند الطيران.

aerophagia بَلْعُ الْهَوَاء. بلع الهواء المفرط اللاشعوري الذي يرافق القلق ويسبب انتفاخ البطن والتهوُّع مما يؤدي إلى الاعتقاد بأنه ناتج عن مرض عضوي.

aerophagy (= aerophagia) بَلْعُ الْهَوَاء.

aerophobia رُهَابُ الْهَوَاء. الخوف من الريح أو نسمات الهواء الخفيف مع الاعتقاد بأنه قد يجلب المرض للشخص.

affect عَاطِفَة؛ وَجْدَان. التعبير المظهري للعاطفة والمقترن بالأفكار والانطباعات الفكرية عن الحوادث أو المنظورات.

- blunted a. وَجْدَانٌ بَلِيد. نقص أو انعدام العاطفة. وهو عَرَضُ عام في الفصام.

- flat a. وَجْدَانٌ مَكْبُوت. قلة أو انعدام التعبير عن العاطفة.

affection 1. عَاطِفَة؛ وَجْدَان 2. عِلَّة. 1. الشعور والحس بالعاطفة 2. عِلَّة أو مرض.

affective عَاطِفِيّ؛ وَجْدَانِيّ. منسوب للعاطفة أو للوجدان أو يتصف بهما.

- a. disorders اضطرابات وَجْدَانِيَّة. اضطرابات تتصف بخلل العاطفة أو بتغيرها وعدم انسجامها.

- a. psychosis (= mood disorder) دُهَانٌ عَاطِفِيّ. اضطرابات المزاج.

- a. reaction إِسْتِجَابَةٌ عَاطِفِيَّة. استجابة عاطفية للمنبهات المحيطية أو الداخلية.

- a. sensibility تَحَسُّسٌ عَاطِفِيّ. حس عاطفي للمؤثرات الخارجية.

- a. state حَالَةٌ عَاطِفِيَّة. حالة هياج عاطفي.

affectivity العَاطِفِيَّة. حالة التأثير بالمنبهات العاطفية.

affectomotor عَاطِفِيّ حَرَكَيّ. فرط العاطفة والحركة كما يحدث في الهوس.

afferent وَارِد؛ مُورِد. متجه نحو المركز أو ناقل للدفعات العصبية نحو المركز كالعصب الوارد.

affinity 1. شَغَف أو علاقة متأصلة 2. انجذاب نحو عضو أو مادة أو بنية معينة.

afteraction فِعْلٌ تَلَوِّيّ. تأثير يحدث بعد توقف المنبه المولد له.

afterbrain الدِّمَاغُ التَّالِيّ. انظر metencephalon.

aftercurrent تَيَّارٌ تَلَوِّيّ. التيار الذي يتولد في العضلة أو العصب بعد توقف التيار الكهربائي المصاحب للدفعات العصبية أو الحركية.

afterdepolarization زَوَالُ الْإِسْتِقْطَابِ التَّلَوِّيّ. زوال استقطاب العصب أو العضلة بعد استقطابهما أثناء مرور الدفعات العصبية أو الحركية.

afterdischarge تَفْرِيعٌ تَلَوِّيّ. الجزء من استجابة العصب الحسي للتنبيه الذي يستمر لفترة بعد توقف التنبيه.

afterhyperpolarization فَرْطُ الْإِسْتِقْطَابِ التَّلَوِّيّ. فرط استقطاب العصب بعد مرور الدفعات العصبية خلاله والذي يتلو زوال الاستقطاب التلوي.

afterimage صُورَةٌ تَلَوِّيَّة. إدراك بصري يدوم لفترة قصيرة بعد زوال المنبه الذي ولد الصورة البصرية الحقيقية الأصلية.

- negative a. صُورَةٌ تَلَوِيَّةٌ سَلْبِيَّةٌ. صورة تلوية معكوسة، إذ تدرك النقاط التي كانت مضيئة في الصورة الأصلية مظلمة والنقاط التي كانت مظلمة مضيئة.

- positive a. صُورَةٌ تَلَوِيَّةٌ مُوجِبَةٌ. صورة تلوية تشبه الصورة الحقيقية الأصلية بالوانها وإضاءتها.

afterimpression جسٌّ تَلَوِيٌّ. انظر aftersensation.

afterloaded تَلَوِيَّةُ التَّحْمِيلِ. عضلة يتولد فيها الجهد أو الشد بعد بدء تقلصها.

afterloading تَحْمِيلٌ تَلَوِيٌّ. حدوث الجهد أو الشد في العضلة بعد بدئها التقلص.

aftermovement حَرَكَةٌ تَلَوِيَّةٌ. تقلص عضلات الذراع اللاإرادي الذي يتلو تقلصها عند الضغط الشديد بالذراع على جسم صلب مما يؤدي إلى رفعه تلقائياً.

afterpains طَلْقٌ تَلَوِيٌّ. الآلام التشنجية الشديدة التي تحس بها الوالدة بعد الولادة بسبب تقلص الرحم.

afterperception إِدْرَاكٌ تَلَوِيٌّ. إدراك الحس الذي يُولد بعد فترة من زوال المنبه.

afterpotential جُهْدٌ تَلَوِيٌّ. الجهد الكهربائي الذي يسجل من العصب بعد انتهاء الجهد السفاتي.

- negative a. الجُهْدُ التَلَوِيُّ السَّالِبُ. انظر afterdepolarization.

- positive a. الجُهْدُ التَلَوِيُّ المُوجِبُ. انظر afterhyperpolarization.

aftersensation الجِسْمُ التَلَوِيٌّ. الحس الذي يدوم لفترة بعد زوال المنبه المولد له.

aftertaste مَذَاقٌ تَلَوِيٌّ. تذوق يستمر لفترة بعد إزالة المادة المولدة له من الفم.

aftervision صُورَةٌ تَلَوِيَّةٌ؛ رُؤْيَا تَلَوِيَّةٌ. انظر afterimage.

age 1. عُمرٌ 2. سِنٌ. 1. مدة حياة الفرد منذ تاريخ ولادته 2. درجة أو مرحلة تطور بعض

خصائص الفرد بالنسبة إلى تطورها لدى الشخص السوي.

- achievement a. العُفْرُ التَّحْصِيلِيٌّ. مدى إنجاز الطفل في تعلمه بالمقارنة مع نفس الإنجاز لطفل سوي في سن معينة.

- emotional a. العُفْرُ الْإِنْفِعَالِيٌّ. مدى تطور عواطف الفرد بالمقارنة مع تطورها في شخص سوي في سن معينة.

- mental a. العُفْرُ الْعَقْلِيٌّ. الدرجات التي يحصل عليها الشخص في اختبار الذكاء وتقاس بالنسبة إلى العمر الزمني لشخص سوي يماثله في درجة الذكاء.

agenesia. انظر agenesia.

- a. corticalis عدم تَخَلُّقِ القَشْرَةِ. عدم تكون قشرة المخ خلقياً خصوصاً الخلايا الهرمية فيها مما يولد الشلل والعته.

agenesis عدم التَخَلُّقِ. 1. عدم تكون أحد الأعضاء خَلْقِيًّا 2. العقم.

- callosal a. عدم تَخَلُّقِ النَفْنِ. عدم أو نقص في تكون الجسم النقيي خلقياً.

- cerebral a. عدم تَخَلُّقِ الْمُخِّ. انظر agenesia corticalis.

agent عَامِلٌ؛ عَمِيلٌ. أية قوة أو مادة يمكن أن تحدث تغييراً كيميائياً أو فيزيائياً أو حيوياً.

- adrenergic blocking a. عَامِلٌ مُحْصِرٌ لِلاَدْرِينِيَّاتِ. مركب يحصر الاستجابة للدفعات العصبية الودية أو للمواد الأدرينالينية الفعل أو للكاتيكولامين.



- adrenergic neuron- blocking a. عَامِلٌ مُحْصِرٌ لِلْعَصْبُونِ الْأَدْرِينَالِينِيِّ. عامل يثبط تحرير النورادرينالين من النهايات العصبية للألياف بعد العقدية.

- blocking a. عَامِلٌ مُحْصِرٌ. عامل يثبط استجابات الأعضاء المستفعدة للدفعات العصبية للجهاز العصبي الذاتي ويمكن أن يكون عاملاً محصراً للفعل الأدريناليني أو محصراً للفعل الكوليني.

- cholinergic blocking a. عَامِلٌ مُحْصِرٌ لِلْكُولِينِيَّاتِ. عامل يحصر أو يبطل عمل الأسيتيل كولين.

- **ganglionic blocking a.** **عَامِلٌ مُحَصِّرٌ عَقْدِيّ.** عامل يحصر مرور الدفعات العصبية عبر التشابكات العقدية أو العصبية العضلية.
- ageusia, ageusia** **إِنْعِدَامُ الذَائِقَةِ.** ضعف أو غياب حس الذوق.
- aggregate** **كُدَاسَةٌ.** تجمع كثيف ومزدحم.
- aggregation** **تَكَدُّسٌ.** تجمع كثيف ومزدحم.
- aggression** **عُدْوَانٌ.** نوع من السلوك الذي يستهدف إثبات الذات والذي يمكن أن يتولد عن دوافع ذاتية أو كرد فعل للخيبة والفشل، ويمكن أن يظهر بصورة سلوك اعتدائي تخريبي أو بصورة شعور عدواني مكبوت أو بصورة حوافز نفسية للتسلط على الآخرين.
- aggressive** **عُدْوَانِيّ.** شخص مصاب بالسلوك العدواني.
- **a. behavior** **aggression** **اُنْظُرْ** **اُغْدَوَانِيّ.**
- **a. psychopath** **مُفْتَلٌّ نَفْسِيّ عُدْوَانِيّ.** مريض مصاب باعتلال نفسي يتصف بالسلوك العدواني.
- agitation** **هَيْجَاجٌ.** حالة من القلق تترافق مع اضطراب حركي.
- agitographia** **كِتَابَةٌ هَزُولِيَّةٌ.** سرعة الكتابة مع إسقاط بعض الحروف أو الكلمات منها من دون وعي.
- agitolalia** **اُنْظُرْ** **اُغْدَوَانِيّ.**
- agitophasia** **تَكَلُّمٌ هَزُولِيّ.** سرعة مفردة في التكلم مع إسقاط بعض المقاطع أو الكلمات من دون وعي مما يشوه النطق.
- agnea (= agnosia)** **عَمَةُ الإِدْرَاكِ؛ عَمَةُ** **المرثيات.** عدم المقدرة على التعرف على الأشياء الاعتيادية المرثية.
- agnosia** **عَمَةُ.** عدم المقدرة على التعرف على المنبهات الحسية.
- **acoustic a. (= auditory a.)** **عَمَةُ سَمْعِيّ.** عدم المقدرة على التعرف على دلالات الكلمات أو الأصوات المسموعة.
- **apraxic a.** **عَمَةُ الأَدَاءِ؛ تَعَدُّرُ الأَدَاءِ.** **apractognosia** **اُنْظُرْ**
- **body image a. (= autotopagnosia)** **عَمَةُ** **صُورَةِ الجِسْمِ.** عدم المقدرة على التعرف على مختلف أقسام الجسم أو توجيهها التوجيه الصحيح.
- **chromatic a.** **عَمَةُ الألوان.** عدم مقدرة المصاب على التفريق بين الألوان بالرغم من رؤيتها لها جميعاً بصورة طبيعية.
- **developmental a.** **عَمَةُ تَنْمُوِيّ.** عمة تنموي يتصف بعدم اكتساب المصاب القدرات التي تمكنه من إدراك المنبهات الحسية وتفهمها.
- **digital a. agnosia, finger** **اُنْظُرْ** **عَمَةُ الأصابع.**
- **finger a.** **عَمَةُ الأصابع.** عدم مقدرة المصاب على التعرف على أصابعه أو أصابع الآخرين.
- **a. for faces** **عَمَةُ الوُجُوهِ.** **اُنْظُرْ** **prosopagnosia.**
- **geometrical a.** **عَمَةُ هَنْدَسِيّ.** عدم مقدرة المريض على إدراك الأبعاد الهندسية للأشياء فلا يمكنه رسمها ولا يمكنه استنساخ أو رسم الصور أو الخرائط.
- **ideational a.** **عَمَةُ إِفْتِكَارِيّ.** عدم المقدرة على إدراك الأفكار والربط بينها لتكوين فكرة عامة مترابطة عن المرثيات أو المسموعات أو المقروئات.
- **localization a.** **عَمَةُ التَّوْضِيْعِ.** عدم المقدرة على توضيح المرثيات في الساحة البصرية.
- **music a.** **عَمَةُ مُوسِيْقِيّ.** عدم المقدرة على إدراك الأنغام والربط بينها.
- **spatial a. visuospatial a.** **عَمَةُ حَيَازِيّ.** **اُنْظُرْ** **عَمَةُ بَصَرِيّ وَهَزَلِيّ.**
- **symbolic visual a.** **عَمَةُ بَصَرِيّ وَهَزَلِيّ.** عدم المقدرة على إدراك معاني الرموز المرثية كرموز الحروف أو الأرقام المكتوبة.
- **tactile a.** **عَمَةُ لَمْسِيّ.** عدم المقدرة على التعرف على المراد والأشياء الاعتيادية باللمس والتحسس.
- **taste a. (= taste blindness)** **عَمَةُ التَّذَوُّقِ.** عدم المقدرة على التعرف والتفريق بين الأذواق المختلفة للأطعمة والمشروبات.
- **time a.** **عَمَةُ الزَّمَنِ.** عدم المقدرة على إدراك توالي الأحداث أو تسلسلها أو مددها.
- **topographical a.** **عَمَةُ طُبُوغَرَاْفِيّ.** عدم المقدرة على التعرف على الطريق حتى في المناطق الاعتيادية المعروفة.

- visual a.** عَمَة إبْصَارِيّ. عدم المقدرة على التعرف على الأشياء والمواد الاعتيادية بمجرد النظر إليها.
- visuospatial a.** عَمَة إبْصَارِيّ حَيْزِيّ. نوع من العمه البصري لا يتمكن المصاب به من إدراك موضع جسمه أو أقسام منه أو موضع المواد والأشياء في محيطه ولا يتمكن من التفريق بين اليمين واليسار فيؤدي ذلك إلى فقدان البصر التجسيمي وطُبوغرافية المحيط.
- agnosic, agnostic** عَمَهِيّ. منسوب للعمه أو مصاب أو متصف به.
- agonist** نَاهِضَة. (ج: نَاهِضَات). 1. عضلة تعمل بمفردها أو بالتعاون مع أخريات لتولد حركة العضو، وعادة ما يولد تقلصها هذا ارتخاء أو انبساط العضلات الضادة 2. دواء له القدرة على تنبيه فعالية فيزيولوجية بتأثيره على المستقبلات الخلوية التي عادة ما تنبئها مواد فيزيولوجية طبيعية.
- agony** 1. أَلَم شَدِيد 2. اِحْتِصَار؛ نَزْع. 1. أَلَم أو معاناة شديدة 2. نزعات الموت
- agoraphobia** رُهَابُ السَّاح. الخوف اللامسبب من الساحات والافضية المفتوحة وخصوصاً عند وجود المصاب فيها بمفرده فيبقى المصاب به في بيته حيث تنتابه نوبات قلق شديد بمجرد التفكير بوجوده في الساحات.
- agrammaphasia** حُبْسَة عِبَارِيَّة. انظر aphasia, syntactical.
- agrammatica (= agrammatism)** حُبْسَة نَحْوِيَّة؛ حُبْسَة لُغَوِيَّة.
- agrammatism** حُبْسَة نَحْوِيَّة؛ حُبْسَة لُغَوِيَّة. عدم المقدرة على التكلم بطريقة لغوية صحيحة بسبب آفة أو مرض دماغي.
- agrammatologia (= agrammatism)** حُبْسَة لُغَوِيَّة.
- agranular cortex** القِشْرَةُ اللَّامُحْبِبَة. انظر cortex.
- agraphia** تَعَذُّرُ الْكِتَابَة. عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة بسبب آفة أو مرض في القشرة المخية.
- absolute a.** تعذر الكتابة المطلقّة. عدم المقدرة حتى على كتابة حرف واحد.
- acoustic a.** تعذر الكتابة السَمْعِيَّة. عدم المقدرة على كتابة الكلام المسموع.
- a. amnemonica** تعذر الكتابة الرّاطِنة. القدرة على كتابة الحروف والكلمات ولكن دون ترتيبها بنظام يدل على معنى أو فكرة معينة.
- a. atactica (= absolute a.)** تعذر الكتابة المُطْلَقَة.
- cerebral a. (= mental a.)** تعذر الكتابة المُخَيَّة.
- jargon a. (= a. amnemonica)** تعذر الكتابة الرّاطِنة.
- literal a.** تعذر الكتابة المُطْلَقَة. عدم المقدرة على كتابة الحروف اللفظية.
- mental a.** تعذر الكتابة العَقْلِيَّة. عدم المقدرة على وضع الجمل والمقاطع للتعبير عن الأفكار.
- motor a.** تعذر الكتابة الحَرَكَتِيَّة. عدم المقدرة على الكتابة بسبب ضعف التنسيق الحركي لليد والاصابع.
- musical a.** تعذر الكتابة المُوسِيقِيَّة. عدم المقدرة على كتابة النغمات الموسيقية.
- optic a.** تعذر الكتابة البَصَرِيَّة. عدم المقدرة على استنساخ الكلمات المقروءة مع عدم تأثر المقدرة على كتابة الكلمات المسموعة.
- sensory a.** تعذر الكتابة الحِسِّيَّة. عدم المقدرة على الكتابة لعدم فهم لغة الكلمات.
- verbal a.** تعذر الكتابة الكَلِمِيَّة. المقدرة على كتابة الحروف منفصلة ولكن دون المقدرة على ضمها لبعضها لتكوين الكلمات وكتابتها.
- agraphic** متعلّق بتعذر الكتابة. ما ينسب إلى تعذر الكتابة أو الإصابة بها.
- agromania** هَوَسُ الْإِنْفَرَاد. هوس الانفراد والتجول في الحقول وحيداً.
- agrypnia (= insomnia)** أَرْق. عدم القدرة على النوم.
- agrypnocoma** سُبَاتٌ سَهْرِيّ. وَسَن مع اليقظة والبهذيان.
- agrypnocoma** مُوقِظ. عامل يسبب اليقظة.
- agrypnocoma** مُوقِظ. عامل يسبب اليقظة.



agraphia

منظران للوجه الجانبي (أ) وللوجه الإنسي (ب) للمخّ يبينان بعض باحاته (المرقمة بأرقام باحاته التي تقوم بوظائف الكلام فيه) وتظهر فيهما الأعراض التي تتولد عند إصابة هذه المناطق أو تلفها:

تعذر الكتابة (agraphia) التكليف أمام المركزي إلى الأمام من باحة اليد والأصابع.

تعذر القراءة (alexia) عمه الكلمات (word blindness)

صمم الكلمات (word deafness)

حبيسة تعبيرية (expressive aphasia) في منطقة بروكا للكلام

agyiophobia رَهَابُ السَّاحِ.
 أنظر agoraphobia.

agyria إِنْغِذَامُ التَّلَافِيفِ. سوء تكون تلافيف
 الدماغ وشقوقه مع صغر الدماغ.

ahylognosia عَمَةُ اللَّفْسِ. عدم المقدرة على
 معرفة تكوين المواد والأشياء باللمس.

ahypnia (= ahypnosis) سَهَارٌ.
 سَهَارٌ. الأرق الشديد وعدم

ahypnosis المقدرة على النوم.

aichmophobia رَهَابُ الْمُسْتَدَقَاتِ. رهاب
 الأدوات والأجسام الحادة.

aid عَوْنٌ. (ج: أَعْوَانٌ). المساعدة التي توفرها
 أية آلة أو جهاز لتحسين أو تقويم أي من وظائف
 الجسم.

- first a. الإِسْعَافُ الْأَوَّلِيُّ. العناية الأولية
 التي تقدم للمصاب في حالات الطوارئ أو الإصابات
 بالنباتات المرضية.

- hearing a. عَوْنٌ سَمْعِيٌّ. آلة تستعمل لتحسين
 السمع بتضخيم الصوت للأشخاص الصم.

- speech a. عَوْنٌ لُفْظِيٌّ. آلة أو علاج يستعمل
 لتقويم النطق.

ailurophilia هَوَسُ الْهَيْرَةِ. الحب المفرط
 للقطط.

ailurophobia رَهَابُ الْهَيْرَةِ. الخوف
 المفرط من القطط.

air encephalography تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ
 الْهَوَائِيِّ. أنظر encephalography.

akatamathesia تَعَذُّرُ الْفَهْمِ. عدم الاستطاعة
 على الفهم والإدراك.

akatanoesis تَعَذُّرُ فَهْمِ الذَّاتِ. عدم
 استطاعة المريض على فهم نفسه.

akathisia (= acathisia) 1. قُمَاصٌ
 2. تَعَذُّرُ الْجُلُوسِ. 1. حالة عدم استقرار حركي
 تدفع المريض إلى الحركة الدائمة وعدم التوقف أو
 الجلوس 2. عدم المقدرة على الجلوس إذ يولد ذلك
 قلقاً شديداً للمصاب.

akatizia قُمَاصٌ؛ تَعَذُّرُ الْجُلُوسِ. أنظر
 akathisia.

akinesia 1. تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ؛ اللأحركية 2. شَلْلٌ
 الْحَرَكَةِ. 1. عدم المقدرة أو ضعف الحركة 2. شلل

العضلات المؤقت الذي يولده زرق البروكاثين فيها.

- a. algera تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ الْأَلْمِيِّ. نوع من الهستيريا
 يتصف بالعم عند أي حركة للجسم أو أقسامه.

- a. amnestica تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ النَّسَاوِيِّ. عدم
 الحركة بسبب عدم استعمال العضلات.

- cerebral a. تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ الْمُخِّي. عدم
 المقدرة على الحركة بسبب آفة مخية.

- reflex a. تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ الْإِنْعِكَاسِيِّ. فقدان
 الحركات الانعكاسية.

- spinal a. تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ النَّخَاعِيِّ. عدم المقدرة
 على الحركة بسبب آفة في النخاع الشوكي.

akinesis (= akinesia) تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ.

akinesesthesia فقد حسَّ الْحَرَكَةِ.
 فقدان حس وإدراك الحركات.

akinetic متعلق بتَعَذُّرِ الحركة؛ لا حَرَكَيٌّ.
 منسوب إلى تَعَذُّرِ الحركة أو متصف بها أو مسبب
 لها.

- a. autism ذاتويَّة تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ. أنظر autism.

- a. epilepsy صَرْعٌ تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ. أنظر epilepsy.

- a. mutism صُمُوتٌ تَعَذُّرُ الْحَرَكَةِ. أنظر mutism.

akoria النَّهْمُ؛ اللَّاشَبَعِيَّةُ. أنظر acoria.

ala جَنَاحٌ. بنية تشريحية شبيهة بالجناح.

- a. alba medialis (= area vestibularis)
 الْجَنَاحُ الْأَبْيَضُ الْإِنْسِيَّ. الباحة الدهليزية.

- a. cerebelli (= a. lobuli centralis)
 الْجَنَاحُ الْمُخِيخِيُّ. جناح الفصيص المركزي.

- a. cinerea (= trigonum nervi vagi)
 الْجَنَاحُ الرَّمَادِي. مثلث العصب المبهم.

- alae lingulae cerebelli أَجْنَحَةُ اللِّسَنِ
 الْمُخِيخِيِّ.

- a. lobuli centralis cerebelli جَنَاحُ الْفُصِصِي
 الْمَرْكَزِيِّ لِلْمُخِيخِ. الامتداد الوحشي نصف الكروي
 للفصيص المركزي للمخيخ.

alalia بَكَامَةٌ. ضعف القدرة على النطق.

- a. cophica (= deaf mutism)** بَكْم. عدم المقدرة على الكلام الذي يترافق مع الصمم.
- a. physiologica (= deaf mutism)** بَكْم؛ بَكَامَةٌ فِيزِيُولُوجِيَّة. بَكَامَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ. تأخر مقدرة الطفل على النطق.
- a. prolongata** بَكَامَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ. تأخر مقدرة الطفل على النطق.
- alalic** أَلِيكَم؛ بَكَامِي. شخص مصاب بالبكامة أو ما يتعلق بها.
- alar** جَنَاحِي. متعلق بالجنح أو شبيه به.
- alcholemla** وجود الكحول في الدم.
- alcoholic** كُحُولِي. متعلق بالكحول أو مصاب بالكحولية.
- alcoholism** الكُحُولِيَّة. اضطراب مرضي يتصف بسوء استعمال الكحول مما يولد اختلالاً اجتماعياً ومهنياً للمصاب به.
- acute a.** الكُحُولِيَّةُ الحَادَّة. السكر الشديد الناتج عن تعاطي كميات كبيرة من الكحول فيولد اللاتناسق العضلي والتخليط العقلي.
- chronic a.** الكُحُولِيَّةُ المُزْمِنَةُ. حالة مرضية تتولد عن تعاطي الكحول لمدة طويلة فتسبب القهم وضعف الشهية والإسهال وفقدان الوزن وتنكس الكبد واضطرابات شديدة في الجهاز العصبي.
- alcoholomania** هَوَسُ الكُحُول. الهوس المستمر في تعاطي الكحول.
- alcoholophilia** وَلَعُ الكُحُول. الهوس المستمر في الرغبة في تعاطي الكحول.
- alemmal** لَاغْمَدِي. ليف عصبي غير مغمد.
- alert** يَقِظ؛ مُنْتَبِه. متحسس للمتغيرات في المحيط.
- alertness** يَقِظَةٌ؛ اِنْتِبَاه. التحسس بالمتغيرات في المحيط.
- alethia** عَدَمُ النِّسيَان. عدم نسيان بعض الحوادث أو الذكريات بالرغم من رغبة الشخص في نسيانها.
- alexia (= word blindness)** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ حُبْسَةُ الْقِرَاءَةِ. نوع من الحبسة التي تتصف بعدم المقدرة على قراءة الكلمات المكتوبة بسبب آفة مخية.
- agnostic a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْعَمَقِيَّة. لا قرائية تتسبب عن عدم مقدرة المصاب على فهم معاني الكلمات المكتوبة أو المطبوعة أو الرموز.
- aphasic a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْحُبْسِيَّة. لا قرائية تتصف بمقدرة المريض على قراءة الكلمات ولكن من دون إدراك أو فهم معانيها.
- cortical a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْقَشْرِيَّة. نوع من الحبسة الحسية التي تنتج عن آفة في التلفيف الزاوي الأيسر.
- motor a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْحَرَكِيَّة. لا قرائية تتصف بقابلية المريض على فهم الكلمات المكتوبة أو المطبوعة ولكن من دون المقدرة على قراءتها بصوت عالٍ.
- musical a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْمُوسِيقِيَّة. عدم المقدرة على قراءة النغمات الموسيقية.
- occipital a. (= word blindness)** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الْقَذَالِيَّة. اللاقرائية القذالية.
- optic a. (= word blindness)** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ عَمَى الْقِرَاءَةِ. اللاقرائية البصرية.
- semantic a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ الدَّلَالِيَّة. اللاقرائية التي يتمكن المصاب بها من القراءة بصوت عالٍ من دون أن يفهم دلالة الكلمات التي يقرأها.
- sensory a. (= word blindness)** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ عَمَى الْقِرَاءَةِ. اللاقرائية الحسية.
- subcortical a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ تَحْتَ الْقَشْرِيَّة. اللاقرائية التي تتولد عن انقطاع الاتصال بين المراكز البصرية والتلفيف الزاوي للمخ.
- tactile a.** تَعَدُّرُ الْقِرَاءَةِ اللَّعْسِيَّة. عدم مقدرة الأعمى على قراءة كتابة بريـل.
- alexia** متعلّق بتَعَدُّرِ الْقِرَاءَةِ. متعلّق أو مصاب باللاقرائية.
- alexithymia** تَعَدُّرُ التَّفْهِيْمِ العاطفي. عدم مقدرة الشخص عن التعبير عن عواطفه بالكلام.
- alganesthesia** تَسْكِين. انظر analgesia.
- algesia (= hyperesthesia)** تَأَلْم؛ فَرْط جِسِّ الأَلْم. تحسس ألمي مفرط.
- algesic** مُؤَلِم.
- algесichronometer** مَقْيَاسُ زَمَنِ التَّأَلْم.

آلة تستعمل لقياس الزمن اللازم لإدراك حس الألم بعد التنبيه. ويسمى أيضاً مقياسية الألم.

algesimeter مقياس الألم. آلة تستعمل لقياس درجة الحساسية للألم الذي يولده وخز بأبرة حادة.

algesimetry قياس الألم. قياس الألم بمقياس الألم.

algesiogenic مؤلم؛ مؤلّد الألم. عامل يولد الألم.

algesiometer مقياس الألم. أنظر algesimeter.

algesthesia حس الألم؛ الألم. أنظر sensation, pain.

algesthesis حس الألم؛ إدراك حس الألم. أنظر algesthesia.

algetic مؤلم. ما يولد حس الألم.

algiomotor حركي ألمي. ما يولد حركة مؤلمة مثل التشنج العضلي.

algiomuscular عضلي ألمي. ما يولد حركة عضلية مؤلمة.

algiovascular وعائي ألمي. فعل وعائي يتولد عن تنبيه مؤلم.

algoceptor مستقبل الألم.

algogenesis (= algogenesis) توليد الألم؛ إيلام. عملية توليد الألم.

algolagnia شبق ألمي. اضطراب جنسي نفسي يتصف بالتلذذ بالألم أو بإحداث الألم النفسي أو الجسدي للشريك الجنسي.

- active a. السادية. أنظر sadism.

- passive a. المازوخية. أنظر masochism.

algology علم الألم. العلم الذي يبحث موضوع الألم.

algometer (= algesiometer) مقياس الألم. مقياس الألم.

algophilia (= masochism) المازوخية. ولع الألم.

algophily (= algophilia) المازوخية.

algophobia رهَابُ الألم. الخوف المبالغ من الألم.

algopsychalia (= psychalgia) ألم نفسي. ألم في الرأس عادة يدرك بأنه ألم عاطفي المنشأ والذي يترافق مع أفكار مؤلمة ووساوس أو أهلاس. وعادة ما يوصف بأنه ألم نفساني المنشأ أو هستيري.

algospasm تشنُّج مؤلم. تشنُّج عضلي مؤلم.

alienation تغرُّب؛ غربة. 1. التغرُّب عن المجتمع وشعور المصاب بأنه غريب عنه ومنبوذ منه. 2. التغرُّب عن الذات وفقدان الهوية الشخصية لها. 3. انفصام العواطف عن الشعور والأفكار الذاتية للمصاب.

- mental a. شذوذ عقلي. أي نوع من أنواع الشذوذ العقلي.

aliquorrhea (= hypoliquorrhea) قلة السائل الدماغي النخاعي. النقص المزمن للسائل الدماغي النخاعي.

allachesthesia (= allesthesia) حس نازح.

allele الليل. الشكل البديل للجين الذي يمكن أن يحتل موقعاً معيناً في الصبغي. ويوجد في صبغيات الإنسان الضعفانية أليلان واحد من كل منهما على أحد الصبغيين الضعفانيين.

allergen مُستأرج. مادة مستضدية تتمكن من توليد نوع مباشر من فرط الحساسية أو الأرجية.

allergic أرجي. متعلق بالأرجية أو مؤلّد عنها أو مصاب بها أو ذات طبيعة أرجية.

allergy أرجية. حالة فرط الحساسية المستحثة بالتعرض للمستضد (الأرج) مما يولد استجابة مناعية ضارة عند التعرض لها في مرات لاحقة.

allesthesia حس نازح. حالة الشعور بالحس وإدراكه في منطقة بعيدة عن النقطة المنبهة.

alleviant (= palliative) مُسكِّن. دواء أو مادة تهدئ الألم.

alliteration حُبْسَة جناسية. خلل التلفظ الذي يستعمل فيه المصاب كلمات تحوي مقاطع متماثلة أو تبدأ بحروف متماثلة.

- allochesthesia** حسُّ نَازِح. أنظر allesthesia.
- allochiria** حسُّ مُقَابِلِ التَّوَضُّع. حالة الحس في أحد الأطراف عند تنبيه الطرف المعاكس له.
- allocinesia** حَرَكَةٌ مُرَاتِبَةٌ. حالة تحريك المريض لطرف معاكس للطرف الذي وجهت إليه الإشارة الإرادية.
- allocortex** القَشْرَةُ العَرِيقَةُ. قشرة المخ الأولية الأصلية التي تشمل القشرة البدائية والقشرة القديمة.
- allodynia** وَجَعٌ جَلَافِي. ألم يتولد عن التنبيه بمنبه غير مؤلم وغير مؤذ عادة.
- alloeroticism (= alloerotism)** شهوانية الغير؛ شَبَقٌ جَلَافِي. حس جنسي موجه لشخص آخر مرافق.
- alloesthesia (= allesthesia)** حسُّ نَازِح.
- allograft** طُعْمٌ مِثْلِي. غرس طعم نسيجي (أو عصبي) ينقل بين أفراد من نوع واحد ولكنهم ذوي أنماط جينية متباينة.
- allokinesis** حَرَكَةٌ مُرَاتِبَةٌ. حركة أحد الأعضاء لا إرادياً ولكنها تتم بصورة انعكاسية أو بصورة منفصلة في أحد الأطراف مقلدة حركة الطرف المقابل.
- allolalia** خَلَلُ النُّطْق. خلل النطق الناتج عن آفة مركزية.
- allophasia (= delirium)** هَذَرٌ؛ هَذْيَان. كلام غير مترابط.
- allopsychosis** دُهَانٌ إِدْرَاقِي. خلل إدراك المحسوسات الخارجية من دون أي خلل حركي في العضلات بصورة خاصة.
- all or none law** قَانُونُ الكُلِّ أَوِ العَدَم. القانون الذي ينص على أن الليف العصبي الواحد إما أن يستجيب للمنبه بأقصى قابليته أو أن لا يستجيب له بالمرّة. وينطبق هذا القانون على العضلة القلبية أيضاً.
- allotriogeusia** غَرَابَةُ المَذَاق. شذوذ في حس الذوق.
- alogia** صُمَات؛ خَرَسٌ. عدم المقدرة على النطق بسبب آفة مركزية.
- alpha adrenergic receptor** مُسْتَقْبِلَةُ ألفا الأدرينالينية الفِعل. أنظر receptor.
- alpha motor neuron** عَصَبُونُ ألفا الحَرَكَي. أنظر neuron.
- alpha receptor** مُسْتَقْبِلَةُ ألفا. أنظر receptor.
- alpha rhythm** نَظْمُ ألفا. أنظر rhythm.
- alpha wave** مَوْجَةُ ألفا. أنظر wave.
- alveus communis** القُرْبِيَّة. أنظر utriculus.
- alveus hippocampi** شَكْوَةُ الحُصَيْن. غَالِيَةُ الحُصَيْن. الطبقة الرقيقة من المادة البيضاء التي تغطي سطح بُطين الحصين.
- alysmus** قَلَقُ المَرَض. القلق الذي ينتاب المريض حول مرضه.
- amacrine cell** خَلِيَّةٌ لَا مِخَوَارِيَّة. أنظر cell.
- amantadine hydrochloride** هيدزوكلوريد الأمانتادين. دواء يستعمل في علاج داء باركنسون لأنه يحفز إفراز الدوبامين المضاد لخلل الحركة.
- amathophobia** رُهَابُ الغُبَار. فرط التخوف من الغبار.
- amaurosis** كُمُتَّة. (ج: كُمُتَات). عمى خصوصاً ذلك الذي لا يترافق مع آفة في العين.
- central a.** كُمُتَّةٌ مُرَكِّزِيَّة. كمة تتسبب عن آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- cerebral a.** كُمُتَّةٌ مُخِّيَّة. كمة تتسبب عن مرض قشرة المخ أو الدماغ.
- a. fugax** كُمُتَّةٌ عَابِرَةٌ. عمى تام أو جزئي وقتي في إحدى العينين يدوم لبضعة دقائق.
- hysterical a.** كُمُتَّةٌ هِسْتِيرِيَّة؛ كُمُتَّةٌ هُرَاعِيَّة. كمة في إحدى العينين أو في كليهما من دون سبب عضوي ظاهر.

amaurotic idiocy عَمَى كَمَنِي. انظر idiocy.

amaxophobia رُهابُ العَرَبَات. الخوف من ركوب المركبات أو التنقل بها.

ambidexter أَصْبَط. شخص يتمكن من القيام بالأعمال الدقيقة باليدين بطريقة متساوية.

ambilateral بِالْجَانِبَيْن. متعلق بالجانبين أو يؤثر بهما سوية.

ambliopia (= diplopia) شَفَع: إزدواجُ الرؤية. إبصار مزدوج للأجسام المرئية.

ambisexual 1. ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّة 2. متصل بالجنسين. 1. من يمتلك الصفات الجنسية الثانوية المشتركة بين الجنسين كشعر العانة. 2. من له ميل جنسي للذكور والإناث.

ambivert مُتَكَافِيءُ المِرَاج. شخص وسط بين المنبسط والمنطوي على ذاته.

amblyaphia ضَعْفُ اللَّمْس. ضعف حس اللمس.

amblygeusia ضَعْفُ الذَّائِقَةِ. ضعف حسن الذوق.

amblyopia عَمَش. ضعف أو انعدام البصر من دون وجود آفة ظاهرة في العين.

ambosexual 1. ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّة 2. متصل بالجنسين. انظر ambisexual.

ambulant سَائِر. ماشي أو يمكنه المشي.

ambulation السَّيْر. عملية المشي.

ambulatory سَائِر؛ سَيْرِي. انظر ambulant.

amenomania هَوَسٌ مَرَحِي. الطور الهوسي في داء الذهان الهوسي الاكتئابي.

amenorrhea ضَهْي. انقطاع الحيض الشاذ.

- hypothalamic a. ضَهْي وِطَائِي المنشأ. انقطاع الحيض بسبب آفة أو اضطراب وِطَائِي.

ament أَهْمِل. شخص مصاب بالهبل أو بالتخلف العقلي.

amentia هَبْل. 1. تخلف عقلي شديد 2. المرحلة الانتهازية من الخرف التنكسي.

amiculum olivare كُسْوَةُ الرُّيْتُونَةِ. محفظة مكونة من الياف مغمدة تحيط بالنواة الزيتونية الدنسية.

amimia تَعَذُّرُ الإِيْمَاء. فقدان قدرة التعبير بالإشارة أو الإيماء.

- amnesic a. تَعَذُّرُ الإِيْمَاء النَّسَاوِي. المقدرة على الإيماء والإشارة من دون معرفة معانيها ودلالاتها.

- receptive a. تَعَذُّرُ الإِيْمَاء الإدراكي. عدم معرفة أو فهم معاني الإيماءات أو الإشارات أو التعبيرات التي تصدر من الآخرين.

amitriptyline hydrochloride

هَيْدُرُوكُلُورِيد الأَمِيتْرِپْتِيلِين. دواء مضاد الاكتئاب يؤخذ بالفم أو يزرق بالعضل.

Ammon's horn قَرْنُ آمُون؛ الحُصَيْن. انظر hippocampus.

amnalgesia نَسْكِينُ إِنْسَائِي. طريقة معالجة لا يترك فيها مجال للمريض لتذكر أي ألم أو ضائقة تتولد له خلالها، وذلك باستعمال المسكنات أو المخدر أو التنويم.

amnemonic نَسَاوِي؛ مُفَقِّدُ الذَّاكِرَةِ، فَاقِدُ الذَّاكِرَةِ. انظر amnesic.

amnesia نَسَاوَةٌ؛ فَقْدُ الذَّاكِرَةِ. عدم المقدرة على تذكر التجارب السابقة.

- affective a. (= elective a.) فَقْدُ الذَّاكِرَةِ العاطفي.

- anterograde a. فَقْدُ ذَاكِرَةِ لَاحِقٍ؛ فَقْدُ الذَّاكِرَةِ القداماني. نساوة التجارب والذكريات للامور التي تحدث بعد بدء نوبة النساوة وعدم المقدرة على تكوين ذكريات جديدة عنها.

- anteroretrograde a. فَقْدُ الذَّاكِرَةِ القداماني والرجعاني؛ نَسَاوَةٌ اللَّاحِقِ والسَّابِقِ. نساوة الأحداث التي تلحق بإصابات الرأس أو آفات المخ التي تولد النساوة مع نساوة الأحداث التي تسبق الإصابة مباشرة.

- auditory a. حُبْسَةٌ سَمْعِيَّة؛ فَقْدُ الذَّاكِرَةِ السمعي. انظر word deafness.

- autohypnotic a. فَقْدُ الذَّاكِرَةِ الذَاتِي؛ نَسَاوَةٌ ذَاتِيَّة. كبت بعض الذكريات المحفوظة بالذاكرة لا شعوريا.

- **Broca's a.** فقد الذاكرة بإصابة فصّ بَرْوَكَا. عدم المقدرة على تذكر معاني الكلمات.
- **catathymic a.** فقد الذاكرة والشعور؛ نَسَاوَةٌ لاشْعُورِيَّة. نساوة لاشعورية لكل شيء عن حادثة معينة.
- **circumscribed a.** فقد الذاكرة المحدّد؛ نَسَاوَةٌ مُحدَّدة. نساوة لكل الأحداث التي حدثت في فترة معينة محددة.
- **continuous a.** فقد الذاكرة المستمر؛ نَسَاوَةٌ مُستَمِرّة. نساوة لكل الأحداث التي حصلت بعد طارئ معين وتستمر حتى الآن.
- **elective a.** فقد الذاكرة الانتخابي؛ نَسَاوَةٌ إنتِخابِيَّة. نساوة لبعض الأحداث الخاصة المعينة وهي نوع من النساوة الهستيرية.
- **emotional a.** فقد الذاكرة الانفعالي؛ نَسَاوَةٌ إنْفِعالِيَّة. نساوة عاطفية المنشأ كالتي تحدث في الحالات الهستيرية بعد التعرض لكرب عاطفي شديد.
- **episodic a.** فقد الذاكرة العارض؛ نَسَاوَةٌ عَارِضَة. نساوة لفترة عارضة أو لجزء من تجربة معينة.
- **fixation a.** فقد الذاكرة التثبيتي؛ نَسَاوَةٌ تَثْبِيتِيَّة. نساوة لأحداث قريبة لعدم التمكن من تثبيتها بالذاكرة.
- **generalized a.** فقد الذاكرة العام؛ نَسَاوَةٌ عَامَّة. نساوة لكل الأحداث والتجارب التي مرت بحياة الفرد.
- **graphokinetic a.** فقد ذاكرة الكتابة؛ نَسَاوَةٌ الكِتَابَة. نساوة الحركات الكتابية مما يؤدي إلى تعذر الكتابة.
- **hysterical a.** فقد الذاكرة الهراعية؛ نَسَاوَةٌ هُرَاعِيَّة. نَسَاوَةٌ هِسْتِيرِيَّة. نساوة لا تتولد عن مرض دماغي عضوي أو عن اختلال الوظائف الدماغية، بل تتولد عن الهستيريا والرغبة اللاشعورية للهروب من حالة مرهقة.
- **incomplete a. (=lacunar a.)** فقد الذاكرة الناقص؛ نَسَاوَةٌ ناقِصَة.
- **infantile a.** فقد الذاكرة الطفلي؛ نَسَاوَةٌ طِفْلِيَّة. النساوة الطبيعية لحوادث وتجارب الطفولة الأولى للشخص.
- **lacunar a.** فقد الذاكرة الفتري؛ نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة. نساوة جزئية لبعض الحوادث أو لأجزاء منها أو لفترات متقطعة.
- **localized a. (=circumscribed a., lacunar a.)** 1. فقد الذاكرة المحدّد؛ نَسَاوَةٌ مُحدَّدة 2. نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة.
- **logophonic a.** فقد الذاكرة اللفظي؛ نَسَاوَةٌ لِفْظِيَّة. نساوة بعض الكلمات فتؤدي إلى حبسة الكلمات.
- **mimokinetic a.** فقد الذاكرة الإيمائي؛ نَسَاوَةٌ إِمَائِيَّة. نساوة التعبير عن العواطف بالإيماء فتؤدي إلى اللايمائية.
- **olfactory a.** فقد الذاكرة الشمي؛ نَسَاوَةٌ شَمِّيَّة. نساوة روائح بعض المواد.
- **organic a.** فقد الذاكرة العضوي؛ نَسَاوَةٌ عُضْوِيَّة. نساوة تتولد عن مرض عضوي.
- **patchy a. (= lacunar a.)** فقد الذاكرة الفتري؛ نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة.
- **phonokinetic a.** فقد الذاكرة التلفظي؛ نَسَاوَةٌ تَلْفَظِيَّة. نساوة حركات التلفظ فتؤدي إلى حبسة حركية.
- **postconcussional a.** فقد الذاكرة التالي للارتجاج؛ نَسَاوَةٌ تَالِيَّة لِلإِرْتِجَاج. نساوة تتولد عن ارتجاج الدماغ.
- **posthypnotic a.** فقد الذاكرة بالتنويم؛ نَسَاوَةٌ بِالتَّنْوِيم. نساوة التجارب التي يمر بها الشخص أثناء تنويمه.
- **post-traumatic a.** فقد الذاكرة التالي للرضح؛ نَسَاوَةٌ تَالِيَّة لِلرَّضْح. النساوة التي تتولد بعد ارتجاج الدماغ أو بعد رضوح الرأس وإصاباته.
- **psychogenic a.** فقد الذاكرة النفسي؛ نَسَاوَةٌ نَفْسَانِيَّة. نساوة فجائية لبعض الأحداث الشخصية الهامة، وهي عادة انتخابية ومحددة وغير مستمرة ولا تتسبب عن مرض عضوي أو عقلي ولكنها قد تتلر بعض الاضطرابات النفسية أو الكرب الشديد ويستعيد في العادة المصاب ذاكرته بعد فترة.
- **retarded a.** فقد الذاكرة بالتعويق؛ نَسَاوَةٌ بِالتَّعْوِيق. عدم المقدرة على الاحتفاظ ببعض

- الذكريات عن حوادث أو أفكار حصلت أثناء فترة شواش وتخليط فكري.
- **retroactive a. (= retrograde a.)** فقد ذاكرة السابق؛ نَسَاوَة السَّابِق، فقد الذاكرة الرجعاني.
- **retroantegrade a.** فقد ذاكرة السابق واللاحق؛ نَسَاوَة السَّابِق واللاحق. نساوة الأحداث التي سبقت الإصابة أو العارضة المخية وبعض الأحداث التي تلت ذلك.
- **retrograde a.** فقد ذاكرة السابق؛ نَسَاوَة السَّابِق. نساوة الأحداث والتجارب التي اكتسبت قبل بدء نوبة النساوة.
- **selective a.** فقد الذاكرة الانتقائي؛ نَسَاوَة إِنْتِقَائِيَّة. نساوة بعض الأحداث وليست كل الأحداث التي حدثت في نفس الفترة.
- **systematic a.** فقد الذاكرة النظامي؛ نَسَاوَة نِظَامِيَّة. نساوة مجموعة معينة من الأحداث.
- **tactile a. (= astereognosis)** فقد الذاكرة اللمسي، نساوة لمسية.
- **transient global a.** فقد الذاكرة الشاملة العابرة؛ نَسَاوَة شَامِلَة عَابِرَة. نساوة شاملة لفترة قصيرة قد تدوم بضع ساعات مع عدم وجود أية أعراض أو علامات أخرى لأي مرض عضوي أو اختلالات عصبية ولا يعرف سببها الذي قد يكون نوبة صرعية أو إقفار دماغي وقتي.
- **traumatic a. (= post-traumatic a.)** فقد الذاكرة التالي للرضح؛ نَسَاوَة تَالِيَة لِلرَّضْح.
- **verbal a.** فقد الذاكرة اللفظي؛ نَسَاوَة لَفْظِيَّة. نساوة بعض الكلمات.
- **visual a.** فقد الذاكرة البصري؛ تَعَذُّرُ القِراءَة. أنظر alexia.
- amnesiac** فَاقِدُ الذَّاكِرَة؛ نَسَاوِي. شخص مصاب بالنساوة.
- amnesic** فاقِد الذَّاكِرَة؛ نَسَاوِي. شخص مصاب بالنساوة أو ما يتصف أو يتعلق بالنساوة.
- amnestic (= amnesic)** نَسَاوِي. فاقِد الذَّاكِرَة، مفقَد الذَّاكِرَة.
- amorphognosia** عَمَة الشَّكْل. عدم المقدرة على معرفة شكل الأجسام.
- amorphosynthesis (= amorpho-**
gnosia) عَمَة الشَّكْل.

- amphetamine** دواء ينبه الجهازين العصبي المركزي والمحيطي، فهو يرخي العضلات القصبية ويهبط الضغطين الانبساطي والتقلصية ويقصص مصرة المثانة ويقلل الشهية.
- amphithymia** اَزْدَوَاجِيَّة المِزَاج. حالة نفسية تتصف بالاكتئاب والهوس.
- amphotony** اَزْدَوَاجِيَّة التَوَثُّر العَصْبِي. حالة تتصف بالتوتر الودي والمبهمي مع فرط توتر كل الجملة العصبية الودية.
- ampulla** امبُولَة. (ج. امبولات). مصطلح تشريحي عام يدل على انتفاخ حوجلي الشكل لبنية بيبيية.
- **anterior membranaceous a.** الامبُولَة الغشائية الأمامية. انتفاخ في إحدى نهايتي القناة الهلالية الامامية.
- **a. canaliculi lacrimalis** الامبُولَة نُفَيْقِي الدَّمْع. توسع في القنية الدمعية قبل انفتاحها في الكيس الدمعي.
- **posterior membranaceous a.** الامبُولَة الغشائية الخلفية. انتفاخ في إحدى نهايتي القناة الهلالية الخلفية.
- amuck (= amok)** سَعَارُ القَتْل؛ عُمُوك. إعتلال ذهني يتصف بفترة اكتئاب تتلوها محاولة قتل الآخرين وثم الانتحار.
- amusia** عَمَة المَوْسِيقِي. عدم المقدرة على توليد الانغام الموسيقية أو إدراكها.
- **motor a.** عَمَة المَوْسِيقِي الحَرَكَي. عدم المقدرة على توليد الانغام الموسيقية.
- **sensory a.** عَمَة المَوْسِيقِي الحِسِّي. عدم المقدرة على إدراك الانغام الموسيقية.
- amyasthenia (= amyosthenia, myo-athenia, myathenia)** وَهْنٌ عَضَلِي. ضعف العضلات.
- amyasthenic** وَاهِنُ العَضَل. مصاب بالوهن العضلي.
- amychophobia** رُهابُ الخَدَش. رهاب الخمش أو الخدش بمخالب القطط والحيوانات.

amyelencephalia إِنْْعِدَامُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.

حالة انعدام الدماغ والنخاع الشوكي خلقياً.

amyelencephalus عَدِيمُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.

مسيخ من دون دماغ ونخاع شوكي.

amyelia إِنْْعِدَامُ النُّخَاعِ. حالة انعدام النخاع

الشوكي خلقياً.

amyelic عَدِيمُ النُّخَاعِ. مسيخ من دون نخاع

شوكي خلقياً.

amyelinic عديم الميالين: عَدِيمُ الغِمدِ

النُّخَاعِيِّينِ. بنية أو ليف عصبي من دون غمد نخاعيني.

amyelonic 1. عَدِيمُ النُّخَاعِ 2. عَدِيمُ

النَّفَاقِ. 1. عديم النخاع الشوكي 2. عديم نقي العظام.

amyelotrophy ضُمُورُ النُّخَاعِ. ضمور

النخاع الشوكي.

amygdala لَوْزَةٌ. مصطلح تشريحي للدلالة

على بنية شبيهة باللوزة، ويستعمل أحياناً للدلالة على الجسم اللوزي في الدماغ.

اللَّوْزَةُ **- accessory a. (= tonsilla lingualis)**

الإضافيّة. اللوزة اللسانية.

لَوْزَةُ الْمُخَيِّحِ **- a. of cerebellum**

انظر tonsilla cerebelli.

amygdaloid body الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

انظر corpus amygdaloideum.

amyloid نَشَوَانِيّ. شبيه النشا.

amyloidosis نَشَاءٌ: الدَّاءُ النَشَوَانِيّ.

ترسب مواد نشوانية في أقسام مختلفة من الجسم.

نَشَاءٌ شَيْخُوخِيّ. **- senile a.** ترسب مواد

نشوانية في أقسام مختلفة من الجسم وفي الدماغ عند الشيخوخة.

amyoesthesia فَقْدَانُ الحِسِّ العَضَلِيّ.

فقدان أو قلة الحس العضلي.

amyoplasia قُصُورُ التَّعَضُّلِ. قصور

التكوّن العضلي.

قُصُورُ التَّعَضُّلِ الخَلْقِيّ. **- a. congenita** قصور

التكون العضلي العام مع تقلص العضلات وشوه المفاصل خلقياً.

amyostasia رُغَاشُ العَضَلِ. رعاش

العضلات الذي يشاهد بصورة خاصة في الرنح التحركي.

amyostatic مُرْتَعِشُ العَضَلِ. المصاب

برعاش العضل.

amyosthenia وَهْنٌ عَضَلِيّ. أنظر

amyasthenia.

amyotaxia رَنْجٌ. انظر ataxia.

amyotaxy رَنْجٌ. انظر ataxia.

amyotonia (= myatonia) وَثَنٌ عَضَلِيّ.

حالة فقدان التوتر العضلي.

amyotrophia (= amyotrophy) ضُمُورٌ

عَضَلِيّ.

- neuralgic a. (= neuralgic amyotrophy)

ضُمُورٌ عَضَلِيّ عَصَبِيّ مُؤَلِمٌ.

- a. spinalis progressiva ضُمُورٌ عَضَلِيّ

نُخَاعِيّ مُتَرَقٍّ. ضمور عضلي بسبب آفة في النخاع

الشوكي يزداد بمرور الأيام.

amyotrophy ضُمُورٌ عَضَلِيّ. ضمور العضلات.

- diabetic a. ضُمُورٌ عَضَلِيّ سَكْرِيّ. ضمور

العضلات المسبب عن داء السكري

ضُمُورٌ عَضَلِيّ عَصَبِيّ مُؤَلِمٌ. **- neuralgic a.**

ضمور عضلي يصاحبه ألم عصبي في المتكبين

والذراعين العلويين مع شلل عضلات حزام الكتف.

ضُمُورٌ عَضَلِيّ زَهْرِيّ (إِفْرَنْجِيّ). **- syphilitic a.**

الضمور العضلي الناتج عن داء الإفرنجي.

amymous مُعَوَّرُ العَضَلِ: فاقد العضل. عضو فيه

عضل قليل أو معدومه.

anabolism إِبْتِنَاء. العمليات الاستقلابية التي

تحول المواد الأولية إلى مركبات معقدة يحتاجها

الجسم في فعالياته الحيوية أو في بناء أنسجته.

anacatesthesia جِسْمٌ الحَوْمِ. الإحساس

بالحوم والطوفان في الفضاء.

anaclisis إِتْكَالٌ أُمُومِيّ: إِتْكَالٌ. 1. اعتماد

الطفل المادي والعاطفي المفرط على رعاية أمه له

مما يؤثر على تطوره، وقد يؤدي حرمانه من ذلك

إلى أثر عكسي 2. إتكال الشخص على عطف

الآخرين نحوه.

anacritic اِنْتِكَالِيْ اُمُوْمِيْ. طفل يتصف بالانتكال الامومي أو شخص يتصف بالانتكال العاطفي على الآخرين.

anacusia (= anacusic) وَقْر. الصمم التام.

anadipsia سَهَاف. العطش الشديد.

anagnosasthenia صُعُوْبَةُ الْقِرَاءَةِ. الصعوبة التي يعانيها الشخص العُصابي عند القراءة.

anagoge, anagogy امثولة النَّفْس، الضمير؛ قدوة النفس. الناحية الوجدانية المثالية للنفس، المتعلقة بالقيم المثالية والروحية.

anagoric مُتَدَيِّن؛ مِثَالِي. شخص متمسك بالقيم المثالية والروحية.

anakatesthesia حِسُّ الْحَوَم. انظر anacatesthesia.

anakusia (= anakusis) وَقْر. انظر anacusia.

analeptic مُنْعَش. دواء يعمل كمادة منبهة للكافئين والامتفامين.

analgesia 1. تَسْكِين 2. بُطْلَانُ الْأَلَم. 1. التفريغ عن الألم من دون فقدان الوعي 2. غياب حس الألم وخصوصاً عند التنبيه بمنبه مؤذ.

a. algera (= a. dolorosa) أَلَمُ الْجُزْءِ الْمُخَدَّر. الشعور التلقائي بالألم في منطقة من الجسم مخدرة أو مزالة الاعصاب.

conduction a. بُطْلَانُ الْأَلَمِ التَّوَصِيلِي. غياب الألم في منطقة من الجسم بتخدير العصب الحسي الذي يغذيها بمخدر.

continuous caudal a. تَسْكِينٌ دَائِبِيٌّ مُسْتَمَر. التفريغ عن ألم الطلق والولادة بالإرواء المستمر للصفيرتين العجزية والقطنية في الحيز فوق الجافية بمحلول مادة مخدرة.

a. dolorosa أَلَمُ الْجُزْءِ الْمُخَدَّر. انظر analgesia algera.

electrical a. تَسْكِينٌ كَهْرَبَائِي. استعمال تيار كهربائي جيبي واطيء الفلطية لتنبيه بعض الاعصاب عبر الجلد لتسكين بعض المتلازمات المؤلمة.

epidural a. تَسْكِينٌ حَوْلَ الْجَافِيَّة. تسكين

ألم أو تخدير قسم من الجسم بحقن مادة مخدرة في الحيز خارج الجافية في القناة الفقارية.

hysterical a. بُطْلَانُ الْأَلَمِ الْهِسْتِيرِي. فقدان حس الألم في منطقة من الجسم لسبب هراعي من دون وجود أية آفة عضوية.

infiltration a. تَسْكِينٌ إِرْتِشَاحِي. تخدير بعض النهايات العصبية برشح محلول مخدر تحت الجلد في منطقة المداخلة الجراحية.

narcolocal a. تَسْكِينٌ مُوَضِعِي. التسكين الموضعي الذي يتولد في منطقة محددة قبل تنبيهه بسبب المداواة قبل التبنجية المسبقة.

a. panaris دَاحِسٌ مُخَدَّر. داحس غير مؤلم في إصبع المصاب بتكهف النخاع.

paretic a. بُطْلَانُ الْأَلَمِ الْخَرْلِي. فقدان حس الألم الذي يترافق مع الشلل الجزئي.

perineural a. تَسْكِينٌ حَوْلَ الْعَصَب. تسكين بترشيع محلول مخدر حول العصب الحسي.

permeation a. (= surface a.) تَسْكِينٌ سَطْحِي. تسكين بالاختراق.

relative a. تَسْكِينٌ نِسْبِي. نوع من التبنج العام غير التام يحتفظ فيه المريض بوعيه مع انعدام حس الألم أو نقصه لحدّ محتمل.

spinal a. تَسْكِينٌ نَخَاعِي. انظر epidural analgesia.

surface a. تَسْكِينٌ السَّطْح. تخدير سطحي بوضع مادة مخدرة على غشاء مخاطي كالعين والأنف والبلعوم والحنجرة والإحليل.

analgesic مُسْكِن؛ 1. عامل مفرج أو مخفف للألم 2. غير حساس للألم.

analgetic (= analgesic) مُسْكِن، مبطل الألم.

analgia بُطْلَانُ الْأَلَم. انعدام حس الألم.

analgic بَاطِلُ الْأَلَم. غير حساس للألم.

analgognosia عَمَةُ الْأَلَم.

anality الشَّرْجِيَّة. مجموع الصفات النفسانية الحسية والسلوكية الشخصية المستمدة من مرحلة التطور الجنسي النفسي الشرجي.

analysis تحليل. انظر psychoanalysis.

analyst مُحَلِّل. من يقوم بالتحليل النفسي أو غيره. انظر psychoanalyst.

anamnesis 1. إِذْكَار. 2. ذَكَائِر. 1. تَذَكُّر. 2. التاريخ المرضي الذي يصفه المريض وخصوصاً عن تاريخه الصحي قبل بدء المرض الحالي.

- associative a. إِذْكَارٌ اِوْتِبَاطِيٌّ. طريقة للحصول على التاريخ المرضي النفسي بمحاولة تمكين المريض من ربط أعراضه المرضية مع حالاته العاطفية وعلاقاته الشخصية مع الآخرين في محيطه.

anamnestic إِذْكَارِيٌّ. متعلق بالإذكار.

ananastasia (= astasia) تَعَدُّرُ الْوُقُوفِ؛ الْأَوْقُوفِيَّةُ. عدم المقدرة على الوقوف أو القيام من المقعد.

anancastic وَسْوَاسِيٌّ قَسْرِيٌّ. انظر obsessive-compulsive.

anandia صُمَات. انظر aphemia.

anaphia اِنْعِدَامُ حِسِّ اللَّمَسِ. نقص أو انعدام حس اللمس التام.

anaphrodisia اِجْفَار. فقدان الرغبة الجنسية.

anaphrodisiac مَجْفَرَةٌ. عامل أو دواء يثبِّط الباه أو الرغبة الجنسية.

anaplasia كَشَمٌ. فقد التمايز الخلوي.

anaptic فَاقِدُ حِسِّ اللَّمَسِ.

anarithmia فَقْدُ مَقْدَرَةِ الْعَدِّ. انعدام المقدرة لى الحساب أو العد بسبب آفة مركزية.

anarthria تَعَدُّرُ النُّطْقِ؛ عُقْلَةٌ. رَثَّة أو عسر التلفظ الشديد.

- a. literalis تَأَتَاة. انظر stuttering.

anastomosis, crossed nerve مُفَاعَرَةٌ عَصَبِيَّةٌ تَصَالُبِيَّةٌ. قطع عصبين وربط القسم المركزي من كلٍ منهما مع القسم الطرفي للعصب الآخر.

andromania غُلْمَةٌ. فرط الرغبة الجنسية عند النساء. انظر nymphomania.

1. مُجَبِّ. 2. مُجَبُّ الذُّكُور. 1. تفضيل البشر على باقي الحيوانات. 2. الرغبة الجنسية نحو الذكور.

androphobia رُهَابُ الذُّكُور. الخَوْف من الذكور أو بغضهم.

anelectrotonus تَوَثُّرٌ مَضْعِدِيٌّ. نقص هَيُوجِيَّة العصب تحت منطقة المصعد عند مرور الدفعة العصبية في العصب.

anemophobia رُهَابُ الرِّيح. الخوف الشديد غير المبرر من الرياح.

anencephalia اِنْعِدَامُ الدُّمَاغ. انظر anencephaly.

anencephalus (= anencephalous) عَدِيمُ الدُّمَاغ. شذوذ خلقي يتصف بانعدام قبو القحف ونصف كرة المخ أو بوجود آثار قليلة لهما ملتصقتان بقاع القحف.

anepithymia اِنْعِدَامُ الشَّهْيَةِ. انعدام الشهية للطعام.

anerethisia قَلَّةُ الْهَيُوجِيَّة. قلة هَيُوجِيَّة البنية الهیوجة.

anergia اِسْتِغْفَال. تعطل.

anergic غَاطِل. 1. غير فعال. 2. واهن. 3. تعطل.

anergy اِسْتِغْفَال. وُهْنٌ، قلة الطاقة والتعطل.

anesthescinesia, anesthekinesia فَقْدَانُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ. فقدان الحس والقدرة على الحركة.

1. تَبْنِيَج؛ تَخْدِير. 2. خَدَرٌ. فقدان الإحساس أو الحس بصورة عامة ويستعمل المصطلح بصورة خاصة لفقدان حس الألم والذي يولد للتمكن من القيام بالمداخلات الجراحية.

- angiospastic a. خَدَرٌ بِانْقِبَاضِ الْأَوْعِيَّة. خدر يتولد عن تشنج الاوعية الدموية.

balanced a. تَبْنِيَجٌ مُتَوَازِن. تبنيج يولد باستعمال عدة مبهجات بكميات كافية من كل منها لإحداث التأثير الامثل من دون استعمال كميات كبيرة من احدهما تجنباً لاضراره غير المرغوبة.

- basal a. تَبْنِيَجٌ أَسَاسِيٌّ. تخدير اولي

- بمداواة المريض قبل التبنيج العميق، وبذلك يمكن تقليل الكمية اللازمة من المبنج الضروري للعملية.
- **block a.** تَبْنِيجٌ إِخْصَارِيٌّ. تبنيج موضعي. يتم بإحصار العصب الحسي المغذي للمنطقة المبنجة.
- **bulbar a.** خَدَرٌ بَصْلِيٌّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة في الجسر.
- **caudal a.** تَبْنِيجٌ عَجَزِيٌّ. تبنيج يولد بحقن المبنج في القناة العجزية.
- **central a.** خَدَرٌ مَرْكَزِيٌّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة مركزية في الجهاز العصبي.
- **cerebral a.** خَدَرٌ مُخِّيٌّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة في المخ.
- **closed a.** تَبْنِيجٌ مُغْلَقٌ. تبنيج إنشاقى بإعادة تنفس الغاز المبنج خلال جهاز مغلق يضاف إليه الأكسجين ويمتص منه ثاني أكسيد الكربون المولد.
- **colonic a.** تَبْنِيجٌ قَوْلُونِيٌّ. تبنيج يولد بحقن المبنج في المستقيم وإلى القولون.
- **combined a. (= balanced a.)** تَبْنِيجٌ مُتَوَازِنٌ.
- **compression a.** خَدَرٌ انْضِغَاطِيٌّ. خدر يتولد عن انضغاط العصب الحسي.
- **conduction a. (= regional a.)** تَبْنِيجٌ نَاجِيٌّ.
- **crossed a.** خَدَرٌ شِقِّيٌّ مُتَصَالِبٌ. انظر hemianesthesia cruciata.
- **dissociated a.** خَدَرٌ مُتَفَارِقٌ. فقدان بعض الحواس مع بقاء بعض الحواس الأخرى بحالة سليمة.
- **dissociation a. (= dissociated a.)** خَدَرٌ مُتَفَارِقٌ.
- **doll's head a.** خَدَرٌ رَأْسِ الدُّمِيَّةِ. خدر يصيب الرأس والرقبة والقسم العلوي من الصدر فقط.
- **a. dolorosa** خَدَرٌ مُؤْلِمٌ. ألم في منطقة خدراء.
- **electric a.** تَبْنِيجٌ كَهْرَبَائِيٌّ. تبنيج يولد بإمرار تيار كهربائي في المنطقة.
- **endobronchial a.** تَبْنِيجٌ دَاخِلُ الْقَصْبَةِ. تبنيج غازي تمرر المادة المبنجة فيه خلال أنبوب يوضع داخل إحدى القصبات الهوائية.
- **endotracheal a.** تَبْنِيجٌ دَاخِلُ الرُّغَامِيِّ.
- تبنيج غازي تمرر المادة المبنجة فيه خلال أنبوب يوضع داخل الرغامى.
- **epidural a.** تَبْنِيجٌ خَارِجُ الْجَافِيَّةِ. تخدير يولد بحقن المبنج في الحيز حول الجافية.
- **facial a.** خَدَرٌ وَجْهِيٌّ. فقدان الحس في الوجه، يتولد عن آفة في العصب الوجهي.
- **frost a.** تَبْنِيجٌ بِالتَّطْلِيحِ. تخدير يولد بتبريد المنطقة برشها بنفثات شديدة من غاز طيار.
- **gauntlet a.** خَدَرٌ قَفَّازِيٌّ. خدر يصيب اليد والمعصم بتوزيع قفَّازي الشكل.
- **general a.** تَبْنِيجٌ عَامٌّ. تبنيج الجسم كله مع فقدان الوعي وحس الألم من كل أنحاء الجسم مع ارتخاء العضلات التام أو الجزئي.
- **girdle a.** خَدَرٌ جِزَامِيٌّ. خدر يصيب المنطقة المحيطة بالحوض.
- **glove a. (= gauntlet a.)** خَدَرٌ قَفَّازِيٌّ.
- **gustatory a.** خَدَرٌ ذَوْقِيٌّ. فقدان حس الذوق.
- **hypnosis a.** تَبْنِيجٌ تَنَوِيْمِيٌّ. تبنيج يولد بعملية تنويم المريض.
- **hypotensive a.** تَبْنِيجٌ خَافِضٌ لِلضَّغْطِ. تبنيج يولد مع خفض ضغط الدم للتقليل من النزف.
- **hypothermic a.** تَبْنِيجٌ تَبْرِيدِيٌّ. تبنيج يولد بتخفيض درجة حرارة الجسم بصورة مقصودة.
- **hysterical a.** خَدَرٌ هُزَاعِيٌّ؛ خَدَرٌ هِسْتِيرِيٌّ. فقدان حس اللمس الذي يرافق بعض أنواع الهستيريا، ومن الممكن تشخيصه لعدم موافقة مواضعه مع مواضع انتشار العصب الحسي للمنطقة.
- **infiltration a.** تَبْنِيجٌ إِرْشَاحِيٌّ. تبنيج موضعي يولد برشح محلول المخدر حول نهايات العصب الحسي للمنطقة.
- **inhalation a.** تَبْنِيجٌ إِنْشَاقِيٌّ. تبنيج يولد باستنشاق مبنج طيار أو غازي.
- **insufflation a.** تَبْنِيجٌ نَفْخِيٌّ. تبنيج يولد بنفخ مزيج من غازات مبنجة أو من أخرة مبنج طيار خلال أنبوب يدخل إلى المجاري التنفسية.
- **intercostal a.** تَبْنِيجٌ وَرَبِيٌّ. تبنيج يولد بإحصار أحد الأعصاب الوربية (بين الضلعية).

1. **تَبْنِيَجْ** - **Intraspinal a. (= spinal a.)** نُخَاعِي 2. خَدَرٌ نُخَاعِي.
- Intravenous a.** تَبْنِيَجْ وَرِيدِي. تبنيج يولد بحقن المبنج داخل الوريد.
- local a.** تَبْنِيَجْ مَوْضِعِي. تبنيج موضع محدد من الجسم.
- lumbar epidural a.** تَبْنِيَجْ قَطْنِي خَارِجَ الْجَافِيَةِ. تبنيج يولد بحقن المبنج خارج الجافية في المنطقة القطنية للنخاع.
- mental a.** خَدَرٌ ذَهْنِي. فقدان القدرة على التعرف وإدراك الإحساسات.
- mixed a. (= balanced a.)** تَبْنِيَجْ مُخْتَلِط.
- muscular a.** خَدَرٌ عَضَلِي. فقدان الحس العضلي.
- nausea a.** فِقْدَانُ حِسِّ الْغَثِيَانِ. عدم الإحساس بالغثيان الذي تهبجه عادة المنبهات المؤذية أو المعقزة.
- nerve blocking a. (= regional a.)** تَبْنِيَجْ بِالْإِخْصَارِ الْعَصْبِي: تَبْنِيَجْ نَاجِي.
- olfactory a.** خُشَام. خدر شَمِي. أنظر anosmia.
- open a.** تَبْنِيَجْ مَفْتُوح. تبنيج إنشاقِي عام مفتوح.
- paraneural a.** تَبْنِيَجْ حَوْلَ الْعَصَب. تبنيج ارتشاقِي بحقن المبنج حول العصب الحسي.
- partial a.** خَدَرٌ جُزْئِي. خدر موضعي مع الاحتفاظ ببعض الإحساسات.
- peripheral a.** خَدَرٌ مُجِيطِي. فقدان الحس في منطقة من الجسم بسبب تغييرات أو آفة العصب الحسي المحيطي.
- permeation a.** تَبْنِيَجْ السُّطْح. تبنيج سطح الجسم أو العضو بوضع المبنج عليه مباشرة وعادة ما يوضع على سطح الغشاء المخاطي.
- pressure a.** تَبْنِيَجْ ضَغْطِي. تبنيج يولد بمبنج موضعي يضغط في النسيج.
- rectal a.** تَبْنِيَجْ مُسْتَقِيمِي. تبنيج يولد بحقن المبنج داخل المستقيم.



anesthesia, local

التخدير الموضعي: طريقة التخدير الموضعي بإحصار عصب إصبع اليد وإبهام القدم بحقن المخدر حول العصب المغذي لهما.

- **refrigeration a.** تَبْنِيجٌ تَتْلِيْجِي. تبنيج يولد باستعمال العاصبة وتبريد المنطقة لدرجة الانجماد تقريباً.

- **regional a.** تَبْنِيجٌ نَاجِي. تبنيج منطقة من الجسم بإحصار عصبها الحسي بطريقة حقن موضعي حول العصب.

- **segmental a.** خَدَرٌ قَطْعِي؛ خَدَرٌ جَذَرِي. خدر يتولد بقطع الجذور النخاعية.

- **spinal a.** 1. تَبْنِيجٌ نُخَاعِي 2. خَدَرٌ نُخَاعِي. 1. تبنيج يولد بحقن المبنى حول النخاع في الحيز تحت العنكبوتي 2. فقدان الحس بسبب آفة النخاع الشوكي.

- **splanchnic a.** تَبْنِيجٌ حَشَوِي. تبنيج يولد بحقن المبنى حول العقدة الهلالية.

- **subarachnoidal a. (= spinal a.)** تَبْنِيجٌ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة.

- **surface a. (= permeation a.)** تَبْنِيجٌ السَّطْح.

- **surgical a.** تَبْنِيجٌ جِرَاحِي. تبنيج عميق لدرجة يسمح بالمداخلة الجراحية من دون إيلام المريض.

- **tactile a. (= anaphia)** خَدَرٌ لَمْسِي. فقدان حس اللمس.

- **thermal a. thermic a.** خَدَرٌ حَرَارِي. فقدان حس الحرارة.

- **topical a. (= surface a.)** تَبْنِيجٌ سَطْحِي.

- **total a.** خَدَرٌ شَامِل. فقدان كل أنواع الحس في المنطقة.

- **traumatic a.** خَدَرٌ رَضَحِي. خدر ينتج عن إصابة رضحية للعصب.

- **twilight a. (= twilight sleep)** خَدَرٌ غَلَسِي؛ نَوْمٌ غَلَسِي.

- **unilateral a. hemianesthesia** خَدَرٌ شَقِي. انظر

- **visceral a.** خَدَرٌ حَشَوِي. فقدان الحس الحشوي.

anesthesimeter (= anesthesiometer)

1. مَقْيَاسُ التَّبْنِيجِ 2. مَقْيَاسُ الْخَدَرِ. آلة لقياس عمق التبنيج 2. آلة لقياس درجة الخدر.

1. بَنْجٌ؛ مُبْنَجٌ. (ج: مُبْنَجَات) **anesthetic** 2. تَبْنِيجِي؛ تَخْدِيرِي. 1. عامل أو دواء يستعمل لإزالة حس الألم. 2. متعلق بالتبنيج أو مولد له.

- **general a.** بَنْجٌ عَامٌ. عامل أو دواء يولد التبنيج العام.

- **local a.** بَنْجٌ مَوْضِعِي. دواء يولد تبنيجاً في موضع محدود من الجسم ويتم ذلك بحصر العصب الحسي للمنطقة.

- **topical a.** بَنْجٌ سَطْحِي. مبنىج يوضع على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي مباشرة.

anesthetospasm تَشْنِجٌ خَدَرِي. تشنج المنطقة مع خدرها.

aneurogenic عَوِيْمُ التَّغْصِيبِ. يتصف بعدم تولد الأعصاب فيه.

aneurysm أُمُّ الدَّمِ. (ج: أمهات الدم). كيسة تتولد من تمدد جدران الشريان أو الوريد أو القلب مولدة ورماً نابضاً.

- **berry a.** أُمُّ الدَّمِ التَّوتِيَّة. أم دم كيسية صغيرة في أحد الشرايين الدماغية وعادة ما تكون عند اتصال الأوعية في دائرة ويليس وغالباً ما تنفجر وتولد نزفاً تحت العنكبوتية.

- **brain a. (= berry a.)** أُمُّ الدَّمِ الدِّمَاغِيَّة.

- **cerebral a. (= berry a.)** أُمُّ الدَّمِ الْمُخَيَّة.

- **intracranial a.** أُمُّ الدَّمِ دَاخِلُ الْفَحْفِيَّة. أي من أمهات الدم التي تتولد داخل القحف.

- **suprasellar a.** أُمُّ الدَّمِ فَوْقَ السَّرَجِيَّة. أم الدم في الشريان السباتي الباطن والتي تتوضع فوق السرج التركي.

angialgia أَلَمُ الْوَعَاءِ. ألم في أحد الأوعية الدموية.

angina ذَبْحَةٌ. ألم تشنجي خانق خصوصاً الذبحة الصدرية.

- **a. capitis (= headache)** ذبحة راسية؛ صُدَاع.

angiodynia (= angialgia) أَلَمُ الْوَعَاءِ.

angiography, cerebral تَصَوِيرُ الْأَوْعِيَّةِ الدِّمَاغِيَّة. التصوير الشعاعي لأوعية الدماغ بعد حقنها بمادة مبيئة.

angioneuralgia أَلَمٌ عَصْبِيٌّ وَعَائِي. حالة تنصف بالمرحوق في أحد الأطراف مع الوذمة والاحمرار.

- angioneurectomy** إِسْتِنصَالُ عَصَبِيٍّ وعائي. قطع عصب ووعاء إحدى المناطق.
- angioneuropathy** اِعْتِلَالُ عَصَبِيٍّ وَعَائِيٍّ. اعتلال عصبي يؤثر غالباً على الأعصاب الوعائية فيؤدي إلى تشنج الأوعية أو شللها أو شلل المحرك الوعائي.
- angioneurotic** عُصَابِيٍّ وَعَائِيٍّ. متعلق بالاعتلال العصبي الوعائي.
- a. edema (= angioedema)** وَذَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وعائية. وذمة موضعية تنتج عن توسع الشعيرات وزيادة نفوذيتها.
- angle** زَاوِيَّةٌ.
- cerebellopontine a.** الزَاوِيَّةُ الْمُخَيَخِيَّةُ الجسريَّة. الزاوية المكونة بين المخيخ والجسر.
- iridial a. (= iridocorneal a.)** الزَاوِيَّةُ الْقُرْحِيَّةُ القرنيَّة. الزاوية المكونة بين قرنية العين وقرنيته.
- angophrasia** نُطْقٌ مُتَقَطِّعٌ؛ فَرْتَنَةٌ. كلام بطيء ومتعب يحصل في الخزل العام.
- anhaphia (= anaphia)** اِنْعِدَامُ جِسْنٍ اللَّمَسِ.
- anhedonia** اِلْتِلَافٌ. عدم الشعور باللذة أو السعادة حتى في الأعمال والحالات المبهجة.
- anhidrosis** اِنْقِطَاعُ التَّعَرُّقِ. غياب أو قلة التعرق.
- thermogenic a.** اِنْقِطَاعُ التَّعَرُّقِ الْحَرِّيِّ. وفن انقطاع التعرق يحدث في المناطق الحارة.
- anilingus** لَاعِقُ الشَّرْجِ. تهيج جنسي للشرج بالشفيتين واللسان.
- animal, decerebrate** حَيَوَانٌ مَفْصُولُ الْمُخِّ. حيوان تجريبي نزع منه الدماغ المقدم أو المخ.
- animal, spinal** حَيَوَانٌ نُخَاعِيٍّ. حيوان تجريبي قطع نخاعه وفصل عن دماغه.
- animal, thalamic** حَيَوَانٌ مِهَادِيٍّ. حيوان تجريبي قطع جذع دماغه فوق مستوى المهاد مباشرة.
- aniridia** اِنْعِدَامُ الْقُرْحِيَّةِ. غياب قرنية العين.
- aniseikonia** تَفَاوُثُ الصُّوَرَتَيْنِ. تباين الصورتين المولدتين في العينين للجسم المنظور بهما في الحجم والشكل.
- anisoaccommodation** تَفَاوُثُ التَّكْيُفِ. تباين قابلية تكيف العينين.
- anisocoria** تَفَاوُثُ الْحَدَقَتَيْنِ. تباين سعة حدقتي العينين.
- anisometropia** تَفَاوُثُ اِلْنِكْسَارِ. تفاوت درجة انكسار العينين.
- anisophoria** حَوْلٌ مُتَفَاوُثٌ. خلل توازن عضلات العينين فتتولد فيهما صورتان بمستويين مختلفين.
- anisopia** تَفَاوُثُ اِلْبَصَارِ. تباين الإبصار بالعينين.
- ankle** كَاكِلٌ. جزء الطرف السفلي الذي يعلو القدم مباشرة.
- a. clonus** زَمْعُ الكَاكِلِ. انظر clonus
- a. jerk** نَفْضَةُ الكَاكِلِ. انظر jerk
- ankylocheilia** اِلْتِصَاقُ الشَّفَتَيْنِ. التصاق الشفتين ببعضهما البعض.
- ankyloglossia** اِلْتِصَاقُ اللِّسَانِ. التصاق اللسان الذي يحدد حركته ويؤدي إلى خلل التلفظ وصعوبته.
- ankylophobia** رُهَابُ الْقَسْطِ. الخوف من القسط في حالات كسور العظام أو التهابات المفاصل.
- anociassociation** اِبْطَالُ التَّدَاعِيَاتِ اِلْمُوَدِّيَّةِ. في التخدير هو حقن السكوبولامين والمورفين قبل إجراء العملية بساعة واحدة لمنع الصدمة الجراحية ثم إحصار حس الألم بحقن المسكنات المحصورة له حول منطقة العملية بعد إجرائها للتقليل من الصدمة الجراحية.
- anociation (= anociassociation)** اِبْطَالُ التَّدَاعِيَاتِ اِلْمُوَدِّيَّةِ.

anocithesia (= anociassociation)

إِبْطَالُ الدَّاعِيَاتِ الْمُؤَذِّةِ.

anodal block

إِحْصَارٌ مُصْعَدِي. إحصار الدفعة العصبية عند مرورها تحت المسرى المصعدي الموضوع على الليف العصبي.

anodal closure contraction

تَقْلُصُ الْغَلْقِ الْمُصْعَدِي. انظر contraction.

anodal opening contraction

تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمُصْعَدِي. انظر contraction.

anode

مُصْعَد. القطب الموجب في الدائرة الكهربائية أو في البطارية الكهربائية.

anodmia

انعدام الشم؛ خُشَام. انظر anosmia.

anodyne

مُسَكِّن. دواء يخفف أو يزيل الألم.

anodynia

إِنْعِدَامُ الْأَلَم. عدم وجود الألم.

anoia (= insanity)

هَبْلٌ؛ عَتَّة. الجنون أو التخلف العقلي الشديد.

anomaly

شَذُوذ. (ج: شَذُوذَات). انحراف كبير عن المقياس السوي خاصة عندما يتسبب من عيب خلقي.

- developmental a.

شَذُوذٌ نَمَائِي. شذوذ يتولد عن سوء تطور الجنين.

anomia

فَقْدُ التَّسْمِيَةِ. عدم المقدرة على تسمية المواد والأشياء أو عدم المقدرة على تذكر أسمائها.

anorexia

قَهَمٌ. فقدان الشهية للطعام.

- a. nervosa

قَهَمٌ عَصَابِي. اضطراب نفسي يصيب الإناث غالباً ويبدأ عند سن البلوغ ويتصف بالخوف من السمعة ورفض الاحتفاظ بادنى وزن قياسي والاعتقاد بانهن مفروطات الوزن حتى عندما يكن هزيلات فينقطعن عن الطعام ويؤدي ذلك إلى انقطاع الحيض لديهن.

anorexigenic (= anorexiant)

مُقَهِم. عامل يقلل الشهية للطعام.

anosmia

خُشَام. انعدام حس الشم.

- a. gustatoria

خُشَامٌ تَذَوُّقِي. انعدام حس شم الطعام.

- preferential a.

خُشَامٌ نَوْعِي. انعدام حس الشم لبعض الروائح فقط.

- a. respiratoria

خُشَامٌ تَنْفُسِي. انعدام حس الشم لانسداد الأنف.

anosmic

مَخْشُومٌ؛ خُشَامِي. مصاب بالخشام أو منسوب إليه.

anosognosia

عَمَّةُ الْعَاقَةِ. عدم المعرفة أو رفض الاعتراف بالإصابة أو بالمرض العصبي كالشلل مثلاً.

anosophrasia (= anosmia)

انعدام الشم؛ خُشَام.

ansa

عُرْوَةٌ. (ج: عُرَى). مصطلح تشريحي يدل على بنية عروية الشكل.

- a. cervicalis

العُرْوَةُ الرِّقَبِيَّة. عروة عصبية في الرقبة تغذي العضلة تحت اللامية تتكوّن من الياف من الجذرين الرقبين الأول والثاني وتتصل بالعصب تحت اللساني والجذرين الرقبين الثاني والثالث.

- a. hypoglossi

العُرْوَةُ تَحْتَ اللِّسَانِيَّة، العُرْوَةُ الرِّقَبِيَّة.

- a. lenticularis

العُرْوَةُ الْعَدْسِيَّة. سبيل عصبي صغير يبدأ من الكرة الشاحبة للنواة العدسية ويمتد حول الحافة الإنسية للمحفظة الداخلية ويختلط مع الياف الحزمة العدسية وتتشابك بعض أليافه مع النوى تحت المهادية وتمتد الألياف الأخرى حتى المهاد.

- ansae nervorum spinalium

عُرَى الأعصاب النُخَاعِيَّة. عرى الياف عصبية تتصل بالجذور الامامية للأعصاب النخاعية.

- a. peduncularis


العُرْوَةُ السُّوَيْقِيَّة. مجموعة من الياف عصبية تربط النواة اللوزية والباحة الكمثرية والقسم الامامي من الوطاء والعديد من النوى المهادية ببعضها البعض، وتمر حزمها العصبية تحت المحفظة الداخلية.

- a. subclavius

العُرْوَةُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّة. خيوط عصبية تمر أمام وخلف الشريان تحت الترقوي لتكوّن عروة تربط العقدتين الرقبيتين الوسطية والسفلية.

- a. Vieussens (= a. subclavius)

العُرْوَةُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّة.



anorexia nervosa

القيم العصبية: اضطراب عصبي ذهاني وأعراضه وعلاماته: (1) كراهية الطعام النفساني المنشأ (2) اليقظة والعدوانية (3) الصور العوَجَة الفخامي للغدة التناسلية بسبب السحب (4) عدم ضمور الثدي (5) هبوط ضغط الدم (6) التثبيط النفساني المنشأ للمراكز الوطائية الموجهة للغدة التناسلية المنبهة للمشاهدة (7) هبوط الهرمون المنبه للغدة التناسلية (8) انقطاع الحامض (9) هبوط معدل الاستقلاب القاعدي (10) الهبوط النسبي لتركيز اليود (11) بقاء شعر الإبطين والعانة سوياً (12) بقاء اليود المرتبط بالبروتين سوياً (13) 17- هيدروكسي كورتيزون البول سوي (14) للسحب الشديد.

- a. vitellina** الغرورة المَحْيَة. وريد جنيني
يبدأ من الكيس المحي ويمر إلى الوريد السري.
- antagonist** مُنَاهِضَة.
- associated a's.** مُنَاهِضَاتٌ مُتَرَابِطَةٌ. عضلات
تعمل على أجزاء مختلفة ولكنها تعمل سوية لتحركها
باتجاهات متوازنة.
- direct a's.** مُنَاهِضَاتٌ مُبَاشِرَةٌ. عضلات تعمل
على نفس الجزء من الجسم ويؤدي عملها المشترك إلى
تثبيت واستقرار الجزء.
- narcotic a.** مُنَاهِضَةُ المُخْذَر. عامل مضاد
لعمل المخدرات على الجهاز العصبي.
- antalgic** مُسَكِّن؛ مُسْتَبْعِدُ الأَلَم.
- antalgic** أنظر antalgic.
- antalgic** مُسَكِّن؛ مُسْتَبْعِدُ الأَلَم.
1. عامل أو عمل يقاوم أو يجنب الألم، مثل اتخاذ
وضع معين أو القيام بمشية خاصة تقلل الألم
2. مسكِّن.
- antanalgesia** قَرَطُ حَسِّ الأَلَم. زيادة
حساسية الألم بسبب استعمال بعض الادوية التي
تهبط عتبه.
- antasthenic** مُضَادُّ الوَهْن. عامل أو دواء
مضاد للوهن يعيد النشاط للجسم.
- antephtaltic** مُضَادُّ الكَايُوس. عامل أو دواء
يمنع حدوث الكايوس والأحلام المزعجة.
- anterograde amnesia** نَسَاوَةُ الأَلْحَق.
- amnesia** أنظر amnesia.
- anterotic (= antaphrodisiac)** مُجَفِّر.
- عامل مضاد للشهوة الجنسية.
- anthophobia** رُهَابُ الزُّهُور. كراهية
الزهور والتخوف منها.
- anthropophobia** رُهَابُ المُجْتَمَعَات.
- التخوف من المجتمعات البشرية.
- antiadrenergic** مُضَادُّ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِينِي.
1. عامل يضاد عمل الدفعات العصبية المنقولة في
الالياف العصبية الودية بعد العقدة الأدرينالية
الفعل 2. عامل مضاد لفعل الأدرينالين أو
النورادرينالين.
- antianxiety** مُضَادُّ القَلَق. دواء مضاد للقلق.
- antiapopleptic** مُضَادُّ السَّكْتَةِ. دواء يفرج
عن السكتة أو يمنعها.
- antibiotic** مُضَادُّ حَيَوِي. مادة كيميائية
يولدها حي مجهري لها القدرة على تثبيط تكاثر أو
قتل أحياء مجهرية أخرى.
- antibody** المُضَدِّ. جزيء غلوبلين مناعي
ذو نسق حمض أميني خاص يمكنه من التفاعل مع
المستضد الذي حفز توليده.
- anticathexis** كَبَتْ الأفكار. الطاقة الضرورية
للأنا كي يتمكن من كبت الأفكار غير المرغوبة.
- anticephalgic** مُضَادُّ الصُّدَاع. ما يعالج
أو يمنع الصداع.
- anticholinergic** مُضَادُّ الفِعْلِ الكُولِينِي.
1. عامل يحصر مرور الدفعات عبر نهايات
الأعصاب اللاودية 2. عامل مضاد لفعل الأسيتيل
كولين.
- anticholinesterase** مُضَادُّ إِسْتِيرَاز
الكُولِين. دواء يمنع حلمة الأسيتيل كولين بإنزيم
إستيراز الكولين مما يتيح له العمل لمدة طويلة
وبفعالية عالية.
- anticoagulant** مانع التَخَثُّر. دواء يمنع
تخثر الدم يستعمل للوقاية من الخثار أو في
معالجته.
- anticonvulsant** مُضَادُّ الإِخْتِلَاج. دواء
يعالج الاختلاج أو يفرج عنه.
- antidepressant** مُضَادُّ الإِحْتِنَاب. دواء
يعالج الاكتئاب أو يفرج عنه ويحسن مزاج المريض.
- antidromic** مُعَاكِسُ المَسِيرَةِ. توصيل
الدفعات العصبية باتجاه معاكس للاتجاه السري
كما يتم أحياناً في عصبونات الجذور الخلفية.
- antiemetic** مُضَادُّ القَيْء. دواء يعالج
الغثيان والتقيؤ أو يمنعهما.
- antiepileptic** مُضَادُّ الصَّرَع. عامل يقاوم
الصَّرَع.
- antifibrillatory** مُضَادُّ الرُّجْفَان. دواء يعالج
الرجفان العضلي وخصوصاً رجفان القلب.

- antihallucinatory** مُضَادُّ الهَلَس. عامل يوقف الهلس.
- antihypnotic** مانع النُّوم. عامل يمنع النوم.
- antihysterical** مانع الهِسْتِيرِيَا. عامل يمنع أو يوقف الهستيريا (الهراع).
- antikinesis** مُقَاوِمَةُ التَّدْوِير. نزعة الكائن لمقاومة الحركة إذ ينحني جسمه باتجاه معاكس لحركة دورانه مثلاً.
- antinarcotic** مُضَادُّ الخُدَار. دواء يقاوم تأثير المخدر.
- antineuralgic** مُضَادُّ الأَلَم العَصَبِي. دواء يضاد الألم العصبي.
- antineuritic** مُضَادُّ التَّهَاب العَصَب. عقار يضاد التهاب الأعصاب.
- antineurotoxin** مُضَادُّ ذَيْفَان العَصَب. مادة تضاد ذيفان العصب.
- antiparalytic** مُضَادُّ الشَّلَل. ما يفرج عن الشلل.
- antiparasymphathomimetic** مُضَادُّ المَآوِذِي. ما يولد تأثيراً مشابهاً لقطع أو حصر العصب اللاودي.
- antiparkinsonian** مُضَادُّ البَارِكِنْسونِيَّة. عامل مؤثر في علاج الباركنسونية.
- antipathy** تَنَافُر. شعور سلبي تجاه شخص آخر أو شيء ما وخصوصاً الشعور الشديد بالبغض والكراهية تجاههما.
- antipsychomotor** مُضَادُّ التَّحَرَاك. النَّفْسَانِي. ما يبطل أو يثبط الظواهر الحركية للفعاليات النفسية أو المخية.
- antipsychotic** مُضَادُّ الذُّهَان. دواء يعالج الذهان.
- antisocial** مُعْتَدِلٌ إجْتِمَاعِيًّا. 1. سلوك إجرامي ينتهك حقوق الآخرين. 2. شخص يتصف بسلوك لا اجتماعي.
- antispasmodic** مُضَادُّ التَّنَشُّج. دواء يفرج عن التشنج العضلي وخاصة العضلات الملساء في الشرايين والقصبات والأمعاء وقناة الصفراء والحالب والمصبرات كما أنه يفرج أيضاً عن تشنج العضلات الهيكلية.
- antispastic** مُضَادُّ التَّنَشُّج. دواء يفرج عن التشنج العضلي خصوصاً العضلات الهيكلية.
- antisymphathetic** مُضَادُّ الْوُدِّي. مادة تولد تأثيراً شبيهاً بتأثير قطع أو إحصار الودي.
- antitoxin** تَزْيِيق. 1. مادة ضد الذيفان 2. مصل ضدي يستعمل كعامل تمنيعي لا فاعل ليقاوم ذيفاناً جرثومياً معيناً.
- antitrimus** صُرَزٌ عَكْسِي. تشنج يمنع غلق الفم الضرزي.
- antrodynia** وَجَعُ الْغَار. وجع أحد الأغوار.
- antralgia** أَلَمُ الْغَار. ألم الجيب الفكي.
- anxiety** قَلَق. شعور بغيض يتضمن الحس بخطر محقق أو حالة عدم استقرار في الرأي أو توقع حدوث أمر هام، ويترافق كل ذلك مع انفعالات واستجابات فيزيولوجية استعداداً لذلك كالخفقان وارتفاع ضغط الدم والتوتر العضلي والرعاش وتسرع التنفس والتعرق والضعف والإعياء. وخلافاً للشعور بالخوف فإن القلق يتولد عن أخطار خيالية أو غير حقيقية أو غير موجودة أصلاً.
- automatic a.** قَلَقٌ تَلَفَاقِي. قلق يتولد عن حالة رضحية نفسية عند ارهاق الجهاز النفسي بمنبهات كثيرة أكثر مما تتحملها النفس.
- castration a.** قَلَقُ الْخِصَاء. الخوف من فقدان الأعضاء التناسلية أو من إصابتها.
- ego a.** قَلَقُ الْأَنَا. القلق المولد من تهديد المخاطر الذاتية المنشأ للأنات والتي تحاول اختراق حدود الكبت لديه.
- eighth month a.** قَلَقُ الشَّهْرِ الثَّامِن. القلق الذي ينتاب الحوامل في الشهر الثامن من الحمل حول آلام الولادة أو فيما إذا كان الوليد ذكراً أم أنثى أو سليماً أو معيباً.
- examination a.** قَلَقُ الْإِمْتِحَان. القلق الذي ينتاب الطلاب أيام امتحاناتهم.
- fixed a.** قَلَقٌ ثَابِت. قلق يتعلق بفكرة أو موضوع معين كالرهاب من حالة أو شيء معين.

- **free-floating a.** قلقٌ عائمٌ. قلقٌ عامٌ شديدٌ غير مرتبط باي موضوع أو حالة أو فكرة معينة.
- **neurotic a. (= anxiety)** قلقٌ. قلقٌ عصائبي.
- **organic a.** قلقٌ عضوي. قلقٌ يترافق مع إصابةٍ وألمٍ في بعض أجزاء الجسم.
- **pathologic a.** قلقٌ مرضي. قلقٌ شديدٌ يستمر لفترة طويلة فيؤدي إلى اضطرابات جسمية.
- **phobic a.** قلقٌ رهائبي. قلقٌ يتولد عن التعرض للحالة أو للموضوع أو للشئ المسبب للرهاب منه لديه.
- **separation a.** قلقٌ الانفراق. قلقٌ ينتاب الطفل عند افتراقه عن أمه أو عن بديلتها ويتصف بالبكاء والهيجية وبعض علامات الاحتجاج والرفض.
- **situation a.** قلقٌ الحالة. القلق الذي ينتاب الشخص عند تعرضه لموقف صعب أو مهيئ.
- **stranger a.** قلقٌ الغريب. القلق الذي يصيب الطفل عند رؤيته شخصاً غريباً للمرة الأولى.
- anxiolytic** مُزيلُ القلق. عامل يخفف القلق أو يزيله.
- anxious** قلق. شخص يعاني من القلق.
- apallesthesia** فقدانُ حسِّ الإهترَاز. انظر pallesthesia.
- aparalytic** لا شللي. غير مصاب بالشلل أو من دون شلل.
- apastia** صُوم. الامتناع عن تناول الطعام كعرض مرضي عصبي.
- apathetic** خامل؛ فائز الشعور. شخص غير مهتم ولا مبال بما يدور حوله من أحداث.
- apathic** خامل. شخص بطيء الاستجابة للمنبهات.
- apathism** خمول. حالة بطء الاستجابة للمنبهات.
- apathy** خمول؛ فتور الشعور؛ لا مبالاة. حالة اللامبالاة وقلة الشعور للأحداث التي تدور في محيط الشخص.
- apertura** فتحة. (ج: فتحات). مصطلح تشريحي يدل على فتحة.
- **a. lateralis ventriculi quarti** الفتحة

- الوَحْشِيَّة لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. فتحة في نهاية الرذب الوحشي للبطين الرابع توصله بالحيز تحت العنكبوتية تسمى أيضاً فتحة لوشكا.
- a. medialis ventriculi quarti** الفتحة
- الإنسيَّة لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. فتحة ناصفة في القسم السفلي من سطح البطين الرابع توصله بالحيز تحت العنكبوتية. تسمى أيضاً فتحة ماجندي.
- apesthetic** عديم الحواس. فاقد الحواس.
- aphagia** إمتناعٌ عن الطَّعام. الامتناع عن تناول الطعام.
- **a. algera** الإمتناع عن الطَّعام الألمي. الامتناع عن تناول الطعام بسبب الألم الذي يولده.
- aphagopraxia (= dysphagia)** عُسْرُ البلع. صعوبة بلع الطعام أو الشراب.
- aphakia** إنعدامُ العدسة. عدم وجود عدسة العين بسبب خلقي أو رضحي.
- aphasia** حُبْسَة. (ج: حُبْسَات). عيب أو فقدان المقدرة على التعبير بالكلام أو بالكتابة أو بالإيماء أو فهم الكلام المنطوق أو المكتوب بسبب إصابة أو مرض المراكز العصبية.
- **acoustic a. (= auditofoy a.)** حُبْسَة سَمْعِيَّة. عدم المقدرة على التعبير عن حس الذوق بالكلمات.
- **ageusic a.** حُبْسَة مذاقيَّة. عدم المقدرة على التعبير عن حس الذوق بالكلمات.
- **amnemonic a.** حُبْسَة نَسَاوِيَّة؛ حُبْسَة التسمية. نسيان الكلمات الذي يؤدي إلى الحبسة.
- **amnesic a. (= amnestic a, anomic a, nominal a.)** حُبْسَة التَّسْمِيَّة؛ حُبْسَة نَسَاوِيَّة. عدم المقدرة على تذكر بعض الكلمات أو أسماء بعض المواد أو الأشخاص مع تمام المقدرة على الفهم وتكرار الكلمات المسموعة ولكنه يتوقف عن الكلام عند محاولة تذكر الأسماء ثم يعتذر ويقدم وصفا للكلمة المنسية.
- **anomic a.** حُبْسَة التَّسْمِيَّة. عدم المقدرة على تذكر الكلمات وخصوصاً أسماء الأشخاص والمواد.
- **anosmic a.** حُبْسَة شَمِيَّة. عدم المقدرة على التعبير بالكلمات عن حس الشم.
- **associative a.** حُبْسَة التَّرايُّط. حبسة تتولد عن اختلال الترابط بين أقسام القشرة المخية.

- ataxic a. (= expressive a.) حُبْسَةُ رَاحِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّةٍ.
- auditory a. (= Wernicke's a. = word deafness) حُبْسَةُ سَمْعِيَّةٍ. عدم فهم الكلمات المسموعة بسبب علة في الباحات السمعية في القسم الخلفي للتلفيفين الصدغيين الأول والثاني في نصف كرة المخ السائدة.
- Broca's a. (= expressive a.) حُبْسَةُ بَرْوَكَا؛ حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّةٍ.
- central a. (= global a.) حُبْسَةُ مَرْكَزِيَّةٍ.
- central sensory a. (Wernicke's a.) حُبْسَةُ حِسِّيَّةٍ مَرْكَزِيَّةٍ. حبسة فرنيكا.
- color name a. حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْأَلْوَانِ. عدم المقدرة على تسمية الألوان المنظورة.
- combined a. حُبْسَةُ مُرَكَّبَةٍ. إصابة الشخص بعدة أنواع من الحبسات في نفس الوقت.
- commissural a. حُبْسَةُ صَوَارِيَّةٍ. حبسة تتولد عن آفة في الجزيرة التي توصل مراكز الكلام الحركية بمراكزه الحسية.
- complete a. حُبْسَةُ تَامَّةٍ. حبسة تتولد عن إصابة كل المراكز الكلامية في الدماغ وعدم المقدرة على التواصل مع الآخرين بأية طريقة.
- conduction a. حُبْسَةُ التَّوَصِيلِ. حبسة الشخص الذي يتكلم بطلاقة ولكنه يكرر بعض الكلمات أو المقاطع المغلوطة في سياق كلامه.
- cortical a. (= global a.) حُبْسَةُ قَشْرِيَّةٍ.
- expressive a. حُبْسَةُ تَعْبِيرِيَّةٍ. حبسة تتصف بعدم المقدرة على التعبير سواء نطقاً أو كتابة أو إيماء بسبب آفة في مراكز الكلام القشرية، ويمكن المصاب من فهم الكلام الذي يسمعه أو يقرأه ويمكنه تكوين الأفكار التي يريد أن يقولها ولكنه لا يتمكن من التعبير عنها.
- expressive-receptive a. (= global a.) حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّةٍ اسْتِقْبَالِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ شَامِلَةٍ.
- fluent a. حُبْسَةُ طَلِيْقَةٍ. حبسة يتكلم المصاب بها كلاماً فصيحاً وصحيحاً لغوياً ولكن من دون أي معنى أو محتوى.
- frontocortical a. (= expressive a.) حُبْسَةُ قَشْرِيَّةٍ جَنْبِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ تَعْبِيرِيَّةٍ.
- frontolenticular a. (= commissural a.) حُبْسَةُ جَنْبِيَّةٍ عَدَسِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ صَوَارِيَّةٍ.
- functional a. حُبْسَةُ وَظِيفِيَّةٍ. حبسة تتولد عن اضطرابات هستيرية شديدة.
- gestural a. تَعَدُّرُ الْإِيْمَاءِ؛ حُبْسَةُ إِيْمَائِيَّةٍ؛ الْأِيْمَائِيَّةُ. انظر amimia.
- gibberish a. (= jargon a.) حُبْسَةُ رَاطِنَةٍ.
- global a. (central a.) حُبْسَةُ شَامِلَةٍ. حبسة عامة تشمل كل جوانب وظيفة الكلام والتواصل بسبب آفة مركزية شاملة لكل مناطق.
- graphomotor a. حُبْسَةُ حَرَكَيَّةٍ كِتَابِيَّةٍ. حبسة لا يتمكن المصاب بها من التعبير بالكتابة.
- impressive a. (= sensory a.) حُبْسَةُ انطباعية؛ حُبْسَةُ حِسِّيَّةٍ.
- intellectual a. (= true a.) حُبْسَةُ فِكْرِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ حَقِيقِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ ثَقَافِيَّةٍ.
- jargon a. حُبْسَةُ رَاطِنَةٍ. حبسة إدراكية يرافقها ترديد مقاطع أو كلمات غير ذات معنى.
- Kussmaul's a. حُبْسَةُ كُوسْمَاوُلٍ. حبسة تتصف بالامتناع الإرادي عن الكلام كما يحدث في الجنون.
- lenticular a. (= commissural a.) حُبْسَةُ عَدَسِيَّةٍ؛ حُبْسَةُ صَوَارِيَّةٍ.
- a. lethica (= amnemonic a.) حُبْسَةُ نَسَاوَةِ الْكَلِمَاتِ.
- mixed a. (= global a.) حُبْسَةُ مُخْتَلَطَةٍ؛ حُبْسَةُ شَامِلَةٍ.
- motor a. (= expressive a.) حُبْسَةُ حَرَكَيَّةٍ؛ حُبْسَةُ تَعْبِيرِيَّةٍ.
- nominal a. حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ. حبسة تتصف بسوء استعمال الكلمات للدلالة على المواد والأشياء.
- nonfluent a. حُبْسَةُ لَا طَلِيْقَةٍ. حبسة تتصف بالنطق بكلام قصير وببطء شديد بسبب آفة في باحة بروكا.
- optic a. حُبْسَةُ بَصَرِيَّةٍ. عدم المقدرة على تسمية المواد والأشياء المنظورة بسبب آفة تقطع الاتصال بين المركزين البصري والكلامي.

- parieto-occipital a. حُبْسَةٌ جَذَارِيَّةٌ قَذَالِيَّة. تُعَدُّ القَرَاءَةُ والأَدَاءُ.
- pathematic a. حُبْسَةُ التَّهْيَب. حِبْسَةٌ تَتَوَلَّدُ عَنْ الخَوْفِ أَوِ التَّهْيَبِ.
- pictorial a. (= global a.) حُبْسَةٌ شَامِلَةٌ.
- psychosensory a. (= receptive a.) حُبْسَةٌ نَفْسِيَّةٌ جِسْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ.
- pure motor a. حُبْسَةٌ حَرَكِيَّةٌ صَرَفًا. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالتَّكَلُّمِ مَعَ الإِحْتِفَازِ بِالمَقْدَرَةِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالكَتَابَةِ أَوْ إِدْرَاكِ الكَلَامِ المَقْرُوءِ أَوِ المَسْمُوعِ.
- receptive a. حِبْسَةٌ اسْتِقْبَالِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى فَهْمِ الكَلَامِ المَقْرُوءِ أَوِ المَسْمُوعِ أَوْ الرَّمُوزِ الكَلَامِيَّةِ اللَّمَسِيَّةِ بِسَبَبِ مَرَضِ مَرَاكِزِ الكَلَامِ السَّمْعِيَّةِ وَالبَصَرِيَّةِ.
- semantic a. حُبْسَةُ الدَّلَالَةِ. حِبْسَةٌ تَتَصَفُّ بِفَقْدَانِ المَقْدَرَةِ الكَامِلَةِ عَلَى التَّعْرِفِ عَلَى مَعْنَى دَلَالَةِ الكَلِمَاتِ وَالمَقَاطِعِ مَعَ نِسَاوَةِ مَعْنَى بَعْضِهَا.
- sensory a. (= receptive a.) حُبْسَةٌ جِسْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ.
- subcortical a. حُبْسَةٌ تَحْتَ القَشْرِيَّةِ. حِبْسَةٌ تَتَسَبَّبُ عَنْ آفَةِ تَقَطُّعِ السَّبِيلِ الوَارِدَةِ لِمَرَاكِزِ الكَلَامِ السَّمْعِيَّةِ.
- syntactical a. حُبْسَةٌ عِبَارِيَّةٌ. حِبْسَةٌ تَتَصَفُّ بِعَدَمِ مَقْدَرَةِ المَرِيضِ عَلَى تَرْتِيبِ الكَلِمَاتِ بِصُورَةٍ صَحِيحَةٍ فَيَبْدُو كَلَامَهُ هَذَا.
- tactile a. حُبْسَةٌ لَمَسِيَّةٌ. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى تَسْمِيَةِ الأشياءِ بِمَجْرَدِ اللَّمَسِ.
- temporoparietal a. (= receptive a.) حُبْسَةٌ صُدْغِيَّةٌ جَذَارِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ.
- total a. (= global a.) حُبْسَةٌ شَامِلَةٌ. انْظُرْ global a.
- transcortical a. حُبْسَةٌ عِبْرَ القَشْرَةِ. حِبْسَةٌ تَتَكُونُ عَنْ آفَةِ تَقَطُّعِ الإِتِّصَالِ بَيْنَ المُنْطَقَةِ الكَلَامِيَّةِ وَالمَرَاكِزِ القَشْرِيَّةِ الأُخْرَى.
- true a. حُبْسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ. حِبْسَةٌ تَتَوَلَّدُ عَنْ آفَةِ تَصَيِّبِ أَحَدِ مَرَاكِزِ الكَلَامِ المَرْكَزِيَّةِ.
- verbal a. (= expressive a.) حُبْسَةٌ تَعْبِيرِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ لَفْظِيَّةٌ.
- visual a. (= alexia) حُبْسَةٌ بَصَرِيَّةٌ؛ تُعَدُّ القَرَاءَةُ؛ الأَقْرَائِيَّةُ.
- Wernicke's a. (= receptive a.) حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّةٌ.
- aphasiac أَحْبَسَ. شَخْصٌ مَصَابٌ بِالحِبْسَةِ.
- aphasic أَحْبَسَ. شَخْصٌ مَصَابٌ بِالحِبْسَةِ أَوْ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.
- aphemesthesia (= alexia) تُعَدُّ القَرَاءَةُ؛ الأَقْرَائِيَّةُ.
- aphemia صُعُوتٌ. فُقْدَانُ المَقْدَرَةِ عَلَى الكَلَامِ بِسَبَبِ آفَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.
- aphephobia (= haphophobia) رُهَابٌ اللُّغْسِ. خَوْفُ الشَّخْصِ مِنْ أَنْ يَلْمَسَهُ أَحَدٌ.
- aphonia فَقْدُ الصَّوْتِ. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى التَّصْوِيتِ.
- a. clericorum فَقْدُ الصَّوْتِ الخُطَابِيِّ. فَقْدُ الصَّوْتِ أَوْ صُعُوبَتُهُ كَالَّذِي يَصَابُ بِهِ الخُطَبَاءُ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِفَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ كَالْقِسَاوَسَةِ.
- hysteric a. فَقْدُ الصَّوْتِ الهِسْتِيرِيِّ. فَقْدُ الصَّوْتِ بِسَبَبِ هِسْتِيرِيٍّ وَمِنْ دُونِ أَيِّ مَرَضٍ أَوْ آفَةٍ عَضْوِيَّةٍ.
- a. paralytica فَقْدُ الصَّوْتِ الشَّلَلِيِّ. فَقْدُ الصَّوْتِ بِسَبَبِ مَرَضٍ شَلَلِيٍّ لِأَعْصَابِ الحَنَجْرَةِ.
- spastic a. فَقْدُ الصَّوْتِ التَّشْنُجِيِّ. اخْتِلَالُ التَّصْوِيتِ بِسَبَبِ تَشْنُجِ عَضَلَاتِ الحَنَجْرَةِ.
- aphonic فَاقِدُ الصَّوْتِ. مَرِيضٌ مَصَابٌ بِفَقْدِ الصَّوْتِ.
- aphonogelia تُعَدُّ القَهْقَهَةُ. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى الضَّحْكِ بِصَوْتٍ عَالٍ.
- aphotesthesia قَلَّةُ حِسِّ الضَّوْءِ. نَقْصَانُ التَّحَسُّسِ بِالضَّوْءِ بِسَبَبِ التَّعَرُّضِ الطَوِيلِ لَضَوْءِ الشَّمْسِ.
- aphrasia حُبْسَةُ الجَمَلِ. عَدَمُ المَقْدَرَةِ عَلَى تَكْوِينِ الجَمَلِ الكَلَامِيَّةِ أَوْ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ المَصَابُ مِنْهَا.
- aphrenia خَرَفٌ. تَخَلَّفٌ عَقْلِيٌّ.
- aphrodisia بَاةٌ؛ الرِّغْبَةُ الجَنْسِيَّةُ. فَيَاجٌ جَنْسِيٌّ.

aphrodisiac بَاهِي. مهيج الغرائز الجنسية.

aphrodisiomania هَوَسُ الْعُلَمَة؛ هَوَسُ العِشْق. erotomania. انظر

aphronesia حَرَف. انظر dementia.

aphronia قَلَّةُ التَّعَقُّل. قلة التفكير بسبب الخرف.

aphthongia حُبْسَةُ تَصَوُّيْتِيَّة. حبسة بسبب تشنج عضلات الكلام.

apokamnosis سُرْعَةُ التَّعَب. سرعة الشعور بالتعب مع النمل وثقل حركة الأطراف وخصوصاً في داء الوهن العضلي.

apoplectic سَكَّتِي. منسوب إلى السكتة أو مرتبط أو مصاب بها.

apoplectiform شَبِيهِ السَّكَّة. حالة شبيهة بالسكتة.

apoplexia (= apoplexy) سَكَّة.

apoplexy سَكَّة. 1. خلل عصبي مباشر ينتج عن اضطراب وعائي دماغي محدد ينتج أحياناً عن نزف داخل القحف أو في أحيان أخرى عن آفة تتولد من انسداد وعاء دماغي.

- asthenic a. سَكَّةٌ وَهْنِيَّة. سكتة تتولد عن الوهن والضعف العام.

- bulbar a. سَكَّةٌ بَصْلِيَّة. سكتة تتولد عن نزيف في الجسر.

- capillary a. سَكَّةٌ شُعْبِيَّة. سكتة تتولد عن انفجار أوعية شعيرية في الدماغ.

- cerebellar a. سَكَّةٌ مُخَيَّجِيَّة. سكتة تتولد عن نزيف في المخيخ.

- cerebral a. (= cerebral hemorrhage) سَكَّةٌ مُخَيَّة. نزف مخي.

- delayed a. سَكَّةٌ أَجَلَة. نزف مخي يحدث بعد بضعة أيام من إصابة الرأس.

- embolic a. سَكَّةٌ صِمِّيَّة. متلازمة سكتية تتولد من انسداد الشريان المعخي بصمة.

- fulminating a. سَكَّةٌ خَاطِطَة. نزف دماغي يؤدي إلى سقوط المصاب فجائياً مع فقدان الوعي التام.

- heat a. ضَرْبَةُ حَرَارِيَّة. انظر heat stroke.

- ingravescant a. سَكَّةٌ مُتَفَاقِمَة. شلل مترق بسبب تسرب دموي خفيف ومستمر من وعاء دماغي.

- neonatal a. سَكَّةٌ الْوَلِيد. متلازمة سكتية تصيب الوليد حديث الولادة.

- ovarian a. سَكَّةٌ مَبِيضِيَّة. تسرب دموي كبير في المبيض.

- pancreatic a. سَكَّةٌ بَنَكْرِيَّاسِيَّة. نزف دموي شديد في البنكرياس يشاهد في خذلان القلب وفي فرط الضغط العالي.

- pituitary a. سَكَّةٌ نُخَامِيَّة. تنكس واسع ومفاجيء في الغدة النخامية يترافق مع ورمها ويؤدي إلى صداع مفاجيء مع العمى والنعاس والتخليط ومن ثم السبات.

- pontile a. (= bulbar a.) سَكَّةٌ جَسْرِيَّة؛ سَكَّةٌ بَصْلِيَّة.

- renal a. سَكَّةٌ كَلَوِيَّة. حالة مميتة تتولد عن تمزق شريان كلوي داخلي.

- spinal a. سَكَّةٌ نُخَاعِيَّة. نزف في مادة النخاع الشوكي.

- thrombotic a. سَكَّةٌ خُثَارِيَّة. سكتة تتولد عن خثار يصيب أحد الشرايين الدماغية.

- traumatic a. سَكَّةٌ رَضَحِيَّة. نزف دماغي يتلو إصابة الرأس وتظهر أعراضه بعد عدة أيام أو أسابيع من الإصابة.

appalesthesia فَقْدَانُ حِسِّ الْإِهْتِرَاز.

apperception إِدْرَاكٌ شُعُورِي. إدراك واع والتعرف على المنبهات الحسية وإدراكها.

apperceptive إِدْرَاكِي شُعُورِي. شخص يدرك المنبهات الحسية.

appersonification نُكْرَانُ الذَّات؛ تَشَاخُص. عدم معرفة المرء لذاته وتعريفها أو اعتقاده بأنه شخص آخر.

appestat نَاطِلُمُ الشَّهْيَةِ. مركز ينظم الشهية للطعام يوجد في الوطاء ويحدد كمية الطعام التي يتناولها الشخص.

appetite شَهْيَة. رغبة الإنسان الطبيعية لتناول الأطعمة.

appetition تَرْغُب. تركيز الرغبة نحو هدف أو موضوع معين واحد.

appetitive اندفاعي. سلوك اندفاعي مثير.

apprehension 1. فهم 2. توجس.

1. إدراك وفهم الحواس والمدرجات 2. توجس وتوقع الخوف والقلق.

apractic مصاب بتعذر الأداء. متعلق بتعذر الأداء أو متصف بها أو مصاب بها.

apraxia تعذر الأداء؛ اللأداءية. فقدان المقدرة على أداء الحركات الإرادية القصدية مع عدم وجود أي شلل أو خلل حركي أو حسي.

تعذر الأداء الحركي. عدم القدرة على القيام بالحركات التلقائية.

amnesic a. تعذر الأداء بفقد الذاكرة. عدم القدرة على أداء الحركات التي يطلب من الشخص القيام بها بسبب عدم تذكره أمر الحركة بالرغم من استطاعته القيام بالحركة لو تذكر الأمر.

classic a. (= ideokinetic a.) تعذر الأداء الافتكاري الحركي؛ اللأداءية المعهودة.

constructional a. تعذر الأداء البنائي. عدم المقدرة الحركية على نسخ الصور أو تركيب قطع اللعب أو الآلات.

cortical a. (= motor a.) تعذر الأداء القشري.

dressing a. تعذر الارتداء. عدم مقدرة المريض على ارتداء ملابسه بالرغم من عدم وجود مرض عضوي أو حركي أو حسي آخر.

ideational a. (= ideatory a., sensory a.) تعذر الأداء الافتكاري.

ideokinetic a. (= ideomotor a.) تعذر الأداء الافتكاري الحركي. انقطاع الارتباط بين مراكز التفكير ومركز حركة الأطراف فيتمكن المصاب من القيام بحركات بسيطة ولكنه لا يتمكن من القيام بالمعقدة منها.

innervation a. (= motor a.) تعذر الأداء التعصبي.

Liebmann's a. تعذر الأداء لبيمان. عدم المقدرة على القيام بحركات متناقسة في الذراع من دون وجود أي شلل فيها.

limb-kinetic a. (= ideokinetic a.) تعذر الأداء الافتكاري الحركي.

motor a. تعذر الأداء الحركي. عدم المقدرة على استعمال الآلات والأدوات للقيام بعمل نافع بالرغم

من معرفة المصاب بطبيعتها وفوائدها وطرق استعمالها.

sensory a. تعذر الأداء الأحسي. عدم المقدرة على استعمال الآلات والأدوات للقيام بعمل نافع لعدم معرفة المريض بطبيعتها وفوائدها وطرق استعمالها.

transcortical a. (= ideokinetic a.) تعذر الأداء الفكري الحركي.

apraxic مصاب بتعذر الأداء. انظر apractic.

aprosexia عجز التركيز. عجز التركيز على العمل أو التفكير.

aprosody زتابة الكلام. كلام يستمر على وتيرة واحدة.

apselaphesia ضعف حس اللمس. نقص حس اللمس وضعفه.

apsithyria فقدان الصوت الهستيري. فقدان القدرة على التصويت حتى ولا همساً بسبب هستيري (هراعي).

apsychia قصور الوعي. نقص الوعي أو فقدانه بصورة تامة.

apsychognosia عمّة الذات. 1. عدم إدراك الشخص لحالته النفسية 2. عدم الإحساس والشعور بتأثير الشخص وسلوكه على الآخرين.

apsychosis (= stupor) ذهول. العجز عن التفكير.

aptitude ليّاقة؛ استعداد. القابليات والمهارات الشخصية في مختلف الحقول.

aquaphobia رهَابُ الماء. الخوف من الاقتراب من الماء أو السباحة فيه.

aqueduct مَسَال. ممر أو قناة في أحد الأعضاء أو البنيات.

cerebral a. مَسَال الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. انظر aqueductus mesencephali.

cochlear a. مَسَالُ القَوَاقِع. انظر aqueductus cochleae.

fallopian a. نَفَقُ الوُجْهِي. انظر canalis facialis.

a. of mesencephalon (= aqueductus mesencephali) مَسَالُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط.

- a. of midbrain مَسَالُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. انظر aqueductus mesencephali.

- a. of Sylvius مَسَالُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. انظر aqueductus mesencephali.

- ventricular a. (= aqueductus cerebri) مَسَالُ الْمُخ. انظر aqueductus cerebri.

- a. of vestibule (= aqueductus vestibuli) مَسَالُ الدِّهْلِيْز. انظر aqueductus vestibuli.

- a. cerebri (= a. mesencephali) مَسَالُ الْمُخ. انظر aqueductus cerebri.

- a. cochlea مَسَالُ الْقَوَاقِعَة. قنية صغيرة تربط سقالة الطبلة مع الحيز تحت العنكبوتية (وتسمى أيضاً قناة اللمفا المحيطة).

- a. endolymphaticus قَنَاقَةُ اللَّفِّ الْبَاطِن. انظر duct, endolymphatic.

- a. mesencephali مَسَالُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. قنية ضيقة في الدماغ المتوسط تربط البطينين الثالث والرابع ببعضهما.

- a. vestibuli مَسَالُ الدِّهْلِيْز. 1. قنية تمتد من دهليز الأذن الداخلية لتفتح على السطح الخلفي للجزء الصخري من العظم الصدغي 2. قناة اللمفا الباطنة.

1. مَائِي 2. الْخَلْطُ الْمَائِي. aqueous 1. مائي أو يحضّر مع الماء 2. الخلط المائي للعين.

رُهَابُ arachnophobia, arachnophobia الْعَنَاقِب. الخوف من العناكب.

الْتِهَابُ arachnitis (= arachnoiditis) الْعَنَكْبُوتِيَّة.

1. عَنَكْبُوتِي 2. الْعَنَكْبُوتِيَّة. arachnoid الغشاء الرقيق الذي يتوسط بين الأم الجافية والأم الحنون.

- a. of brain, cranial a. عَنَكْبُوتِيَّة الدِّمَاغ. العنكبوتية التي تحيط بالدماغ.

- a. of spinal cord (= spinal a.) عَنَكْبُوتِيَّة النُّخَاع. العنكبوتية التي تحيط بالنخاع الشوكي.

عَنَكْبُوتِي arachnoidal متعلق بالعنكبوتية.

الْعَنَكْبُوتِيَّة arachnoidea الغشاء الرقيق

الذي يتوسط بين الأم الجافية والأم الحنون ويفصله الحيز تحت العنكبوتية عن الأم الحنون.

- a. encephali (= a. mater encephali) عَنَكْبُوتِيَّة الدِّمَاغ. العنكبوتية التي تحيط بالدماغ.

- a. spinalis (= a. mater spinalis) عَنَكْبُوتِيَّة النُّخَاع. العنكبوتية التي تحيط بالنخاع.

الْتِهَابُ الْعَنَكْبُوتِيَّة. التهاب arachnoiditis غشاء العنكبوتية.

- chronic adhesive a. الْتِهَابُ الْعَنَكْبُوتِيَّة المزمن اللصوقي. تتخثر عنكبوتية الدماغ والنخاع والتصاقها بالأم الحنون. وينتج عن التهاب سابق في السحايا أو رضحها أو أية إصابة أخرى فيها أو حقن مادة غريبة في الحيز تحت العنكبوتية. وتعتمد الأعراض والعلامات على مدى اتساع الإصابة.

الْعَنَكْبُوتِيَّة الْحَنُوتَة: العنكبوتية الرقيقة. اعتبار arachnopia (= leptomeninges) الغشاءين العنكبوتي والحنون كوحدة وظيفية واحدة.

سَوَاءُ الرِّفَاء. dysraphia. انظر araphia

تَسْجُر. 1. الفروع الانتهازية arborization لبعض الألياف العصبية 2. نهايات متفرعة لبعض الألياف العصبية الحركية التي تنتهي فروعها عند الألياف العضلية.

arbor medullaris vermis (= arbor vitae cerebelli) الشجرة النخاعية للدودة؛ شجرة الحياة المخيخية.

شَجَرَةُ الْحَيَاة arbor vitae cerebelli الفروع الشجرية للمادة البيضاء المخيخية التي تظهر في المقطع الناصف للمخيخ.

arbor vitae of vermis (= arbor vitae cerebelli) شجرة حياة الدودة المخيخية؛ شجرة الحياة المخيخية.

قَوْس. بنية أو سبيل عصبي على شكل قوس arc منحني.

قَوْسٌ عَصْبِيَّة. سلسلة من عصبونين أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

neural a. عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

عَصْبُونِيْن أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

- reflex a. قَوْسٌ اِنْعَاسِيَّةٌ. القوس العصبي الذي تمر خلاله الدفعات العصبية الواردة والمتجهة نحو المركز العصبي والذي تصدر منه الإجابة التي تمر دفعاتها الصادرة خلاله أيضاً لتتجه نحو العضو المستقل.

- sensorimotor a. (= neural a.) قَوْسٌ حِسِّيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ: قَوْسٌ عَصَبِيَّةٌ.

archaeocerebellum المَخْيِخُ البِدَائِي. القسم التطوري القديم من المخيخ، وهو يشمل العقدة النذفية العقدية واللسين وتغذيها الياف قوقعة دمليزية بصورة رئيسية كما يستلم اللسين بعض الالياف النخاعية المخيخية أيضاً.

archaeocortex القَشْرَةُ البِدَائِيَّة. قسم قَشْرَةُ المَخِّ الذي يتطور مع القشرة القديمة بالترابط مع الجملة الشمية وهي أقدم تطورياً من القشرة الحديثة ولا تحتوي على بنيات طبقية.

archencephalon الدِمَاعُ البِدَائِي. الدماغ البدائي أمام الحبل الظهري الذي يتطور منه الدماغ المتوسط والدماغ الأمامي.

archeocerebellum المَخْيِخُ البِدَائِي. انظر archaeocerebellum.

archeocortex القَشْرَةُ البِدَائِيَّة. انظر archaeocortex.


archeokinetic (= archeocinetic) حَرَكِيَّةٌ بِدَائِيَّة. آلية العصب الحركي البدائية التي تشاهد في الجهاز العصبي المحيطي والعقدي.

archipallium القَشْرَةُ البِدَائِيَّة. البالة البدائية. انظر archaeocortex.

archistriatum المَخْطَاطُ البِدَائِي. الجسم المخطط البدائي الذي يمثل في الإنسان الجسم اللوزي.

ardanesthesia فَقْدَانُ حِسِّ الحَرَارَةِ. انظر thermanesthesia.

area بَاحَةٌ. حيز محدود، ويستعمل الاصطلاح تشريحياً ليدل على موضع محدد أو منطقة وظيفية محدودة.



arc, reflex

القوس الانعكاسية: (1) منطقة الجلد المنبه والعصب الحسي (2) السبيل العصبي الوارد (3) العقدة الشوكية (الخلية العصبية الحسية) (4) الجذر الخلفي (5) خلية عصبية دماغية (6) السبيل العائلي للمنعكس (7) العصبون الحركي للقرن الأمامي (8) الجذر الأمامي (9) السبيل العصبي الصادر (10) تنبيه عضلات الذراع وانثناءها.

- acoustic a. (= a. acoustica, vestibular a.) البَاحَةُ السَّمْعِيَّةُ: البَاحَةُ الدَّهْلِيْزِيَّةُ.

- amygdaloid a. (= a. amygdaloidea anterior) البَاحَةُ اللُّوْزِيَّةُ.

- a. amygdaloidea anterior البَاحَةُ اللُّوْزِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. منطقة عبورية ضعيفة التمايز في القسم القشري الإنسي للجسم اللوزي تقصّل عبره النوى مع المناطق المجاورة.

- association a's. بَاحَاتٌ تَرَابُطِيَّةُ. باحات قشرة المخ التي تترايط مع بعضها البعض ومع المهاد الجديد بواسطة ألياف عديدة تمر خلال الجسم الثفني والمادة البيضاء لنصفي كرة المخ وتتم في هذه المناطق الكثير من الوظائف الدماغية العليا كالوظائف العقلية والعاطفية والفكرية والذاكرة والتعلم.

- auditory a. (= vestibular a.) البَاحَةُ السَّمْعِيَّةُ: البَاحَةُ الدَّهْلِيْزِيَّةُ.


- Betz cell a. (= motor a.) البَاحَةُ الحَرَكِيَّةُ: بَاحَةُ خَلَايَا بَيْتْز.

- Broca's motor speech a. بَاحَةُ بَرْوَكَا الكَلَامِيَّةُ الحَرَكِيَّةُ. باحة تشمل أجزاء من القسمين الوصادي والمتلثي للتلفيف الجبهي السفلي وتؤدي إصابتها إلى حبسة حركية

- Broca's parolfactory a. (= a. subcallosa) البَاحَةُ تَحْتَ الثَّنْيَةِ.

- Brodmann's a's. بَاحَاتٌ بَرْوَدْمَان. باحات القشرة المخية المختلفة والتميز باختلافات ترتيب طبقاتها الخلوية الست مما يعطي كلّ منها رقماً خاصاً بها.


القشرة الحسية الحركية للمخ



areas, cerebral

رسم يبين الباحات الحسية والحركية في قشرة المخ امام وخلف الشق المركزي.

- **a. centralis** البَاحَةُ المَرْكَزِيَّة. بقعة الشبكية.
انظر macular retinae.
- **cingulate a.** البَاحَةُ الحِزَامِيَّة. الباحة
التي تشمل التلفيف الحزامي والبرزخ.
- **a. cochleae** البَاحَةُ القَوَاقِعِيَّة. القسم الامامي
من الجزء السفلي من قاع الصماخ السمعي الباطن
بالقرب من قاعدة القوقعة.
- **a. cribrosa media (= a. vestibularis inferior)** البَاحَةُ المِصْفَوِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ.
باحة الدهليز السفلية.
- **a. cribrosa superior (= a. vestibularis superior)** البَاحَةُ المِصْفَوِيَّةُ الْعُلَوِيَّةُ.
باحة الدهليز العلوية.
- **dorsal hypothalamic a. (= regiohypothalamica dorsalis)** المِنطَقَةُ الظَّهْرِيَّةُ
للوطاء.
- **entorhinal a.** البَاحَةُ الشَّمِيَّةُ الدَّاخِلِيَّة.
جزء القشرة المخية للتلفيف جنيب الوطاء وعلى الجهة
الإنسية للشق الشمي.
- **excitable a.** بَاحَةُ مُسْتَنَّاظَةٍ. أية باحة في
القشرة المخية تولد عند استثارتها استجابات حركية.
- **excitomotor a. (= motor a.)** بَاحَةُ اسْتِنَّاظَةٍ
حَرَكَيَّة.
- **eye a.** البَاحَةُ الْعَيْنِيَّة. باحة الساحة العينية
في الفص الجبهي التي تسيطر على حركة العينين.
- **frontal a's.** البَاحَاتُ الجَبْهِيَّة. باحات قشرة المخ
التي توجد أمام الشق المركزي وتشمل تلك الموجودة
على المنطقة الحجاجية والوجه الإنسي للفص الجبهي.
- **fronto-orbital a. (= prefrontal a.)** البَاحَةُ
أَمَامُ الجَبْهِيَّة! البَاحَةُ الجَبْهِيَّةُ الحَاجَاجِيَّة.
- **gustatory a.** البَاحَةُ الذَّوْقِيَّة. باحة القشرة
الدماغية التي تستلم حس الذوق وهي مختلفة عادة في
الشق الوحشي من مخ الإنسان.
- **a. hypothalamica dorsalis (= regiohypothalamica dorsalis)** باحة الوطاء
الظَّهْرَانِيَّة: نَاجِيَّةُ ظَهْرِ الوطاء. البَاحَةُ الوطاءِيَّة.
- **a. hypothalamica lateralis** بَاحَةُ الوطاءِ
الوَحْشِيَّة. باحة في منطقة الوطاء المتوسطة على
الجهة الوحشية من القبو ومن الحزمة الحلمية
المهادية.
- **insular a.** بَاحَةُ الْجَزِيرَةِ. قشرة الجزيرة.




areas, cerebral

المناطق الدماغية القشرية (والدماغية الشمية) المتعلقة بالانفعالات العاطفية والوظائف الحشوية المستقلة: (1) الباحة الحركية 4 (2) الباحة الحسية الجسدية (3) الجسم الثفني (4) الحصين (5) التلفيف الحصيني (6) الباحة البصرية 17 (7) الجهاز الشمي 1 (8) المعقد اللوزي (9) الجهاز الشمي 2 (10) الجهاز الشمي 3 (11) القشرة الحجاجية (12) البصلة الشمية (13) الجسم الحلمي (14) الباحات أمام الجبهية 10، 11، 12 (15) المهاد (16) القبو (17) التلفيف الحزامي (18) الباحة أمام الحركية 6.

- language a. بَاحَةُ اللِّغَةِ. إحدى مناطق قشرة المخ في نصف الكرة السائد التي تتحكم وتسيطر على إدراك اللغة والكلام.
- macular a. باحة البقعة؛ بُقْعَةُ الشَّبَكِيَّة. انظر macular retinae.
- motor a. البَاحَةُ الحَرَكِيَّة. منطقة القشرة المخية الواطئة العتبة ذات فترة الكمون القصيرة للمنبهات الكهربائية التي تولد الاستجابات الحركية العضلية.
- motor speech a. (= Broca's motor speech a.) بَاحَةُ الكَلَام الحَرَكِيَّة.
- a. nervi facialis بَاحَةُ العَصَب الوَجْهِي. جزء قاع الصماخ السمعي الباطن من حيث يدخل العصب الوجهي إلى القناة الوجهية.
- olfactory a. البَاحَةُ السَّمِّيَّة. 1. منطقة واسعة تشمل البصلة الشمية والسبيل والمثلث الشميين والجزء الأمامي من التلفيف الحزامي والمعقف. 2. المادة المثقبة الأمامية.
- a. opaca البَاحَةُ المَعْتَمَةِ.
- parolfactory a. of Broca (= a. subcallosa) بَاحَةُ بروكا حول الشَّمِّيَّة؛ البَاحَةُ تَحْتَ الثَّنَائِيَّة.
- a. perforata (= substantia perforata) الباحة المثقبة؛ المَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ.
- peristriate a. البَاحَةُ حَوْلَ المَحْطَاطِيَّة. باحة في القشرة القذالية للمخ تحيط بالقشرة البصرية المخططة.
- piriform a. البَاحَةُ الكُمُثْرِيَّة الشَّكْل. باحة في الدماغ الشمي تشمل التلفيف الشمي الوحشي وعتبة الجزيرة والمعقف وجزء من التلفيف جنيب الوطاء. وهي عادة شبيهة بشكل الكمثرى.
- postcentral a. البَاحَةُ خَلْفَ المَرْكَزِي. الباحة الحسية التي تقع بالخلف من التلم المركزي لنصف كرة المخ وهي منطقة الإدراك الحسي الأولي العام.
- a. postrema البَاحَةُ خَلْفَ الحَافَةِ. باحة صغيرة شبيهة باللسان تقع على الجدار الوحشي للبطين الرابع بين الحبل الفاصل والحديبة الناحلة ومن الممكن أن يحور فيها الحاجز الدموي الدماغي.
- postrolandic a. (= postcentral a.) البَاحَةُ بَعْدَ المَرْكَزِي.
- precentral a. (= motor a.) البَاحَةُ الحَرَكِيَّة؛ البَاحَةُ أَمَامَ المَرْكَزِي.
- prefrontal a. البَاحَةُ أَمَامَ الجَبْهِيَّة. قشرة الفص الجبهي أمام القشرة قبل الحركية مباشرة وهي منطقة تختص بالوظائف الارتباطية بصورة عامة.
- premotor a. البَاحَةُ أَمَامَ الحَرَكِيَّة. قشرة الفص الجبهي التي تقع مباشرة أمام التلفيف قبل المركزي.
- preoptic a. (= a. preoptica) البَاحَةُ أَمَامَ البَصْرِيَّة. مجموعات متعددة من الخلايا تقع في المستوى الناصف مباشرة تحت الصوار الأمامي للدماغ الانتهاشي وهي مرتبطة وظيفياً بالوطاء.
- pretectal a. (= a. pretectalis) البَاحَةُ أَمَامَ السَّقْفِيَّة. باحة تقع عند اتصال الدماغ المتوسط والدماغ البيني وتمتد من موقع ظهري وحشي لصوار فوق المهاد نحو الأكمة القحفية حيث تتوضع فيها النواة أمام السقفية.
- primary a's. البَاحَاتُ الأُولِيَّة. باحات القشرة المخية التي تشمل الباحات الحركية والحسية.
- primary receptive a. بَاحَةُ اسْتِقْبَالِيَّة أُولِيَّة. باحة القشرة المخية التي تستقبل الإسقاطات المهادية لأنواع الحواس الأولية كالبصر والسمع واللمس وما شاكل.
- projection a's. البَاحَاتُ الإسْقَاطِيَّة. باحات القشرة المخية التي تستقبل الإسقاطات الحسية الأولية المباشرة من أنحاء الجسم.
- psychomotor a. (= motor a.) البَاحَةُ الحَرَكِيَّة.
- pyriform a. (= piriform a.) البَاحَةُ الكُمُثْرِيَّة الشَّكْل.
- receptive a. (= primary receptive a.) بَاحَةُ اسْتِقْبَالِيَّة.
- rolandic a. (= motor a.) البَاحَةُ الحَرَكِيَّة.
- sensorimotor a. البَاحَةُ الحَسِّيَّة الحَرَكِيَّة. القشرة المخية قبل وبعد التلم المركزي وتشمل التلفيف بعد المركزي (الباحة المستقبلية الأولية) والتلفيف قبل المركزي (الباحة الحركية).
- sensory a. (= primary receptive a.) الباحة الحسية؛ البَاحَةُ الاسْتِقْبَالِيَّة الأُولِيَّة.

- **septal a.** البَاحَةُ الحَاجِزِيَّة. الباحة الموجودة على نصفي كرة المخ وتشمل الباحة جنب الشمية (الباحة تحت الثقبية) والمنطقة المناسبة من الحاجز الشفاف. وتصل هذه الباحة ارتباطات من المناطق الشمية والوطائية والحسينية.
- **silent a.** بَاحَةٌ صَامِتَةٌ. منطقة دماغية تحدث فيها بعض الآفات المرضية من دون توليد أية أعراض مرضية للمصاب.
- **somatic sensory a. (= somatosensory a.)** بَاحَةُ الحِسِّ الجَسَدِيِّ. باحة الإسقاط القشرية المخية في التلفيف بعد المركزي تستقبل المعلومات التي تبدأ عند تنبيه مستقبلات الجلد والمفاصل والعضلات والاحشاء وهي تشارك في الإدراك الواعي للحواس.
- **a. striata (= cortex, straita):** البَاحَةُ المَخْطُوطَةُ: القَشْرَةُ المَخْطُوطَةُ.
- **strip a.** البَاحَةُ الشَّرِيطِيَّة. منطقة ضيقة طولانية تفصل الباحة الحركية عن الباحة قبل الحركية ويعتقد بأنها منطقة مثبطة.
- **a. subcallosa (= subcallosal a.)** البَاحَةُ تَحْتَ الثَّقْبِيَّة. باحة صغيرة على السطح الإنسي لقشرة نصف كرة المخ أمام التلفيف تحت الثقبية مباشرة.
- **supplementary a's.** البَاحَاتُ الإِضَافِيَّة. باحات حركية أو حسية تكمل الباحات الأولية.
- **suppressor a's.** بَاحَاتُ كَاطِبَةٍ. باحات في قشرة المخ تثبط أو تمنع الحركات الجسمية.
- **vagus a. (= trigonum nervi vagi)** البَاحَةُ الدِفْلِيَزِيَّة. حدة دائرية مثلثة تقع بالجهة الوحشية لنقرة البطين الرابع وتر من فوقها السطور البصلية وهي تمتد إلى الرقب الوحشي حيث تكون الحدية السمعية.
- **a. vestibularis inferior** البَاحَةُ الدِفْلِيَزِيَّةُ السُّفْلِيَّة. القسم السفلي من قاع الصماخ السمعي الباطن.
- **a. vestibularis superior** البَاحَةُ الدِفْلِيَزِيَّةُ العُلْوِيَّة. القسم العلوي من قاع الصماخ السمعي الباطن.

- **visual a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّة. القشرة المخية المخططة وحول المخططة في الفص القذالي.
- **visuopsychic a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّةُ النَّفْسَانِيَّة. باحة القشرة المخية المتخصصة في ترجمة وإدراك الحواس البصرية.
- **visuosensory a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّةُ الحِسِّيَّة. باحة إسقاطية في قشرة المخ تستقبل الدفعات الحسية التي تبدأ من شبكية العين وهي باحة تحيط بالشق المهادي وتقوم بإدراك الحواس البصرية الواعية.
- **Wernicke's a.** بَاحَةُ فَرْنِيكَة. الباحة التي تشمل مركز الكلام في القسم الخلفي من التلفيف الصدغي العلوي والتلفيف فوق الهامشي والزواوي.
- **areflexia** فَقْدُ المُنْعَكَسَات. فقدان المنعكسات.
- **argamblyopia** غَمَشُ الإِفْهَال. غمش يتولد لعدم استعمال العين لفترة طويلة.
- **arhigosis (= arrhigosis)** فَقْدَانُ حَسِّن. عدم المقدرة على إدراك حس البرد.
- **arhinencephalia (= arhinencephaly)** إِنْغِدَامُ الدِّمَاغِ الشَّمِيِّ. الغياب الخلقي للدماغ الشمي.
- **arithmomania** هَوَسُ الحِسَاب. هوس عد الخطوات عند المشي مثلاً أو عد درجات السلم أو أعمدة الكهرباء وما شاكل ذلك وهو عرض في الاضطراب الوسواسي القسري.
- **arousal** 1. تَهَيُّجٌ جِنْسِيٌّ. 2. تَهَيُّجٌ جِنْسِيٌّ. حالة التيقظ والاستجابة للمنبهات الحسية 2. هيجان جنسي.
- **arrector pili** مَفْقَةُ الشَّعْرَةِ. عضلة جلدية صغيرة ملساء تلتصق بالغمد النسيجي الضام لجريب الشعرة يؤدي تقلصها إلى وقوف الشعرة وانتصابها، ويغذيها عصب ودي.
- **arrhaphia (= status dysrrhaphia)** خَلَلُ الإِرْتِفَاء. خَالَةٌ سُوءُ الرُّفُو.
- **arrhinencephalia (= arhinencephalia)** غِيَابُ الدِّمَاغِ الشَّمِيِّ.
- **arteralgia** أَلَمٌ شَرِيَانِي المَنَشَأ. ألم يتولد عن إصابة الشريان مثل الصداع الذي ينتج عن التهاب الشريان الصدغي.
- **arteria (= artery)** شَرِيَان. (ج: شرايين). اسم تشريحي للشريان.




arteria

شريانين ولوردة الوجه وفروة الرأس: (1) الشريان والوريد الصدغيان (2) الشريان الوجني الحجاجي (3) الشريان وفروة الوجهين المستعرضان (4) الشريان والوريد فوق الحجاج (5) الشريان والوريد فوق البكري (6) الوريد الأنفي الجبهي الشريان الأنفي الظهري (8) الشريان والوريد الزاويان (9) الوريد الوجني العميق (10) الوريد الوجني الأمامي (11) شريان الوجني (12) الشريان والوريد الوجهين (13) الشريان السباتي الظاهر (14) الشريان السباتي الباطن (15) الشريان قسطنطين (16) الوريد الوداجي الباطن (17) الوريد الوجني الخلفي (18) الوريد الوجني الأصلي (19) الشريان قنطاري الشريان الوداجي الظاهر (21) الشريان والوريد خلف الأنفي (22) الوريد القذالي (23) الشريان القذالي (24) فروع قسطنطين للشريان القذالي (25) الوريد الخشائي المشعري (26) الوريد والشريان الصدغي السطحي و (27) فرعها الجداري و (28) فرعها الجبهي (29) الوريد الجداري المشعري (30) الخوذة (مقطوعة).


- a. auditiva interna (= a. labyrinthi)
الشريان الأذني الباطن. الشريان التيهي.
- a. basilaris (= basilar artery) الشريان القاعدي.
- a. carotis communis (= common carotid artery) الشريان السباتي الظاهر.
- a. carotis interna (internal carotid artery) الشريان السباتي الباطن.
- arteriae centralis anterolaterales
الشرايين المركزية الأمامية الوحشية. شرايين تبدأ من القسم الوتدي للشريان المخي الوسطي وتغطي مجموعتين من الفروع الإنسية والوحشية وتتوزع إلى النواتين العدسية الأمامية والمذنبية والمحفظة الباطنة للدماغ.
- arteriae centralis anteromedialis
الشرايين المركزية الأمامية الإنسية. القسم قبل الموصل من الشريان المخي الأمامي ولا يعطي أية فروع ويفذي الجسمين المخططين الأمامي والإنسي.
- a. centralis brevis الشريان المركزي القصير. شريان مركزي طويل من القسم قبل الموصل للشريان المخي الأمامي.
- a. centralis longa الشريان المركزي الطويل. شريان مركزي طويل وهو فرع من القسم قبل الموصل للشريان المخي الأمامي.
- arteriae centralis posterolateralis
الشرايين المركزية الخلفية الوحشية. القسم بعد الموصل من الشريان المخي الخلفي ولا يعطي أية فروع ويفذي السويقة المخية والمهاد الخلفي والأكيمن والأجسام الركبية والصنوبرية.
- arteriae centralis posteromedialis
الشرايين المركزية الخلفية الإنسية. القسم بعد الموصل من الشريان المخي الخلفي ولا يعطي أية فروع ويفذي المهاد الأمامي والجدار الوحشي للبطين والكرة الشاحنة للنواة العدسية.
- a. cerebelli inferior anterior (= inferior anterior cerebellar artery) الشريان المخيخي السفلي الأمامي.
- a. cerebelli inferior posterior (= inferior

- posterior cerebellar artery) الشريان المخيخي السفلي الخلفي.
- a. cerebelli superior الشريان المخيخي العلوي. شريان يبدأ من الشريان القاعدي ولا يعطي أية فروع ويتوزع إلى المخيخ العلوي والدماغ المتوسط والجسم الصنوبري والصفيرة المشيمانية للبطين الثالث.
- a. cerebri anterior (= anterior cerebral artery) الشريان المخيخي الأمامي.
- a. cerebri media (= middle cerebral artery) الشريان المخيخي الوسطي.
- a. cerebri posterior (= posterior cerebral artery) الشريان المخيخي الخلفي.
- a. choroidea anterior (anterior choroidal artery) الشريان المشيمائي الأمامي.
- a. communicans anterior cerebri (= anterior cerebral communicating artery) الشريان الموصل المخيخي الأمامي.
- a. communicans posterior cerebri (= posterior cerebral communicating artery) الشريان الموصل المخيخي الخلفي.
- a. ethmoidalis anterior (= anterior ethmoidal artery) الشريان العزالي الأمامي.
- a. ethmoidalis posterior (= posterior ethmoidal artery) الشريان العزالي الخلفي.
- a. frontobasalis lateralis (= latera frontobasal artery) الشريان الجبهي القاعدي الوحشي.
- a. frontobasalis medialis (= medial frontobasal artery) الشريان الجبهي القاعدي الإنسي.
- a. gyri angularis (= angular gyrus artery) شريان التفيف الزاوي.
- a. hypophysialis inferior (= inferior hypophyseal artery) الشريان النخامي السفلي.
- a. hypophysialis superior (= superior hypophyseal artery) الشريان النخامي العلوي.




arteria cerebri

شرايين الوجه الوحشي الأيسر للدماغ: (1) الفرع الصدغي الخلفي للمخي المتوسط (2) الفرع الصدغي الأوسط للمخي المتوسط (3) الفرع الصدغي الأمامي للمخي المتوسط (4) الشريان السباتي الباطن (5) الشريان المخي الأمامي (6) الشريان الموصل الأمامي (7) الشريان المخي الأمامي (8) الشريان المخي المتوسط (9) الفروع الانتهازية للمخي الأمامي (10) الفرع الحجاجي الجبهي للمخي المتوسط (11) الفرع الجبهي للمخي المتوسط (12) الفرع أمام الرولاندي للمخي المتوسط (13) الفرع الرولاندي للمخي المتوسط (14) الفرع الجداري الأمامي للمخي المتوسط (15) الفرع الجداري الخلفي للمخي المتوسط (16) الفرع الجداري القذالي (الزاوي) للمخي المتوسط (17) الفروع الانتهازية للمخي الخلفي.




arteria cerebri

شرايين قاعدة الدماغ: (1) الشريان الموصل الأمامي (2) الفرع الراجع للمخي الأمامي (3) السباتي الباطن (4) المخي الأمامي (5) المخي المتوسط (6) الشريانان المخططان الإنسي والوحشي (7) الشريان المشيموي الأمامي (8) الشريان الموصل الخلفي (9) الشريان المخي الخلفي (10) الشريان المخيخي العلوي (11) الشريان القاعدي (12) الشريان السعبي الباطن (13) الشريان المخيخي العلوي الأمامي (14) الشريان الفقري (15) الشريان النخاعي الأمامي (16) الشريان المخيخي السفلي الخلفي (17) الشريان النخاعي الخلفي.



arteria cerebri

شريانين الجهة الإنسية للدماغ: (1) فروع الجبهي الباطني (2) الخلفي (3) المتوسطي (4) الأمامي (5) الفرع الحافلي النفسي (6) الفرع الجبهي القطبي (7) الشريان المخي الأمامي الأيمن (8) الفرع الحجاجي (9) الشريان الموصل الأمامي (10) الفرع الراجع (11) الشريان المخي الأمامي الأيمن (12) الشريان السباتي الباطن (13) الشريان الموصل الخلفي (14) الفرع الصدغي الأمامي (15) الفرع الصدغي الخلفي (16) الفرع المهادي (17) الفرع الجداري القذالي (18) الشريان المخي الخلفي الأيمن (19) الفرع أمام الإسفيني (20) الفرع جنيب المركزي (21) الفرع حول النفسي.



arteria cerebri

منظر جبهي للدماغ يبين شرايينه المختلفة: (1) الفرع جنيب المركزي للمخ الأمامي (2) فروع الجبهي الباطن الأمامي والمتوسط والخلفي للمخ الأمامي (3) الفرع التفتي الحافي للمخ الأمامي (4) الفرع الجسري القطني للمخ الأمامي (5) الفرع الحجابي للمخ الأمامي (6) الفرع الراجع للمخ الأمامي (7) الشريان المخي الأمامي (8) الشريان السباتي الباطن (9) شريان المشيمية الأمامي (10) العصب المحرك للعين (11) الشريان القاعدي (12) العصب المبعد (13) الشريان السععي الباطن (14) الشريان المخيخي السفلي الأمامي (15) الشريان المخيخي السفلي الخلفي (16) الشريان النخاعي الخلفي (17) الشريان الفقري (18) الشريان المخيخي العلوي (19) الشريان المخيخي الخلفي (20) الشريان الموصل المتوسط والخلفي (21) الشريان الموصل الأمامي (22) الشريان المخي المتوسط (23) الفروع الصغرية الأمامية والأمامية للشريان المتوسط (24) الفرع الجداري القذالي للمخ المتوسط (25) الفرعان الجداريان الأمامي والخلفي (26) الفرعان الرولاندي وأمام الرولاندي للمخ المتوسط (27) الفرع الجبهي للمخ المتوسط (28) الفرع الحجابي الجبهي للمخ المتوسط (29) الفرعان المخططان الإنسي والوحشي للمخ المتوسط.

- a. inferior anterior cerebelli (= anterior inferior cerebellar artery) الشَّرِيَّانُ الْمُخَيَّيُّ السُّفْلِيُّ الْأَمَامِيُّ.
- a. inferior posterior cerebelli (= posterior inferior cerebellar artery) الشَّرِيَّانُ الْمُخَيَّيُّ السُّفْلِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. labyrinthi (= labyrinthine artery) الشَّرِيَّانُ التَّبْهِي.
- a. meningea anterior (= ramus meningeus anterior arteriae ethmoidalis anterioris) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِيُّ الْأَمَامِيُّ. الفرع السَّحَائِيُّ الْأَمَامِيُّ لِلشَّرِيَّانِ الْغُرْبَالِيِّ الْأَمَامِيِّ.
- a. meningea media (= middle meningeal artery) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِيُّ الْأَوْسَطُ.
- a. meningea posterior (= posterior meningeal artery) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- arteriae mesencephalicae شَرَايِينُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطُ. شَرَايِينُ تَبْدَأُ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْقَاعَدِيِّ وَلَا تَعْطِي أَيْةَ فُرُوعٍ وَتَتَوَزَّعُ إِلَى سَوِيْقَةِ الْمَخ.
- a. occipitalis (= occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيُّ.
- a. occipitalis lateralis (= lateral occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيُّ الْوُحْشِيُّ.
- a. occipitalis medialis (= medial occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيُّ الْإِنْسِي.
- a. ophthalmica (= ophthalmic artery) الشَّرِيَّانُ الْعَيْنِيُّ.
- a. paracentralis (= paracentral artery) الشَّرِيَّانُ الْمَجَاوِرُ لِلْمَرْكَزِيِّ.
- arteriae parietales anterior et posterior الشَّرَايِينُ الْجِدَارِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ وَالْخَلْفِيَّةُ. الْقِسْمُ الْإِنْتِهَائِيُّ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْمُخِيِّ الْمُتَوَسِّطِ وَيَتَفَرَّعُ إِلَى الْفُرْعَيْنِ الْأَمَامِيِّ وَالْخَلْفِيِّ اللَّذَيْنِ يَتَوَزَّعَانِ إِلَى الْقَصِينِ الْجِدَارِيِّ الْأَمَامِيِّ وَالصَّدْغِيِّ الْخَلْفِيِّ.
- a. parieto-occipitalis (= parietooccipital artery) الشَّرِيَّانُ الْجِدَارِيُّ الْقَذَالِيُّ.
- a. pericallosa (= pars postcommunalis arteria cerebri anterioris) الشَّرِيَّانُ حَوْلَ الْفَنْي. الْفَرْعُ بَعْدَ الْمَوْصَلِ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخِيِّ الْأَمَامِيِّ.
- arteriae pontis (= pontine a's.) الشَّرَايِينُ الْجَسْرِيَّةُ.
- a. precunealis شَرِيَّانُ الطَّلُّ (أَمَامُ الْإِسْفِينِ). الْقِسْمُ خَلْفَ الْمَوْصَلِ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخِيِّ الْأَمَامِيِّ وَلَيْسَتْ لَهُ أَيْةُ فُرُوعٍ وَيَغْذِي الطَّلُّ (أَمَامُ الْإِسْفِينِ).
- a. spinalis anterior (= anterior spinal artery) الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِيُّ الْأَمَامِيُّ.
- a. spinalis posterior (= posterior spinal artery) الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. sulci centralis (= central sulcus artery) شَرِيَّانُ التَّلْمِ بَعْدَ الْمَرْكَزِيِّ.
- a. sulci precentralis (= precentral sulcus artery) شَرِيَّانُ التَّلْمِ قَبْلَ الْمَرْكَزِيِّ.
- a. temporalis anterior (= anterior temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَمَامِيُّ.
- a. temporalis media arteriae temporalis superficialis) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَوْسَطُ لِلشَّرِيَّانِ الصَّدْغِيِّ السَّطْحِيِّ. يَبْدَأُ مِنَ الشَّرِيَّانِ الصَّدْغِيِّ السَّطْحِيِّ وَلَيْسَتْ لَهُ أَيْةُ فُرُوعٍ وَيَغْذِي الْمَنْطَقَةَ الصَّدْغِيَّةَ.
- a. temporalis media partis insularis arteriae cerebri mediae الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَوْسَطُ لِلْقِسْمِ الْجَزِيرِيِّ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخِيِّ الْأَوْسَطِ. الْقِسْمُ الْجَزِيرِيُّ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْمُخِيِّ الْمُتَوَسِّطِ وَلَيْسَتْ لَهُ أَيْةُ فُرُوعٍ وَيَتَوَزَّعُ إِلَى قَشْرَةِ الْفَصْرِ الصَّدْغِيِّ بَيْنَ الشَّرِيَّانَيْنِ الْمُخَيَّيْنِ الْأَمَامِيِّ وَالْخَلْفِيِّ.
- a. temporalis posterior (= posterior temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. temporalis profunda posterior (= posterior deep temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ الْعَمِيقُ.
- a. vertebralis (= vertebral artery) الشَّرِيَّانُ الْفَقْرِيُّ.

arteriola (= arteriole) شُرَيْن. (ج): فرع شرياني صغير خصوصاً ذلك القريب من الشعيرات.

- a. macularis inferior الشُرَيْنُ البَقْعِي السُّفْلِي. الشرين السفلي الذي يغذي بقعة الشبكية.

- a. macularis superior الشُرَيْنُ البَقْعِي العلوي. الشرين العلوي الذي يغذي الشبكية.

arteriosclerosis تَصَلُّبُ شُرَيَانِي. تصلب وتثخن جدران الشرايين.

- cerebral a. تَصَلُّبُ الشَّرَايِينِ الدِّمَاغِيَّة. تصلب شرايين الدماغ.

artery شُرَيَان. وعاء دموي ينقل الدم من القلب إلى أقسام الجسم المختلفة.

- auditory a., internal (= arteria labyrinthi) الشُرَيَانُ التِّهْمِي. شريان يبدأ من الشريان القاعدي أو الشريان المخيخي السفلي وينتشر خلال الصماخ السمعي الباطن إلى الأذن الداخلية.

- basilar a. (= arteria basilaris) الشُرَيَانُ القَاعِي. الشريان الذي يتكون من اتصال الشريانيين الفقريين الأيمن والأيسر وتغذي فروعه جذع الدماغ والأذن الداخلية والمخيخ والمخ الخلفي.

- carotid a., common (= arteria carotida communis) الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْأَصْلِي. الشريان الذي يتفرع من الجذع العضدي الراسي (الأيمن) أو من قوس الأبهر (الأيسر) وينقسم إلى الشريانيين السباتيين الظاهر والباطن.

- carotid a., external الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الظَّاهِر. الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي العام وتنتشر فروعه إلى الغدة الدرقية والبلعوم واللسان والوجه وإلى المناطق القذالية والأذنية الخلفية والصدغية السطحية والفكية العلوية.

- carotid a., internal الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْبَاطِن. الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي العام وتنتشر فروعه إلى مناطق الأذن الوسطى والعين والحجاب والصفيرة المشيمية والغدة النخامية والمخ.

- central a's. الشَّرَايِينُ الْمُرَكَّزِيَّة. مجموعة من الشرايين التي تتفرع من الشرايين المخية الكبيرة المختلفة وتوزع لمختلف أقسام المخ.

- cephalic a. (= common carotid a.) الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْأَصْلِي.

- cerebellar a., inferior anterior الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي السُّفْلِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان القاعدي وينتشر إلى القسم الأمامي السفلي للمخيخ وللأقسام السفلية والوحشية للجسر وأحياناً إلى القسم العلوي من البصلة.

- cerebellar a., inferior posterior الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي السُّفْلِي الْخَلْفِي. شريان يتفرع من الشريان الفقري ويتوزع إلى القسم السفلي من المخيخ والبصلة والصفيرة المشيمية للبطين الرابع.

- cerebellar a., superior الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي العلوي. شريان يتفرع من الشريان القاعدي وتتوزع فروعه إلى القسم العلوي من المخيخ والدماغ المتوسط والجسم الصنوبري والصفيرة المشيمية للبطين الثالث.

- cerebral a., anterior الشُرَيَانُ الْمُخِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى القشرة الحجاجية والجبهية والجدارية والجسم الثفني والمحفظة الداخلية والصفيرة المشيمية للبطين الجانبي.

- cerebral a., middle الشُرَيَانُ الْمُخِي الْأَوْسَط. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى القشرة الحجاجية والجبهية والجدارية والصدغية والجسم المخطط والمحفظة الداخلية.

- cerebral a., posterior الشُرَيَانُ الْمُخِي الْخَلْفِي. هو الانتعاب الانتهائي للشريان القاعدي ويتوزع إلى القشرتين الصدغية والقذالية وإلى الدماغين البيني والمتوسط وإلى الصفيرتين المشيميتين في البطينين الثالث والجانبي والباحة البصرية للقشرة المخية وإلى البنيات الأخرى المتعلقة بالسبيل البصري.

- choroidal a., anterior شُرَيَانُ الْمَشِيمِيَّة الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن أو الشريان المخي الوسطي ويتوزع إلى داخل الدماغ والصفيرة المشيمية للبطين الجانبي وإلى المناطق المجاورة.

- communicating a., anterior cerebral الشُرَيَانُ الْمُؤَصِّلُ الْمُخِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان الأمامي قبل منطقة الموصل ويعمل بعض التوصيلات مع الشرايين المخية الأمامية.

- communicating a., posterior cerebral

الشَّرِيَّانُ الْمُوصِّلُ الْمُخَيُّ الْخَلْفِي. شريان يوصل بعض التوصيلات من الشريان السباتي الباطن إلى الشرايين المخية الخلفية.

- ethmoidal a., anterior الشَّرِيَّانُ الْغَرْبَالِي الْأَمَامِي.

شريان يتفرع من الشريان العيني ويتوزع إلى الأم الجافية والأنف والجيب الجبهي والخلايا الغרבالية الامامية.

- ethmoidal a., posterior الشَّرِيَّانُ الْغَرْبَالِي الْخَلْفِي.

شريان يتفرع من الشريان العيني ويتوزع إلى الخلايا الغרבالية الخلفية والأم الجافية والأنف.

- frontobasal a., lateral الشَّرِيَّانُ الْجَبْهِي الْقَاعِدِيُّ الْوُخْشِي.

شريان يتفرع من القسم الجزيري من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الوحشية السفلية للفص الجبهي.

- frontobasal a., medial الشَّرِيَّانُ الْجَبْهِي الْقَاعِدِيُّ الْإِنْسِي.

شريان يتفرع من القسم بعد الموصل من الشريان المخي الامامي ويتوزع إلى القشرة الوحشية السفلية للفص الجبهي.

- gyrus a., angular شَرِيَّانُ الْقَلْفِيفِ الزَاوِي.

فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى الفصوص الصدغية والجدارية والقذالية.

- hypophyseal a., inferior الشَّرِيَّانُ النُّخَامِي السُّفْلِي.

فرع صغير من القسم المخي من الشريان السباتي الباطن يغذي الغدة النخامية.

- hypophyseal a., superior الشَّرِيَّانُ النُّخَامِي الْعُلْوِي.

فرع صغير من القسم المخي من الشريان السباتي الباطن يغذي الغدة النخامية.

- labyrinthine a. الشَّرِيَّانُ الْقِيْهِي.

شريان يتفرع من الشريان القاعدي أو من الشريان المخيخي السفلي الامامي ويتوزع خلال الصماخ السمعي الباطن إلى الأذن الداخلية.

- lenticulostriate a. الشَّرِيَّانُ الْعَدْسِي الْمُخْطَاطِي.

واحد من الفروع الإنسية أو الوحشية من الفروع الامامية الوحشية المركزية للشريان المخي الواسطي وهي كثيراً ما تتعرض للنزف المخي.

- meningeal a., middle الشَّرِيَّانُ السَّحَائِي الْأَوْسَط.

فرع من شريان الفك العلوي ويتوزع إلى عظام القحف والأم الجافية.

- meningeal., posterior الشَّرِيَّانُ السَّحَائِي

الْخَلْفِي. فرع من الشريان البلعومي الصاعد ويتوزع إلى عظام القحف والجافية الخلفية.

- occipital a. الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي.

شريان يتفرع من الشريان السباتي الظاهر ويتوزع إلى عضلات الرقبة والفروة والسحايا والخلايا الخشائية.

- occipital a., lateral الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي الْوُخْشِي.

فرع انتهائي أو قشري للشريان المخي الخلفي ويتوزع إلى الأقسام الامامية والإنسية والوسطية والخلفية للفص الصدغي.

- occipital a., middle الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي الْأَوْسَط.

فرع انتهائي أو قشري من الشريان المخي الخلفي ويتوزع إلى ظهر الجسم الثفني والإسفين والطلل والتلفيف اللساني والقسم الخلفي للوجه الوحشي للفص القذالي.

- ophthalmic a. الشَّرِيَّانُ الْعَيْنِي.

شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى العين والحجاج وبنيات الوجه المجاورة.

- paracentral a. الشَّرِيَّانُ الْمَجَاوِر لِلْمَرْكَزِي.

فرع من الشريان المخي الامامي بعد الموصل وينتشر إلى قشرة المخ والشق المركزي الإنسي.

- parietal a's., anterior & posterior

الشَّرِيَّانَانِ الْجِدَارِيَّانِ الْأَمَامِي وَالْخَلْفِي. فرع انتهائي من الشريان المخي الواسطي يتفرع إلى فرعين امامي وخلفي يتوزعان إلى الفص الجداري الامامي وإلى الفص الصدغي الخلفي.

- parieto-occipital a. الشَّرِيَّانُ الْجِدَارِي الْقَذَالِي.

شريان يتفرع من القسم بعد الموصل من الشريان المخي الامامي ويتوزع إلى الفص الجداري وأحياناً إلى الفص القفوي.

- pontine a's. الشَّرَايِينُ الْجِسْرِيَّة.

شرايين تتفرع من الشريان القاعدي وتتوزع إلى الجسر والمناطق الدماغية المجاورة.

- spinal a., anterior الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِي الْأَمَامِي.

شريان يتفرع من قسم الشريان الفقري داخل الفقار ويتوزع إلى النخاع الشوكي.

- spinal a., posterior الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِي الْخَلْفِي.

يتفرع من الشريان المخيخي الامامي السفلي ويتوزع إلى النخاع الشوكي.

- sulcus, central, a. شَرِيَّانُ التَّلْمِ الْمَرْكَزِي.

فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم المركزي.

- **sulcus, postcentral, a.** شَرِيَانُ التَّلَمِ بَعْدَ الْعُزْكَزِيِّ. فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط يتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم بعد المركزي.

- **sulcus, precentral, a.** شَرِيَانُ التَّلَمِ قَبْلَ الْعُزْكَزِيِّ. فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط يتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم قبل المركزي.

- **temporal a., anterior** الشَّرِيَانُ الصَّدْغِيُّ الْأَمَامِيُّ. شريان يتفرع من القسم الجزيري للشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الأمامية للفص الصدغي.

- **temporal a., anterior deep** الشَّرِيَانُ الصَّدْغِيُّ الْأَمَامِيُّ الْعَمِيقُ. شريان يتفرع من الشريان الفكي العلوي ويتوزع إلى العضلة الصدغية ويتفاغر مع الشريان الصدغي المتوسط.

- **temporal a., posterior** الشَّرِيَانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ. شريان يتفرع من القسم الجزيري للشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الخلفية للفص الصدغي.

- **temporal a., posterior deep** الشَّرِيَانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ الْعَمِيقُ. فرع من الشريان الفكي العلوي يتوزع إلى العضلة الصدغية ويتفاغر مع الشريان الصدغي المتوسط.

- **vertebral a.** الشَّرِيَانُ الْفَقْرِيُّ. شريان يتفرع من الشريان تحت الترقوي ويتوزع إلى عضلات الرقبة والفقرات والنخاع الشوكي والمخيخ وداخل المخ.

arthralgia أَلَمٌ مَفْصَلِيٌّ. ألم في أحد المفاصل.

arthresthesia حِسٌّ مَفْصَلِيٌّ. حس المفصل.

arthrodynia وَجَعٌ مَفْصَلِيٌّ. وجع أحد المفاصل.

arthrogryposis 1. اِعْوِجَاجُ الْمَفْصَلِ 2. تَشَنُّجٌ تَكَرُّزِيٌّ. 1. انثناء المفصل أو تقفُّعه 2. تشنج تركززي للعضلات.

- **congenital multiple a.** اِعْوِجَاجُ الْمَفَاصِلِ الْخَلْقِيَّةِ. متلازمة تتصف بثبات معظم المفاصل بأوضاع شاذة مختلفة مع نقص تنامي العضلات وتناميها.

arthroneuralgia وَجَعٌ مَفْصَلِيٌّ. ألم ينشأ في المفصل أو من حواليه.

arthropathy, neurogenic اِعْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ عَصَبِيٌّ الْمُنْشَأُ.

arthropathy, neuropathic اِعْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ عَصَبِيٌّ الْمُنْشَأُ. تنكس مترقُ مزمن لقسم المفصل المتحمل للضغط والذي يمكن أن يكون مضاعفة لأحد الاعتلالات العصبية وخصوصاً التابس الظهري المصحوب بفقدان الحس الذي يؤدي إلى ارتخاء العضلات والبنيات الساندة وبالتالي إلى عدم استقرار المفصل.

arthropathy, tabetic اِعْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ تَابِسِيٌّ. اعتلال مفصلي ناتج عن التابس الظهري.

A-scan encephalography تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ التَّقْرِيسِيَّ A. تخطيط صدى الدماغ ببعدين يبين أحدهما الوقت اللازم لعودة الصدى ويبين الثاني شدته.

ascending reticular activating system الْجِهَازُ الشَّبَكِيُّ الْمُنْشِطُ الصَّاعِدُ. أنظر system.

ascending reticular alerting system (= ascending reticular activating system) الْجِهَازُ الشَّبَكِيُّ الْمُوقِظُ الصَّاعِدُ.

asemasia حُبْسَةٌ دَلَالِيَّةٌ. عدم المقدرة على التواصل سواء بالكلمات أو بالإشارات.

asemia تَعَدُّرُ الدَّلَالَةِ؛ اسْتِنْبَاهٌ. حُبْسَةٌ تنصف بعدم المقدرة على التعبير بالكلام أو بالإشارات أو فهم الكلام والإشارات بسبب آفة مركزية.

- **a. graphica** اسْتِنْبَاهُ الْمَكْتُوبِ. عدم المقدرة على التعبير بالكتابة (تعدُّر الكتابة) أو فهم الكلمات المكتوبة (تعدُّر القراءة) بسبب آفة مركزية.

- **a. mimica** اسْتِنْبَاهُ الْإِيْمَاءِ. عدم المقدرة على التعبير بالإشارات أو على توليد أية تعابير عاطفية أو فكرية.

- **a. verbalis** اسْتِنْبَاهُ اللَّفْظِ. عدم المقدرة على تلفظ الكلمات أو فهم ما يسمعه المصاب منها.

aseptic طَاهِرٌ؛ مُعَقَّمٌ؛ عَقِيمٌ. خالٍ من العدوى أو من المواد النتنة.

asexual لاجنسي. شخص مصاب باللاجنسية أو انعدام الجنس.

asexuality إنعدام الجنس. انعدام الرغبة الجنسية.

asitia بغض الطعام.

asomatognosia عمّة أقسام الجسم. عدم مقدرة المريض على التعرف على بعض أقسام جسمه.

association 1. ترابط 2. تداعي 3. مشاركة. 1. مصطلح يدل على المناطق المخية التي توصل الباحثات الحركية الأولية بالباحة الحسية الأولية. 2. ترابط بين ظاهرتين نفسانيتين كفكرتين أو شعورين نتيجة الخبرة والممارسة والتعلم 3. مجموعة أفراد أو كيانات اجتماعية تتعاون في سبيل تحقيق هدف معين.

- dream a. تداعي الأحلام. أفكار أو عواطف ترتبط بأحلام سابقة وتؤثر على سلوك الشخص وتكتشف بالتحليل النفسي.

- a. of ideas تداعي الأفكار. تداعي أفكار سابقة وربطها مع أفكار أو حوادث لاحقة.

astasia تعذّر الوقوف. عدم التناسق الحركي مع عدم المقدرة على الوقوف.

- a. - abasia تعذّر الوقوف والعشي. عدم التناسق الحركي مع عدم المقدرة على الوقوف أو على الخطو بالرغم من استطاعة المصاب تحريك ساقيه وأطرافه عند جلوسه أو استلقائه وقد يكون ذلك بسبب رنح هستيري.

astereocognosy عمّة التجسيم. انظر **astereognosis**.

astereognosis عمّة التجسيم. عدم المقدرة على التعرف على المواد والأشياء وأشكالها بمجرد لمسها وتحسسها.

asthenia وهن. ضعف أو فقدان القوة والنشاط.

- bulbospinal a. وهن بصلي نخاعي؛ وهن عضلي وبيل. انظر **myasthenia gravis**.

- myalgic a. وهن عضلي مؤلم. حالة تتصف بالضعف والتعب العام مع ألم في العضلات.

- neurocirculatory a. وهن عصبي دوارني.

متلازمة تتصف بالخفقان وضيق النفس والشعور بالتعب والخوف من التحرك وعدم الراحة خصوصاً عند القيام بأي مجهود حركي مهما كان بسيطاً ويعتبرها البعض بأنها من علامات عصاب القلق وقد يكون فرط التنفس والاستجابات المستقلة هي السبب في توليد هذه الأعراض.

- periodic a. وهن دوري. حالات من الوهن الشديد تعاود بين فترة وأخرى.

asthenophobia رهَاب الوهن. الخوف من الضعف والوهن.

astigmatism لأبوريّة. عدم تساوي سطوح العين الانكسارية مما يولد صوراً مشوشة للأجسام المرئية في بؤر غير متطابقة أو غير متناسقة بمستوى واحد.

astraphobia (= astrapophobia) رهَاب الصواعق. الخوف من البرق والرعد.

astroblast أرومة نجمية. خلية تتطور لتكون خلية نجمية.

astroblastoma ورم الأرومة النجمية. ورم بخلايا نجمية غنية بالهيولى وتحوي كل منها نواتين أو أكثر.

astrocyte خلية نجمية. خلية دبقية عصبية تنشأ من الأديم الظاهر ولها نتوءات ليفية أو جبلية أو ليفية جبلية.

- fibrous a's. خلايا نجمية ليفية. توجد خصوصاً في المادة البيضاء للدماغ ولها فروع رقيقة وطويلة وهيولية ومتفرعة. يمتد بعضها إلى المادة البيضاء وتكون ليفية ويمتد بعضها الآخر إلى المادة السنجابية وتكون جبلية.

- gemistocytic a. (= gemistocyte) خلية نجمية مفعومة. خلية نجمية لها جسم شديد التورم وتحوي نواة في أحد أطرافها وجبلية واضحة.

- plasmotofibrous a's. خلايا نجمية جبلية اللبقات. خلايا نجمية توجد في مواضع اتصال المادتين البيضاء والسنجابية في الدماغ وتكون الزوائد الممتدة إلى المادة السنجابية جبلية أما تلك الممتدة للمادة البيضاء فتكون ليفية.

- protoplasmic a's. خلايا نجمية جبلية.

خلايا نجمية توجد بصورة خاصة في المادة السنجابية من الدماغ ولها فروع عديدة وكلها جبليّة.

astrocytoma وَرَمُ النَجْمِيَّات. ورم مختلف الخباثة يتكون من خلايا نجمية ويصنف إلى أربع درجات حسب شدة خباثته.

- anaplastic a. وَرَمُ الأَرْوَمَةِ الدَّبِقِيَّةِ المُتَعَدِّدِ الأشكال. انظر glioblastoma multiforme.

- a. fibrillare وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ اللَّيْبِيّ. ورم النجميات المكون من خلايا نجمية ليفية تولد فروعاً خيطية أو أليافاً عصبية.

- gemistocytic a. وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ ملغوم الخلايا. ورق النجميات تكون فيه أجسام الخلايا الورمية منتفخة وهياكلية متجانسة وحمضة الانصباع.

- pilocytic a. وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ المُتَوَازِي اللَّيْبِيَّات. نوع من ورم النجميات الليفي تكون فيه الليفيات مرتبة بصفوف متوازية.

- a. protoplasmaticum وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ الجِبْلِيّ. ورم النجميات مكون من خلايا نجمية جبليّة.

astrocytosis كَثْرَةُ النَجْمِيَّات. تكاثر الخلايا النجمية بسبب تلف العصبونات القريبة منها خلال نوبات نقص التأكسج أو نقص سكر الدم.

astroglia دَبَقُ النَجْمِيَّات. مجموعة من الخلايا النجمية الدبقية التي تعتبر كنسيج مستقل.

astroma وَرَمُ النَجْمِيَّات. انظر astrocytoma.

astrophobia رُهابُ النُجُوم. الخوف من رؤية النجوم والسماء.

asyllabia حُبْسَةُ المَقَاطِع. مصاب يتعرف على الحروف بوضوح ولكنه لا يتمكن من تجميعها لتكوين كلمات أو مقاطع (تعدّر نطق المقاطع).

asylum مَأْوَى. ملجأ للمعوزين أو للمرضى النفسانيين أو كبار السن أو المعاقين.

- lunatic a. بِيْمَارِسْتَان. مأوى المصابين بأمراض نفسية.

- old people's a. مَأْوَى المُسِنَّين. مأوى كبار السن.

asymbolia عَمَةُ الرُّمُوز. عدم المقدرة على فهم الرموز بأنواعها كالكلمات والرسوم والإشارات والإيماءات والتعبير.

- pain a. عَمَةُ الأَلَم. عدم الاستجابة النفسية للإحساسات المؤلمة الذي يمكن أن يكون خلقياً أو نتيجة آفة مركزية في الدماغ وخصوصاً في التلفيف فوق الهامشي في الفص الجداري السائد.

asymmetry لا تَنَاطُر. عدم وجود تناظر بين الأقسام المتناسقة أو المتناظرة على طرفي الجسم والتي تكون عادة متشابهة.

- encephalic a. لا تَنَاطُر دِمَاجِيّ. عدم تناظر نصفيّ. كرة المخ إذ إنها لا يكونان متساويين في الحجم.

asynchronism (= asynchrony) لا تَرَافُق. حدوث فعاليات تحدث عادة متزامنة في أوقات متباينة مما يؤدي إلى فقدان التناسق بينهما.

asyndesis حُبْسَةُ التَّرَابُط. كلام تبديل فيه مواقع الكلمات والمقاطع بطريقة شاذة كما يحدث في هذيان المفصوم.

asynergia (= asynergy) تَعَدُّر التَّآزُر؛ اللاتَّآزُرِيَّة. عدم التناسق بين أقسام العضو أو بين الأعضاء التي تعمل عادة باتساق. فقد يولد اختلال عصبي فقدان التناسق بين العضلات التي تعمل عادة متعاونة لتوليد حركة متوازنة ومتناسقة. حيث تتقلص فيه مختلف العضلات بمختلف الشدود والاتجاهات والتوقيت.

atactic رَنَحِيّ. 1. منعدم التناسق وغير منتظم. 2. متعلق أو يتصف أو مصاب بالرنح.

atactiform رَنَحِيّ الشَّكْل. شبه بالرنح.

ataractic 1. مُطْمَئِنٌّ؛ مُهْدِئ. 2. إِطْمِئْنَانِيّ. 1. ما يمكنه أن يهدئ ويطمئن. 2. دواء مهدئ.

ataralgnesia تَسْكِينٌ تَطْمِينِيّ. طريقة تسكين وتركين لتطمين المصاب وإزالة أي ألم أو قلق نفسي منه وخصوصاً ذلك الذي يرافق حالات المداخلة الجراحية.

ataraxia (= ataraxy) إِطْمِئْنَانٌ؛ طَمَآنِيَّة. راحة البال واستقراره.

ataraxic مُطْمَئِنٌّ. مرتاح البال.

ataxaphasia حُبْسَةُ تَكْوِين الجَمَل. انظر ataxiaphasia.

ataxia رَنَح. فشل التناسق العضلي وسوء نظام الحركات واختلالها.

- acute a. رَنَحٌ حَاد. رنح يبدأ بصورة مفاجئة.

- **acute cerebellar a.** رَنْحٌ مُخَيِّجٌ حَادٍ. رنج يصيب إحدى جهتي الجسم ويترافق مع ورم أو رضخ أو مرض عدواني في المخيخ فيولد نقص توتر عضلات الجهة المصابة وعدم تناسقها والرنج.
- **alcoholic a.** رَنْحٌ كُحُولِيٌّ. حالة تشبه التابس الظهري بسبب فقدان حس الوضع في حالة الكحولية المزمنة.
- **autonomic a.** رَنْحٌ مُسْتَقْلِلِيٌّ؛ رَنْحٌ ذَاتِيٌّ. عدم التناسق بين الجهازين الودي واللاودي للجهاز العصبي المستقل.
- **central a.** رَنْحٌ مُوَكِّدِيٌّ. رنج بسبب آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- **cerebellar a.** رَنْحٌ مُخَيِّجِيٌّ. رنج بسبب آفة في المخيخ.
- **cerebral a.** رَنْحٌ مُخَيِّجِيٌّ. رنج بسبب آفة في المخ.
- **cervical a.** رَنْحٌ رَقَبِيٌّ. رنج حسي يتولد عن آفة في القسم الرقبى للنخاع.
- **family a. (= Friedrich's a.)** رَنْحٌ عَائِلِيٌّ؛ رَنْحٌ فَرِيدْرَايْخِيٌّ.
- **Friedrich's a.** رَنْحٌ فَرِيدْرَايْخِيٌّ. مرض وراثي جسدي متنحي يبدأ عادة عند الطفولة والحادثة مع تصلب العمودين الظهري والجانبى للنخاع الشوكي الذي يولد الرنج وخلل الكلام وانحناء العمود الفقري الجانبى وخلل الحركة وشلل العضلات وخصوصاً الأطراف السفلية.
- **frontal a.** رَنْحٌ جَبْهِيٌّ. اختلال توازن حركات الجسم بسبب ورم الفص الجبهي.
- **hereditary a. (= Friedrich's a.)** رَنْحٌ وَرَثَائِيٌّ.
- **hysterical a.** رَنْحٌ هِسْتِيرِيٌّ؛ رَنْحٌ هُزَاعِيٌّ. رنج يظهر كمرض هستيري.
- **Intrapsychic a.** رَنْحٌ نَفْسِيٌّ. انفصام بين الفكر والسلوك الذي يشاهد في الفصام.
- **kinetic a. (= motor a.)** رَنْحٌ حَرَكِيٌّ.
- **labyrinthine a. (= vestibular a.)** رَنْحٌ تَيْهِيٌّ؛ رَنْحٌ دَهْلِيْزِيٌّ.
- **Leyden's a.** تَابِسٌ كَاذِبٌ. انظر pseudotabes.
- **locomotor a. (= tabes dorsalis)** تَابِسٌ ظَهْرِيٌّ؛ رَنْحٌ تَحْرُكِيٌّ.
- **Marie's a. (= hereditary cerebellar a.)** رَنْحٌ مُخَيِّجِيٌّ وَرَثَائِيٌّ.
- **motor a.** رَنْحٌ حَرَكِيٌّ. عدم المقدرة على تنسيق حركات العضلات.
- **ocular a. (= nystagmus)** رَنْحٌ عَيْنِيٌّ.
- **Sanger Brown's a.** رَنْحٌ سَانْغَرُ بَرَاوْنٍ. تنكس نخاعي مخيخي وراثي يظهر بين سن 11-45 ويبدأ في الساقين وينتشر إلى الذراعين والوجه ثم يؤثر على عمليتي البلع والنطق ويؤدي إلى شلل العصب العيني والعصب محرك العين.
- **sensory a.** رَنْحٌ حَسِّيٌّ. رنج يتولد عن فقدان الحس العميق (حس وضع المفاصل) مما يؤدي إلى سوء التحكم في حركة العضلات وعدم تناسقها ويزداد ذلك سوءاً عند غلق العينين.
- **spinal a.** رَنْحٌ نَخَاعِيٌّ. رنج ينتج عن مرض النخاع الشوكي.
- **spinocerebellar a.** رَنْحٌ نَخَاعِيٌّ مُخَيِّجِيٌّ. مرض وراثي يصيب النخاع والمخيخ ويؤدي إلى أعراض رنجية.
- **static a.** رَنْحٌ سَتَاتِيكِيٌّ؛ رَنْحٌ سَكُونِيٌّ. الترنج وعدم الثبات والاستقرار عند وقوف المصاب.
- **a. telangiectasia** رَنْحٌ التَّوَسُّعِ الوِعَائِيِّ. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية يتصف بالرنج المخيخي والرأفة والتوسع الوعائي العيني الجلدي بدرجات متفاوتة ونقص المناعة الخلوية مما يؤدي إلى بعض الإصابات وترافق كل ذلك إصابات واختلالات متنوعة في مختلف وظائف الجسم.
- **thermal a.** رَنْحٌ حَرَارِيٌّ. حالة تتصف باختلاف تموجي شديد في درجة حرارة الجسم.
- **truncal a.** رَنْحٌ جَذْعِيٌّ. رنج يؤثر على عضلات الجذع بسبب آفة مركزية.
- **vestibular a.** رَنْحٌ دَهْلِيْزِيٌّ. رنج وعدم تناسق الحركات بسبب مرض الدهليز.
- ataxiodynamia** رَنْحٌ وَهْنِيٌّ. رنج يترافق مع الوهن.
- ataxiagram** مُخَطَّطُ الرَنْحِ. 1. مخطط يرسمه المصاب بالرنج 2. مخطط يسجله مخطاط الرنج.
- ataxiagraph** مِخْطَاطُ الرَنْحِ. جهاز يسجل

درجة رنج الجسم عند وقوف المصاب مع غلق عينيه.

ataxiometer مِقْيَاسُ الرَّنَج. جهاز يقيس درجة الرنج.

ataxiamnesic رَنَحِي نَسَاوِي. مصاب بالرنج والنسابة.

ataxiaphasia حُبْسَةُ تَكْوِينِ الْجُمْل. عدم مقدرة المريض على ترتيب الكلمات لعمل جملة واحدة مفيدة.

ataxic (= atactic) رَنَحِي.

ataxiophemia لَجَلْجَة؛ رَنَجُ عَضَلَاتِ النُّطْق. انظر ataxophemia.

ataxiophobia (= ataxophobia) رُهَابُ الإِضْطِرَاب.

ataxoadynamia رَنَجٌ وَهْنِي. رنج مترافق مع وهن شديد.

ataxophemia رَنَجُ عَضَلَاتِ النُّطْق. اضطراب التلظ بسبب رنج عضلات النطق.

ataxophobia رُهَابُ الإِضْطِرَاب. الخوف الشديد من أي نوع من الاضطراب.

ataxy رَنَج. انظر ataxia.

atelencephalia خَلَلٌ تَطَوُّرُ الدِّمَاغ؛ نَقَاصُ الدِّمَاغ. التطور الخلقي المعيب للدماغ.

atelocephalous نَاقِصٌ تَكْوُنُ الرَّأْس؛ نَقِصُ الرَّأْس. مسيخ لم يكتمل تطور رأسه.

atelocephaly نَقْصُ تَكْوُنِ الرَّأْس؛ نَقَاصُ الرَّأْس. نقص في تطور وتكوين القحف.

ateloencephalia (= atelencephalia) خَلَلٌ تَطَوُّرُ الدِّمَاغ؛ نَقَاصُ الدِّمَاغ.

atelomyelia نَقْصُ تَكْوُنِ النُّخَاع؛ نَقَاصُ النُّخَاع. نقص تطور النخاع الشوكي.

atephobia رُهَابُ الدِّمَار. الخوف من الدمار بأنواعه.

athalposis عَمَةُ الدِّفء. عدم الإحساس بالحرارة أو بالمنبهات الحرارية.

atheroma عَصِيدَة. كتلة من صفائح بطانة

شريانية متخنة ومتنكسة تتكون في داء تصلب العصيدي.

atherosclerosis تَصَلُّبٌ عَصِيدِي. نوع من تصلب الشرياني الشائع حيث تتكون صفائح صفراء (عصيدات) تحوي كولستيرول ومادة شحمية وبلعميات شحمية وتتكون ضمن بطانة الشرايين الكبيرة والمتوسطة وطبقتها الوسطية الباطنة.

- a. obliterans (= arteriosclerosis obliterans) التَّصَلُّبُ الشَّرِيَانِي الْمُسِد. تصلب شرياني يؤدي تكاثر العصيدات ونموها فيه إلى انسداد الشريان.

athetoid كَنَفَانِي. شبيه بالكنع أو مصاب به.

athetotic (= athetotic) كَنَعِي.

athetosis كَنَعٌ. اختلال يتصف بحركات تموجية أو التوائية لإرادية بطيئة شديدة خاصة في اليدين ويمكن أن يحدث بعد الشلل الشقي (الفالج).

- double a. (= double congenital a.) كَنَعٌ خِلْقِي مُزْدَوِج. كنع خلقي بطرفي الجسم بسبب رضح ولادي والذي يمكن أن يحدث مع الشلل السفلي التشنجي.

- pupillary a. (= hippus) رَقْصُ الحَدَقَة. كنع الحدقة.

athetotic (=athetotic) كَنَعِي؛ مُكَنَع. متعلق بالكنع أو منتصف به.

athymia 1. إِنْغِدَامُ الْعَاطِفَة 2. إِنْغِدَامُ التَّوْتَة. 1. فُقدان الحس والعاطفة مع الكآبة 2. انعدام غدة التوتة.

atlantoaxial subluxation رَخَاوَةُ الْفَهْقِي الْمَحْوَرِي. رخاوة أو خلع جزئي للمفصل الفهقي المحوري.

atlas الْفَهْقَة. الفقرة العنقية العلوية الاولى المتصلة بالقحف.

atonia وَثِي. انظر atony.

- choreatic a. وَثِي رَقْصِي. نقص التوتر العضلي الذي يشاهد في داء الرقص.

atonic وَأَن. ناقص التوتر السوي أو متعلق بالوثنى.

atonicity وَنَى. حالة غياب التوتر أو الشد العضلي.

atony (= atonia) وَنَى. نقص التوتر والشد العضلي.

atopognosia (= atopognosis) عَمَهُ. تَوْضِيع الإحْسَاس. عدم مقدرة المريض على توضيح موقع الحس على جسمه.

atrabiliary سَوْدَاوِي؛ كَثِيب. انظر melancholic.

atresia, aqueductal رَتْقُ الْمَسَال. غياب أو انسداد المسال الخلقي.

atrophia (= atrophy) ضُمُور.

- a. bulborum hereditaria ضُمُورُ الْمُقَلَّة. الوراثة؛ داء نُورِي. انظر Noorie's disease.

- a. cerebri senilis simplex ضُمُورُ الدِّمَاغ. الشَّيْخُوخِي البَّسِيط. خرف شيخوخي مع ضمور دماغي شديد وفقدان الكثير من العصبونات.

- a. dolorosa ضُمُورُ الْمُقَلَّة المؤلِم. ضمور مقلة العين مع الألم الشديد.

- a. senilis (= senile atrophy) ضُمُور شَيْخُوخِي.

atrophie (= atrophy) ضُمُور.

atrophy ضُمُور.

- corticostriatal a. ضُمُورُ قَشْرِيٍّ مُخَطَّطِي. نُخَاعِي. انظر Creutzfeldt-Jakob syndrome.

- denervated muscle a. ضُمُورُ الْعَضَلَةِ الْفَرَّالَةِ. التَّعَصِيب. ضمور العضلة عند إزالة عصبها الحركي منها.

- disuse a. ضُمُورُ عَدَمِ الْإِسْتِعْمَال. ضمور العضلة لعدم استعمالها لفترة طويلة.

- facial a. ضُمُورُ الْوَجْهِ.

- hemifacial a. (= progressive unilateral facial a.) ضُمُور وَجْهِي أَحَادِي الْجَانِب: ضُمُور نَصْفِ الْوَجْهِ.

- idopathic muscular a. (= progressive muscular dystrophy) ضُمُور عَقْلِي مَتَرَق: ضُمُورُ عَضَلِيٍّ غَامِض.

- ischemic muscular a. (= Volkmann's contracture) ضُمُورُ عَضَلِيٍّ إِفْقَارِي.

- leaping a. ضُمُورُ قَفْزِي. ضمور عضلي مترق يبدأ في اليدين وينتشر إلى المئكب من دون أن يصيب عضلات الذراع.

- myelopathic muscular a. ضُمُورُ عَضَلِيٍّ بِاعْتِلَالِ النُّخَاع. ضمور عضلي ينتج عن آفة في النخاع الشوكي.

- myopathic a. ضُمُورُ بِالْإِعْتِلَالِ الْعَضَلِي. ضمور العضلة بسبب علة فيها.

- neural a. (= neuropathic a.) ضُمُورُ بِالْإِعْتِلَالِ الْعَصَبِي.

- neuropathic a. ضُمُورُ بِالْإِعْتِلَالِ الْعَصَبِي. ضمور عضلي ينتج عن مرض في الجهاز العصبي المحيطي.

- neurotic a. (= neuropathic a.) ضُمُورُ بِالْإِعْتِلَالِ الْعَصَبِي.

- neurotrophic a. ضُمُورُ بِاعْتِلَالِ الْعَصَبُونَات. التَغْذِوَّة. ضمور يتولد عن تلف العصبون المحيطي الذي يديم تغذية النسيج مما يؤدي إلى ضموره.

- olivopontocerebellar a. ضُمُورُ الزَيْتُونَةِ وَالْجِسْرِ وَالْمُخِيخ. ضمور يصيب قشر المخيخ والسويقة المتوسطة والجسم الزيتوني السفلي.

- optic a. ضُمُورُ الْقَرَصِ الْبَصَرِي. ضمور القرص البصري بسبب تنكس الياف العصب والسبيل البصريين.

- physiologic a. ضُمُورُ فِيزِيُولُوجِي. ضمور بعض الأعضاء طبيعياً عند كل الأشخاص بسبب تقدم العمر.

- progressive muscular a. (= spinal muscular a.) ضُمُورُ عَضَلِيٍّ مُتَرَق.

- progressive neural muscular a. (= progressive neuromuscular a.) ضُمُور عَصَبِي عَضَلِيٍّ مَتَرَق.

- progressive neuropathic (peroneal) muscular a. ضُمُورُ بِالْإِعْتِلَالِ الْعَصَبِي.

(الشظوي المترقي). عضلي وراشي يبدأ في العضلات التي يغذيها العصب الشظوي ومن ثم يتطور تدريجياً ليشمل اليدين والذراعين.

- **progressive spinal muscular a.**
ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ تَخَاعِي. (= spinal muscular a.)
- **progressive unilateral facial a.** ضُمُورٌ وَجْهِيٌّ شَفِيٌّ مُتَرَقٍّ. ضُمُورٌ مُتَرَقٍّ لجلد وأنسجة وعظام وعضلات إحدى جهتي الوجه.
- **senile a.** ضُمُورٌ شَيْخُوخِي. الضمور الطبيعي للأنسجة والأعضاء الذي يحصل عند تقادم العمر.
- **spinal muscular a.** ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ تَخَاعِي. داء تنكسي متروِّق في الخلايا الحركية للنخاع الشوكي ويبدأ عادة في العضلات الصغيرة في اليد وأحياناً في الأطراف العلوية والمنكبين ومن ثم ينتشر تدريجياً إلى عضلات الأطراف السفلية.
- **trophoneurotic a.** ضُمُورٌ عَصَبِيٌّ تَغْدَوِي. ضُمُورٌ بسبب مرض المراكز التي ينشأ منها العصب المغذي للمنطقة أو للعضو.
- atropine** أتروبين. اسم كيميائي لمادة قلوانية تستحضر من البَلَادُونَا أو يحضر صناعياً، وهي مادة محصرة للفعل الكوليني وتستعمل كمادة مضادة للتشنج وإرخاء العضلات أو إيقاف الرعاش والصلل في داء باركنسون أو لزيادة سرعة القلب بحصر العصب المبهم. كما أنها تستعمل كمادة مضادة لكثير من المواد السامة أو مضادة للافراز أو موسعة للحدقة.
- atropinism** الأَتْرُوبِينِيَّة. التسمم بالأتروبين.
- attack** هَجَمَةٌ. عارضة المرض أو بدايته.
- **anxiety a. (= panic a.)** هَجَمَةٌ قَلَق. هجمة مقلقة.
- **panic a.** هَجَمَةٌ هَلَع. عارضة قلق حاد شديد تحدث في الكثير من حالات الرهاب مثل رهاب الساح أو غيره.
- **transient ischemic a.** هَجَمَةٌ إِفْقَارِيَّةٌ عَابِرَةٌ. هجمة اضطراب دماغي قصيرة الامد (من بضعة دقائق إلى بضعة ساعات) تتولد عن خلل وعائي ولكن من دون توليد أي نقص عصبي مستديم وتتسبب هذه الهجمات غالباً عن مرض انسدادى وعائى خصوصاً في الجملة الوعائية السباتية - القاعدية - الفقارية.
- **vagal a. (= vasovagal a.)** هَجَمَةٌ مُبْهَمِيَّة. هَجَمَةٌ وَعَائِيَّةٌ مُبْهَمِيَّة. استجابة وعائية عصبية المنشأ تتصف بالشحوب والغثيان والتعرق وبطء القلب والهبوط السريع لضغط الدم

الذي إذا ما وصل إلى مستوى واطئ جداً أدى إلى فقدان الوعي. وتتولد هذه الهجمات عن الكرب العاطفي الشديد المترافق مع الخوف أو الألم.

انتباه. 1. التركيز الانتقائي
لإدراك جزء من الظروف أو المنظورات التي تظهر في المحيط. 2. الاستجابة الانتقائية لنوع واحد من المنبهات.

1. وَضْعَةٌ. 2. مَوْقِف. 1. وضعة
الجسم أو موضعه. 2. وضعة أقسام جسم الجنين بعضها لبعض. 3. نزعة الاستجابة الإيجابية أو السلبية للأشخاص الآخرين أو للحالات أو لமானج العمل والأوامر المختلفة.

audimutitas بَكْمُ السَّمِيع. بكم يصيب الشخص بالرغم من أن له سمعاً طبيعياً.

audioanalgesia تَسْكِينٌ سَمْعِي. تقليل أو إيقاف الألم بالاستماع إلى الأصوات الموسيقية.

audiogram مَخْطُطُ السَّمْع. تسجيل عتبات حدة سمع الشخص للموجات الصوتية المختلفة.

audiometer مَقْيَاسُ السَّمْع. جهاز الكتروني يولد أصواتاً نقية معروفة التردد والشدة تستعمل لقياس حدة السمع ومداه.

audiometry قِيَاسُ السَّمْع. قياس حدة ومدى السمع باستعمال مقياس السمع.

audition سَمَاع. عملية السمع.

- **chromatic a.** سَمَاعٌ لَوْنِي. رؤية بعض الألوان عند الاستماع إلى بعض الأصوات.

- **gustatory a.** سَمَاعٌ ذَوْقِي. الحس ببعض الاذواق عند الاستماع إلى بعض الأصوات.

aula مَقْدَمُ البُطَيْنِ الثَّالِث. النهاية الامامية للبطين الثالث.

aura أَوْرَةٌ. إحساس ذاتي أو ظاهرة حركية تسبق النوبات الانتبائية مباشرة وتعلن بدئها.

- **a. asthmatica** أَوْرَةٌ الرُّبُو. أورة تسبق نوبة الربو.

- **auditory a.** أَوْرَةٌ سَمْعِيَّة. إحساس سمعي يسبق أحياناً نوبة الصرع.

- **epigastric a.** أَوْرَةٌ شَرْسُوفِيَّة. إحساس مزعج في المنطقة الشرسوفية يسبق نوبة الصرع أحياناً.

- **epileptic a.** أَوْرَةٌ الصَّرَع. إحساس ينذر المصاب أحياناً بقدوم نوبة الصرع.

a. hysterica أَوْرَة الهستيريا. إحساس شبيه بأورة الصرع ينذر الشخص بقدوم نوبة الهستيريا.

- Intellectual a. أَوْرَة فِكْرِيَّة. حالة احلامية تسبق نوبة الصرع أحياناً.

- kinesthetic a. أَوْرَة جِسْمِيَّة حَرَكِيَّة. إحساس بحركة أحد أقسام الجسم سواء تحرك القسم فعلاً أو لم يتحرك أبداً.

- motor a. أَوْرَة حَرَكِيَّة. حركة تسبق نوبة الصرع.

- a. procursiva أَوْرَة الجَرْي. فترة جري قصيرة تسبق نوبة الصرع أحياناً.

- reminiscent a. (= intellectual a.) أَوْرَة فِكْرِيَّة.

aural 1. أُذُنِيّ 2. أُورِيّ. 1. نسبة إلى الأذن 2. نسبة إلى الأورة.

autism ذَاتَوِيَّة؛ انْطَوَاءٌ عَلَى الذَّاتِ؛ انْطَوَائِيَّة. الانصراف إلى الأفكار الذاتية وأحلام اليقظة والأوهام والأهلاس والابتعاد عن الحقائق الواقعية وطفيان تفضيل الذات والنفس على كل ما هو في محيطها.

- akinetic a. ذَاتَوِيَّة لَا حَرَكِيَّة؛ سُبَاتٌ سَهْرِيّ. انظر coma vigil.

- infantile a. (= autistic disorder) ذَاتَوِيَّة طِفْلِيَّة؛ إِضْطِرَابٌ انْطَوَائِيّ. انظر disorder.

autistic ذَاتَوِيّ؛ انْطَوَائِيّ. المصاب بالانطواء على الذات.

autocatharsis تَنْفِيسٌ ذَاتِيّ. علاج نفساني بتشجيع المريض على كتابة أفكاره ومشاعره وإحساساته وخبراته وتجاربته ومشاكله، وبهذا يفرج عن عواطفه المكبوتة.

autoeroticism (= autoerotism) شَبِيقٌ ذَاتِيّ. شبيق موجه نحو الذات.

autognosis مَعْرِفَةُ الذَّاتِ. طريقة علاج بالتحليل النفسي بمساعدة المريض على تحليل نفسه ذاتياً.

autograft طُعْمٌ ذَاتِيّ. طعم نسيجي يؤخذ من الجسم لغرسه في منطقة أخرى منه.

autohypnosis تَنْوِيمُ الذَّاتِ. تنويم الشخص لنفسه ذاتياً.

autokinesis تَحَرُّكٌ إِرَادِيّ. حركة الشخص إرادياً.

autokinetic مُتَحَرِّكٌ إِرَادِيًّا. قابل أو متمكن من الحركة الإرادية.

automatic تِلْقَانِيّ. 1. لا إرادي، عمل ينفذ تلقائياً 2. ذاتي الحركة أو ذاتي التنظيم.

- a. behavior سُلُوكٌ تِلْقَانِيّ. انظر behavior.

automatism تِلْقَانِيَّة؛ سُلُوكٌ تِلْقَانِيّ. سلوك غير موجه وغير مستهدف ومن غير سيطرة واعية عليه ومن دون شعور المريض به ويشاهد في الصرع النفساني الحركي والفصام الجامودي.

- ambulatory a. تِلْقَانِيَّة سَيْرِيَّة. حالة سير المريض وقيامه ببعض الأعمال من دون وعي أو معرفة بما يعمل.

- command a. تِلْقَانِيَّة أَمْرِيَّة. القيام ببعض الأعمال التي يؤمر المريض القيام بها فينفذها من دون تفكير ومن دون التأكد من صلاحيتها كما يحدث في حالات التنويم.

automysophobia رُهَابُ الْقَذَارَةِ. خوف المصاب من كونه قذراً أو ذا رائحة كريهة.

autonomic ذَاتِيّ؛ مُسْتَقَلٌّ. مستقل ذاتياً أو عمل ينفذ من دون سيطرة الإرادة عليه.

- a. nervous system الْجِهَازُ الْعَصَبِيُّ الْمُسْتَقَلُّ؛ الْجِهَازُ الْعَصَبِيُّ الذَّاتِيّ. انظر system.

autophilia التَرْجِسِيَّة؛ عِشْقُ الذَّاتِ. انظر narcissism.

autophobia رُهَابُ الْإِنْفِرَادِ. رهاب الانفراد بالذات أو الخوف عند وجود الشخص بمفرده ولوحده.

autopsychic نَفْسِيّ ذَاتِيّ. متعلق بنفس الشخص وب عقله ووعيه.

autopsychorhythmia نَظْمٌ نَفْسِيّ ذَاتِيّ. فعالية الدماغ الكهربائية النظامية المرضية.

autopsychotherapy مُعَالَجَةٌ نَفْسِيَّةٌ ذَاتِيَّة. تحليل نفسي ذاتي.

autosomatognosis تَوْهَمُ بَقَاءِ الْمُبْتَوِّرِ.

حس قسم من الجسم الذي سبق أن أزيل منه بالبتير بكونه لا زال موجوداً في موضعه.

autosuggestibility قَابِلِيَّةُ الْإِيحَاءِ الدَّائِي. حالة فكرية خاصة تقل فيها الإرادة ويصبح من السهل الإيحاء للشخص.

autosuggestion الإِيحَاءُ الدَّائِي. عملية إقناع الشخص لنفسه لقبول بعض الأفكار أو المعتقدات أو الآراء من دون مناقشة أو اعتراض.

autosynnoia الْإِنْشِغَالُ بِالدَّات. تركيز المريض كل اهتماماته على نفسه وأفكاره وتخيالاته للحد الذي يفقده الاتصال بالعالم الخارجي.

autotopagnosia عَمَةُ وَضْعِ الْجِسْم. عدم مقدرة المريض على وضع أعضاء جسمه وتوجيهها بالاتجاه المناسب وعدم معرفة مواضعها.

auxotonic مُتَقَلِّصٌ ضِدَّ الْمَقَاوِمَةِ. التقلص العضلي الشديد ضد المقاومة المتزايدة.

aversive (= noxious) مُكْرَهُ؛ مُنْفَر. ما ينفر ويحفر على اجتنابه.

avoidance إِجْتِنَاب. وسيلة دفاعية واعية أو غير واعية ترفض مواجهة بعض الحالات أو الفعاليات أو الأشياء التي قد تحدث للشخص القلق والصراع النفسي.

awareness وَعْي؛ إدراك. وعي الشخص وإدراك الحوادث التي تحدث في محيطه أو الإحساسات والمشاعر الداخلية.

- reality a. وَعْيُ الْحَقَائِق. إدراك الشخص للحوادث التي تحدث في محيطه وإدراك مفزاها وعلاقتها ببعضها.

- spatial a. وَعْيٌ حَيَازِي. معرفة الشخص لمواضع المواد والأشياء في محيطه.

axilemma غِشَاءُ الْمَحْوَر. انظر axolemma.

axis 1. محور. 2. المحور. 1. خط يدور الجسم حوله أو خط مركزي تترتب حوله مجموعة من بنى الجسم. 2. الفقرة الرقبية الثانية.

- cerebrospinal a. الْمَحْوَرُ الدِّمَاغِي النُّخَاعِي. الجهاز العصبي المركزي.

- encephalospinal a. الْمَحْوَرُ الزَّاسِي النُّخَاعِي. الجهاز العصبي المركزي.

axis cylinder الْمَحْوَر. انظر axon.

axoaxonic مَحْوَرِي مَحْوَرِي. يشير إلى

مشبك بين محور أحد العصبونات ومحوار عصبون ثانٍ.

axodendritic مَحْوَرِي تَفْصُي. يشير إلى مشبك بين محور أحد العصبونات وتغصن عصبون ثانٍ.

axofugal (= axifugal) مُبْتَعِدٌ عَنِ الْمَحْوَر. مبتعد عن المحور أو المحوار.

axolemma غِشَاءُ الْمَحْوَر. الغشاء المغطي للمحور.

axon مَحْوَر. (ج: مَحَاوِير). 1. محور الجسم وهو العمود الفقري. 2. فرع العصبون الذي ينقل الدفوعات العصبية من جسم خلية إلى نهاياته والتي تنتقل بدورها من تفرعاته إلى عصبون آخر أو إلى عضو مستقل. وقد يكون المحوار محاطاً بغمد نخاعيني وقد لا يكون مغمداً كما في بعض أعصاب الجهاز المستقل.

- myelinated a. مَحْوَرٌ مُغْمَد. محوار محاط بغمد نخاعيني (ميلييني).

- naked a. (= unmyelinated a.) مَحْوَرٌ غَيْرُ مُغْمَد. محوار غير مغمد.

- unmyelinated a. مَحْوَرٌ غَيْرُ مُغْمَد. محوار غير محاط بغمد ميلييني.

axonotmesis إِنْهَتَاكُ الْمَحْوَر. إصابة المحوار التي تؤدي إلى تمزقه والغمد النخاعيني (الميلييني) المحيط به من دون إصابة النسيج الضام الذي يحيطه، ويؤدي ذلك إلى تنكس قسمه المقطوع تحت الإصابة ثم يبدأ تجرده بعد ذلك تلقائياً بصورة جيدة عادة.


axopetal (= axipetal) نَحْوُ الْمَحْوَر. متجه نحو المحور أو المحوار.

axophage بَلْعَمُ الْمَحْوَر. خلية دبقية عصبية تتواجد في الكهوف النخاعية في التهاب النخاع.

axoplasm جَبْلَةُ الْمَحْوَر. الجبلية الموجودة في المحوار.

axosomatic مَحْوَرِي جَسَدِي. يشير إلى المشبك بين محور أحد العصبونات وخلية أخرى في الجسم.

axospongium إِسْفَنْجَةُ الْمَحْوَر. البنية الشبكية التي تكون مادة محوار العصبون.



axon

رسم تخطيطي للعصبون يبين أقسامه المختلفة والمحوار.

B

Babinski's law قَانُونُ بَابِنْسْكِي. أنظر law.

Babinski's reflex مُنْعَكَسُ بَابِنْسْكِي. أنظر reflex.

Babinski's sign عَلَامَةُ بَابِنْسْكِي. أنظر sign.

backache أَلَمُ الظَّهْرِ: ظَهَار. أَلَمُ الظهر كعلامة غير مولدة عن تشوه بنيوي أو مرض ظهري معين فيه.

backalgia أَلَمُ الظَّهْرِ: ظَهَار. أنظر backache.

ballism (= ballismus) الْقَذَائِفِيَّةُ: رَفْنٌ.

ballismus الْقَذَائِفِيَّةُ: رَفْنٌ. حركات قذفية عنيفة تتولد عن تقلص العضلات الدانية للأطراف نتيجة آفة نواة لويزي (النواة تحت المهادية) أو ارتباطاتها العصبية. ويمكن أن تظهر في جهة واحدة من الجسم ولكنها غالباً ما تظهر في الجهتين.

ballistic قَذَائِفِيٌّ. 1. متعلق بالقذائف أو بداء القذائفية 2. نفضي.

ballistophobia رُهَابُ الْقَذَائِفِ. رهَاب الرصاص والقذائف.

band of Broca, diagonal (= stria diagonalis) شَرِيْطُ بَرُوكَا الْمَائِلُ: السُّطْر الْمَائِل.

band, Vicq d'Azyr شَرِيْطُ فَيِّك دَازِير. شريط من ألياف عصبية مغمدة رقيقة في الطبقة الحبيبية الخارجية.

baragnosis عَمَةُ الْوَزْن. عدم المقدرة على معرفة الوزن.

barbaralalia عُسْرُ تَلْفُظِ الْأَجْنَبِيِّ. عسر النطق عند التكلم بلغة أجنبية.

barbital بَارَبِيْتَال. دواء من مجموعة الباربيتورات يستعمل كممنوم ومركن ويؤخذ عن طريق الفم.

barbitone بَارَبِيْتُون: بَارَبِيْتَال. أنظر barbital.

barbiturate بَارَبِيْتُورَات. مجموعة من الأدوية المركنة المنومة تستخلص من حمض الباربيتوريك ومنها دواء الفيتوباربيتال.

baresthesia حِسُّ الْوَزْن: حِسُّ الضَّغْط. حس الضغط والوزن.

baresthesiometer مَقْيَاسُ حِسِّ الْوَزْن: مَقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْط. آلة تقيس حساسية الشخص للضغط والوزن.

baroagnosis عَمَةُ الْوَزْن. أنظر baragnosis.

baroreceptor مُسْتَقْبَلَةُ الضَّغْط. أنظر baroreceptor.

baroelectroesthesiometer مَقْيَاسُ الْحِسِّ الْوَزْنِيِّ الْكَهْرَبَائِيِّ. آلة تقيس درجة الضغط عند التحسيس الكهربائي لحسي الألم أو التئمل.

barognosis إدراك العِزْن. الإدراك الواعي لحس الوزن ومعرفة مقداره.

baroreceptor مُسْتَقْبَلَةُ الضَّغْط. نهاية عصبية حسية تتنبه بتغير الضغط الواقع عليها كتلك الموجودة في الأوعية الدموية.

barrier حَائِل. حاجز.

- **blood-brain b.** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ. الحائل الذي يفصل الدم عن متن الجهاز العصبي المركزي ويتكون من جدران الشعيرات الدموية للجهاز والأغشية الدبقية المحيطة بها.

- **blood-cerebral b. (= blood brain b.)** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ.

- **blood-cerebrospinal fluid b.** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ. (= blood-brain b.) الحائل الدموي للسائل الدماغي النخاعي.

baryesthesia حِسُّ الْوِزْنِ. **baresthesia** انظر

baryglossia ثِقَلُ الْكَلَامِ. التفوه بكلمات بطيئة وغليلة.

barylalia ثِقَلُ التَّلَفُّظِ. النطق بكلمات غليظة غير واضحة لصعوبة ربط الحروف لتكوين الكلمات.

baryphonia ثَخُنُ الصَّوْتِ. النطق بصوت ثخين وثقل.

base (=basis) قَاعِدَةٌ. 1. القسم السفلي من الجسم. 2. المكوّن الرئيسي للمركب. 3. الجزء الأحماضي من الملح.

- **b. of dorsal horn of spinal cord** قَاعِدَةُ الْقَرْنِ الظَّهْرِيِّ لِلنَّخَاعِ. جزء القرن الظهري السنجابي من النخاع الشوكي المتصل بالقسم المركزي من مادته السنجابية.

basilarachnitis, basilarachnoiditis إِنْتِهَابُ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ الْقَاعِيَّةِ. التهاب القسم القاعدي من غشاء العنكبوتية.

basioccipital قَاعِيٌّ قَذَالِيّ. متعلق بالناثيء القاعدي للعظم القذالي.

basiphobia رُهَابُ السَّيْرِ. انظر **basophobia**.

basis (=base) قَاعِدَةٌ. القسم السفلي أو الرئيسي من الجسم أو العضو أو ذلك القسم من العضو أو الجسم المعاكس لقمته.

- **b. cerebri (= facies inferior cerebri)** الْوَجْهُ السُّفْلِيُّ لِلْمُخِّ.

- **b. cochleae** قَاعِدَةُ الْقَوْقَعَةِ. القسم الخلفي من القوقعة الذي يستقر على الصماخ السمعي الباطن.

- **b. cornus dorsalis medullae spinalis** قَاعِدَةُ الْقَرْنِ الظَّهْرِيِّ لِلنَّخَاعِ. انظر **dorsal horn of spinal cord**

- **b. cranii externa** ظَاهِرُ قَاعِدَةِ الْقَحْفِ. السطح الظاهر للقسم السفلي من القحف.

- **b. cranii interna** بَاطِنُ قَاعِدَةِ الْقَحْفِ. السطح الباطن للقسم السفلي من القحف.

- **b. encephali (= facies inferior cerebri)** الْوَجْهُ السُّفْلِيُّ لِلْمُخِّ.

- **b. modioli** قَاعِدَةُ عِمَادِ الْقَوْقَعَةِ. القسم العريض من العمد الواقف على الجزء الوحشي من الصماخ السمعي الباطن

- **b. pedunculi cerebri** قَاعِدَةُ السُّوَيْقَتَيْنِ الْمُخَيَّتَيْنِ. الحزمة الكبيرة من سبل الألياف العصبية التي تكون القسم البطني من السويقتين المخيتين والتي تتكون من الألياف القشرية النخاعية والقشرية النورية والقشرية الجسرية والجدارية الصدغية الجسرية والجببية الجسرية الهابطة من قشرة المخ إلى الجسر والنخاع.

- **b. stapedis** قَاعِدَةُ الرِّكَابِ. الصفيحة البيضوية العظمية على قاعدة العظم الركابي والتي تستقر في النافذة الدهليزية.

basophobia (= basiphobia) رُهَابُ السَّيْرِ. رهاب الوقوف والسير بالرغم من عدم وجود شلل عضلي في الأطراف التي يتمكن المريض من تحريكها عند جلوسه أو استلقائه.

bathesthesia الْحِسُّ الْعَمِيقُ. انظر **bathyesthesia**.

bathmotropic مُكَيِّفُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يحور استجابة النسيج للمنبهات.

- **negative b.** مُثَبِّطُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يقلل استجابة النسيج العضلي للمنبهات.

- **positive b.** مُحَفِّزُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل ينشط استجابة النسيج العضلي للمنبهات.

bathmotropism تَكْيِيفُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يحور درجة استثارية العضلات لملاءمة الحالة الوظيفية.

bathophobia رَهَابُ الْعُمْقِ. رهَابُ النظر إلى الأعماق كالأبار أو النزول إليها.

bathyanesthesia فَقْدَانُ الْحِسِّ الْعَمِيقِ. فقدان حس العضلات والمفاصل.

bathyesthesia الْحِسُّ الْعَمِيقُ. حس الأقسام العميقة تحت سطح الجسم كالحس العضلي والحس المفصلي.

bathyperesthesia قَرُطُ الْحِسِّ الْعَمِيقِ. فرط حس البنيات والأعضاء العميقة.

bathypesthesia (= bathyhypoesthesia) نَقْصُ الْحِسِّ الْعَمِيقِ. قلة حس البنيات والأعضاء العميقة في الجسم.

battarismus تَأْتَاة. stuttering. أنظر

bedsore النَّاقِيَّة. decubitus ulcer. أنظر

bedwetting التَّبَوُّلُ فِي الْفِرَاشِ؛ النَّقَاصُ. enuresis. أنظر

behavior سُلُوك. التصرفات والفعاليات الشخصية الظاهرة التي يمكن أن يشاهدها الآخرون أو من الممكن إظهارها باستعمال بعض الطرق التشخيصية الخاصة.

- acquired b. سُلُوكٌ مُكْتَسَبٌ. سلوك مكتسب الشخص من تجاربه الطويلة في حياته وهو غير السلوك الغريزي الطبيعي.

- adaptive b. سُلُوكٌ تَلَاوُمِيٌّ. سلوك محوّر يساعد الكائن على التفاعل مع محيطه بكفاءة مما يساعده على البقاء.

- affective b. سُلُوكٌ عَاطِفِيٌّ. سلوك انفعالي.

- aggressive b. سُلُوكٌ عُدُوَانِيٌّ. سلوك اعتدائي.

- agnostic b. سُلُوكٌ عَمْهِيٌّ. السلوك اللاأدري.

- anticipating b. سُلُوكٌ تَوَقُّعِيٌّ. سلوك استباقي.

- automatic b. التَّلَقَّائِيَّةُ؛ سُلُوكٌ تَلَقَّائِيٌّ. automatism. أنظر

- collective b. سُلُوكٌ جَمَاعِيٌّ. سلوك مجموعة من الأشخاص الأسوياء لا يقوم أي منهم بهذا السلوك لو كان بمفرده.

- defensive b. سُلُوكٌ دِفَاعِيٌّ. سلوك الدفاع عن النفس عند تعرضها للهجوم أو لخطر ماثل.

- goal directed b. سُلُوكٌ مُسْتَهْدَفٌ. سلوك موجه بالهدف.

- impulsive b. سُلُوكٌ مُتَهَوِّزٌ. تصرف أو فعل مفاجيء من دون تفكير أو تقدير لعواقبه وقد يكون سلوكاً مرضياً وعادة ما يتصف بتصرف انفجاري تتلوه بعض الراحة والتفريغ النفسي.

- instinctive b. سُلُوكٌ غَرِيْزِيٌّ. سلوك طبيعي معقد ومنظم ولا يتعلمه الكائن ولكنه سلوك ذو غرض بيولوجي محدد للنوع وينتقل وراثياً مثل سلوك بناء العش عند الطيور.

- instrumental b. سُلُوكٌ وَسِيلِيٌّ. سلوك يستخدم كوسيلة لإحداث تغيير معين في المحيط.

- invariable b. سُلُوكٌ ثَابِتٌ. سلوك غير متغير لانه محدد بالبنية أو الوظيفة الذاتية كالفعل المنعكسي.

- maternal b. سُلُوكٌ أُمُومِيٌّ. سلوك الأم وحنانها نحو أطفالها.

- mating b. سُلُوكٌ تَزَاوُجِيٌّ. سلوك الزوجين تجاه بعضهما.

- operant b. (= instrumental b.) سُلُوكٌ مُجَزٍّ. سلوك متوقع الإثابة.

- reproductive b. سُلُوكٌ تَنَاسُلِيٌّ. سلوك بعض الحيوانات أثناء موسم التناسل.

- respondent b. سُلُوكٌ اسْتِجَابِيٌّ؛ سلوك منعكسي إشرطي.

b. therapy مُعَالَجَةُ سُلُوكِيَّة. أنظر

- variable b. سُلُوكٌ مُتَغَيِّرٌ. سلوك يتغير باستمرار نتيجة تجارب الشخص وخبرته وتعلمه.

- voluntary b. سُلُوكٌ إِرَادِيٌّ. سلوك إرادي يقوم به الشخص لسبب خاص.

behavioral سُلُوكِيٌّ. متعلق بالسلوك.

behaviorism السُّلُوكِيَّة. نظرية في علم النفس تنص على أن السلوك الظاهر والملاحظ هو الذي يجب الاهتمام به في دراسات علم النفس ويجب إهمال الأفكار والعواطف المكبوتة وغير المنظورة في مثل هذه الدراسات.

bends أَلَمٌ هُبُوطِ الضَّغْطِ. آلام شديدة في البطن والساقين تنتج عن هبوط الضغط الجوي المفاجيء والسريع.

benzodiazepene بَنْزُوْدِيَاذِيْبِين. دواء مهدئ مضاد للقلق ومرخٍ للعضلات ومسكن وله تأثير منوم.

benztropine بَنْزْتْرُوْبِين. دواء مضاد الفعل الكولينري ومضاد الهستامين ومخدر موضعي ويستعمل في علاج داء باركنسون عن طريق الفم أو بالحقن بالعضل أو بالوريد.

beriberi بَرِي بَرِي. داء ينتج عن نقص فيتامين B₁ (ثيامين) ويتصف بالتهاب الأعصاب والوذمة ومريضات القلب.

- atrophic b. (= dry b.) البَرِي بَرِي الجَاف.

- cerebral b. (= Wernicke- Korsakoff syndrome.) البَرِي بَرِي الدماغِي؛ متلازمة فرنيكة - كورساكوف.

- dry b. البَرِي بَرِي الجَاف. نوع من البري بري يتصف بالشلل الرخو والضمور العضلي وانعدام المنعكسات وقد يصاحب ذلك تضخم القلب وتسرع.

- infantile b. البَرِي بَرِي الْوَلِيدِي. مرض يصيب الأطفال الرضع الذين يرضعون حليب أمهات معوزين الثيامين ويصابون بنقص التبول والوذمة المترقية وغالباً بفشل القلب الحاد والموت. وقد يصابون أحياناً بالتقيؤ وانعدام الصوت والتشنج الظهري والاختلاج.

- paralytic b. (= dry b.) البَرِي بَرِي الشَّلْيِي.

- wet b. البَرِي بَرِي الرُّطْب. نوع من البري بري يتصف بفشل القلب والوذمة ولكن من دون إصابة كبيرة للجهاز العصبي.

bestiality مُوَاقَعَةُ الْبَهَائِم. إتيان البهيمة.

beta blockers مُحَصِّرَاتُ الْبِيْتَا. أنظر blocker.

beta rhythm نَظْمٌ بِيْتَا. أنظر rhythm.

beta waves أَمْوَاجٌ بِيْتَا. أنظر wave.

bethanechol بِيْثَانِيْكُول. شادة كولينية الفعل لا يحلمها إستيراز الأسيتيل كولين ولها تأثير مسكاريني وتستعمل كدواء منبه لتقلص عضلات القناة الهضمية والمسالك البولية والمثانة بعد العمليات أو بعد فقدان التوتر العصبي المنشأ.

betweenbrain الدِّمَاغُ الْبَيْنِي. أنظر diencephalon.

bibliomania هَوَسُ الْكُتُب. الرغبة في جمع الكتب وخصوصاً القديم والنادر منها.

bibliotherapy الْمُعَالَجَةُ بِالْكَتُب. المعالجة بقرأة الكتب في حالات الاضطرابات العقلية أو لأغراض الصحة العقلية.

bicoronal ثَنَائِي الْإِكْلِيل. متعلق بالإكليلين المتشعب كل واحد منهما من المحفظة الداخلية للدماغ.

bilateral بِالْجَانِبَيْن. جانبي الجسم أو ذو جانبيين.

bilateralism تَنَازُلُ الْجَانِبَيْن. تناظر مرآتي لجانبي الجسم.

binocular 1. بِالْعَيْنَيْن 2. ذُو عَيْنَيْن. 1. الإبصار بالعينين 2. مجهر ذو عينيتين.

biocybernetics عِلْمُ التَّحَكُّمِ الْحَيَوِي. علم التواصل والتحكم في الحيوانات.

biofeedback تَلْقِيمٌ حَيَوِي رَاجِعٌ؛ تَغْذِيَّةٌ حَيَوِيَّةٌ رَاجِعَةٌ. عملية تجهيز الشخص بالمعلومات الخاصة إما بطريق السمع أو البصر عن أحد المتغيرات الفيزيولوجية في جسمه كسرعة القلب أو مستوى ضغط الدم أو درجة الحرارة والتي تساعده على التحكم فيها إرادياً.

- alpha b. تَغْذِيَّةُ الْفَا الْحَيَوِيَّةُ الرَّاجِعَةُ. حالة إعلام الشخص بالسمع بصورة مستمرة عن نمط ونظم موجاته الدماغية بغرض زيادة نشاط موجات ألفا مما يؤدي إلى حالة من الارتخاء واليقظة عند الشخص.

biopsy خَزْعَةٌ؛ اخْتِرَاعٌ. استئصال جزء من نسيج حي من جسم المريض لغرض فحصه وعادة بالفحص المجهرى وذلك لأغراض التشخيص المرضي.

biopsychic نَفْسِيٌّ حَيَوِيٌّ. متعلق بالظواهر النفسانية والعقلية للكائنات الحية.

biopsychology (= psychobiology) عِلْمُ النَّفْسِ الْبِيُولُوجِي. علم النفس البيولوجي.

biorhythm نَظْمٌ حَيَوِيٌّ. ظواهر فيزيولوجية دورية مثل النظم اليوماوي.

biothesiometer مِقْيَاسٌ حَسَّ الْإِهْتِرَاز. آلة تقيس عتبة إدراك حس الاهتزاز.

bipolar ذُو قُطْبَيْنِ. 1. بنية ذات قطبين.
2. عصبون ذو قطبين.

- b. neuron عَصْبُونٌ ذُو قُطْبَيْنِ. عصبون ذو
فرعين أحدهما المحاور.

bisexual ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّةِ. شخص
يتصف بثنائية الجنس.

bisexuality ثُنَائِيَّة الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّةِ.

1. خنوثة حقيقية في حالة وجود غدتين جنسيتين
واحدة من كل جنس. 2. شخص له سلوك مذهري
وخصائص من الجنسين. 3. انجذاب نحو كلا
الجنسين الذكر والأنثى، فهو جنوسي ومغاير
الجنس في ذات الوقت. 4. وجود صفات نفسية
للجنسين أي الذكورة والأنوثة لدى نفس الشخص.

bitter مُرٌّ. طعم كريحه مثل طعم الكينين.

blackout غَيْمُومَةٌ. حالة تتصف بغياب البصر
وفقدان الوعي الموقت بسبب نقص دوران الدم في
الدماغ.

bladder مَثَانَةٌ. كيسة غشائية تتجمع فيها
السوائل وتستعمل اصطلاحياً للكيسة البولية.

- atonic b. مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ. حالة تتصف بتمدد
المثانة البولية وضعف تقلصها من دون أية إصابة في
الجهاز العصبي المركزي.

- atonic neurogenic b. مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.
المنشأ. مثانة وائية بسبب إصابة أعصابها الحسية
التي تربطها بالتخاع وتتصف بفقدان القدرة على
التحكم على وظائفها والحس بالرغبة بإفراغها عند
امتلائها المفرط. وغالباً ما تشاهد في التابس الظهري.

- automatic b. مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. مثانة عصبية
الاعتلال بسبب القطع الكامل للنخاع الشوكي فوق
مستوى الشدافات العجزية مما يؤدي إلى فقدان
المنعكسات البولية وحس المثانة والتبول الشديد
الإلزامي مع بقاء مثالة بولية كبيرة في المثانة.

- autonomic b. (= automatic b.) مَثَانَةٌ
تَلْقَائِيَّةٌ.

- autonomous b. مَثَانَةٌ مُسْتَقْلِلَةٌ. مثانة عصبية
الاعتلال بسبب آفة في القسم العجزية من النخاع التي
تقطع القوس المنعكسي الذي يتحكم بالمثانة وتتصف
بفقدان حس المثانة ومنعكس بدء التبول والسلس.

- cord b. (= automatic b.) مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ.

مَثَانَةٌ - **denervated b. (= autonomous b.)** مُسْتَقْلِلَةٌ.

مَثَانَةٌ مَشْلُولَةُ الحَرَكَةِ. **- motor paralytic b.**
مثانة عصبية الاعتلال بسبب قطع الأعصاب أو
العصبونات التي تنظم منعكساتها ويتصف النوع الحاد
من هذا الداء بتمدد المثانة المفرط المؤلم مع عدم
المقدرة على إفراغها أما النوع المزمن فيتصف
بصعوبة بدء التبول مع العصر والإجهاد وضعف تيار
التبول وتقطعه

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةٌ. حالة وظيفية تتصف **- nervous b.**
بالرغبة المقيمة للتبول مع عدم المقدرة على ذلك
بصورة تامة.

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةُ الإِعْتِلَالِ. أي خلل **- neurogenic b.**
وظيفي في المثانة البولية ينتج عن آفة عصبية محيطية
أو مركزية.

مَثَانَةٌ - **nonreflex b. (= autonomous b.)** مُسْتَقْلِلَةٌ.

- paralytic b. (= atonic neurogenic b.) مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةُ الإِعْتِلَالِ.

مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. **- reflex b. (= automatic b.)**

- sensory paralytic b. (= atonic neurogenic b.) مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةُ الإِعْتِلَالِ.

مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. **- spastic b. (= automatic b.)**

مَثَانَةٌ. **- tabetic b. (= atonic neurogenic b.)** وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةُ الإِعْتِلَالِ: مَثَانَةٌ تَابِيسِيَّةٌ.

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةٌ **- uninhibited neurogenic b.**
الإِعْتِلَالُ غَيْرُ مُثَبِّطَةٍ. مثانة عصبية الاعتلال بسبب
آفة في منطقة العصبونات الحركية العلوية التي تقطع
السبل القشرية النخاعية وتتصف بالرغبة الملحة على
التبول والإفراغ المتكرر اللاإرادي والفعالية التبولية
الواطنة العتبة.

عَمَى. عدم المقدرة على الرؤية. **blindness**

عَمَةُ الألوان. عدم المقدرة **- amnesic color b.**
على تسمية اللون المنظور بسبب مرض دماغي.

عَمَى الألوان. عدم المقدرة على رؤية **- color b.**
بعض الألوان أو كلها.

عَمَى الإِرْتِجَاجِ. عَمَى وظيفي **- concussion b.**

- يُنتج عن الانفجار الشديد كانفجار القنابل أو المتفجرات.
- **mental block** blocking. انظر فِكْرِيّ.
- **nerve b.** إحصارُ العَصَب. تخدير موضعي بحقن المخدر خارج أو حول العصب وبالقرب منه لإحصار توصيل الدفقات العصبية خلاله.
- **paracervical b.** إحصارُ حَوْل الرّقبة. تخدير الضفيرة والعقدة الحثليتين بحقن المبنج في القبر الوحشي للمهبل.
- **paraneural b.** إحصارُ حَوْل العَصَب. تبنيج العصب بحقن المبنج حوله.
- **parasacral b.** تخدير حَوْل العُجْزِيّ. تخدير موضعي بحقن المبنج الموضعي حول الأعصاب العجزية عند ظهورها من الثقوب العجزية.
- **paravertebral b.** إحصارُ حَوْل الفَقَارِيّ. حقن هيدروكلوريد البروكائين حول العقدة الرقبية الصدرية (التجمية) ويجرى ذلك في نوبات تسرع القلب أو السكتة وما شاكل ذلك.
- **perineural b.** إحصارُ حَوْل العَصَب. تخدير يجري بحقن المبنج بالقرب من العصب أو حوله.
- **presacral b.** إحصارُ أَمَام العُجْزِيّ. تخدير يتم بحقن المبنج حول الأعصاب العجزية وعلى السطح الأمامي للعجز.
- **pudendal b.** إحصارُ العَصَب الفَرْجِيّ. تبنيج العصب الفرجي بإحصاره بالمبنج الموضعي الذي يحقن إلى أحذوبة عظم الورك.
- **sacral b.** إحصارُ عُجْزِيّ. تخدير يجري بزرق المبنج الموضعي إلى الحيز خارج الجافية في القناة الشوكية.
- **spinal b. (= subarachnoid b.)** انسداد تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة.
- **spinal subarachnoid b.** انسدادُ تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة النخامية. حالة انسداد مجرى السائل المخي النخاعي في القناة الشوكية.
- **subarachnoid b.** إحصارُ تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة. تخدير يولد بحقن المخدر الموضعي في الحيز تحت العنكبوتية حول النخاع الشوكي.
- **sympathetic b.** إحصارُ الوُدِّيّ. إحصار الجذع الودي بزرق المبنج حول الفقري.
- يُنتج عن الانفجار الشديد كانفجار القنابل أو المتفجرات.
- **cortical b.** عَمَى قَشْرِيّ. عمى ينتج عن آفة في المنطقة البصرية من قشرة المخ.
- **cortical psychic b.** عَمَى قَشْرِيّ نَفْسِيّ. فقدان الذاكرة البصرية للصور والاتجاهات الحيزية في المحيط بسبب آفة في الفص البصري.
- **functional b.** عَمَى وَظِيفِيّ. عمى هستيري من دون أية آفة بصرية أو عصبية.
- **hysterical b. (= functional b.)** عَمَى وَظِيفِيّ؛ عَمَى هِسْتِيرِيّ.
- **mind b. (= psychic b.)** عَمَى نَفْسِيّ.
- **object b.** عَمَى الأشياء. عدم المقدرة على التعرف على الأشياء الموجودة في المحيط وعلى طبيعتها ووظائفها بالرغم من رؤيتها جيداً.
- **psychic b.** عَمَى نَفْسِيّ. عدم المقدرة على التعرف على المنبهات البصرية بسبب آفة في الدماغ.
- **soul b. (= psychic b.)** عَمَى نَفْسَانِيّ.
- **syllabic b.** عَمَى المَقَاطِع. عدم المقدرة على فهم مقاطع الكلام.
- **taste b.** عَمَى الذُّوق. عدم المقدرة على تذوق بعض المواد وإدراك حسها.
- **text b.** تَعَذُّرُ القِرَاءَةِ؛ الأَلْفَرَائِيَّة. انظر alexia.
- **word b.** تَعَذُّرُ القِرَاءَةِ؛ الأَلْفَرَائِيَّة. انظر alexia.
- blinking** طَرَفٌ. منعكس متكرر لفلق الأجفان لنشر فيلم الدمع على سطح العين وحماية القرنية من الجفاف أو الأذى.
- block** إحصار. 1. انسداد أو إيقاف 2. تخدير موضعي.
- **adrenergic b.** إحصارُ الفِغَل الأدريناليني. انظر blockade, adrenergic.
- **epidural b.** تخدير خَارِجَ الجَافِيَّة. انظر anesthesia, epidural.
- **intercostal b. (= intercostal nerve b. = intercostal anesthesia)** تخدير وَرَبِيّ.
- **intraspinal b. (= subarachnoid b.)** إحصارُ

- vagal b. (= vagus nerve b.) إحصَارُ المُنبَهِم.

إحصار الدفعات العصبية في العصب المبهم بحقن المينج الموضعي حول المبهم عند مخرجه من القحف.

blockade إحصَار. إحصار المستقبل،

إحصار تأثير الناقل الهرموني أو العصبي على مستقبلية سطح الخلية بواسطة ضادة دوائية ترتبط بالمستقبلية.

- adrenergic b. إحصَارُ الفِعلِ الأدريناليني.

تنشيط انتقائي لاستجابة الدفعات العصبية الودية وللكاتيكولامين وللأمينات الأدرينالينية الفعل الأخرى سواء في موقع مستقبلية ألفا أو مستقبلية بيتا في الأعضاء المستقلة أو في العصبونات الأدرينالينية الفعل بعد العقدة.

- alpha adrenergic b. (= adrenergic b.)

إحصَارُ العَصَبُونِ الأدريناليني ألفا.

- beta adrenergic b. (= adrenergic b.)

إحصَارُ العَصَبُونِ الأدريناليني بيتا.

- cholinergic b. إحصَارُ الفِعلِ الكولينيني. تنشيط

انتقائي للدفعات العصبية للأعصاب الكولينينية الفعل في المشابك العقدية المستقلة وفي المستغلات اللاودية بعد العقدة أو في الاتصالات العصبية العضلية.

- narcotic b. إحصَارُ المُخَدَّرَات. إحصار التأثير

السُّمِّي للمخدر باستعمال أدوية مثل الميثادون في معالجة الإدمان.

- neuromuscular b. إحصَارُ عَصَبِيٍّ عَضَلِيٍّ.

فشل الانتقال العصبي العضلي الذي ينتج عن اعتلال الاتصال العصبي العضلي.

blocker مُحَصِّر. مادة تحصر أو تسد مرور

بعض الفعاليات أو المواد.

- alpha b.

مُحَصِّرُ ألفا. دواء يؤدي

إلى إحصار الفعل الأدريناليني في المستقبلات الأدرينالينية الفعل ألفا.

- beta b.

مُحَصِّرُ بيتا. دواء يؤدي إلى

إحصار الفعل الأدريناليني في المستقبلات الأدرينالينية الفعل بيتا 1، أو بيتا 2، أو في كليهما.

blocking إحصَار. 1. حصر مرور الدفعات

العصبية الواردة مما يؤدي إلى تخدير موضعي 2. حصر الأفكار أو حرمانها؛ توقف التفكير

الفجائي عند حصول نوبة ألم.

- b. agent, competitive عَامِلُ إحصَارِيٍّ

مُنافِس. عامل أو دواء غير فعال ينافس المادة الناقلة الفيزيولوجية ويمنعها من الوصول إلى المستقبلية وبذلك يحصر عملها.

- b. agent, depolarizing عَامِلُ مُحَصِّرٍ

مُزِيلُ الإِسْتِقْطَاب. عامل يزيل استقطاب المستقبلية وبهذا يشبط تنبيهها بالمنبه الفيزيولوجي.

blood- brain barrier حَائِلُ دَمَوِيٍّ دِمَاعِيٍّ.

أنظر barrier.

blush تَوَرَّد.

احمرار الوجه عند الخجل

بسبب توسع أوعيته الجلدية.

body جِسْم.

1. جذع الكائن وأعضاؤه

2. أكبر وأهم جزء من أي عضو 3. كتلة أو تجمع من مواد بنوية.

- amygdaloid b.

الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

أنظر corpus amygdaloideum.

- b. of cerebellum جِسْمُ المُخَيِّخ.

أنظر corpus cerebelli.

- b. of fornix جِسْمُ القَبْو.

أنظر corpus fornicis.

- geniculate b.

الجِسْمُ الرُّجْبِيّ.

أنظر corpus geniculatum.

- habenular b.

العَبَان. أنظر habenula.

- hyaloid b.

الجِسْمُ الرُّجَاجِيّ.

أنظر vitreous body.

- infundibular b.

الجِسْمُ القِمْعِيّ. الفص

الخلفي للغدة النخامية.

- juxtarestiform b. الجِسْمُ المُجَاوِرُ لِلْمَرَسِيّ

الشكل. بنية تربط النواة الدهليزية الوحشية مع النواة البرحاء وتنقل الدفعات العصبية الدهليزية.

- Luy's b. (= nucleus subthalamicus)

النَّوْةُ تَحْتَ المِهَادِيَّة.

- mamillary b.

الجِسْمُ الحَلْمِيّ.

أنظر corpus mamillare.

- medullary b. of cerebellum (= corpus

medullare cerebelli) لُبُّ المُخَيِّخ.

- medullary b. of vermis شَجَرَةُ الْحَيَاةِ
arbor vitae لَب الدودة، أنظر cerebelli

- Nissl b's. أجسام نيسل. أجسام حبيبية كبيرة
قعدة توجد في أجسام العصبونات وتتكون من
الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة وعديدات الريباسات
الحرة.

- olivary b. (= oliva) الزيتونة؛ الجسم الزيتوني.

- pacchionian b's. الحَبَبَات العَنُكَبَوِيَّة.
granulationes arachnoideae انظر

- paraolivary b's. (= accessory olivary
nuclei) النُويَات الزيتونية الإِضَافِيَّة.

- pineal b. الجسم الصَّنَوْبِرِي. جسم مسطح
صغير مخروطي الشكل فوق المهادي يقع فوق الأكمة
العلوية وتحت طرف الجسم الثفني وهو مركز تركيب
الميلاتونين الذي يثبط تنامي الغدد التناسلية.

- pituitary b. الغُدَّة الخَافِيَّة.
pituitary gland انظر

- quadrigeminal b's. الأَجْسَام الرُّبَاعِيَّة.
corpora quadrigemina انظر

- restiform b. الجسم المَرَسِي الشَّكَل.
pedunculus cerebellaris caudalis انظر

- sand b. رَمَل الدِّمَاغ. acervulus انظر

- tigroid b's. (= Nissl b's.) أجسام نيسل؛
الأَجْسَام الثَّغَرَاء.

- trapezoid b. الجسم المُنَحْرِفِي.
corpus trapezoideum انظر

- vitreous b. الجسم الرُّجَاجِي. الجسم الهلامي
الشفاف الذي يملأ القسم الداخلي من مقلة العين بين
العدسة والشبكة.

body agnosia عَمَّة الجسم.
agnosia انظر

body rocking تَارْجُح الجسم. حركة
الجسم النظمية الأمامية الخلفية عند الجلوس.

brachial عَضْدِي. متعلق بالعضد.

brachialgia أَلَم عَضْدِي. ألم في الذراع أو
الذراعين.

- b. statica paresthetica أَلَم الذَّرَاع المَذَلِّي

الإِنْضَافَاطِي. ألم الذراع واليد الذي يحدث أثناء النوم
بسبب انضغاط الأوعية الدموية للذراع.

brachium العَضُد. 1. الذراع، خصوصاً
قسمها من الممكب حتى المرفق 2. اصطلاح عام
يدل على أية بنية أو نقوء شبيه بالذراع.

- b. colliculi caudalis ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الذَّنْبِيَّة.
الياف من الغنيل الوحشي تمر إلى الأكمة الذنبية ثم
تتجه إلى الامام لتنتهي في الجسم الركيبي الإنسي.

- b. colliculi inferioris (= b. colliculi
caudalis) ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الذَّنْبِيَّة.

- b. colliculi rostralis ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الرُّأْسِيَّة
(المنقارية). الياف تتسلق في الناحية البطنية
الوحشية من الجهة الوحشية للأكمة الرأسية للدماغ
المتوسط لتنتقل أليافاً من الشبكية والشع البصري إلى
الأكمة العلوية.

- b. colliculi superioris (= b. colliculi
rostralis) ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الغُلُويَّة.

- b. of cranial colliculus (= b. colliculi
rostralis) ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الغُلُويَّة.

- b. opticum الذَّرَاعُ البَصَرِيَّة. أحد الفروع التي
تمتد من الأجسام الرباعية إلى المهاد البصري.

- b. pontis ذِرَاعُ الجِسْرِ. انظر
pedunculus cerebellaris medius

- b. quadrigeminum inferius (= b.
colliculi caudalis) ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ السُّفْلِيَّة.

- b. quadrigeminum superioris
(= b. colliculus rostralis) ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ
الرُّأْسِيَّة.

brachybasia قَصَرُ الخَطُويَّة. مشية بطيئة
قَصيرة الخطو كما تشاهد في الشلل الشقي
المزدوج.

brachycephalia (= brachycephaly) قَصَرُ الرُّأْس.
قَصَرُ الرُّأْس. رأس قصير

brachycephaly ذُو منسب رأسي بين 81.0-85.4.

bradyacusia ثِقَلُ السَّمْع. قلة السمع.

bradyarthria (= bradylalia) لَفَفٌ؛ ثِقَلُ
النُّطْق.

bradycinesia (= bradykinesia) بَطْءُ الْحَرَكَةِ.

bradyecoa تَبَاطُؤُ السَّمْعِ. صمم جزئي.

bradyesthesia بَطْءُ الإِدْرَاكِ. بطء أو قلة الفهم والإدراك.

bradyglossia تَبَاطُؤُ النُّطْقِ. بطء التلفظ الشاذ.

bradykinesia بَطْءُ الْحَرَكَةِ. بطء الحركات الشاذ مع تبدل الاستجابة الفكرية والحركية.

bradylalia لَفَفٌ؛ ثِقَلُ النُّطْقِ. بطء تلفظ الكلمات الشاذ بسبب آفة دماغية.

bradylexia بَطْءُ الْقِرَاءَةِ. بطء القراءة غير الناتج عن أي خلل بصري أو فكري أو عدم معرفة القراءة.

bradylogia بَطْءُ الْكَلَامِ. بطء الكلام الناتج عن العجز في التفكير كالذي يحصل في الأمراض العقلية.

bradyphasia (= bradylalia) لَفَفٌ؛ ثِقَلُ النُّطْقِ.

bradyphemia بَطْءُ الْكَلَامِ. انظر bradylogia.

bradyphrasia بَطْءُ التَّلَفُّظِ. بطء لفظ الكلمات.

bradyphrenia تَبَلُّدُ الذَّهْنِ. حالة تتصف بالعجز في المبادرة الفكرية السريعة وببطء الفعالية النفسية الحركية وعدم الاهتمام والتفاعل مع المحيط وينتج كل ذلك عن التهاب الدماغ الوبائي.

bradypragia بَطْءُ الْعَمَلِ. البطء في القيام بأي عمل.

bradyteleocinesia (= bradyteleokinesia) بَطْءُ التَّنْظِيقِ الْحَرَكِيِّ.

bradyteleokinesia بَطْءُ التَّنْظِيقِ الْحَرَكِيِّ. البطء في تنسيق الحركات فتتوقف الحركة أو تبطل كثيراً قبل إكمالها ووصولها إلى هدفها.

brain (= encephalon) الدِّمَاغُ. قسم الجهاز العصبي المركزي الذي يوجد في القحف والمكون

من الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر وهو يقوم بوظائف السيطرة على الحركات العضلية وتنسيقها وإدراك الحواس وتنظيمها والسيطرة على توليد النطق وحفظ الذكريات وتوسيع الأفكار والعواطف والانفعالات.

- new b. الدِّمَاغُ الْجَدِيدُ. انظر neoencephalon, neencephalon.

- old b. الدِّمَاغُ الْقَدِيمُ. انظر paleoencephalon, paleoencephalon.

- olfactory b., smell b. (= rhinencephalon) الدِّمَاغُ الشَّمِّي.

- respirator b. دِمَاقُ الْمِنْفَاسِ. حالة المصاب بعد موت دماغه السريري والتي يحافظ فيها على الفعاليات الحيوية صناعياً باستعمال المنفاس.

- split b. دماغ منشطر. دماغ يُقَطَعُ فيه الاتصال بين نصفي كرة المخ للسيطرة على نوبات الصرع.

- tween b. الدِّمَاغُ الْبَيْنِي. انظر diencephalon, interbrain.

- visceral b. (= limbic system) الدِّمَاغُ الْحَشَوِيِّ. الجهاز الحوفي.


- wet b. (= cerebral edema) وَذَمَةُ الدِّمَاغِ. حالة وذمة الدماغ.

brainstem جِذْعُ الدِّمَاغِ. قسم الدماغ الذي يشبه الجذع والذي يربط نصفي كرة المخ بالنخاع الشوكي والذي يشمل الجسر والبصلة (الدماغ المستطيل) والدماغ المتوسط، وقد يضم البعض الدماغ البيني أيضاً إلى جذع الدماغ.

brainwashing غَسْلُ الدِّمَاغِ. محاولة منتظمة لغرس معتقدات وآراء معينة لدى الشخص خلاف رغبته، وعادة بمعتقدات تتناقض مع معارفه وآرائه السابقة.


bregma الْهَامَةُ. نقطة على سطح القحف عند اتصال الدرزين الإكليلي والسهمي.

bromocriptine بَرُومُوكْرِپْتِين. مادة شاذة للدوبامين وتستعمل كدواء في علاج داء باركنسون ويثبط إفراز الحليب ويحفز الإباضة.




brain

نصفا كرة المخ منفلوران من الأعلى: (1) القطب الجبهي (2) التلفيف الجبهي العلوي (3) التلفيف الجبهي المتوسط (4) التلم الجبهي العلوي (5) التلم المركزي (6) التلفيف فوق الهامشي (7) التلم الصدغي العلوي (8) التلفيف الزاوي (9) التلم تحت الجداري (10) الفص الجداري السفلي (11) الفص الجداري العلوي (12) الفص القذالي (13) التلم الجداري القذالي (14) التلم الحزامي (15) التلم داخل الجداري (16) التلفيف خلف المركزي (17) التلم خلف المركزي (18) التلم المركزي (19) التلفيف امام المركزي (20) التلم امام المركزي (21) التلم الجبهي السفلي (22) التلم الجبهي العلوي (23) الشق للمخي الطولاني.




brain

صورة للمسطح السفلي للدماغ تبين بعض أقسامه والأعصاب القحفية: (1) القطب الجبهي (2) القمع (3) الالتام الحجاجية (4) التلافيف الحجاجية (5) الغدة النخامية (6) القطب الصدغي (7) المادة المثقبة الأمامية (8) العصب المحرك للعين (9) معقف التلافيف جنب الحصين (10) الجسم الحلمي (11) التلافيف القذالي الصدغي الوحشي (12) التلم الصدغي السفلي (13) التلافيف جنب الحصين (14) السويقة المخية (15) العصب الثلاثي التوائم (16) العصب الوسطاني (17) العصب الوجهي (18) العصب الدهليزي القوقعي (19) النذفة المخيخية (20) المخيخ (21) الضفيرة المشيمية للبطين الرابع (22) العصب اللساني البلعومي (23) العصب المبهم (24) العصب اللساني (25) العصب الإضافي (26) جزيرات العصب الرقبي الأول (27) التصلاب الهرمي (28) دوادة المخيخ (29) الحبل الشوكي (30) القطب القذالي (31) لوزة المخيخ (32) الشق المتوسط للبصلة (33) هرم البصلة (34) الزيتونة (35) المخيخ (36) العصب المبعد (37) الجسر (38) العصب البكري (39) العقدة الثلاثية التوائم (40) العصب الفكي السفلي (41) الجذر الحركي للعصب الثلاثي التوائم (42) الحفرة بين السويقتين (43) العصب العيني (44) العصب الفكي العلوي (45) الحدة الرمامية (46) السطور المشيمية الوحشية (47) العصب البصري (48) التصلاب البصري (49) السبيل الشمي (50) البصلة الشمية (51) التلم الشمي (52) الشق المخي الطولاني.




brain

مقطع ناصفي للدماغ يبين بعض أجزائه: (1) المهاد (2) الحصين (3) الجسم الحلمي (4) اللوزة (5) الدماغ الأمامي القاعدي (6) القشرة الجبهية.




brain

مقطع سهمي متوسط عبر الدماغ: (1) التلم الحزامي (2) التلم النقي (3) مؤخر الجسم النقي (4) أمام الإسفين (5) التلم تحت الجداري (6) التلم الجداري القذالي (7) السقف (الصفحة الرباعية التوائم) (8) الإسفين (9) التلم المهادي (10) القطب القذالي (11) التلفيف القذالي الصدغي الإنسي (12) المخيخ (13) شجرة الحياة في المخيخ (14) لب الدودة (15) الشراع البصلي الأمامي (16) المزلاج (17) التلفيف القذالي الصدغي الإنسي (18) الحبل الشوكي (19) النسيجة المشيمية للبطين الرابع (20) للبصلة (النخاع المستطيل) (21) البطين الرابع (22) المسال المخي (23) الجسر (24) المادة المثقبة الخلفية (25) العصب المحرك للعين (26) الجسم الحلمي (27) الفص الخلفي للغدة النخامية (28) الغدة النخامية (29) الفص الأمامي للغدة النخامية (30) القمع (31) التصلب البصري (32) العصب البصري (33) الرقب البصري للبطين الثالث (34) الصفحة الانتهازية (35) تلم الوطاء (36) القطب الجبهي (37) التلفيف جنب النهائي (38) الباحة تحت النقي (39) منقار الجسم النقي (40) ركة الجسم النقي (41) التلفيف الجبهي العلوي (42) الصوار الأمامي (43) عمود القبو (44) النقبة بين البطينين (45) التلم الحزامي (46) الحاجز الشفاف (47) جسم القبو (48) جذع الجسم النقي (49) المهاد (50) الالتصاق بين المهادين (51) التلفيف الحزامي (52) النسيجة المشيمية للبطين الثالث (53) الصوار الخلفي (54) الرقب للصنوبري (55) الغدة للصنوبرية (56) التلم المركزي (57) الفصيص جنب المركزي.




brain

مقطع أفقي عبر المخ عند مستوى العلق القاعية والمحفظة الداخلية مبيناً بعض أقسامه وأقسام الدماغ (1) جوف الحاجز الشفافي (2) الجسم الثفني (3) الحاجز الشفافي (4) العائق (5) المحفظة الخارجية (6) تلافيف الجزيرة (7) النواة العيسية (8) عمود القبو (9) النقطة بين البطينين (10) نواة الجسم الركبي الوحشي (11) نويات المهاد (12) البطين الثالث (13) الأريمة العلوية (14) الورقات المخيخية (15) جسم المخيخ (16) الشريان المخيخي العلوي (17) قدم الحصين (18) القرن الخلفي للبطين الجانبي (19) الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي (20) نوب النواة المنحبة (21) الصفيحة اللبية الإنسية (22) الصفيحة اللبية الوحشية (23) الكرة الشاحبة (24) العائق (25) البطامة (الجزء الوحشي من النواة العيسية) (26) الطرف الخلفي للمحفظة الداخلية (27) ركبة المحفظة الداخلية (28) الطرف الأمامي للمحفظة الداخلية (29) البطين الثالث (30) رأس النواة المنحبة (31) القرن الأمامي للبطين الجانبي (32) الشق المخي للطلواني.




brain

مقطع جبهى عبر الدماغ الانتهاء بمستوى الصوار الأمامي: (1) القرن الأمامي للبطين الجانبى (2) رأس النواة المنزلة (3) الفص الجبهى (4) المحفظة الداخلية (5) النواة العدسية (6) القلم الجانبى (7) القلم جنبى النهائي (8) الوزة (9) البطين الثالث (10) القمع (11) التصلب البصرى (12) عمود القيو (13) السبيل البصرى (14) الكرة الشاحبة (15) الفص الصدغى (16) المحفظة الخارجية (17) الجزيرة (18) العائق (19) المحفظة القصوى (20) القشرة (21) الصوار الأمامى (22) الحاجز الشفاف (23) الجسم النصفى (24) التليف الحزامى (25) الشق المعى الطولانى.



brain

مقطع في المستوى الجبهي للدماغ يبين بعض أقسامه الرئيسية ونوى الوطاء المختلفة: (1) الجسم الثفني (2) النواة المنزلة (3) البطين الجانبي (4) الحاجز الشفاف (5) جسم القبو (6) المهاد (7) السبيل الحلمي المهادي إلى النواة الأمامية (8) البطين الثالث (9) المحفظة الداخلية (10) قشرة العدسية (11) الكرة الشاحبة (12) الباحة الوطائية الظهرية (13) النواة جنيب البطين (14) عمود القبو (15) العروة العدسية (16) النواة حول البطين (17) الباحة الوطائية الوحشية (18) الباحة الوطائية الأمامية (19) النواة فوق البصرية (20) السبيل البصري (21) النواة المقوسة حول البطين (22) القمع (23) سوقة النخاعي.



brain

مقطع سهمي متوسط عبر جذع الدماغ: (1) جسم القيو (2) تلم الوطاء (3) الثقبية بين البطينين (4) الحاجز الشفافي (5) عمود القيو (6) الجسم الخلمي والحببة الرمادية (7) الصفيحة الإنتهائية (8) متقار الجسم الثفني (9) ركبة الجسم الثفني (10) التلافيف جانب الذهائي (11) الصوار الأمامي (12) الباحة تحت الثفني (13) الصفيحة الإنتهائية (14) الربب البصري (15) الربب القمعي (16) التصلب البصري (17) القمع (18) الفص الأمامي للغدة النخامية (19) الفص الخلفي للغدة النخامية (20) العصب المحرك للعين (القحفي الثالث) (21) الحفرة بين السويقتين (22) الجسر (23) تصالب السويقتين المخيخيتين العلوية والسفلية (24) الحزم الطولانية للجسر (25) الحزمة الطولانية الإنسية (26) الحفرة المعينية (27) البطين الرابع (28) القناة المركزية (29) الحبل الشوكي (30) الضفيرة المشيمية للبطين الرابع (31) المعقيدة (32) لهة الدودة (33) المركز الليبي للدودة (34) نصف الكرة المخيخية (35) أعلى نقطة في البطين الرابع (36) ورقة الدودة (37) البطين الرابع (38) لسين المخيخ (39) الفصيص المركزي (40) الشراع البصلي العلوي (41) السويقة المخيخية (42) القنة (43) الصفيحة الرباعية التوائم (44) المسال المخيخي (45) مؤخر الجسم الثفني (46) الغدة الصنوبرية (47) ريب الصنوبرية (48) ريب فوق الصنوبرية (49) مثلث العنان (50) الصوار الخلفي (51) البطين الثالث (52) الضفيرة المشيمية للبطين الثالث (53) المهاد (54) الالتصاق بين المهادين (55) جذع الجسم الثفني.

رَهَابٌ (**brontophobia = astraphobia**)
الرَّعْدُ. رهَابُ الرعد والبرق.

صَرِيْفُ الْأَسْنَانِ **bruxism**
النظمي والتشنجي اللاإرادي واللاوظيفي وغالباً ما يحدث أثناء النوم وهو علامة اضطرابات نفسية.

هَوَسُ الصَّرِيْفِ **bruxomania**
الأسنان وصريرها خلال النهار ومن دون وعي المصاب.

بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ (**bud, gustatory = taste bud**)
ذَوْقِيٌّ.

بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ **bud, taste**
صغير يحوي مستقبلات ذوقية، يوجد على سطح اللسان وفي الشدق.

بَصْلَةٌ (ج: بصلات). كتلة كروية **bulb**
الشكل: استعمل اللفظ سابقاً للدلالة على النخاع المستطيل.

البَصْلَةُ السَّمْعِيَّةُ. الدهليز الغشائي. **- auditory b.**

بَصْلَةُ إِنْتِهَائِيَّةُ. 1. جسم كروي أو **- end b.**
بيضوي في نهاية الليف العصبي يوجد عادة في الجلد والأغشية المخاطية والعضلات والمفاصل والنسيج الضام والأحشاء 2. قدم انتهائي.

البَصْلَةُ الشَّمْعِيَّةُ. انظر **- olfactory b.**
bulbus olfactorius

بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ. انظر **bud, taste**. **- taste b.**

بَصْلَةُ إِنْتِهَائِيَّةُ. **- terminal b. (= end b.)**

بَصْلَتِي جِسْرِيٍّ. اصطلاح يدل **bulbopontine**
على الجسر ومنطقة النخاع المستطيل (البصلة) التي تقع فوقه.

بَصْلَةٌ. 1. جسم كروي أو بيضوي **bulbus**
2. النخاع المستطيل.

- b. cornus occipitalis ventriculi lateralis
بَصْلَةُ الْقَرْنِ الْقَذَالِيِّ لِلْبَطْنَيْنِ الْجَانِبِيَّ. بارزة في القسم العلوي من الجدار الإنسي للقرن القذالي للبطين الجانبي فوق مهماز الطير وتولدها الألياف الطرفية للملقط الجبهي عند مرورها نحو الفص القذالي.

مُقَلَّةُ الْعَيْنِ. كرة العين. أو بصلة العين. **- b. oculi**

البَصْلَةُ الشَّمْعِيَّةُ. الامتداد البصلي **- b. olfactorius**

الشكل للسبيل الشمي على السطح السفلي للفص الجبهي في كل من نصفي كرة المخ والذي يدخل فيه العصب الشمي.

حُرْمَةٌ. (ج: حزم). مجموعة **bundle**
من الألياف العضلية أو العصبية المرصوفة مع بعضها على شكل حزمة.

حُرْمَةٌ زَائِغَةٌ. مجموعة من **- aberrant b.**
الألياف الهرمية التي تترك السبيل القشري النووي في مستويات متتالية من جذع الدماغ لتوصل أليافها إلى نوى الأعصاب القحفية.

الحُرْمَةُ الْقَرْيَّةُ **- cornucommissural b.**
الحزمة المخصوصة التي تمر على سطح العمود الخلفي وصوار النخاع الشوكي.

- fundamental b's of spinal cord
(= fasciculi proprii medullae spinalis)
الحُرْمُ الْمَخْصُوصَةُ لِلنَّخَاعِ الشُّوكِيِّ.

الحُرْمَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلدِّمَاغِ **- medial forebrain b.**
الأمامي. مجموعة من الألياف التي تبدأ من المناطق الشمية القاعدية ومن المنطقة حول اللوزية ومن النوى الحاجزية وتمر إلى اللحاء الوحشي، وتستمر بعض الألياف إلى سقيفة الدماغ المتوسط وتترحل في النوى المستقلة الحشوية في جذع الدماغ.

- Monakow's b. (= tractus rubrospinalis)
حُرْمَةُ مُونَاكُوف.

الحُرْمَةُ **- olivocochlear b. of Rasmussen**
الرَبْتُونِيَّةُ الْقَوْعِيَّةُ لِرَاسْمُوسِن. حزمة من الألياف تبدأ من المعقد الزيتوني العلوي وتنتهي عادة في قوقعة الجهة المعاكسة.

- b. of Oort (= olivocochlear b. of Rasmussen)
الحُرْمَةُ الرَبْتُونِيَّةُ الْقَوْعِيَّةُ
لرَاسْمُوسِن.

- solitary b. (= tractus solitarius medullae oblongatae)
الحُرْمَةُ الْوَحِيدَةُ لِلْبَصْلَةِ.
انظر tract

الحُرْمَةُ الْخَلْمِيَّةُ **- thalamomamillary b.**
المِهَادِيَّةُ. انظر fasciculus mamillothalamicus.

- b. of Vicq d'Azyr (= fasciculus mamillothalamicus)
الحُرْمَةُ الْخَلْمِيَّةُ
المِهَادِيَّةُ.

- Weissmann's b. حُرْمَةُ فَايْسَمَان. حزمة
الالياف العضلية المخططة التي توجد في المغزل
العصبي العضلي.

butabarbital sodium

بُوتَابَرْبِيتَال

الصُّودْيُوم. دواء يستعمل عن طريق الفم كمركن
ومنوم.

button's, terminal أَرْزَارُ إِنْتِهَائِيَّة؛

الأقدام الإنتِهائية. أنظر end feet.

C

cacesthenic مُفْتَلّ الحَوَاسِّ. شخص ذو أعضاء حسية ضعيفة.

cacesthesia اِخْتِلَالُ الحِسِّ. اضطراب أو اختلال أو شذوذ إحدى الحواس.

cachexia دَنَفٌ. نُحُول وهزال عامواختلال بنيوي يترافق عادة مع الأمراض المزمنة أو سوء التغذية أو نقصها.

- neurogenic c. دَنَفٌ عَصَبِيّ المنشأ. دنف ينتج عن مرض عصبي أو عقلي مزمن.

- psychogenic c. (= neurogenic c.) دَنَفٌ نفسيّ؛ دَنَفٌ عَصَبِيّ.

cacodemonomania هَوَسُ الشَّيَاطِين. هوس الشخص بوجود روح شريرة تتملكه.

cacogeusia فَسَادُ التَذَوُّقِ. الحس بذوق رديء في الفم من دون تذوق مادة رديئة.

cacosmia فَسَادُ الشَّمِّ. الحس برائحة خبيثة من دون التعرض لأيّة رائحة.

calcar مِهْمَاز. المِهْمَاز أو بنية شبيهة به.

- c. avis مِهْمَازُ الطَّيْرِ. نِتوء على الجدار الإنسي للقرن القذالي للبطين الجانبي أسفل بصلة القرن القذالي ويتولد من امتداد التلم المِهْمَازِي.

calcarine مِهْمَازِيّ. منسوب للمِهْمَاز، أو مِهْمَازِي الشكل.

caliculus كُوَيْسَة. (ج: كُوَيْسَات). بنية كاسية الشكل.

- c. gustatorius كُوَيْسَة ذَوْقِيَة. العضو الانتهائي لعصب الذوق الكاسي الشكل والذي يحيط بقاعدة الحليمة الذوقية المحوطة اللسانية.

callosal ثَقَفِيّ. متعلق بالجسم الثقني.

callosum (= corpus callosum) الجِسْمُ الثَقَفِيّ، الثَقَفِيّ.

calmative مُرَكِّن؛ مُهْدِئ. دواء أو عامل يخفف الهياج.

calvaria (= calvarium) القَبْة. القسم العلوي من القحف الشبيه بالقبة والمكون من الأقسام العلوية للعظام القذالية والجبهية والجدارية.

canal 1. قَنَاة 2. نَفَق. 1. ممر أنبوبي ضيق أو مجرى للسوائل 2. ممر للأوعية والأعصاب.

- arachnoid c. قَنَاة العَنَكَبُوتِيَّة. صهريج الوريد المخي الكبير.

- auditory c., external (= meatus, external acoustic) الصِّمَاحُ السَّمْعِيّ الظَّاهِر.

- cerebrospinal c. القَنَاة الدَّمَاعِيَّة النُّخَاعِيَّة. التجويف البدائي للدماغ والنخاع في الجنين.

- cochlear c. القَنَاة القَوِّعِيَّة. القناة الحلزونية داخل القوقعة.

- craniopharyngeal c. القَنَاة القَحْفِيَّة البُلْبُومِيَّة. قناة توجد أحياناً وتمر خلال العظم الوددي وتفتح في السرج التركي.

- neural c. (= canalis vertebralis) القَنَاة العَصَبِيَّة؛ النَفَقُ الفَقْرِيّ.

- optic c. (= canalis opticus) النَفَقُ البَصْرِيّ.

- semicircular c's. الأَقْنِيَّة الهَلَالِيَّة. الأقنية التيهية الثلاث الامامية والأفقية (الجانبية) والخلفية.

- spinal c. (= canalis vertebralis) النَقْفُ الفقري.

canaliculus قَنْيَةٌ؛ نَفَقٌ. قناة أنبوبية ضيقة جداً تكون ممراً ضيقاً للسوائل والأعصاب والأوعية.

canalis (= canal) نَفَقٌ؛ قَنَاة. ممر أو مجرى أنبوبي ضيق لمرور الأعصاب أو الأوعية أو السوائل.

- c. centralis medullae spinalis قَنَاة النُخَاع المَرْكَزِيَّة. قناة ضيقة تمتد على طول النخاع الشوكي وتبطنها البطانة العصبية وتمتد إلى الأعلى حتى النخاع المستطيل حيث تتصل بالبطين الرابع.

- canales diploici أَنْقَاقٌ خِلَالِ اللُّوْحَتَيْنِ. اقنية عظمية في عظام القحف توجد في العظام الإسفنجية بين لوحتيها الظاهرة والباطنة وتوفر ممرات للأوردة بين اللوحتين.

- c. facialis نَفَقُ الوُجْهِ. قناة في العظم الصدغي للعصب الصدغي تبدأ من الصماخ السمعي الباطن وتمر فوق دهليز الأذن الباطنة ثم تنتهي إلى الخلف على الجدار الإنسي للتجويف الطبلي حتى تصل إلى خارج الجزء الصخري من العظم الصدغي عند الثقب الإبرية الخشائية.

- c. opticus النَفَقُ البَصَرِي. ثقب في العظم الوتدي في قمة الحاج تكون أنبوباً يمرر العصب البصري والشریان العيني.

- c. semicircularis anterior القَنَاة الهَلَالِيَّةُ الأَمَامِيَّة. القناة العظمية الهلالية الأمامية التي تمرر الأنبوب الهلالي الأمامي الغشائي.

- c. semicircularis lateral القَنَاة الهَلَالِيَّةُ الجَانِبِيَّة. القناة التي تمرر القناة الهلالية الجانبية الغشائية للتي.

- c. semicircularis posterior القَنَاة الهَلَالِيَّةُ الخَلْفِيَّة. القناة التي تمرر القناة الهلالية الخلفية الغشائية للتي.

- c. semicircularis superior (= c. semicircularis anterior) القَنَاة الهَلَالِيَّةُ الأَمَامِيَّة.

- c. spinalis (= c. vertebralis) النَقْفُ الفقري.

- c. vertebralis النَقْفُ الفقري. القناة المكونة

من ثقب الفقرات المتجاورة والتي تأوي النخاع الشوكي والسحايا

cancerophobia رُهابُ السَّرْطَان. الخوف من الإصابة بالسرطان.

cannabis الحَشِيش. مادة تستحصل من زهور قمة نبات القنب الهندي وهي مادة مهلوسة.

canthus مُوقٌ؛ لِحَاط. إحدى زاويتي فتحة العين.

cantus galli (= laryngismus stridulus) تَشَنُّجُ الحَنْجَرَةِ الصَّرِيرِي.

capsula (= capsule) مَحْفَظَةٌ. بنية تشريحية تحيط وتحفظ بنية أخرى فيها.

- c. externa المَحْفَظَةُ الخَارِجِيَّة. الطبقة الرقيقة من المادة البيضاء التي تفصل القسم الوحشي من النواة العدسية عن العائق.

- c. extrema المَحْفَظَةُ القُصْوَى. المادة البيضاء التي تفصل العائق عن قشرة الجزيرة.

- c. ganglii مَحْفَظَةُ العُقْدَةِ. النسيج الضام ذو الصفائح الذي يحيط بالعقدة العصبية والمتصل بالغمد العصبي للأعصاب الجذرية التي تتصل بها.

- c. interna المَحْفَظَةُ الدَاخِلِيَّة. كتلة مروحية الشكل من الألياف البيضاء تفصل النواة العدسية عن رأس النواة المدببة في الجهة الإنسية وعن ظهر المهاد وذنب النواة الذنبية. وهي تتكون من ذراع أمامي وركبة وذراع خلفي يتكون من ثلاثة أقسام مهادي عدسي وتحت العدسي وخلف العدسي.

- capsulae nuclei lentiformis مَحْفَظَتَا النُّوَاةِ العَدْسِيَّة. انظر capsula externa; capsula interna.

capsule (= capsula) مَحْفَظَةٌ.

- c's. of the brain مَحْفَظَتَا الدِّمَاغ. طبقتا المادة البيضاء المخيتان وهما المحفظتان الداخلية والخارجية.

- external c. المَحْفَظَةُ الخَارِجِيَّة. انظر capsula externa.

- internal c. المَحْفَظَةُ الدَاخِلِيَّة. انظر capsula interna.

- ocular c. (= vagina bulbi) غِمْدُ المَقْلَةِ.

- optic c. المَحْفَظَةُ البَصَرِيَّة. البنية الجينية التي تتطور منها صلبة العين.

- Tenon's c. (= vagina bulbi) غَمْدُ المَقْلَة.

caput الرَّأْس؛ رَأْس. النهاية العلوية للجسم التي تشتمل على الوجه والجمجمة والدماغ وأعضاء الحس الخاص (العين والأذن واللسان والأنف والته والدهليز (جهاز التوازن).

- c. cornus dorsalis medullae spinalis رَأْسُ القَرْنِ الخَلْفِي لِلنُّخَاع. الجزء البيضوي أو المغزلي من القرن الخلفي أو المادة السنجابية للنخاع الشوكي بين الجزء الضيق من القرن (عنق القرن) وقمته.

- c. nuclei caudati رَأْسُ النَوَاةِ المُدَنَّبَةِ. أكبر جزء من النواة المدنبة والذي يقع في مقدمتها ويبرز إلى القرن الأمامي للبطين الجانبي.

carbachol كربأكول. شادة كولينية الفعل لا تتحلل بأنزيم إستيراز الأسيتيل كولين، وتستعمل كمنبه لبعض العضلات اللاإرادية وخصوصاً للعضلة ومصرة الحديقة ولتخفيض الضغط داخل العين في معالجة الزرق.

carbamazepine كربأمازيبين. دواء مضاد الاختلاج ومسكن ويستعمل في علاج الصرع وألم التهاب العصب ثلاثي التوائم ويؤخذ عن طريق الفم.

carbidopa كربيدوبا. دواء يستعمل في علاج داء باركنسون مع الليفودوبا لأنه يولد تركيزاً عالياً من الدوبامين في الدماغ باستعمال جرعات صغيرة من الليفودوبا. وبهذا فإنه يقلل من المضاعفات الجانبية لهذا الدواء.

carcinomatophobia (= cancerphobia) رُهابُ السَّرطان.

carcinophobia (= cancerphobia) رُهابُ السَّرطان.

cardialgia (= cardiodynia) 1. ألمُ الفؤاد. 2. ألمُ قَلْبِي.

1. ألم في مقدمة الصدر أو أعلى البطن 2. وجع القلب.

cardiodynia وَجَعُ قَلْبِي. وجع في القلب.

carina جُوجُؤ. بنية بارزة حرفية الشكل.

- c. fornicis جُوجُؤُ القَبْو. بروز على السطح السفلي للقبو.

carniophobia (= carnophobia) رُهابُ أَكْلِ اللَّحْم. الخوف من أكل اللحوم.

carotidynia (= carotodynia) إيلامُ السُّبَّاتِي. إيلام على طول مسار الشريان السباتي وهي نوبات عادة ما تحدث على جهة واحدة من الرقبة.

carpopedal spasm تَشَنُّجُ رُسْغِي قَدَمِي. تشنج الرسغ والقدم.

CAT (= computerized axial tomography) تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ مَخَوْرِيٌّ مُحَوَّسَب. أنظر tomography.

catabolism تَقْوِيض. عملية استقلابية استهلاكية يحول فيها الكائن المواد إلى مركبات إفراغية.

catalepsy الجُمْدَة. حالة صمل عضلي واحتفاظ المريض بالوضعية التي يوضع بها. وهي حالة تشاهد في الفصام الجامودي الشديد.

cataleptiform جُمْدِي الشَّكْلِ. حالة شبيهة بالجُمْدَة.

catalogia قُرْزَرَة: تَكَرَّارِيَّةُ اللَّفْظ. أنظر verbigeration.

cataphasia قُرْزَرَة: تَكَرَّارِيَّةُ اللَّفْظ. أنظر verbigeration.

cataphora وَسَنٌ مُتَقَطِعٌ. وسن مستمر يتقطع بفترات يقظة بسيطة غير تامة.

cataphoria إحْوال سفلي. الهبوط السفلي لمحوري إبصار العينين الدائم بعد توقّف المنبّهات الدامجة لهما.

cataphrenia (= pseudodementia) وَهَنٌ عَقْلِي. نوع من الخرف ينتهي عادة بالشفاء.

cataplectic جُمْدِي. 1. منسوب للجُمْدَة أو مصاب بها أو شبيه بها 2. حالة تبدأ بصورة مفاجئة وشديدة.

cataplexis (= cataplexy) الجُمْدَة. حالة تتصف بنوبة مفاجئة من الوهن العضلي ونقص

التوتر وقد تبدأها بعض المنبهات العاطفية كالخوف والرغبة أو الحزن الشديد أو الغضب أو الدهشة.

catathymia طُغْيَانُ الْعَوَامِلِ النَّفْسِيَّةِ. حالة وجود عوامل نفسية مكبوتة في اللاوعي ولكنها شديدة لدرجة أنها تطفئ أحياناً وتؤثر على الوعي.

catatonia (= schizophrenia, catatonic) جَامُود. نوع من الفصام الذي يتصف بتغيرات في التوتر العضلي والاستجابات الحركية مع الذهول والوضعية الثابتة الشاذة والعمل أو الهياج.

catecholamine كَاتِيكُولَامِين. مركّب له فعل محاكي الودي ويشابه المركبات الأخرى من مجموعته (الدوبامين والنورابينيفرين والابنيفرين).

catecholaminergic كَاتِيكُولَامِينِي الْفِعْل. ينشّط بالكاتيكولامين أو يفرزه.

catelectrotonus تَوَثُّرٌ مَهْبِطِي. زيادة هيوجية الليف العضلي أو العصبي بالقرب من المهبط عند مرور التيار الكهربائي بسبب هبوط التوتر الكهربائي في المنطقة.

1. ضَعْفٌ **cathaeresis (= catheresis)** دَوَائِي الْمَنْشَأَ 2. فِعْلٌ مُعْتَدِل. 1. ومن عام ينتج عن العلاج بأحد الأدوية 2. فعل معتدل.

catharsis إِفْرَاقُ الْمَكْبُوتِ. في الطب النفسي هو إطلاق الأفكار والآراء المكبوتة في الوعي الباطن مصحوباً بانفعال عاطفي وتفرّج نفسي.

cathexis تَرْكِيزُ الطَّاقَةِ النَّفْسِيَّةِ. تركيز القوى النفسية بصورة واعية أو غير واعية على شخص أو موضوع أو فكرة معينة بالذات.

cathisophobia تَعَذُّرُ الْجُلُوسِ؛ قَمَاصٌ؛ الْأَقْعُودِيَّةُ. انظر akathisia.

cathodal closure contraction تَقْلُصُ الْغَلْقِ الْمَهْبِطِي. انظر contraction.

cathodal opening contraction تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمَهْبِطِي. انظر contraction.

cathode مَهْبِط. القطب السالب في الدائرة الكهربائية أو في البطارية الكهربائية.

c. ray oscilloscope مِنتَظَرُ الذَّبْذِبَاتِ

بِالْأَشْعَةِ الْمَهْبِطِيَّةِ. انظر oscilloscope.

cauda ذَنْبٌ. بنية ذنبية الشكل أو ذنب العضو أو البنية.

c. corporis striati ذَنْبُ الْجِسْمِ الْمُخَطَّطِ؛ ذَنْبُ النُّوَاةِ الْمُذَنْبَةِ. انظر cauda nuclei caudati.

c. equina ذَنْبُ الْفَرَسِ. مجموعة الجذور الشوكية التي تنزل من القسم السفلي من النخاع الشوكي والتي تحتل القناة الفقرية تحت مستوى النخاع والتي تشبه في شكلها ذنب الفرس.

c. nuclei caudati ذَنْبُ النُّوَاةِ الْمُذَنْبَةِ. جزء النواة المذنبية الذي يستدق من جسمها وينحني حول جذر القرن السفلي للبطين الجانبي ويمتد رأسياً كالنواة اللوزية.

caudatolenticular مُذَنْبِي عَدَسِي. منسوب إلى النواتين المذنبية والعنسية للجسم المخطط.

caudex cerebri سَوَيْفَةُ الْمُخ. ذنبيات المخ.

caumesthesia قَرْطُ جِسْنِ الْحَرَارَةِ. حس حراري محرق عند التعرض لحرارة غير عالية أو واطئة نسبياً.

causalgia حَرَقِي. ألم محرق يترافق غالباً مع تغيرات نمائية في الجلد يتسبب عن إصابة العصب المحيطي المغذي للمنطقة.

cavitas (= cavum) جَوْفٌ. (ج: أَجْوَاف). حَيَزٌ أو نَقْرَةٌ مجوفة.


c. cranias جَوْفُ الْقُحْفِ. الجوف المحاط بعظام الجمجمة.

c. epiduralis الْحَيَزُ حَوْلَ الْجَافِيَّةِ. الحيز بين الجافية وجدار القناة الفقرية يحوي الضفائر الوريدية.

c. septi pellucidi جَوْفُ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ. الفلح الناصف بين صفيحتي الحاجز الشفاف في المخ.

c. subarachnoidealis الْحَيَزُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ. الحيز الذي يفصل العنكبوتية عن الأم الحنون والذي يحوي السائل الدماغي النخاعي وتمر عبره الترابيق التي توصل بين جدرانه.

c. tympanica الْجَوْفُ الطَبْلِي. القسم الرئيسي من الأذن الوسطى المكون من جوف ضيق في العظم الصدغي وممتلئ بالهواء ويحوي العظيمات



ب



1

cauda equina

بعض أورام النخاع الشوكي وذنب الغرس.

(أ) ورم ذنب الغرس

(ب) ورم وعائي في النخاع الشوكي.

السمعية ويتصل بالخلايا الخشائية الهوائية وبغار
الخشاء وبالبلعوم الأنفي عن طريق القناة السمعية.

cavitation

تَكَهَفٌ؛ تَجْوِيفٌ. تكون
التجاويف مثلاً في النخاع الشوكي في داء تكهف
النخاع.

cavity (= cavitas)

جَوْفٌ.

- cranial c. (= cavitas cranias)

جَوْفُ القَْخَفِ.

- epidural c. (= cavitas epiduralis) الحَيْرُ
حَوْلَ الجَافِيَّةِ.

- mastoid c. (= antrum mastoideum) غَارُ
الْخَشَاءِ. حيز هوائي في الجزء الخشائي من العظم
الصدغي يتصل بالجوف الطبلي والخلايا الخشائية.

**- subarachnoid c. (= c. subar-
achnoidealis)**

الحَيْرُ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّةِ.

- subdural c. (= spatium subdurale) الحَيْرُ
تَحْتَ الجَافِيَّة.

- tympanic c. (= c. tympanicum) الجَوْفُ
الطَبْلِي.

خَلِيَّة. (ج: خلايا). كتلة جبلية تحوي cell
نواة وتحيط بها جبلية تحوي عضيات مختلفة
ويغلفها غشاء خلوي. وهي وحدة بنائية للأنسجة
كما أنها تكون وحدة وظيفية في الأجسام الحية.

- acoustic hair c. خَلِيَّةٌ سَمْعِيَّةٌ شَعْرِيَّة. خلايا
مهدبة في القوقعة تعمل كمستقبلات حسية في عضو
كورتني.

- amacrine c. خَلِيَّةٌ لا مِحْوَارِيَّة. نوع من
عصبونات شبكية العين لا تحوي محواراً ولكن لها
فروع تشبه التفرعات.

- apolar c. خلية لا قطبية؛ عصبون لا محواري.
عصبون لا يحوي محواراً أو أقطاباً.

- arkyochrome c. عَصْبُونٌ شَبَكِي الصِبْغَات. عصبون
توجد فيه حبيبات نيسل مرتبة بشكل شبكي.

- basket c. خَلِيَّةٌ ذاتُ سَلَّة. خلية قشرة المخ
ذات محوار ويكون لها فرشاة من الخيوط التي تكون
شبكة سلوية الشكل تتوضع فيها خلية بركنجي.

- Betz's c's. خَلَايَا بَتَز. خلايا هرمية عقدية
كبيرة توجد في الطبقة الهرمية الداخلية لقشرة المخ.

- bipolar c. خلية بقطبين؛ عَصْبُونٌ بِقُطْبَيْن. عصبون ذو فرعين.

- Cajal c. خَلِيَّةٌ كَاهَال. خلية دبقية نجمية مرتبة
بشكل أفقي في الطبقة الجزيئية لقشرة المخ.

- caudate c's. خَلَايَا مُذَنَّبَة. خلايا دبقية عصبية
في المادة السنجابية ذات استطالات متعددة تشبه
أذناب المذنب.

- cometal c's. (= caudate c's.) خَلَايَا مُذَنَّبَة.

- commissural c's. (= heteromeral c's.) خَلَايَا صَوَارِيَّة. خلايا عصبية في المادة السنجابية
للنخاع الشوكي تعبر فروع محاورها إلى المادة
البيضاء للجهة المعاكسة.

- compound granule c. دَبَقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ. microglia
انظر

- cone c. (= cone, retinal) مَخْرُوطُ الشَبَكِيَّة.

- c's. of Corti خَلَايَا كُورْتِي. خلايا عضو كورتني
في الأذن الداخلية.

- ependymal c's. خَلَايَا البَطَانَةِ العَصَبِيَّة. خلايا
البطانة التي تبطن تجاويف الجهاز العصبي.

- ganglion c. خَلِيَّةٌ عُقْدِيَّة. 1. نوع من الخلايا
العصبية الكبيرة التي توجد في العقد العصبية 2. الخلية
الثالثة في سلسلة طبقات خلايا الشبكية وهناك أنواع
عديدة منها حسب نمط تفرعاتها للأنسجة الجهاز
العصبي المركزي (الدبق العصبي) وهناك ثلاثة أنواع
من هذه الخلايا اللاعصبية، الخلايا النجمية (الدبقية
الكبرى)، والخلايا القليلة التغصن والدبقيات الصغيرة.

- giant pyramidal c's. (= Betz's c's.) خَلَايَا
بَتَز.

- glial c. (= neuroglial c.) خَلِيَّةٌ دَبَقِيَّة.

- gutter c. (= microglia c.) دَبَقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ.

- gustatory c's (= taste c's.) خَلَايَا ذُوقِيَّة.

- hairs c's. خَلَايَا شَعْرِيَّة. خلايا ظهارية عصبية
ذات نتوءات شعرية الشكل توجد في عضو كورتني
وفي العرف الانبولي والقريبة والكيسية في الأذن
الداخلية وتستلم أليافاً عصبية صادرة وواردة من
العصبين القوقعي والدهلزي.

- hecatomeral c's. خَلَايَا مُرْدَوِجَة التَفْرِغ. خلايا عصبية في المادة السنجابية للنخاع تنقسم
محاورها إلى فرعين يذهب أحدهما إلى المادة البيضاء
بنفس الجهة ويذهب الثاني إلى المادة البيضاء للجهة
المعاكسة.

- heteromeral c's. (= commissural c's.) خَلَايَا صَوَارِيَّة؛ خلايا أحادية التوصل.

- horizontal c. خَلِيَّةٌ أَفْقِيَّة. أحد أنواع عصبونات
الشبكية تمر فروعها بشكل أفقي وهناك نوعان منها.

- horn c's. خَلَايَا قَرْنِيَّة. خلايا قرون النخاع
الشوكي.

- Hortega c. (= microglial c.) دَبَقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ.

- mitral c's. الخَلَايَا التَّاجِيَّة. الخلايا الهرمية التي
تكون إحدى طبقات البصلة الشمية.

- mossy c. (= protoplasmic astrocyte) خَلِيَّةٌ
اشْمِيَّة. خلية نجمية جبلية.

- **motor c.** خَلْيَةٌ حَرَكِيَّةٌ. العصبون الصادر خصوصاً. من النخاع الشوكي الذي يستمر محواره في سيره لينضم إلى عصب حركي.
- **myoepithelial c's** خَلَايَا عَضَلِيَّةٌ ظَهَارِيَّةٌ. خلايا عضلية ملساء محورة وقلوصة ويعتقد أنها من أصل أديمي ظاهر وتوجد حول المجموعات الإفرازية لبعض الغدد كالغدد العرقية والدمعية والحلمية ويؤدي تقلصها إلى طرح محتويات هذه الغدد.
- **nerve c. (= neuron)** عَصْبُونٌ.
- **neuroepithelial c's. (= neuroglia c's.)** خَلَايَا ظَهَارِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.
- **neuroglia c's., neuroglial c's.** خَلَايَا دَبَقِيَّةٌ. خلايا سائدة لانسجة الجهاز العصبي المركزي.
- **olfactory c's.** الخَلَايَا الشَّمْعِيَّةُ. خلايا مغزلية منوأة ومتخصصة توجد مغروسة بين الخلايا الظهارية في الغشاء المخاطي للأنف.
- **phalangeal c's.** خَلَايَا سَلَامِيَّةٌ. خلايا سائدة في عضو كورتي تستند قواعدها على الغشاء القاعدي وتحيط وتسد الخلايا الشعرية الداخلية والخارجية.
- **pillar c's.** خَلَايَا عِمَادِيَّةٌ. خلايا طولانية في عضو كورتي مرتبة بصفين ويلتقي رأسا الخليتين المتجاورتين بينما تتباعد قاعدتيهما عن بعضهما وبذلك يكونان نفقاً بينهما يمتد على طول الغشاء القاعدي وتستند الخلايا الشعرية لعضو كورتي على جانبيهما.
- **pineal c's. (= pinealocyte)** خَلَايَا الجِسْمِ الصَّنَوْبُورِيِّ.
- **psychic c's.** الخَلَايَا النَّفْسِيَّةُ. خلايا القشرة المخية.
- **Purkinje's c's.** خَلَايَا بَرْكِنجِي. عصبونات كبيرة متفرعة في الطبقة المتوسطة من قشرة المخ.
- **pyramidal c.** خَلْيَةٌ هَرَمِيَّةٌ. خلية عقدية كبيرة هرمية الشكل في القشرة المخية تكوّن مع فروعها العصبون الهرمي.
- **Renshaw c's.** خَلَايَا رَنْشَاو. عصبونات بينية في المنطقة البطنية الإنسية للقرن الامامي للنخاع الشوكي تكون اتصالاً تثبيطياً مع العصبون الحركي.
- **rod c's.** خَلَايَا عَصَوِيَّةٌ. عصيات الشبكية.
- **root c's.** خَلَايَا جَذَرِيَّةٌ. عصبونات تولد محاورها جذور الاعصاب.
- **satellite c's.** خَلَايَا تَابِعَةٌ: خلايا سائلة. خلايا الغد العصبي الذي يغلف العقد العصبية.
- **Schwann's c.** خَلْيَةٌ شَفَّان. خلية كبيرة منوأة يغلف غشاؤها محوار الليف العصبي المحيطي المغمد ويلتف حوله بشكل لولبي، وهو مصدر النخاعين ويولد الغد النخاعيني بين عقد رانفير.
- **sensory c.** خَلْيَةٌ حِسِّيَّةٌ. عصبون أحد الاعضاء الحسية المحيطية.
- **stellate c.** خَلْيَةٌ نَجْمِيَّةٌ. خلية تكون مع فروعها شكلاً نجمياً كالخلايا التي توجد في قشرتي المخ والمخيخ.
- **supporting c's.** خَلَايَا سَائِدَةٌ. خلايا تسند العصبونات أو المستقبلات الحسية كالخلايا الموجودة في عضو كورتي أو في التيه.
- **sustentacular c's. (= supporting c's.)** خَلَايَا سَائِدَةٌ.
- **tactile c. (= corpuscula tactus)** خَلْيَةٌ لمسيّة؛ جُسْنِمٌ لَفْسِيّ. انظر corpuscle, Meissner's.
- **taste c's.** خَلَايَا ذَوْقِيَّةٌ. الخلايا الداخلية للبراعم الذوقية المغطاة بخلايا التغطية.
- **tautomerall c's.** خَلَايَا صِنَوِيَّةٌ. خلايا المادة السنجابية للنخاع الشوكي التي ترسل فروعها للاتصال بالمادة البيضاء على نفس الجهة من النخاع.
- **touch c. (= tactile c.)** خَلْيَةٌ لَمْسِيَّةٌ.
- **cellula** خَلْيَةٌ. 1. خلية 2. حيز صغير مغلق.
- **cellulae ethmoidalis** الخَلَايَا الْغُرْبَالِيَّةُ. احياز مليئة بالهواء في العظم الغربالي تتصل بالقمع الغربالي وبالفقاعة الغربالية.
- **cellulae mastoidae** الخَلَايَا الْخُشَائِيَّةُ. الاحياز الهوائية للنتوء الخشائي للعظم الصدغي.
- **cellulae tympanicae** الخَلَايَا الطَبْلِيَّةُ. احياز في الجوف الطبلي بين النتوءات العظمية لقاعدته او جانبه الوداجي.
- **cenesthesia (= somatognosis)** الحِسُّ الْمُشْتَرِك. الشعور العام الذي يحسه الفرد بذاته وبويعه وبوظائف أعضائه وبجسده.
- **cenesthesiopathy, cenesthopathy** حِسُّ الْإِغْتِلَال. شعور الفرد العام بعدم الراحة

والاستقرار مع وهن العزيمة وضعف الإرادة مع عدم الشعور باعتلال قسم معين من جسمه.

مركز. 1. وسط الجسم (center = centre)
2. مجموعة عصبونات متخصصة بالقيام بوظيفة معينة.

- brain c. مركز دماغي. باحة في قشرة المخ ذات بنية أو وظيفة خاصة.

- Broca's c. (= speech c.) مركز الكلام.

- cheirokinesthetic c. مركز الكتابة. في القسم الخلفي من التلفيف الجبهي الثاني الأيسر يتحكم في حركات أقسام الجسم أثناء الكتابة.

- ciliospinal c. المركز الهذائوي النخاعي. مركز في القسم السفلي من النخاع الرقبي وفي قسمه الصدري العلوي يتحكم في توسيع حدقة العين.

- coordination c. مركز تنسيقي. مركز عصبي يقوم بتنسيق بعض وظائف الجسم.

- cortical c. مركز قشري. قسم من قشرة المخ متميز وظيفياً عن المناطق المجاورة له ويتحكم بوظيفة جسمية خاصة ويسمى أيضاً باحة أو حقل أو منطقة.

- dominating c. مركز سائد. المركز المسيطر على فعاليات مجموعة من المراكز التي تتحكم في وظيفة معينة.

- eupraxis c. مركز تنسيق حركي. أي من مراكز قشرة المخ الذي يسيطر ويتحكم في تنفيذ فعل أو عمل حذق ماهر.

- heat-regulating c's. (= thermoregulator c's). مراكز تنظيم الحرارة.

- inhibitory c. مركز تثبيطي. مركز عصبي يثبط عمل مركز أو مراكز أخرى أو وظائف أو عمليات جسمية.

- nerve c. مركز عصبي. مجموعة من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تعمل سوية في تنظيم فعالية جسمية معينة.

- reflex c. مركز منعكسي. أي مركز في الدماغ أو في النخاع يستلم إشارات حسية من أطراف الجسم ويستجيب لها بفعل حركي أو إفرازي. وهناك العديد من هذه المراكز.

- sensory c. مركز حسّي. مركز في الجهاز العصبي المركزي يدرك الإشارات الحسية التي يستلمها من أنحاء الجسم.

مركز السلوك الجنسي. sex-behavior c. النواة البطنية الوحشية للوطاء التي تسيطر على السلوك الجنسي.

مركز الكلام. speech c. (= Broca's c.) مركز في التلفيف السفلي (الأيسر) السائد يتحكم في وظائف الكلام.

مراكز تنظيم الحرارة. thermo-regulatory c's. مراكز في الوطاء تنظم فقدان الحرارة من الجسم أو احتفاظه بها وبذا تبقى درجة حرارته ثابتة.

مركز فريكة. Wernicke's c. المركز المركزي للكلام.

المركز السمعّي للكلام. word c., auditory مركز التلفيف الصدغي العلوي المستعرض الذي يتحكم في إدراك معاني الكلمات المسموعة.

المركز البصري للكلام. word c., visual مركز في القسم الخلفي من الفص الجداري الأيسر يتحكم في إدراك معاني الكلمات المكتوبة أو المطبوعة.

(متعلق) بمركز الدماغ. centrencephalic متعلق بمركز الدماغ.

نايذ. مبتعد عن المركز. centrifugal

جايذ. متجه نحو المركز. centripetal

حركة مركزية التنبيه. centrocinesia (= centrokinesia) حركة مركزية التنبيه.

حركة مركزية التنبيه. centrokinesia حركة تبدأ من تنبيه مركزي.

رأسياً. متجه نحو الرأس. cephalad


ألم الرأس؛ صداع. cephalalgia (= cephalgia, headache) ألم في منطقة الرأس.

صداع هستاميني. histamine c. (= cluster headache) صداع هستاميني.

صداع ربعي. quadrant c. ألم في منطقة تكون ربع الرأس.

وذمة الرأس. وذمة في منطقة الرأس. cephaledema

رأسّي. متعلق أو منسوب للرأس أو للنهاية الرأسية للجسم. cephalic



centre, speech

مناطق قشرة المخ التي تسيطر على وظيفة الكلام: (1) باحة الوجه (2) الحزمة المقوسة (3) القشرة البصرية (4) القلم الزاوي (5) باحة فرنيكة (6) شق سيلفيس (7) باحة بروكا.

cephalitis (= encephalitis)

إلتهاب
الدماغ.

cephalocentesis

بزل الرأس. البزل
الجراحي للرأس.

cephalocaudal

رأسيّ ذنبيّ. منسوب إلى
محور الجسم ابتداء من الرأس حتى الذنب.

cephalochord

الحبل الظهريّ الرأسيّ.
جزء الحبل الظهري الجنيني الذي يمتد داخل
القحف.

cephalocele

قيلة رأسيّة. بروز جزء
من محتويات القحف للخارج.

**cephalodynia (= cephalalgia,
headache)**

وجع الرأس؛ صداع.

- orbital c.

قيلة رأسيّة حجاجيّة. بروز جزء من
محتويات القحف للخارج خلال عيب في جدار الحجاج.

cephalogram صُورَةُ الرَّأْسِ المَقَاسِيَّةِ.

صورة شعاعية للرأس تشمل الفك السفلي بمنظر جانبي يصور لقياس أبعاد أقسام الرأس.

cephalogyric (خاص) بِتَدْوِيرِ الرَّأْسِ.

متعلق بحركة الرأس التدويرية.

cephalohematocele (= **cepha-lhematocele**) قَيْلَةٌ دَمَوِيَّةٌ رَاسِيَّةٌ.

ورم دموي تحت سمحاق القحف يتصل بأحد الجيوب الدموية خلال عظام القحف.

cephalohematoma (= **cephalhema-toma**) وَرْمٌ دَمَوِيٌّ رَاسِيٌّ. نزف تحت سمحاق

عظام القحف وعادة ما يتولد نتيجة رضح يصيب القحف.

cephaloma (= **medullary cancer**)

سَرَطَانَةٌ نَخَاعِيَّةٌ. سرطانة لينة نخاعية البنية لقلة احتوائها على السدى.

cephalomotor مُحَرِّكٌ لِلرَّأْسِ. محرك الرأس أو منسوب لحركة الرأس.

cephalonia ضَخَامَةُ الرَّأْسِ والدِّمَاغِ. ضخامة الرأس الشاذة مع فرط تنسج الدماغ التصلبي.

cephalopathy إِعْتِلَالُ الرَّأْسِ. أي مرض يصيب الرأس.

cephaloplegia شَلْلُ الرَّأْسِ. شلل عضلات الرأس والوجه.

cephalotome مِبْضَعُ الرَّأْسِ. آلة لثقب أو قطع رأس الجنين.

cephalotomy بَضْعُ الرَّأْسِ. 1. قطع رأس الجنين لتسهيل الولادة 2. تشريح رأس الجنين.

cephalotropic إِلِيفُ الدِّمَاغِ. أليف الأنسجة الدماغية.

ceptor مُسْتَقْبِلٌ؛ مُتَقَبِّلٌ. بنية عصبية تستلم المنبهات الخارجية وتوصلها إلى الأعصاب ثم إلى المراكز العصبية.

- chemical c. مُتَقَبِّلٌ كِيمِيَائِيٌّ. متقبل يحول المنبهات المناسبة إلى تفاعلات كيميائية كهربائية في الجسم.

- contact c. مُتَقَبِّلٌ تَمَاسِيٌّ. متقبل يستلم المنبهات بالتماس المباشر.

- distance c. مُتَقَبِّلٌ بُعَادِيٌّ. عضو حسي يستقبل المنبهات التي تصدر في محيط الجسم من مصادر بعيدة عنه كالضوء والصوت.

- nerve c. مُتَقَبِّلٌ عَصَبِيٌّ. متقبل أو مستقبل عصبي.

cerebellar مُخَيَخِيٌّ. متعلق أو منسوب للمخيخ.

cerebellifugal صَادِرٌ مِنَ الْمُخَيَخِ. مبتعد عن المخيخ.

cerebellipetal وَارِدٌ لِلْمُخَيَخِ. متجه نحو المخيخ.

cerebellitis إِلْتِهَابُ الْمُخَيَخِ. أي التهاب يصيب المخيخ.

cerebellofugal (= **cerebellifugal**) صَادِرٌ مِنَ الْمُخَيَخِ.

cerebello-olivary مُخَيَخِيٌّ رَيْثُونِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى الجسم الزيتوني.

cerebellopontile مُخَيَخِيٌّ جِسْرِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى الجسر.

cerebellopontine (= **cerebello-pontile**) مُخَيَخِيٌّ جِسْرِيٌّ.


cerebllorubral مُخَيَخِيٌّ حَفْرَاوِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النواة الحمراء.

cerebellorubrospinal مُخَيَخِيٌّ حَفْرَاوِيٌّ نَخَاعِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النواة الحمراء ومن ثم إلى النخاع الشوكي.

cerebellospinal مُخَيَخِيٌّ نَخَاعِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النخاع الشوكي.


cerebellum الْمُخَيَخِ. قسم الدماغ التالي الذي يحتل الحفرة الخلفية للقحف خلف جذع الدماغ والذي يقوم بوظيفة تنسيق حركات الجسم، ويتكون من جسم المخيخ الذي يحوي الدودة وهي الشريط الضيق الوسطي والفصين الجانبيين (نصفي كرة المخيخ) وهو مرتبط بجذع الدماغ.

cerebral مُخَيٌّ، دِمَاعِيٌّ. متعلق أو منسوب للمخ أو للدماغ.




cerebellum

السبل العصبية الواردة للمخيخ: (1) السويقة المخية (2) السبل من قشرة المخ (3) الجسر (4) النواة الدهليزية (5) العصب والنواة الدهليزيان (6) الزيتونة السفلية اليمنى (7) الزيتونة السفلية اليسرى (8 و 9) السبل النخاعي المخيخي البطني (10) السبل النخاعي المخيخي الظهرى (11) الحزمة الإسفينية (12) الحزمة الدقيقة (13) السبل النخاعي المخيخي الظهرى (14) الحزمة الإسفينية (15) النواة الإسفينية (16) النواة الدقيقة (17) السبل الزيتوني المخيخي (18) السويقة المخيخية السفلية (الجسم المرسى الشكل) (19) السويقة المخيخية الوسطية (عضد الجسر) (20) العقيدة (21) الشق الابتدائي (22) اللسين (23) السويقة المخيخية العلوية (العضد الملتحمي). كما تظهر فيه مناطق تمثيل بعض الأعضاء.



cerebellum

السطح العلوي للمخيخ: (1) الفصيص المركزي (2) القنة (3) الحفرة (4) وريقة الدودة (5) حذبية الدودة (6) الفصيص الهلالي السفلي (7) الفصيص الهلالي العلوي (8) الفصيص البسيط (9) الشق الأول (10) الفصيص المربع الأمامي (11) اللسين.



cerebellum

السطح السفلي للمخيخ: (1) نصف الكرة المخيخية (2) نهاية الدودة (3) الشق الثانوي (4) حذبية الدودة (5) هرم الدودة (6) الفصيص الهلالي العلوي (7) الشق الأفقي (8) الفص الهلالي السفلي (9) الفصيص ذو البطيخ (10) اللوزة المخيخية (11) النذفة (12) عقيدة الدودة.

| | | | |
|---|--|---|---|
| cerebration | إِفْتِهَام. الفعاليات الوظيفية للدماغ - التفكير. | cerebro | إِعْتِلَالُ دِمَاعِي. أي مرض يصيب الدماغ. |
| cerebriform | دِمَاعِي الشَّكْل. ما يشبه شكل الدماغ أو أنسجته. | cerebrophysiology | فِيزْيُولُوجِيَا الدِّمَاع. علم وظائف الدماغ. |
| cerebrifugal | صَادِرٌ مِنَ الدِّمَاع. مبتعد عن المخ أو الدماغ. | cerebropontile | مُخِّي جِسْرِي. متعلق بالمخ والجسر. |
| cerebripetal | وَارِدٌ لِلدِّمَاع. متجه نحو المخ أو الدماغ. | cerebrorachidian (= cerebrospinal) | دِمَاعِي نُخَاعِي. |
| cerebritis | الْتِهَابُ الدِّمَاع. أي التهاب يصيب الدماغ. | cerebroscclerosis | تَصَلُّبٌ دِمَاعِي. داء يؤدي إلى تصلب الدماغ الشديد. |
| - saturnine c. | الْتِهَابُ الدِّمَاع بِالرِّصَاص. التهاب الدماغ بالتسمم بالرصاص. | cerebrosis | إِعْتِلَالٌ دِمَاعِي. أي مرض يصيب الدماغ. |
| cerebrocardiac | دِمَاعِي قَلْبِي. متعلق أو منسوب للدماغ والقلب. | cerebrospinal | دِمَاعِي نُخَاعِي. متعلق بالدماغ والنخاع الشوكي. |
| cerebrocerebellar | مُخِّي مَخِيخِي. متعلق بالمخ والمخيخ. | cerebrospinal | عِلَاجٌ دِمَاعِي نُخَاعِي. أي دواء يؤثر على الدماغ والنخاع. |
| cerebroid | دِمَاعَانِي. شبيه الدماغ. | cerebrostomy | فَعْرُ الدِّمَاع. عملية إجراء فتحة في الدماغ. |
| cerebrology | عِلْمُ الدِّمَاع. مجموع المعلومات والدراسات المتعلقة بالدماغ. | cerebrotomy | بَضْعُ الدِّمَاع. بضع الدماغ جراحياً. |
| cerebroma | وَرَمُ الدِّمَاع. أي ورم في الدماغ. | cerebrotonia | نَزْعَةٌ فِكْرِيَّة؛ نَزْعَةٌ دِمَاعِيَّة. حالة نفسية تتصف بحب العزلة وكبت العواطف والتكيف الذاتي. |
| cerebromacular | دِمَاعِي بُقْعِي. متعلق بالمخ وبقعة الشبكية أو بما يصيبهما. | cerebrovascular | 1. وَعَائِي مُخِّي
2. وَعَائِي دِمَاعِي. متعلق بأوعية المخ أو الدماغ. |
| cerebromalacia | تَلَيُّنُ الدِّمَاع. تليين أنسجة الدماغ الشاذ. | cerebrum | 1. المَخ. 2. الدِّمَاع. 1. جزء الدماغ الذي يحتل القسم العلوي من جوف القحف والذي يحوي نصفي كرة المخ المتصلتين ببعضهما بواسطة الجسم الثفني. ويكون القسم الأكبر من دماغ الإنسان 2. يستعمل المصطلح أحياناً ليدل على الدماغ المقدم والدماغ المتوسط سوية أو ليعني الدماغ كله. |
| cerebromedullary (= cerebrospinal) | دِمَاعِي نُخَاعِي. | cervical | رَقَبِي؛ عُنُقِي. متعلق بالرقبة أو بعنق أي عضو كعنق الرحم. |
| cerebromeningeal | دِمَاعِي سَحَائِي. متعلق بالدماغ والسحايا. | cervicobrachialgia | أَلَمٌ رَقَبِي عَضْدِي. ألم في الرقبة والذراع بسبب انضغاط جذور الأعصاب النخاعية الرقبية. |
| cerebromeningitis (= meningoencephalitis) | الْتِهَابُ السَّحَائِيَا والدِّمَاع. | | |
| cerebroptosis (= cerebroptosis) | إِعْتِلَالٌ دِمَاعِي. | | |
| - c. psychica toxemica (= Korsakoff's psychosis) | دُهَانُ كُورْسَاكُوف. دُهَانُ كُورْسَاكُوف. | | |

cervicodynia وَجَعُ الرَقَبَةِ. ألم في منطقة الرقبة.

cervix of axon عُقُقُ المِحْوَار. الجزء الضيق من المحوار قبل المنطقة المغطاة بالغمد النخاعيني.

chain سِلْسِلَةٌ. ارتباط مجموعة من الأشياء ببعضها بأسلوب خطي بحيث تتصل نهاياتها ببعضها مثل سلاسل العصبونات في قوس المنعكس.

- sympathetic c. (= truncus sympathicus) سِلْسِلَةُ الوُدِّي: الجَذْعُ الوُدِّي.

chalasia إِرْتِخَاء. ارتخاء فتحة العضو كارتخاء مصرة الفؤاد الذي يسبب التقيؤ في الولدان.

chamber غُرْفَةٌ. حجرة حيز مغلق.

- anterior c. of eye الغُرْفَةُ الأَمَامِيَّةُ للعين. جزء الغرفة المائية للعين الكائن بين القرنية والعدسة.

- aqueous c. الغُرْفَةُ المَائِيَّةُ. قسم مقلة العين الذي يحوي الخلط المائي.

- posterior c. of eye الغُرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للعين. جزء الغرفة المائية للعين الذي تحده القرنية من الامام والعدسة والرباط المعلق من الخلف.

- vitreous c. الغُرْفَةُ الرُّجَاجِيَّةُ. حيز مقلة العين الذي يحوي الخلط الزجاجي والذي تحده العدسة والجسم الهدبي من الامام والجدار الخلفي للمقلة من الخلف.

channel, perineural القَنَاءَةُ حَوْلَ العَصَب. قناة لمفية تحيط بالجذع العصبي.

character خَاصَّة. (ج: خواص).

1. صفة تدل على طبيعة الكائن أو الموضوع.
2. إحدى الخواص التي تدل على شخصية صاحبها.

- acquired c. خَاصَّةٌ مُكْتَسَبَةٌ. خاصة غير وراثية يكتسبها الشخص من محيطه.

- dominant c. (= dominant trait) خَاصَّةٌ سَائِدَةٌ: خَلَّةٌ سَائِدَةٌ.

- Inborn c. خَاصَّةٌ خَلْقِيَّةٌ. خاصة تظهر عند الشخص قبل ولادته وتولد معه.

- paranoid c. خَاصَّةٌ زَوْرَانِيَّةٌ. خاصة يتصف

صاحبها بعدم الثقة بالآخرين وفراط الحساسية للانتقاد والروح الاعتدائية.

- primary sex c's. الخَوَاصُ الجِنْسِيَّةُ الأُولِيَّةُ. الخواص الجنسية الذكرية والانثوية المتعلقة بالتناسل مباشرة.

- recessive c. (= recessive trait) خَاصَّةٌ مُنْتَحِيَّةٌ.

- secondary sex c's. الخَوَاصُ الجِنْسِيَّةُ الثَانَوِيَّةُ. الخواص الجنسية الخاصة بالذكر والأنثى والتي تميزهما عن بعضهما وغير متعلقة بالتناسل.

cheilophagia قَضْمُ الشَّفَةِ. عادة قضم الشفة اللاشعوري.

cheiralgia أَلَمُ اليَد. ألم في اليد.

- c. paresthetica أَلَمُ اليَدِ المَذَلِّي. التهاب الفرع السطحي للعصب الكعبري.

cheirombrachialgia أَلَمُ اليَدِ والذِرَاع. متلازمة تتصف بألم وتتمل الذراع واليد والأصابع.

cheiromcinesthesia (= cheiromkines-thesis) إِذْرَاكُ حَرَكَةِ اليَد. تَوْسُّمُ اليَد. الشعور والمقدرة على معرفة جهة اليد المنبهة ومعرفة كونها الجهة اليسرى أو اليمنى.

cheiromgnosia إِذْرَاكُ حَرَكَةِ اليَد. إدراك الشخص لحركات يديه خصوصاً عند الكتابة.

cheiromkinesthesia إِذْرَاكُ حَرَكَةِ اليَد. إدراك الشخص لحركات يديه خصوصاً عند الكتابة.

cheiromlogy (= dactylology) التَوَاصُلُ بِحَرَكَاتِ اليَد.

cheiropodalgia أَلَمُ اليَدِ والقَدَم. ألم في اليد والقدم.

cheiromspasm تَشَنُّجُ اليَد. تشنج عضلات اليد.

chemanesis نَسَاوَةٌ علاجِيَّة. النساوة العكوسة والمسيطر عليها والتي تحدثها بعض الأدوية كالتى تحدث في بعض حالات التخدير.

chemoceptor (= chemoreceptor) مُسْتَقْبِلَةٌ كِيمِيَائِيَّةٌ.

chemopsychiatry الطَّبُّ النَفْسِي الكِيمِيَائِي. معالجة بعض الأمراض النفسية أو العاطفية بالأدوية الكيميائية.

chemoreception اسْتِقْبَالٌ كِيمِيَائِيٌّ. حالة التحسس أو قابلية استقبال المنبهات الكيميائية من المحيط.

chemoreceptor مُسْتَقْبَلَةٌ كِيمِيَائِيَّةٌ. متقبل حساس للمنبهات الكيميائية كالمستقبلات الشمية والذوقية أو بعض المستقبلات الخاصة الحساسة للتغيرات الكيميائية في مجرى الدم وخصوصاً نقص الأكسجين فتزيد من سرعة التنفس وضغط الدم، وهي المستقبلات الموجودة في الأجسام السباتية والأبهرية.

chemothalamectomy الاسْتِئْصَالُ الكِيمِيَائِيُّ لِلْمِهاد. تخريب جزء من المهاد بواسطة عامل كيميائي.

cheromania هَوَسُ الانْتِشَاح. الطور الهوسي في داء الذهان الهوسي الاكتئابي.

cherophobia رُهابُ الانْتِشَاح. الخوف من الانشراح أو من إظهاره.

chiasm تَصَالُفَةٌ. تصالب أو تعابر صليبي بشكل X.

التَصَالُفَةُ (= chiasma opticum) - optic c. البَصَرِيَّة.

chiasma تَصَالُفَةٌ. تعابر صليبي بشكل X كتعابر بنيتين متشابهتين مثل تعابر العصبين البصريين.

chill نَاقِصٌ. رعاش أو اهتزاز لإرادي يسببه تقلص العضلات الإرادية مع شعور بالبرد والإصفرار.

نَاقِصٌ عَصَبِيٌّ. رعاش بسبب التهيج - nervous c. العصبي غير المصحوب بتغير درجة حرارة الجسم.

chirobrachialgia (= cheiro-brachialgia) أَلَمُ اليَدِ والذِرَاع.

chiropodalgia (= cheiropodalgia) أَلَمُ اليَدِ والقَدَم.

chloral hydrate كلورال هيدرات؛ هيدرات الكلورال. دواء يستعمل كمسكن وكمنوم ويعطى عن طريق الفم.

chlordiazepoxide كلورديازيبوكسيد.

دواء مهدئ يستعمل عن طريق الفم لعلاج حالات القلق الحاد والكحولية المزمنة أو عند الامتناع عن الكحول أو المخدر.

chlorpromazine كلوربرومازين. دواء يستعمل كمضاد للقيء وكمهدئ ويستعمل بطريقة الحقن المستقيمي.

cholesteatoma وَرَمٌ كُولِسْتِيرُولِيٌّ. كتلة كيسية الشكل ذات بطانة صدفية مطبقة مليئة بحطام توتسفي وغالباً ما تحتوي كولستيرول. وتصيب عادة السحايا والجهاز العصبي المركزي وعظام القحف والأذن الوسطى ومنطقة الخشاء.

cholesterol كُولِسْتِيرُول. كحول ستيريودي شبيه الشحم يتبلور على شكل وريقات أو صفائح ويوجد في شحوم ودهون الحيوانات وفي الدم وفي أنسجة الدماغ والأغمد النخاعية للأعصاب والكبد والكلية والغدة الكظرية كما يوجد في عصيدات الشرايين وحصاة الصفراء وفي الأنسجة السرطانية وهو ضروري لتركيب الهرمونات الستيرويدية يركب عادة في الكبد ولكن بعضه يؤخذ مع الطعام.

choline acetyl (= acetylcholine) أسيتيل كولين.

choline acetylase (= choline acetyltransferase) أسيتيلازُ الكُولِين.

choline acetyltransferase نَاقِلَةٌ الأسيتيل كُولِين. إنزيم يعمل في تركيب الأسيتيل كولين ويوجد في جسيمات تشابكات الجهاز العصبي المستقل والعضلات المخططة وبعض مناطق الجهاز العصبي المركزي.

cholinergic كُولِينِيٌّ الفِعْل. 1. ما ينبه أو ينشط أو ينقل بالأسيتيل كولين ويطلق على الألياف العصبية التي تحرر الأسيتيل كولين في التشابكات عند مرور نبضة عصبية خلالها كالنهايات العصبية اللاودية 2. عامل يولد تأثيراً كعمل الأسيتيل كولين.

cholinesterase اسْتِيزَازُ الكُولِين. إنزيم يعمل على حلمة الأسيتيل كولين إلى كولين وماء.

cholinoceptive كُولِينِيّ الْإِسْتِقْبَالِ. المواقع على الأعضاء المستقلة التي تتنبه بالمواد الكولينية الفعل.

cholinoceptor مُسْتَقْبِلَةُ كُولِينِيَّة. متقبلة كولينية الفعل.

cholinolytic خَالُّ الكُولِين. عامل يحصر عمل الأسيتيل كولين أو العوامل الكولينية الفعل في المناطق الكولينية العمل وهي الأعضاء التي تغذيها الأعصاب اللاودية أو في العضلات المخططة أو في التشابكات العصبية.

cholinomimetic مُحَاكِي الكُولِين. عامل أو مادة تحاكي في عملها عمل الأسيتيل كولين وهي مادة محاكية للأودي.

chordoma وَرَمٌ حَبْلِيّ. ورم خبيث يتولد من البقايا الجنينية للحبل الظهرية.

chordotomy (= cordotomy) بَضْعُ الحَبْلِ. قطع السبيل النخاعي المهادي الوحشي وعادة في الربع الأمامي الوحشي للنخاع أمام الرباط المسنن لمعالجة الألم الشديد الذي لا يطاق.

chorea رَقَصٌ. حركات نفضية سريعة ومعقدة متنوعة ومستمرة وغير إرادية بالرغم من أنها تبدو أحياناً كأنها حركات منسقة.

- acute c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ حَادٍ. رقص سايدتهام.

- atonic c. (= paralytic c.) رَقَصٌ وَنَانِيّ. رقص شللي.

- Bergeron's c. رَقَصٌ بَرغِيرُون. رقص كهربائي طفولي يتصف بتشنج نظمي شديد ولكنه من النوع الحميد.

- chronic c. (= Huntington's c.) رَقَصٌ مُزْمِن. رقص هنتنغتون.

- chronic progressive hereditary c. رَقَصٌ مُزْمِنٌ مَتَرَقٌّ وَرَاثِيّ: (= Huntington's c.) رقص هنتنغتون.

- chronic progressive nonhereditary c. رَقَصٌ مُزْمِنٌ مَتَرَقٌّ لَا وَرَاثِيّ: رَقَصٌ (= senile c.) شَيْخُوخِيّ.

- c. cordis رَقَصٌ قَلْبِيّ. رقص يترافق مع عدم انتظام شديد في عمل القلب.

- dancing c. (= saltatory c.) رَقَصٌ قَفْزِيّ.

- degenerative c. (= Huntington's c.) رَقَصٌ تَنَكُّسِيّ.

- diaphragmatic c. رَقَصٌ جِجَافِيّ. إصدار المريض لصرخات عالية خاصة في عرة غير مؤلمة.

- c. dimidiata (= hemichorea) رَقَصٌ شَقِيّ. رقص يصيب جهة واحدة من الجسم.

- Dubini's c. (= electric c.) رَقَصٌ دُبِينِيّ. رقص حاد مميت من الرقص الكهربائي تسبب عدوى الجهاز العصبي المركزي.

- electric c. رَقَصٌ كَهْرَبَائِيّ. نوع من نوبات الحركات المفاجئة الشديدة والرمع العضلي وقد ينتج ذلك من التهاب الدماغ الوبائي.

- c. festinans (= paralysis agitans) رَقَصٌ خَبَبِيّ. رنح خبيث أو شلل رعشي.

- fibrillary c. رَقَصٌ رَجْفَانِيّ. تقلص رجفاني للعديد من عضلات الجسم.

- c. gravidarum رَقَصٌ حَمْلِيّ. رقص سايدتهام يحدث في الأشهر الأولى من الحمل والذي يمكن أن يكون نتيجة إصابة سابقة بالداء الروماتزمي أو بدونها ويعاود الرقص في المرات اللاحقة للحمل الأول الذي ظهر خلاله.

- hemilateral c. (= hemichorea) رَقَصٌ شَقِيّ.

- Henoch's c. (= chronic progressive electric c.) رَقَصٌ كَهْرَبَائِيّ مَتَرَقٌّ مُزْمِن.

- hereditary c. (= Huntington's c.) رَقَصٌ هَنْتِنِكْتُون؛ رَقَصٌ وَرَاثِيّ.

- Huntington's c. رَقَصٌ هَنْتِنِكْتُون. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويتصف برقص مترقي مزمن مع تردي عقلي ينتهي بالخرف ويمكن أن يصيب الأشخاص في أي عمر ولكن غالباً ما يصيبهم في العقد الرابع وينتهي بالموت بعد حوالي 15 عاماً.

- hyoscine c. رَقَصٌ الْهْيُوسِين. حركات شبيهة بالرقص تظهر في حالات التسمم الحاد بالهْيُوسِين.

- hysterical c. رَقَصٌ هِسْتِيرِيّ. هستيريا تحويلية تظهر فيها حركات رقصية.
- c. infectora (= Sydenham's c.) رَقَصٌ عَدَوَانِيّ.
- juvenile c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ يَفْعِيّ.
- laryngeal c. (= diaphragmatic c.) رَقَصٌ حَنَجَرِيّ.
- limp c. رَقَصٌ وَهْنِيّ. رقص شديد يتصف بالوهن العام ونقص توتر الأطراف.
- malleatory c. رَقَصٌ مِطْرَقِيّ. رقص نظمي يقوم المريض فيه بحركات طرقية مستمرة.
- maniacal c. (= c. insaniens) رَقَصٌ هَوَسِيّ. رقص يترافق مع الجنون.
- methodic c. رَقَصٌ نِظَامِيّ. رقص يقوم فيه المريض بحركات رقصية في أوقات منتظمة.
- mimetic c. رَقَصٌ التَّقْلِيد. رقص يقوم فيه المريض بتقليد بعض الحركات.
- minor c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ صَغِير.
- c. nocturna رَقَصٌ لَيْلِيّ. رقص تستمر فيه الحركات حتى أثناء النوم.
- c. nutans رَقَصٌ انْحِنَائِيّ. رقص يترافق مع انحناء الرأس التشنجي.
- one sided c. (= hemichorea) رَقَصٌ شِقِيّ.
- paralytic c. رَقَصٌ شَلَلِيّ. رقص تستبدل فيه الحركات بالثبات والسكون.
- posthemiplegic c. رَقَصٌ تَالٍ لِلْفَالِج. نوبة رقص يمكن أن تصيب العضلات نصف المشلولة بعد الشلل الشقي.
- prehemiplegic c. رَقَصٌ سَابِقٌ لِلْفَالِج. نوبة رقص يمكن أن تصيب العضلات قبل بدء الشلل الشقي.
- procursive c. (= rotary c.) رَقَصٌ دَوْرَانِيّ. نوع من رقص سيدنهام يقوم فيه الطفل بحركات دورانية أو اثنتائية.
- rheumatic c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ رُومَاتَزْمِيّ.
- rhythmic c. رَقَصٌ نَظْمِيّ. رقص هستيري يقوم فيه المصاب بحركات رقصية نظمية.

- rotary c. (= procursive c.) رَقَصٌ دَوْرَانِيّ.
- saltatory c. (= dancing c.) رَقَصٌ قَفْرِيّ. رقص نظمي مع حركات رقصية.
- senile c. رَقَصٌ شَيْخُوخِيّ. اضطراب بسيط يصيب الشيوخ يتصف بحركات رقصية من دون أي خلل عقلي.
- simple c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ بَسِيط.
- Sydenham's c. رَقَصٌ سِيدْنَهَام. رقص حاد يصيب الأحداث بين سن الخامسة والخامسة عشر أو أثناء الحمل وعادة ما يترافق مع الحمى الروماتزمية ويتصف بحركات لإرادية تزداد شدة وتؤثر على الحركات الإرادية والمشيّة وحركات الذراعين والنطق مع اضطراب نفساني بسيط وقد يصيب المرض إحدى جهتي الجسم وقد يكون من النوع الشللي الصملي.
- choreal (= choreic) رَقَصِيّ.
- choreatic (= choreic) رَقَصِيّ.
- choreic رَقَصِيّ. منسوب للرقص أو يتصف به.
- choreiform رَقَصِيّ الشَّكْل. شبيه بالرقص.
- choreoathetosis رَقَصٌ كُنْعِيّ. حالة تتصف بحركات رقصية كنعية.
- choreoid (= choreiform) رَقَصِيّ الشَّكْل؛ رَقَصَانِيّ.
- choreomania هَوَسٌ رَقَصِيّ. اضطراب يصيب الشباب وعادة بأعداد كبيرة في المجتمعات المغلقة يتصف بحركات رقصية هستيرية.
- choreophrasia تَلَفُظٌ رَقَصِيّ. تكرار بعض الجمل والمقاطع دون الاهتمام بترتيبها ومعانيها.
- chorial 1. مَشِيمَائِيّ. 2. مَشِيمَوِيّ.
- 1. منسوب إلى المشيماء. 2. منسوب للمشيمية
- choriomeningitis إِنْتَهَابُ السَّحَايَا وَالْمَشِيمِيَّات. التهاب السحايا الدماغية مع ارتشاح لمفاوي في الصفيحة المشيمية.
- lymphocytic c. إِنْتَهَابُ السَّحَايَا وَالْمَشِيمِيَّاتِ اللَّفْأَوِيّ. نوع من التهاب السحايا الفيروسي يصيب الشباب في أشهر الخريف والشتاء وتسببه فيروسات تنتقل من القوارض للإنسان.

chorion المشيماء. الطبقة الخلوية التي تكون الغشاء المحيط بالجنين.

choroid المشيمية. الطبقة المصطبغة الرقيقة للعين التي تمتد من الحافة المشرشرة حتى العصب البصري وتنقل الاوعية والأعصاب للشبكية.

choroidectomy استئصال الضفيرة المشيمية. استئصال الضفيرة المشيمية الوعائية للبطن الجانبي للدماغ.

chromatopsia رؤية ملونة. اختلال بصري ترى فيها الاجسام غير الملونة باللون مخالفة كما لا ترى الاجسام الملونة باللونها الحقيقية.

chromesthesia إحساس لوني. إحساس وهمية للألوان تترافق مع الإحساسات الحقيقية للسمع والذوق والشم.

chromosome صبغي. بنية في نواة الخلية تحمل خيط الدنا الذي ينقل المعلومات الوراثية والمرتبطة بالرنا.

X c. صبغي X. الصبغي الجنسي الانثوي الذي تحمله كل الاعراس الانثوية ويكون نصف ما تحمله الاعراس الذكورية.

Y c. صبغي Y. الصبغي الجنسي الذكري الذي لا تحمله الاعراس الانثوية ولكنه يكون نصف ما تحمله الاعراس الذكورية.

chronaxie, chronaxy زمّة. اق سر مدة من التيار الكهربائي اللازمة لتنبيه العضلة أو العصب (لتوليد التقلص أو الدفعة العصبية) والذي تكون شدته ضعف شدة قرارة التيار (الفولتية العتبية).

chronognosis إدراك الزمن. الشعور بالزمن ومرور الوقت.

chronomyometer مقياس الزمّة العضلية. جهاز لقياس الزمّة العضلية.

chronophobia رهَابُ الزمن. الخوف من مرور الوقت أو عصاب السجن وهو القلق أو الرهبة التي يشعر بها المسجونون عند محاولتهم التكيف بحياة السجن لمدة طويلة.

chronotaxis تَوَهَانُ زمني. عدم

معرفة الوقت أو مدته بسبب آفة في المهاد أو الفص الجبهي.

cibophobia رهَابُ الطعام. عوف الطعام وكراهيته والخوف من تناوله.

cicatrix (= scar) ندبة. النسيج الجديد الذي يتكون في الجرح عند التئامه.

ciliary هَدَبِي. منسوب إلى أهداب العين أو شبيه بها.

ciliosis رفُ الجفن. ارتجاج الجفن التشنجي.

cinclisis حركات تردئية سريعة. حركات تناوبية سريعة كالغمز السريع أو التنفس السريع.

cinerea المادّة السنجابية. المادّة السنجابية للجهاز العصبي.

cinereal سنّجَابِي. منسوب إلى المادّة السنجابية العصبية.

cinesalgia ألم العضلة الحركيّة. ألم العضلة عند حركتها.

cingula أحزمة. جمع حزام.

cingulectomy إقْطَاعُ التَلْفِيفِينِ الحَزَامِيَيْنِ. تدمير النصفين الامامين للتلفيفين الحزاميين على جهتي المخ.

cingulotomy بَضْعُ التَلْفِيفِينِ الحَزَامِيَيْنِ. بضع التلفيفين الحزاميين لمعالجة الألم غير المتحمل أو لمعالجة الاضطرابات النفسية في حالات الإدمان.

cingulum حزام؛ الحزام. 1. بنية أو جزء يحيط ببنية أخرى 2. حزمة من الألياف ارتباطية تحيط بالجسم الثنائي جزئياً بالقرب من المستوى الناصف للمخ وهي تربط التلفيفين الحزامي والحصيني.

- c. hemispheri (= gyrus, cingulate) التَلْفِيفُ الحَزَامِي.

cingulumotomy (= cingulotomy) بَضْعُ التَلْفِيفِ الحَزَامِي.

circle دائرة. شكل منحنٍ منتظم مغلق.

- arterial c. of Willis (= circulus

arteriosus cerebri) دَائِرَةُ وِيلِيْس الشَّرِيَانِيَّة. الدائرة الشريانية الدماغية.

- vascular c. of optic nerve الدَائِرَةُ الوَعَائِيَّة للعَصَب البَصْرِي. دائرة شريانية في الصلبة تحيط بموقع دخول العصب البصري.

- c. of Willis دَائِرَةُ وِيلِيْس. الدائرة الشريانية الدماغية.

circuit, reflex دَائِرَةُ الْمُنْعَكْس. سلسلة العصبونات التي تقوم بتوصيل دفعات الفعل المنعكسي.

circuit, reverberating دَائِرَةُ تَرْدِيدِيَّة. نوع من السبيل العصبي الذي يحوي عرى تغذية راجعة توجد في الجهاز العصبي المركزي والتي تؤدي إلى إدامة الفعل العصبي.

circulus arteriosus cerebri الدَائِرَةُ الشَّرِيَانِيَّة الدِّمَاغِيَّة. التفاغر المهم المتعدد الاضلاع الذي يتكون من الشرايين السباتي الباطن والمخيخي الامامي والخلفي والموصلين الامامي والخلفي، وتسمى أيضاً دائرة ويليْس.

cistern صِهْرِيْج. حيز مغلق يعمل كخزان للسوائل.

- ambient c. الصِهْرِيْج المُكَتَنَف. الصهرج الذي يربط الصهرج الوريدي المخي الكبير مع الصهرج بين السويقتين.

- basal c. (= Interpeduncular c.) الصِهْرِيْج القَاعِي. الصهرج (= Interpeduncular c.)

- cerebellomedullary c. الصِهْرِيْج المُخِيْخِي البَصَلِي. الحيز تحت العنكبوتية الكبير الذي يبدأ من السطح السفلي للمخيخ والسطح الخلفي للبلصلة (النخاع المستطيل) ويستمر للأسفل إلى تحت العنكبوتية النخاعية. ومن الممكن بزله بواسطة إبرة تقرر خلال الغشاء الفقهي القذالي الخلفي (البزل الصهرجي).

- chiasmatic c. صِهْرِيْج التَّصَالُبِيَّة. حيز تحت العنكبوتية بين التصالبة البصرية ومنقار الجسم الثفني.

- c. of fossa of Sylvius (= c. of lateral cerebral fossa) صِهْرِيْج حَفْرَةِ سِيلْفِيُوس؛ صهرج حفرة الوَحْشِيَّة.

- great c. (= cerebellomedullary c.) الصِهْرِيْج الكَبِير؛ الصِهْرِيْج المُخِيْخِي البَصَلِي.

- interpeduncular c. الصِهْرِيْج بَيْن السُّوَيْقَتَيْن. توسع في الحيز تحت العنكبوتية بين سويقتي المخ.

- c. of lateral cerebral fossa صِهْرِيْج الحَفْرَةِ المُخَيَّة الوَحْشِيَّة. الحيز بين العنكبوتية والحفرة المخية الوحشية.

- posterior c. (= cerebellomedullary c.) الصِهْرِيْج الخَلْفِي؛ الصهرج المخي البصلي.

- subarachnoid c's. الصَّهْرَايُجُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة. توسعات موضعية في الحيز تحت العنكبوتية تتولد في المناطق التي لا تتبع فيها العنكبوتية والام الجافية حواف الدماغ بصورة كاملة ويتم بذلك توليد أحياء صهرجية للسائل الدماغي النخاعي.

- c. of Sylvius (= c. of lateral cerebral fossa) صِهْرِيْج الحَفْرَةِ الْمُخَيَّة السُّفْلِيَّة؛ صِهْرِيْج سِيلْفِيُوس.

- terminal c's. الصَّهْرَايُجُ النِّهَائِيَّة. صهاريج تتكون من أزواج من الاقنية المستعرضة التي تتصل مع النبيبات العضلية وتكون مع النبيب المتوسط T ثلاثيات العضلة.

cisterna magna الصِهْرِيْج الكَبِير. انظر cistern, great

cisternography تَصَوِيرُ الصِهْرِيْج. التصوير الشعاعي للصهرج القاعدي للدماغ بعد حقن مادة مابينة تحت العنكبوتية.

clairaudience السَّمَاعُ الْغَيْبِي. القدرة النظرية على سماع الأصوات وإدراكها من دون الحاجة للأذن أو للوظيفة السمعية الطبيعية، وبذا يتمكن السامع من معرفة معلومات عن حوادث تحدث بعيداً عنه أو في أوقات متفاوتة ومتباعدة.

clairvoyance الْإِسْتِبْصَار؛ تَبْصُرُ الْخَبَائَا. نوع من الإدراك الغيبي اللاحسي حيث يتعرف الشخص على حوادث ويشاهد أموراً بعيدة عنه أو في أوقات متباعدة ومتباعدة.

claudicant اغْرَج. المصاب بالعرج أو منسوب إليه.

claudication عَرَجٌ. عدم تناسق المشية بسبب آفة في أحد الطرفين السفليين أو في كليهما أو بسبب آفة مركزية ويصاحبه الألم أحياناً.

عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ. متلازمة اعراض - **intermittent c.** تتصف بعدم وجود الألم عندما يكون المصاب مستقراً ثم يبدأ الألم والوهن عندما يبدأ بالسير ويستمر بل يزداد تدريجياً حتى لا يتمكن المريض من مواصلة سيره فيضطر إلى التوقف فتزول الاعراض تدريجياً. وينتج ذلك عن امراض انسداد الشرايين في الاطراف السفلية مثل الالتهاب الوعائي الخثاري المسد في حالة انضغاط ذنب الفرس.

claudicatory أَغْرَجٌ؛ عَرَجِيٌّ. مصاب بالعرج المتقطع أو منسوب إليه.

claustral عَائِقِيٌّ. منسوب للعائق.

claustromania (= claustrophilia) حُبُّ الْإِنْفِلَاقِ.

claustrophilia حُبُّ الْإِنْفِلَاقِ. الرغبة المرضية في الانغلاق في الغرف مع غلق كل أبوابها ونوافذها.

claustrophobia رُهَابُ الْإِنْفِلَاقِ. الخوف المرضي من البقاء في مكان مغلق كالمصاعد أو الممرات أو الخوف من الاحتجاز والحبس.

claustrum الْعَائِقُ. الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية الموجودة خارج المحفظة الخارجية للنواة العدسية وتفصلها عن المادة البيضاء للجزيرة ويتكون أغلبها من خلايا مغزلية.

clava (= tuberculum nuclei gracilis) حُدَيْبَةُ النَّوَاةِ النَّاجِلَةِ؛ دَبْيَسَةٌ.

clavus hystericus ثَفْنٌ هِسْتِيرِيٌّ. الشعور بالألم حاد مثل ألم دخول مسمار إلى الرأس.

clawfoot قَدَمٌ مَخْلَبِيَّةٌ. التقوس العاليي للمقدم مع فرط تمدد أصابعها عند المفاصل المشطية السلامية مع انثناء مفاصلها القاصية.

clawhand يَدٌ مَخْلَبِيَّةٌ. انثناء وضمور اليد والأصابع الذي يحدث مع آفات العصب الزندي في الجذام وتكهف النخاع والذي يتصف بفرط انبساط المفاصل السنجابية السلامية وانثناء المفاصل بين السلاميات.

cleft, synaptic الْفَلْحُ الْمَشْبِكِيٌّ. فُحْج

ضيق خارج الخلايا بين الغشائين الخلويين قبل وبعد المشبكيين.

cleisiophobia رُهَابُ الْإِنْفِلَاقِ. **claustrophobia** انظر

clenching صَرِيْفُ الْأَسْنَانِ. صك الأسنان وانضغاط الفكين على بعضهما مع إطباق مركزي في حالات التوتر العصبي الحاد أو القيام بعمل جسمي شاق مثل رفع ثقل كبير.

cleptomania هَوَسُ السَّرِقَةِ. **kleptomania** انظر

cleptophobia رُهَابُ السَّرِقَةِ. **kleptophobia** انظر

climacophobia رُهَابُ السَّلَامِ. الخوف من الصعود أو النزول على السلالم.

clinocephalism (= clinocephaly) تَسَطُّحُ الرَّأْسِ.

clinocephaly تَسَطُّحُ الرَّأْسِ. تسطح الرأس الخلقي أو تكهف قمة الرأس.

clinomania هَوَسُ الْإِسْتِلْقَاءِ. فرط الرغبة في الاستلقاء على الظهر.

clinostatism إِسْتِلْقَاءٌ. وضعة استلقاء الجسم.

clinothrapy مُعَالَجَةٌ بِالْإِسْتِلْقَاءِ. معالجة المريض بوضعه مستلقياً في سريره.

clithrophobia رُهَابُ الْإِنْفِلَاقِ. **claustrophobia** انظر

clivus الْمَخْدَرُ. سطح عظمي في الحفرة القحفية الخلفية ينحدر من الثقب الكبيرة إلى الأعلى إلى ظهر السرج ويتكون قسمه السفلي من جزء من القسم القاعدي للعظم القذالي ويتكون قسمه العلوي من سطح جسم العظم الوتدي.

- basilar c. (= c. ossis occipitalis) الْمَخْدَرُ الْقَاعِدِيّ.

- c. monticuli (= declive) الْحَذْوَةُ.

- c. ossis occipitalis (= basilar c.) الْمَخْدَرُ الْقَاعِدِيّ؛ مَخْدَرُ الْعَظْمِ الْقَذَالِيّ. القسم القاعدي من

- المحدر المكون من جزء من القسم القاعدي للعظم القذالي.
- c. ossis sphenoidalis** - مَحْدَرُ الْعَظْمِ الْوَتْدِيِّ. القسم العلوي من المحدر المكون من سطح جسم العظم الوتدي.
- clomipramine** - كلوميبيرامين. دواء مضاد للإكتئاب.
- clonazepam** - كلونازيبام. دواء مضاد للاختلاج أو الرمع.
- clonic** - رَمَعِيّ. منسوب للرمع أو ذو طبيعة رمعية.
- clonicotonic** - رَمَعِيّ تَوَثُّرِيّ. يتصف بالرمع والتوتر في نفس الوقت.
- clonidine** - أدريناليني كلونيدين. دواء أدريناليني الفعل، ولكنه يعمل أيضاً كمضاد للفعل الأدريناليني عندما يكون تركيز الأدرينالين عالياً. يستعمل كعلاج مضاد لفرط ضغط الدم ويستعمل عن طريق الفم.
- clonism, clonismus** - تَرَمُّع. تشنج رمعي ترددي متتالي.
- clonixeril** - كلونيكسيريل. دواء مسكن.
- clonospasm** - تَشَنُّج رَمَعِيّ. تشنج العضلات ورمعها المتزامنان.
- clonus** - رَمْع. تقلص العضلات وارتخاؤها المتناوبان بسرعة.
- ankle c.** - رَمْعُ الْكَاحِل. سلسلة من الحركات الشاذة للقدم يحرضها ثنيها المفاجيء للخلف الذي يولد التقلص والارتخاء المتناوبين للعضلة ثلاثية الرؤوس الساقية.
- anodal closure c.** - رَمْعُ غَلْقِ الْمَصْعَد. تقلص عضلي رمعي يتولد عند غلق الدارة الكهربائية عند المصعد.
- anodal opening c.** - رَمْعُ فَتْحِ الْمَصْعَد. تقلص عضلي يتولد عند المصعد عند فتح الدارة الكهربائية أو قطعها.
- cathodal closure c.** - رَمْعُ غَلْقِ الْمَهْبِط. تقلص عضلي رمعي يتولد عند المهبط عند غلق الدارة الكهربائية.
- cathodal opening c.** - رَمْعُ فَتْحِ الْمَهْبِط. تقلص عضلي رمعي يتولد عند المهبط عند فتح أو قطع الدارة الكهربائية.
- foot c. (= ankle c.)** - رَمْعُ الْقَدَم. حركة الرضفة النفضية.
- patellar c.** - رَمْعُ الرَضْفَةِ. حركة الرضفة بين الإبهام والسبابة ودفعها بشدة نحو القدم مرة واحدة أو أكثر. يمثل ذلك منعكساً شاداً مع تقلص وانقباض العضلة رباعية الرؤوس الفخذية.
- toe c.** - رَمْعُ إِبْهَام الْقَدَم. حركة إبهام القدم النظامية التي يحفزها البسط المفاجيء للسلاهي الأولى.
- wrist c.** - رَمْعُ الْمِعْصَم. حركة اليد التشنجية التي يحفزها بسط اليد بشدة عند المعصم.
- clouding** - تَغْشِيم. عدم الوضوح.
- c. of consciousness** - تَغْشِيمُ الْوَعْي. فقدان الإدراك والشعور بالمحيط وفقدان المقدرة على الاستجابة لمنبهاته.
- clubbing** - تَعَجُّر. تغير تكاثري في الأنسجة الرخوة عند السلاهيات الانتهازية لأصابع اليد والقدم.
- clubfoot (= talipes)** - خَنْفُ الْقَدَم. تشوه القدم الخلقي.
- clubhand (= talipomanus)** - خَنْفُ الْيَد. تشوه اليد بسبب غياب الزند أو الكعبرة الخلقي فتلتف اليد إلى خارج موضعها أو تغير شكلها الطبيعي.
- clumsiness** - عَدَمُ الرِّشَاقَةِ. عدم البراعة في الحركات.
- cocaine** - كُوكَايْن. مادة كيميائية تستحضر من أوراق أشجار الكوكا أو بالتركيب الكيميائي وتستعمل كمبئج موضعي للأغشية المخاطية.
- coccyalgia (= coccygodynia)** - أَلَمُ الْفُصْعُص.
- coccydynia (= coccyalgia)** - أَلَمُ الْفُصْعُص.
- coccygodynia (= coccyodynia)** - أَلَمُ

الْعُصْفُصُ. ألم في العنصر والمنطقة المجاورة له والمحيط به.

cochlea القَوَقَعَة. أنبوب حلزوني الشكل يكون قسماً من الأذن الداخلية وهو الجزء الرئيسي من عضو السمع.

- membranous c. القَوَقَعَة الغشائية: القَنَاءَة
ductus cochlearis أنظر القَوَقَعِيَّة.

coconscious مُوَاجِبٌ لِلشُّعُور. ما هو خارج عن حدود الوعي ولكنه قد يظهر إلى سطح الذاكرة في ظروف ملائمة خاصة.

code رَامُوز. نظام قواعد خاصة لنقل المعلومات (كرواميز الدفعات العصبية).

codeine كُودَايْن. قلواني مخدر يستحصل من الأفيون ويستعمل كمسكن أو مضاد للسعال ويعطى بواسطة الفم.

cognition إِسْتِعْرَافٌ؛ عِرْفَة. العمليات الفكرية التي تجعلنا نعي معاني الأمور والمدارك وأغراضها، وهي تشمل كل مناحي الإدراك والتفكير والذاكرة.

cognitive إِسْتِعْرَافِي. متعلق بالاستعراف.

coherence تَرَابُطٌ؛ تَمَاسُكٌ. متانة وانسجام التفكير والكلام.

coition (= coitus) جِمَاع.

coitophobia رُهابُ الجِمَاع. التخوف الشاذ من الجماع.

coitus جِمَاع. الاتصال الجنسي خلال المهبل بين الذكر والأنثى.

- incomplete c. (= c. interruptus) عَزَل.

- c. interruptus عَزَل. جماع يسحب فيه القضيب من المهبل قبل الدفق وهي طريقة تستعمل لمنع الحمل.

- c. reservatus عَزَل؛ جِمَاعٌ مُدَخَّر. جماع يكبت فيه الدفق إرادياً.

collapse وَهْطٌ؛ انْهِيَار. حالة إعياء ووهن عام بسبب جسدي أو نفسي ويتصف بانهيار قلبي وعائي أو بصدمة.

collateral رَافِد. فرع جانبي صغير كوعاء دموي أو فرع عصبي.

colliculi أَكْنِيَمَات. جمع أكيمة.

colliculus أَكْنِيَمَة. حذبة أو مرتفع صغير.

- caudal c. الأَكْنِيَمَة الذَّنْبِيَّة. إحدى الأَكْمِيَتَيْن السفليتين في سقف الدماغ المتوسط والتي تحوي مراكز المنعكسات السمعية.

- facial c. أَكْنِيَمَة الوُجْهِي. الأكيمة الإنسية فوق السطور البصلية في الحفرة المعينية التي تولدما الركبة الداخلية للعصب الوجهي ثم تنثني للخلف حول نواة العصب المبعد.

- inferior c. (= caudal c.) الأَكْنِيَمَة السُّفْلِيَّة؛ الأَكْنِيَمَة الذَّنْبِيَّة.

- rostral c. الأَكْنِيَمَة الرُّأْسِيَّة. إحدى الأَكْمِيَتَيْن العلويتين في سقف الدماغ المتوسط التي تحوي مراكز المنعكسات البصرية.

- superior c. (= rostral c.) الأَكْنِيَمَة العُلْوِيَّة؛ الأَكْنِيَمَة المنقارية.

collum رَقَبَة؛ عُنُق. 1. جزء الجسم الذي يربط الرأس بالجزع ويسمى قسمه الأمامي «الرقبة» أما قسمه الخلفي فيسمى «الققا» 2. مصطلح عام لآلية بنية رقبة الشكل لأي عضو أو قسم في الجسم.

colnalgia أَلَمُ القَوْلُون. ألم في القولون.

colpalgia أَلَمُ المَهْبَل.

column عَمُود. بنية تشريحية عمودية الشكل.

- anterior c. of spinal cord العَمُودُ الأَمَامِي لِلنُّخَاع. القسم الأمامي من المادة السنجابية للنخاع الشوكي والذي يحوي العصبونات الحركية التي تغذي العضلات الهيكلية للرقبة والجزع والأطراف. ويظهر العمود في المقطع المستعرض للنخاع بشكل قرن يسمى القرن الأمامي للنخاع.

- anterolateral c. الحَبْلُ الأَمَامِي الوُخْشِي لِلنُّخَاع. أنظر **funiculus lateralis medullae spinalis**.

- autonomic c. of spinal cord (= intermediolateral c. of spinal cord) العمود المستقل للنخاع؛ العَمُودُ الوُخْشِي الوَسْطِي لِلنُّخَاع.

- c. of Burdach (= fasciculus cuneatus medullae spinalis) الحُرْمَةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.
- Clark's c. (= thoracic c.) العَمُودُ الصَّدْرِيّ.
- dorsal c. (= vertebral c.) العَمُودُ الْفَقَارِيّ.
- dorsal gray c. (= nucleus proprius) النَوَاةُ الْمُخْصُوصَةُ. العמוד السنجابي الظهري.
- dorsal c. of spinal cord العَمُودُ الظَّهْرِيّ لِلنَّخَاعِ. القسم الخلفي من المادة السنجابية للنخاع الشوكي ويحوي مجموعات من العصبونات الحركية ممتدة على طول النخاع ومجموعتين محدنتين في المنطقتين الصدرية والقطنية العلوية ويظهر العمود في المقطع المستعرض للنخاع بشكل قرن يسمى القرن الخلفي للنخاع.
- fornix c. عَمُودُ الْقَبْوِ. إحدى الكتلتين الليفيتين العموديتين المتباعدتين من النهاية الأمامية من جسم القبو والتي تنزل إلى الدماغ البيني.
- fundamental c. (= fasciculi proprius) الحُرْمُ الْمُخْصُوصَةُ.
- c. of Goll (= fasciculus gracilis medullae spinalis) الحُرْمَةُ الناحلة لِلنَّخَاعِ.
- Gower's c. (= tractus spinocerebellaris anterior) السَّبِيلُ النَّخَاعِيّ الْمُخَيَّجِي الْأَمَامِيّ.
- gray c's. الْأَعْمَدَةُ السِّنْجَابِيَّةُ. الأعمدة الطولانية الثلاثة للنخاع الشوكي (الأمامية والخلفية والجانبية) المكونة من المادة السنجابية والتي تحوي أجسام العصبونات وهي تبدو كالقرون في المقطع المستعرض للنخاع.
- intermediolateral c. of spinal cord العَمُودُ الْجَانِبِيّ الْوَسْطِيّ لِلنَّخَاعِ.
- c. of Lissauer (= tractus dorsolateralis) السَّبِيلُ الظَّهْرِيّ الْوُخْشِيّ.
- posteromedian c. of medulla oblongata (= fasciculus gracilis medullae oblongatae) الحُرْمَةُ الناحلة لِلْبَصَلَةِ.
- posteromedian c. of spinal cord (= fasciculus gracilis medullae

- spinalis) العמוד الخلفي الناصفي للنخاع؛ الحُرْمَةُ الناحلة لِلنَّخَاعِ.
- spinal c. (= vertebral c.) العَمُودُ الْفَقَارِيّ.
- Spitzka-Lissauer c. (= tractus dorsolateralis) السَّبِيلُ الظَّهْرِيّ الْوُخْشِيّ.
- Stilling's c. (= thoracic c.) العَمُودُ الصَّدْرِيّ.
- striomotor c. العَمُودُ الْمُخْطَطِيّ الْحَرَكَيّ. عمود صادر من القرن الأمامي للنخاع يغذي العضلات المخططة.
- thoracic c. العَمُودُ الصَّدْرِيّ. عمود من الخلايا في القسم الإنسي من قاعدة العמוד السنجابي الظهري يقع خلف العמוד الوحشي مباشرة ويمتد من الشدفة الرقبية الثامنة حتى الشدفة القطنية الثالثة أو الرابعة ويعطي أليافاً للسبيل النخاعي المخيخي الظهري على نفس الجهة.
- vertebral c. العَمُودُ الْفَقَارِيّ. التجمع الطولاني لل فقرات من قاعدة القحف حتى العنق.
- عمود. (ج: أعمدة). columna (= column) أعمدة. جمع عمود.
- columnae سَبَاتٌ؛ غَيْبُوبَةٌ. حالة فقدان الوعي لا يوقظ منها المصاب حتى بالتنبيه الشديد.
- agrypnodal c. (= c. vigil, locked-in syndrome) سَبَاتٌ سَهْرِيّ.
- alcoholic c. سَبَاتٌ كُحُولِيّ. سبات يحدث في التسمم الكحولي الشديد.
- alpha c. سَبَاتٌ أَلْفَائِيّ. سبات يتصف بسيادة موجات ألفا في المخطط الكهربائي لدماغ المصاب.
- apoplectic c. سَبَاتٌ سَكْتِيّ. الذهول الذي يرافقه السكتة.
- diabetic c. سَبَاتٌ سَكْرِيّ. السبات الذي يصاحب الحمض السكري الشديد.
- hepatic c. سَبَاتٌ كَبِدِيّ. السبات الذي يصاحب الاعتلال الدماغي الكبدي.
- irreversible c. سَبَاتٌ لَأَعْكُوسٌ؛ موت الدماغ. انظر brain death.
- Kussmaul's c. سَبَاتٌ كُسْمَاوُل. سبات وعوز الهواء في الحمض السكري.

- **metabolic c.** سُبَاتٌ إِسْتِقْلَالِيّ. سبات يصاحب الاعتلال الدماغي الاستقلابي.
- **c. somnolentium** سُبَاتٌ مُتَقَطِع. انظر cataphora.
- **uremic c.** سُبَاتٌ يُوْرِيْمِيّ. سبات ينتج عن اليوريمية.
- **c. vigil** سُبَاتٌ سَهْرِيّ. سبات نابه أو لحظة ظاهرة دون أية استجابة للمنبهات الخارجية أو استجابة ضعيفة لها جداً.
- comatose** مَسْبُوت؛ سُبَاتِيّ. شخص مصاب بالسبات أو الغيوبة.
- commissura (= commissure)** صَوَارٌ؛ مُلتَقَى.
- commissure** صَوَارٌ؛ مُلتَقَى. محل اتحاد قسمين متناسين.
- **c. of caudal colliculi** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الذَّنْبِيَّتَيْنِ. شريط من الألياف العصبية يوصل الأكيمنتين الذنبيتين.
- **c. of cerebrum, anterior** الصَوَارُ الْأَمَامِيّ لِلْمُخ. حزمة من الألياف العصبية المغمدة تسير عرضياً في الصفحة الانتهائية وتربط أقسام نصفي كرة المخ وتتكون من قسم أمامي صغير وقسم خلفي كبير.
- **c. of cerebrum, middle (= adhesio interthalamica)** الصَوَارُ الْوَسْطِيُّ لِلْمُخ؛ الْإِلْتِصَاقُ بَيْنَ الْمِهَادَيْنِ.
- **c. of cerebrum, posterior (= c. of epithalamus)** الصَوَارُ الْخَلْفِيّ لِلْمُخ.
- **c. of cerebrum, rostral (= posterior c. of cerebrum)** الصَوَارُ الْخَلْفِيّ لِلْمُخ.
- **c. of cranial colliculi (= c. of rostral colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْخَلْفِيَّتَيْنِ.
- **c. of epithalamus** صَوَارُ الْمُهَيْد. حزمة ألياف عصبية كبيرة تعبر الخط الوسطي لفوق المهادي فوق النقطة التي ينفتح عندها المسال المخي في البطين الثالث.
- **Forel's c.** صَوَارُ فُورِيل. الحزمة العصبية التي ترتبط بالنواة تحت المهادية.
- **c. of fornix** صَوَارُ الْقَبْو. حزمة من الألياف العصبية توصل حُصَيْنِي الْجَهْتَيْنِ وتمر من خلال جسم القبر.
- **gray c. (= substantia grisea intermedia centralis)** الصَوَارُ السِّنْجَابِيّ؛ الْمَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ الْمَرْكَزِيَّة.
- **habenular c.** الصَوَارُ الْعِنَانِيّ. حزمة ألياف من السطور البصلية تمر خلال عنان كل من الجهتين لتتصالب وتنتهي في عنان الجهة الثانية.
- **hippocampal c. (= c. of fornix)** الصَوَارُ الْحُصَيْنِيّ؛ صَوَارُ الْقَبْو.
- **c. of inferior colliculi (= c. of caudal colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ السُّفْلِيَّتَيْنِ.
- **interthalamic c. (= adhesio interthalamica)** الْإِلْتِصَاقُ بَيْنَ الْمِهَادَيْنِ.
- **c. of rostral colliculi (= c. of superior colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْمُتَقَارِبَتَيْنِ. صوار الأكيمنتين العلويتين.
- **c. of superior colliculi** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْعُلْوِيَّتَيْنِ. حزمة من الألياف العصبية تربط الأكيمنتين العلويتين.
- **supraoptic c's.** الْأَصُورَةُ فَوْقَ الْبَصَرِيَّة. ما لا يقل عن ثلاث حزم من الألياف العصبية. توجد فوق الصوار البصري وهي حزمة «كدن» (الحزمة السفلية أو البطنية) وحزمة «مينرت» (الحزمة الظهرية أو العلوية) وحزمة «غانزر» (الحزمة الامامية) وتسمى أصدورة ولكنها هي في الواقع تصالبات عصبية.
- **white c. of spinal cord** الصَوَارُ الْأَبْيَضُ لِلنَّخَاع. البنية المكونة من تعابر الألياف العصبية من جهة واحدة إلى الجهة الأخرى من النخاع أمام وخلف القناة المركزية.
- commotio (= concussion)** إِرْتِجَاج. الاهتزاز الشديد أو الصدمة التي تتولد عنه.
- **c. cerebri** إِرْتِجَاجٌ دِمَاعِيّ. ارتجاج الدماغ.
- **c. spinalis** إِرْتِجَاجٌ نَخَاعِيّ. ارتجاج النخاع.
- compatible** مُتَوَافِق. 1. من يستطيع التألؤم ومعايشة الآخرين في أحد المجتمعات 2. مانح أو

متلقي للدم أو للأنسجة أو للأعضاء لا يولد النقل أو الغرس لدى أي منهما أي رد فعل.

1. مُعْقَد 2. مُرَكَّب 3. عُقْدَة. **complex**
1. معقد وغير بسيط 2. مجموعة مواد أو حالات مختلفة أو عوامل متناسبة مع بعضها متشابهة أو غير متشابهة مثل مجموعة من الأعراض التي تولد متلازمة مرضية 3. مجموعة من الأفكار المترابطة في اللاشعور لها نسق عاطفي متقارب وتؤثر على سلوك الشخص وحالاته لدرجة كبيرة.

- amygdaloid c. (= corpus amygdaloideum) الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

- calcarine c. calcar avis. انظر الطير. **عُقْدَة الخِصَاء**. الأفكار اللاشعورية والدوافع التي تنبع من الخوف من فقدان الأعضاء التناسلية كعقاب عن الممارسة الجنسية اللاشرعية.

- Electra c. عُقْدَة إِلِكْتِرا؛ عُقْدَة الأب. انحراف نفسي يتصف بحب البنت لابيها حباً جنسياً وكرهيتها لأمها.

- Inferiority c. مُرَكَّب النَقْص. العقدة التي تتولد من شعور الشخص بوجود نقص حقيقي أو وهمي فيه وتؤثر بطريقة تعامل الشخص مع هذا الشعور على نمط سلوكه.

- Oedipus c. عُقْدَة أُوَيْب؛ عُقْدَة الأم. انحراف نفسي يتصف بحب الولد لأمه حباً جنسياً وكرهيتها لابيه.

- symptom c. (= syndrome) مُعْقَدُ الْأَعْرَاض؛ مُتَلَازِمَة.

complexion سَحْنَاء. لون ومظهر جلد الوجه.

comprehension إدراك؛ فَهْم. المقدرة على فهم وإدراك معاني المنبهات الحسية.

compression انْضِغَاط. 1. عملية ضغط الأجسام أو المواد على بعضها البعض 2. في علم الأجنة تقصير أو حذف بعض مراحل تنامي الجنين.

- c. of the brain انْضِغَاطُ الدُّمَاغ. حالة انضغاط الدماغ تتولد عن كسر في القحف أو عن ورم أو خراج أو خثرة دموية.

- c. of cranial nerves انْضِغَاطُ الْأَعْصَاب

القَحْفِيَّة. انضغاط الأعصاب الذي يتولد عن ورم أو كسر في القحف.

انْضِغَاطُ النُّخَاع. انضغاط النخاع الذي - spinal c. يتولد عن كسر في الفقرات أو عن ورم أو خراج وتختلف الأعراض المولدة عنه حسب موقع الآفة المولدة له وتشمل الألم والاختلالات الحسية والحركية.

الاجْبَار. 1. دافع لا يقاوم **compulsion** للقيام بعمل غير منطقي أو غير نافع 2. دافع اجباري لتكرار القيام بعمل ما من دون حاجة أو ضرورة له كفسل اليدين أو لمس جسم معين أو عد الدراهم من دون سبب معروف أو لسبب لاشعوري. إجْبَارٌ مُعَاوَد. في التحليل النفسي - repetition c. هو الدافع لإعادة القيام بعمل أو تجارب عاطفية سابقة من دون سبب واضح.

الزُّرُوع. الدافع الداعي إلى القيام **conation** بعمل من أي نوع.

مَفْهُوم. (ج: مفاهيم). الصورة **concept** العقلية لاية عملية أو موضوع أو شيء.

1. مَفْهُوم؛ **conception (= concept)** إدراك 2. إخصاب.

إرتجاج. رَجَّة أو اهتزاز شديد **concussion** أو النتائج التي تولدها مثل هذه الإصابات للأنسجة الرخوة أو للدماغ.

إرتجاجُ الدُّمَاغ. فقدان الوعي - c. of the brain نتيجة ضربة أو صدمة شديدة للرأس يدوم في الحالات البسيطة لفترة قصيرة مع احتمال فقدان القوى العقلية للمصاب مثل نساوة السابق أو الاعتلال العاطفي. أما في الحالات الشديدة فإنه يدوم لفترة طويلة مع اختلال وظائف جذع الدماغ لتوقف التنفس العابر وتوسع الحذقة والاختلال الحركي الوعائي.

إرتجاجُ البَته. صمم مع - c. of the labyrinth طنين أو اختلال التوازن يتولد عن صدمة للأذن أو الفيحاء بالقرب منها.

إرتجاجُ النُّخَاع. اعتلال - c. of the spinal cord وظيفي عابر للنخاع نتيجة رضح آلي له.

1. إشْرَاط 2. تَكْنِيف. تعلم **conditioning** يتم فيه توليد استجابة معينة لمنبه غير نوعي لم يكن في السابق قبل تعلمه عليه قابلاً على إحداث

مثل تلك الاستجابة ويتم ذلك بتكرار هذا المنبه بالتزامن مع المنبه النوعي الخاص الذي يولد هذه الاستجابة عادة وبعد تكرار هذا الترافق لمرات عديدة كافية يتعلم الكائن الاستجابة المعينة لهذا المنبه الجديد غير النوعي.

- **aversive c.** إَشْرَاطٌ مُفَقِّرٌ. إشراف يستعمل فيه العقاب ليزامن إحساسه السلبي مع استجابة غير مرغوب بها.

- **avoidance c.** إَشْرَاطٌ إِبْجَتَابِيٌّ. إشراف فعال يتعلم الشخص فيه توليد استجابة تلغي الاستجابة للمنبه البغيض أو تجنبه إياه.

- **classical c. conditioning** إَشْرَاطٌ تَقْلِيدِيٌّ. انظر توليد استجابة تلغي الاستجابة

- **instrumental c. (= operant c.)** إَشْرَاطٌ فَعَالٌ.

- **operant c.** إَشْرَاطٌ فَعَالٌ. إشراف يتعلم فيه الشخص استجابة حركية معينة لأحد المنبهات الخاصة تجلب له مكافأة مغرية ومفيدة أو مفرقة.

conduct 1. تَصَرُّفٌ 2. وَصْلٌ. 1. السلوك الشخصي للفرد الذي يتضمن عاملاً أخلاقياً ويقتضي معرفة اجتماعية وإرادة قوية. 2. يمرر الدفعة العصبية على طول الليف العصبي أو ينشرها إلى الأنسجة الهيجوة.

conductance إِيصَالِيَّةٌ. القدرة على التوصيل.

conduction تَوْصِيلٌ. نقل وإيصال الموجات الصوتية، أو الحرارة، أو الدفعات العصبية أو الكهربائية.

- **aerial c.** تَوْصِيلٌ هَوَائِيٌّ. توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية خلال الهواء في الأذنين الخارجية والوسطى.

- **anterograde c. (= forward c.)** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ.

- **antidromic c.** تَوْصِيلٌ مُعَاكِسٌ لِلْمَسِيرَةِ. توصيل الدفعات العصبية باتجاه معاكس للاتجاه السوي، مثلاً من المحوار إلى التغصنات.

- **avalanche c.** تَوْصِيلٌ تَهْوُورِيٌّ. توصيل دفعات عصبية من النهايات العديدة لأحد العصبونات إلى أجسام مجموعة كبيرة من العصبونات مما يولد تهيجا منتشراً واسعاً لمدخل عصب صغير نسبياً.

- **bone c.** تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ. توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية بطريق العظام القحفية.

- **cranial c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ قَحْفِيٌّ. تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ.

- **dromic c.** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ. توصيل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.

- **ephaptic c.** تَوْصِيلٌ بِالمُشْبِكِ الجَانِبِيِّ. توصيل الدفعات العصبية عبر المشبك الجانبي بدلاً من التوصيل المشبكي.

- **forward c. (= dromic c.)** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ.

- **one way c.** تَوْصِيلٌ بِاتِّجَاهٍ وَاحِدٍ. توصيل الدفعات العصبية خلال المشابك باتجاه واحد فقط.

- **osteotympanic c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ طَبْلِيٌّ.

- **saltatory c.** تَوْصِيلٌ قَفْزِيٌّ. التوصيل السريع للجهد العصبي من عقدة رانفير إلى العقدة المجاورة في الأعصاب المغلفة بدلاً من توصيله على طول الليف العصبي.

- **synaptic c.** تَوْصِيلٌ مُشْبِكِيٌّ. توصيل الدفعات العصبية عبر المشبك.

- **tissue c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ نَسْجِيٌّ. تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ.

- **unidirectional c. (= one way c.)** تَوْصِيلٌ بِاتِّجَاهٍ وَاحِدٍ.

cone مَخْرُوطٌ. 1. المستقبل الضوئية الشبكية المتخصصة بالرؤية الضوئية 2. جسم ذو شكل مخروطي.

- **cerebellar pressure c.** مَخْرُوطٌ مَخْنِجِيٌّ. انْضِغَاطِيٌّ. تشوه الدماغ الذي ينتج عن زيادة ضغط داخل القحف الذي يدفع المخيخ إلى داخل القناة الشوكية.

- **medullary c.** المَخْرُوطُ النُخَاعِيٌّ. انظر conus medullaris.

- **retinal c.** مَخْرُوطٌ شَبَكَوِيٌّ. خلية متقبلة بصرية مسؤولة عن الرؤية الضوئية واللونية والميز البصري وتنتشر في البقعة المركزية للشبكية وأقسامها الخلفية ونقل كثيراً حتى تنعدم في القسم الامامي من الشبكية.

- c. of spinal cord (= conus medullaris)

مَخْرُوطُ النُّخَاع.

- visual c. (= retinal c.)

مَخْرُوطُ شَبَكَوِيٍّ.

conexus interthalamicus

(= adhesio interthalamica) الوَصِيلَةُ

بَيْنَ الْمِهَادِينَ.

confabulation

تَخْرِيف. تلفيق بعض

الحوادث الخيالية يرويها بعض المصابين بالأمراض العصبية العضوية لملء بعض الفراغات في ذاكرتهم.

conflict

صِرَاع. صراع نفسي وغالباً لا

شعوري يتولد عن تصادم دوافع أو رغبات أو متطلبات متناقضة أو غير متجانسة.

- approach-approach c.

صِرَاعُ الْمَرْغُوبَيْنِ.

صراع يتولد عن الرغبة الشديدة للوصول إلى هدفين متناقضين يولدان صراعاً نفسياً شديداً.

- approach-avoidance c.

صِرَاعُ الْمَرْغُوبِ

والمَكْرُوه. صراع يتولد عن الرغبة للوصول إلى أحد الأهداف ولكنه يتضمن عوامل مرغوبة فيه مع عوامل أخرى غير مرغوبة فيتولد صراع لتجنب الأهداف غير المرغوبة.

- avoidance-avoidance c.

صِرَاعُ الْمَكْرُوهَيْنِ.

صراع يتولد من الرغبة في اجتناب عاملين غير مرغوبين بدرجة متساوية.

- extrapsychic c.

صِرَاعُ خَارِجِ النَّفْسِ. صراع

يتولد بين الرغبات والاحتياجات الشخصية للفرد مع رغبات الآخرين.

- intrapersonal c. (= intrapsychic c.)

صِرَاعُ دَاخِلِ النَّفْسِ.

- Intrapsychic c.

صِرَاعُ دَاخِلِ النَّفْسِ. صراع

يتولد بين الرغبات غير المتجانسة واللاشعورية والرغبات والاحتياجات الشخصية والأفكار الذاتية في داخل فكر الشخص.

confrontation

مُجَابَهَةٌ. طريقة علاجية

نفسية يعالج بها المرضى النفسانيين بإظهار أقوالهم أو أعمالهم المتناقضة لهم مباشرة ليقنعوا أنفسهم بتناقضها.

confusion

تَخْلِيطٌ؛ التَّبَاس. تشويش فكري

بالنسبة للوقت أو المحل أو الأشخاص ويطرق أحياناً مع تشويش الوعي.

confusional

تَخْلِيطِيٌّ. متعلق بالتخليط.

congenital

خُلِقِيٌّ. حالات موجودة لدى

المولود حين الولادة وعادة قبلها بصرف النظر عن أسبابها.

conjugal

إِقْتِرَائِيٌّ. متعلق بالزواج أو

بالزوجين.

conscious

وَاعٍ. شخص مدرك لنفسه وأعماله

ومحيطة.

consciousness

وَعْيٌ؛ شُعُور. حالة إدراك

الشخص لنفسه وأعماله ومحيطه ويتمتع بإحساس كامل.

consensual

إِتْفَاقِيٌّ. ما يتجهج بالتنبيه

المنعكسي، ويستعمل المصطلح للدلالة على استجابة حدقتي العينين سوية للمنبه الذي يركز على إحداهما.

constitution

بَنِيَّةٌ؛ بَنِيَان. بناء الجسم

أو حالته الوظيفية التي تعينها فيه العوامل الوراثية والفيزيولوجية والكيميائية والتي قد تعدلها الظروف البيئية.

constitutional

بَنِيَوِيٌّ. 1. ما يؤثر على

كافة بنية الجسم وليس على موضع واحد فيه فقط 2. متعلق بالبنية.

constriction, Ranvier (= node of

Ranvier)

عُقْدَةُ رَانْفييه.

contract

يَتَقَلَّصُ. يقصر كالعضلة مثلاً

عند تنبيهها بمنبه وافٍ.

contractile

قَلْوُصٌ. يتمكن من التقلص

أو يتصف بخاصية التقلص.

contractility

قَلْوُصِيَّةٌ. المقدرة على

التقلص استجابة لمنبه مناسب.

- idiomuscular c.

قَلْوُصِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ.

تقلص العضلة الذاتي في حالة ضمورها أو حثلها.

- neuromuscular c.

قَلْوُصِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ.

التقلص العضلي السوي نتيجة التنبيه العصبي لها.

- تَقْلُصُ** contraction قصر العضلة وصغر حجمها وتولد أو زيادة توترها.
- **anodal closure c.** تَقْلُصُ الْفَلَقِ الْمَصْعِدِي. تقلص العضلة عند قطع الدارة الكهربائية عند المصعد.
- **anodal opening c.** تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمَصْعِدِي. تقلص العضلة تحت المصعد عند فتح الدارة الكهربائية.
- **cathodal closure c.** تَقْلُصُ الْفَلَقِ الْمَهْبِطِي. تقلص العضلة عند المهبط عند غلق الدارة الكهربائية.
- **cathodal opening c.** تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمَهْبِطِي. تقلص العضلة عند المهبط عند فتح الدارة الكهربائية.
- **cicatricial c. (= wound c.)** تَقْلُصُ نَدَبِي. تقلص العضلة المتناوب مع فترات انبساطها.
- **clonic c.** تَقْلُصُ رَمْعِي. تقلصات المتناوب مع فترات انبساطها.
- **fibrillary c's.** تَقْلُصَاتٌ لَيْبِقِيَّةٌ. تقلصات تلقائية شاذة تحدث بالتناوب في حزم متفرقة من العضلة المصابة بمرض عضلي.
- **isometric c.** تَقْلُصُ تَوَثُرِيٍّ عَقْلَانِي. تقلص عضلي متواصل يتولد عن تنبيه العضلة بمنبه كهربائي مستمر.
- **isometric c.** تَقْلُصُ إِسْوِيٍّ الطول. تقلص العضلة من دون تغيير طولها ومن دون تغيير المسافة بين أصلها ومغزها ولكن بزيادة توترها.
- **Isotonic c.** تَقْلُصُ إِسْوِيٍّ التَوَثُرِ. تقلص العضلة من دون تغيير توترها ولكن تقصر المسافة بين أصلها ومغزها.
- **myotatic c.** تَقْلُصُ مَطِّي. تقلص العضلة عند تعديدها المفاجيء أو عند النقر على وترها.
- **paradoxical c.** تَقْلُصُ تَنَاقُضِي. التنبيه العضلي (الكهربائي) الذي يؤدي إلى حركة العضو باتجاه مناقض لوظيفتها، عند تنبيه العضلة الباسطة مثلاً ينثنى العضو بدلاً من انبساطه والعكس بالعكس ويحصل ذلك في شلل العضلات التام أو الجزئي وينتج عن انتشار المنبه إلى العضلات السليمة المثنية للعضو.
- **postural c.** تَقْلُصُ وَضْعِي. تقلص العضلة الذي يولد توتراً كافياً في العضو للمحافظة على وضعه أو وضع الجسم.
- **tetanic c.** تَقْلُصُ تَكَرَّرِي. تقلص العضلة المستمر من دون فترات انبساط فيها.

- **tone c.** تَقْلُصُ التَوَثُرِ. تقلص العضلة الذي يتولد فيها تدريجياً وببطء مع فترة انبساط طويلة.
- **tonic c.** تَقْلُصُ تَوَثُرِي. تقلص العضلة المستمر بسبب تنبيهها العصبي المتتالي ولكن بسرعة تكفي لتقلص أليافها المتفرقة ويؤدي تراكم هذه التقلصات إلى توتر العضلة الفيزيولوجي المستمر.
- **wound c.** تَقْلُصُ الْجَرْحِ. تقلص فتحة الجرح الجلدي التلقائي.
- contracture** تَقْفُصٌ. حالة ثابتة للعضلة تتصف بمقاومتها للتمديد المنفعل وينتج ذلك عن تليف الأنسجة الرابطة للعضلة أو للمفاصل أو بسبب اعتلال الألياف العضلية.
- **Dupuytren c.** تَقْفُصُ دُوْبُوِيْتِرَان. قصر وتشنج وتليف لفافة راحة اليد مما يولد تشوهاً انثنائياً لأحد الأصابع ويترافق ذلك غالباً مع الصرع المزمن.
- **ischemic c.** تَقْفُصُ إِقْفَارِي. تقفع وتنكس العضلة بسبب اضطراب دورتها الدموية بالضغط على أوعيتها مثلاً باللفافة الشادة أو بالرضح أو بالبرد الشديد.
- **organic c.** تَقْفُصُ عُضْوِي. تقفع دائم ومستمر يتولد عن مرض عضوي.
- **post-poliomyelitic c.** تَقْفُصُ تَالٍ لِإِلْتِهَابِ سَنَجَابِيَّةِ النَخَاعِ. انفتال أحد المفاصل الذي يتلو التهاب النخاع بسبب الشلل التام أو الجزئي لإحدى العضلات أو لمجموعة منها مما يعطي العضلات المعاكسة لها الفرصة لقتل المفصل.
- **veratrine c.** تَقْفُصُ بِالْفِيرَاتَرِين. تقفع يتولد عن زرق الفيراترين داخل العضلة.
- **Volkmann's c.** تَقْفُصُ فُولْكَمَان. تقفع الأصابع وأحياناً المعصم مع فقدانها لقوتها والذي يتطور بسرعة بعد إصابة شديدة في منطقة المرفق أو لسوء استعمال العاصبة وقد يحدث تقفع مشابه في الكاحل وأصابع القدم لأسباب مشابهة في الساق.
- contrastimulant** مُضَادُّ التَنْبِيهِ؛ مُحَمِّدٌ. 1. أي عامل يضاد التنبيه 2. دواء مكثب.
- contrastimulus** مُنَبِّهٌ مُضَادُّ. أي دواء أو عامل أو قوة تقاوم التنبيه.



contracture

تقلع ثابت في اليد اليمنى بوضعة الفني بسبب اعتلال اليافها العضلية

contrecoup رَجْعُ الضَّرْبَةِ. إصابة تتولد عن صدمة أو ضربة على غير موقعها مثل كسر إحدى جهتي القحف عند صدمة جهته المعاكسة.

control 1. مُرَاقِبَةٌ: تَضْبِيط 2. مُكَافَحَةٌ. 1. التحكم في إحدى العمليات أو تحديدها 2. مكافحة بعض الامراض.

- associative automatic c. تَحَكُّمٌ اِرْتِبَاطِيٌّ ذاتي. دفعات عصبية تبدأ من الجسم المخطط وتعمل على السبيل النهائي المشترك وبذلك تؤثر على العضلات.

- aversive c. تَحَكُّمٌ مُنْفَرٍ. استعمال بعض المنبهات الكريهة في المعالجة النفسانية لتغيير سلوك غير مرغوب فيه.

- feedback c. تَضْبِيطٌ اِرْتِجَاعِيٌّ. تحكم فيزيولوجي خاص حيث تولد الزيادة في اية وظيفة تثبيطاً للمركز أو للعوامل المنبهة لها فتقللها ويحصل العكس عند تقليلها حيث تنبّه هذه العوامل المراكز المولدة لها وتؤدي إلى زيادتها.

- idiodynamic c. تَحَكُّمٌ دِينَغِيٌّ ذاتي. دفعات عصبية من خلايا العمود السنجابي الامامي والنوى

الحركية للدماغ التي تحافظ على الحالة النماية السوية للعضلات.

- reflex c. تَضْبِيطٌ مُنْعَكِسِيٌّ. التحكم بالفعالية العضلية بواسطة دفعات عصبية تنقل إليها عن طريق الأقواس المنعكسية.

- stimulus c. التَحَكُّمُ التَنْبِيهِيٌّ. تأثير منبهات المحيط على سلوك الفرد.

- synergic c. تَحَكُّمٌ تَأَزُرِيٌّ. دفعات عصبية تنقل من المخيخ إلى الطريق المشترك للتحكم في الفعالية العضلية لوحدة الجسم المتآزرة.

- tonic c. تَحَكُّمٌ تَوَثُرِيٌّ. الدفعات العصبية التي تنتقل إلى الطريق المشترك النهائي خلال الأقواس المنعكسية للتحكم في التوتر العضلي.

- vestibuloequilibrium c. تَحَكُّمٌ دِهْلِيْزِيٌّ. قَوَازِنِيٌّ. دفعات عصبية من الاقنية الهلالية والكيس والقريبة للمحافظة على توازن الجسم.

- volltional c. (=voluntary c.) تَحَكُّمٌ اِرَادِيٌّ.

- voluntary c. تَحَكُّمٌ اِرَادِيٌّ. دفعات عصبية من الباحة الحركية لقشرة المخ تتحكم في الفعاليات العضلية حسب إرادة الشخص.

contusion رَضٌّ. كدمة أو إصابة قسم من الجسم من دون جرح الجلد.

- **brain c.** رَضُّ الدِّمَاغ. رض مع فقدان الوعي يتولد عن رضح مباشر للرأس وعادة ما يترافق مع كسر القحف.

- **contrecoup c.** رَضُّ رَجْع الضَّرْبَةِ. رض يتولد عن ضربة أو صدمة لإحدى جهتي الرأس فيولد ضرراً في نصف كرة المخ في الجهة المعاكسة من الرأس.

- **c. of spinal cord** رَضُّ النُّخَاع. رضح عضوي للنخاع بسبب ضربة أو صدمة للعمود الفقري تؤدي إلى انعدام الوظيفة الدائم أو الوقتي لأقسام الجسم تحت مستوى الرضح.

conus مَخْرُوطُ النُّخَاع. أنظر cone.

- **conus medullaris** مَخْرُوطُ النُّخَاع. النهاية السفلية المخروطية الشكل للنخاع الشوكي عند مستوى الفقرة القطنية العلوية.

conversion إِنْقِلَابٌ؛ تَحْوِيل. آلية دفاعية لا شعورية يتحول بها القلق الذي يتولد عن صراع نفسي إلى تعبير جسمي رمزي.

convolution تَلَفُّيف. (ج: تلافيف). منطقة مرتفعة غير منتظمة تتولد من بنية مطوية على نفسها مثل تلافيف الدماغ.

- **Broca's c.** تَلَفُّيفُ بْرُوكَا. التلفيف الجبهي السفلي لنصف كرة المخ الأيسر.

- **Heschl's c.** تَلَفُّيفُ هِشَل. التلفيف الصدغي المستعرض الأمامي.

- **Zuckerkandl's c.** تَلَفُّيفُ زُوكَرْكَندَل. التلفيف جنيب الانتهائي.

convulsant مُخَلِّج. عامل يولد الاختلاج.

convulsion إِنْخِلَاج. تقلص لإرادي شديد أو سلسلة من التقلصات اللاإرادية في العضلات الإرادية.

- **central c.** إِنْخِلَاجٌ مَرْكَزِيٌّ. اختلاج يتسبب عن آفة الجهاز العصبي المركزي ولا يسببه أي سبب خارجي.

- **choreic c.** إِنْخِلَاجٌ رَقْصِيٌّ. نفضات رمعية عضلية شبيهة بالحركات الرقصية.

- **clonic c.** إِنْخِلَاجٌ رَمْعِيٌّ. اختلاج يتصف بتقلصات عضلية تتناوب مع ارتخائها.

- **coordinate c.** إِنْخِلَاجٌ مُتَنَاسِقٌ. اختلاج يتصف بحركات رمعية شبيهة بالحركات الطبيعية الإرادية المستهدفة.

- **epileptiform c.** إِنْخِلَاجٌ صَرْعِيٌّ الشَّكْل. اختلاج يصاحبه فقدان الوعي.

- **essential c. (=central c.)** إِنْخِلَاجٌ أَساسِيٌّ؛ إِنْخِلَاجٌ مَرْكَزِيٌّ.

- **febrile c's.** إِنْخِلَاجَاتٌ حُمُوءِيَّة. الاختلاجات التي تصاحب الحميات عند الأطفال والرضع.

- **hysterical c, hysteroid c.** إِنْخِلَاجٌ هِسْتِيرِيٌّ؛ إِنْخِلَاجٌ هُزَاعِيٌّ. هستيريا اختلاجية تتصف بأعراض تشبه الاختلاجات الحقيقية.

- **local c.** إِنْخِلَاجٌ مَوْضِعِيٌّ. تشنج بسيط يصيب عضلة واحدة أو أكثر في منطقة محدودة من الجسم.

- **mimetic c. (=mimic c.)** إِنْخِلَاجٌ إِمَائِيٌّ. تشنج وجهي أو عرة وجهية.

- **puerperal c.** إِنْخِلَاجٌ نَفَاسِيٌّ. تشنجات لإرادية عند النساء قبيل أو أثناء أو بعد الولادة مباشرة.

- **salaam c.** إِنْخِلَاجٌ سَلَامِيٌّ. اختلاج مع تشنج انحناء الرأس وطاقاته للامام.

- **spontaneous c. (=central c.)** إِنْخِلَاجٌ تَلَفَّائِيٌّ. تشنج توتري من دون فقدان الوعي.

- **tetanic c.** إِنْخِلَاجٌ تَوَثُّرِيٌّ. تشنج توتري طويل بسبب تفريغ صرعي.

- **uremic c.** إِنْخِلَاجٌ يُونِيمِيٌّ. اختلاج يتولد عن اليوريمية.

convulsivant (=convulsant) مُخَلِّج. عامل أو مادة تولد الاختلاج.

convulsive إِنْخِلَاجِيٌّ. متعلق بالاختلاج أو يتصف به.

coordination تَنَاسُقٌ؛ تَنَسِيقٌ. قيام الأعضاء المترابطة بوظائفها بصورة منسقة ويطلق عادة على تنسيق الدماغ للوظائف الحركية للعضلات لتوليد حركات منسقة.

copodyskinesia عُسْرُ الْحَرَكَةِ الْكَلْبِي. عجز الحركة نتيجة تعب العضلات.

coprolalia (= coprophrasia) بُذَاء. استعمال كلمات بذيئة وقذرة بدافع لاإرادي في بعض حالات الفصام.

coprolomania (= coprolalia) هَوَسُ البُذَاء. هَوَسُ البراز. الهوس الشاذ بالبراز والقذارة.

coprophilia هَوَسُ البراز. الهوس الشاذ بالبراز والقذارة.

coprophobia رُهابُ البراز؛ رُهابُ التَّغَوُّط. رهاب التبرز أو رؤية البراز.

coprophrasia (= coprolalia) بُذَاء.

coprostrasophobia رُهابُ الإمساك. رهاب توقف التغوط.

copulation جِمَاع؛ مُجَامَعَة. أنظر coitus.

cord حَبْل. بنية طويلة مدوّرة وقابلة للثني.

- ganglionated c. (= truncus sympathicus) جَذَعُ الْوُدِّي. الحَبْلُ الْمُعَقَّد.

- lumbosacral c. (= truncus lumbosacralis) الجَذَعُ الْقَطَنِي الْعَجَزِي.

- nerve c. حَبْلٌ عَصَبِي. جذع أو حزمة الياف عصبية.

- spinal c. (= medulla spinalis) النُّخَاعُ الشُّوكِي.

- Willis's c's. جِبَالٌ وَيْلِيْس. مجموعة من الحزم الليفية (من تراكيب الجافية) تمتد عرضياً عبر الزاوية السفلية للجيب السهمي العلوي.

cordotomy 1. بَضْعُ النُّخَاع 2. قَطْعُ الحَبْلِ الصَّوْتِي. أنظر chordotomy.

cornea الْقَرْنِيَّة. البنية الشفافة التي تكون القسم الأمامي من غلالة العين.

cornu قَرْن. (ج: قُرُون). بروز قرني الشكل وخصوصاً في مقطعه العرضي.

- c. Ammonis قَرْنُ آمُون؛ الْحَصِين. أنظر hippocampus.

- c. anterius medullae spinalis (= c.

ventrale medullae spinalis) الْقَرْنُ الْأَمَامِي لِلنُّخَاع.

- c. dorsale medullae spinalis الْقَرْنُ الظَّهْرِي لِلنُّخَاع. الثنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل الظهري للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

- c. frontale ventriculi lateralis الْقَرْنُ الْجَنْبِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للأمام من جزئه المركزي إلى الفص الجبهي للمخ.

- c. inferius ventriculi lateralis (= c. temporale ventriculi lateralis) الْقَرْنُ الْأَمَامِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. القرن الصدغي للبطين الجانبي.

- c. laterale medullae spinalis الْقَرْنُ الْوَحْشِي لِلنُّخَاع. البنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل الوحشي للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

- c. occipitale ventriculi lateralis الْقَرْنُ الْقَذَالِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للخلف من جزئه المركزي إلى الفص القذالي.

- c. temporale ventriculi lateralis الْقَرْنُ الصَّدْغِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للأسفل وإلى الأمام من القسم المركزي خلف المهاد إلى الفص الصدغي.

- c. ventrale medullae spinalis الْقَرْنُ الْبُطْنِي لِلنُّخَاع. البنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل البطني للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

corona تَاج؛ إِكْلِيل. بروز إكليلي الشكل يحيط ببنية تشريحية.

- c. radiata الإِكْلِيلُ الْمُتَشَعِّع. الألياف الإسقاطية المتشعبة والمارة من المحفظة الباطنة إلى كل أنحاء القشرة المخية.

corpus جِسْم. (ج: أَجْسَام). كتلة معزولة من مادة أو من نسيج متخصص.

- amygdaloideum الْجِسْمُ الْوُزِّي. معقد بيضوي صغير من مجموعة من النوى مغطى جزئياً بالقشرة الكثرية الشكل ضمن ذروة الفص الصدغي وأمام القرن السفلي للبطين الجانبي للدماغ وهو جزء من الجهاز الحوفي وله اتصال بالمراكز الشمية

وبالقشرة الحوفية ويرسل أليافاً إلى الحصين والحاجز والمهاد وخصوصاً إلى الوطاء.

- corpora bigemina (=optic bodies)

الجسمان التوأمان؛ الجسمان البصريان. جسمان في دماغ الحيوانات اللاشعورية وهما يناسبان الأكيمة العلويتين للأجسام الرباعية في دماغ الثدييات. انظر corpora quadrigemina.

- c. callosum الجسم الثفني. كتلة مقوسة من المادة البيضاء توجد في أعماق الشق الطولاني تتكون من ألياف عرضانية تربط نصفي كرة المخ وتتكون من الأمام إلى الخلف من المنقار والركبة والجذع والرفادة.

- c. cerebelli جسم المخيخ. الجزء الرئيسي من المخيخ الذي يتكون من نصفي كرة المخيخ المتصلين بشريط ناصف، أي بالدودة.

- c. fornicis جسم القنبر. القسم الوسطي من قنبر المخ الذي يتكون من اندماج النصفين الجانبيين تحت الجسم الثفني.

- c. geniculatum laterale الجسم الركبي الوحشي. بارزة في المهاد التالي تكونها النواة الركبية الوحشية المدفونة تحتها وبالجبهة الوحشية من النواة الركبية الإنسية وتترحل فيها الدفعات العصبية البصرية لتمر إلى القشرة المهادية. تسمى أيضاً المهاد البصري.

- c. geniculatum mediale الجسم الركبي الإنسي. بارزة في المهاد التالي تكونها النواة الركبية الإنسية المدفونة تحتها وبالجبهة الوحشية من الأكيمة العليا وتترحل فيها الدفعات العصبية السمعية لتمر إلى القشرة السمعية في المخ.

- c. hypothalamicum (=nucleus subthalamicus) جسم الوطاء. النواة تحت المهاد.

- c. interpedunculare (=nucleus interpeduncularis) النواة بين السويقتين.

- c. Luysii (=nucleus subthalamicus) النواة تحت المهاد.

- c. mamillare الجسم الحليمي. إحدى الكتلتين الكرويتين الصغيرتين الموجودتين بالقرب من بعضهما في الحيز بين السويقتين أمام المادة المثقبة الخلفية في المنطقة الوطائية الخلفية وتتكون كل

واحدة منهما من نواتين رئيسيتين إنسية ووحشية وتجمعات صغيرة من المادة السنجابية.

- c. medullare cerebrelli لب المخيخ. المادة البيضاء في المخيخ.

- c. medullare vermis (=arbor vitae cerebelli) شجرة الحياة المخيخية.

- c. nuclei caudati جسم النواة الذنبية. قسم النواة الذنبية التي تقع في الجزء المركزي من البطين الجانبي للدماغ وتمتد من الرأس إلى الخلف حتى تستمر مع ذنب النواة الذنبية.

- c. pineale الجسم الصنوبري. جسم مخروطي مسطح صغير في فوق المهادي يقع فوق الأكيمة العلوية وتحت رفادة الجسم الثفني.

- c. pyramidale medullae (=pyramis medullae oblongata) هرم البصلة؛ هرم النخاع المستطيل.

- corpora quadrigemina الأجسام الرباعية. الأكيمة القحفية والذنبية لسقف الدماغ المتوسط مجتمعة.

- c. restiforme (=pedunculus cerebellaris caudalis) السويقة المخيخية الذنبية.

- c. rhomboidale (=nucleus dentatus) النواة المسننة. الجسم المعيني.

- c. striatum الجسم المخطط. أحد مكونات النوى القاعدية وهو جسم مكون من مادة سنجابية ومادة بيضاء تحت قشرة المخ وأمام وعلى الجهة الوحشية للمهاد في كل من نصفي كرة المخ. وتترتب المادة السنجابية فيه في كتلتين رئيسيتين: النواة الذنبية والنواة العدسية. أما المظهر المخطط للجسم الذي يظهر في مقطعه فتولده أشرطة تربط المادة السنجابية وتمر من إحدى النواتين إلى النواة الأخرى خلال المادة البيضاء للمحفظة الداخلية.

- c. subthalamicum (=nucleus subthalamicus) النواة تحت المهاد.

- c. trapezoideum الجسم المنحرفي. كتلة من ألياف مستعرضة تمتد خلال القسم المركزي للجسر مكونة جزءاً من سبيل العصب القوقعي.

- c. vitreum الجسم الزجاجي. المادة الشفافة التي تملأ قسم العين الذي يقع بين العدسة والشبكية.

1. جُسَيْمٌ. (ج: جُسَيْمَات).
2. كَرْيَةٌ. (ج: كَرِيَات). كتلة صغيرة أو جسم صغير.

- Alzheimer's c's. جُسَيْمَاتُ آلزهايمر. جسيمات حبيبية مركبة توجد في الخلايا الدبقية القليلة التغصن في الدماغ.

- axile c. (=axis c.) جُسَيْمٌ مَحْوَرِيّ. القسم المركزي من الجسم المسمي.

- Dogiel's c. جُسَيْمٌ تناسليّ: جُسَيْمٌ دُوْجِيل. عضو انتهائي حسي مغلف يوجد في الأغشية المخاطية للأعضاء والأعضاء التناسلية وفي الجلد حول حلمة الثدي.

- Golgi's c's. جُسَيْمَاتُ غُولْجِي. أعضاء انتهائية مكينة توجد في أوتار العضلات في منطقة اتصالها بالألياف العضلية وهي تنقل حسّ تغيرات التوتر العضلي إلى الألياف العصبية الحسية التي تتصل بها.

- Golgi-Mazzoni c's. جُسَيْمَاتُ غُولْجِي مَارْزُونِي. جسيمات لمسية توجد في الأنسجة تحت الجلدية لنهايات الأصابع وتشبه جسيمات باسيني ولكن لها صفائح أقل ومخروط أكبر نسبياً وفيها ليف عصبي كثير التفرع.

- Krause's c's. (=corpuscula bulboidea) جسيمات بصلية الشكل: جُسَيْمَاتُ كراوْزَة. نهايات عصبية صغيرة مغلفة ومكينة توجد في الجلد والأغشية المخاطية والملتحمة والقلب، وهي تعمل كمستقبلات حرارية سريعة التكيف.

- lingual c. جُسَيْمٌ لِسَانِيّ. نهاية عصبية حسية مكينة توجد في الحليمات الذوقية.

- Mazzoni's c's. (=corpuscula bulboidea) جُسَيْمَاتُ مَارْزُونِي. نهايات عصبية حسية تشبه جسيمات كراوْزَة.

- Meissner's c's. (=corpuscula tactus) جُسَيْمَاتُ مايسنر. نهايات عصبية حسية مكينة متوسطة الحجم توجد في الجلد وخاصة في راحة اليد وأخمص القدم وهي نهايات عصبية لمسية.

- Merckel's c's. (=menisci tactus) جُسَيْمَاتُ مِرْكَل. نهايات عصبية حسية كاسية الشكل توجد في الجلد والكثير منها يتكون من فروع ليف عصبي واحد ويتلامس كل واحد منها بخلية ظهارية

محورة. وهي توجد في البشرة العميقة وفي جريبات الشعر وفي الحنك العظمي حيث تعمل كمستقبلات لمسية.

- nerve c's. جُسَيْمَاتُ الْعَصَب. خلايا الغمد التي توجد بين غمد الليف العصبي والغمد النخاعي.

- Pacini's c's. (=pacinian c's.) جُسَيْمَاتُ بَاسِينِي. نهايات عصبية ذات صفائح متخصصة باستقبال منبهات الضغط.

- Purkinje's c's. خَلَايَا بَرْكِنْجِي. انظر Purkinje's cells.

- Ruffini's c's. جُسَيْمَاتُ رُوفِينِي. نهايات عصبية ذات صفائح متخصصة بحس الحرارة والضغط.

- Schwalbe's c. جُسَيْمٌ شَفَالْبَة. انظر caliculus gustatorius.

- tactile c. (= corpusculum tactus) جُسَيْمٌ لَمْسِيّ. انظر Meissner's c.

- taste c. (= taste cell) جُسَيْمٌ ذَوْقِيّ. خلية ذوقية.

- Timofeev's c's. جُسَيْمَاتُ تِمُوفِيُو. نوع من جسيمات باسيني المتخصصة التي توجد تحت مخاطية القسمين البروستاتي والغشائي للإحليل.

- touch c's. (= tactile c's.) جُسَيْمَاتُ لَمْسِيَّة.

- Wagner's c's. (= tactile c's.) جُسَيْمَاتُ لَمْسِيَّة.

جُسَيْمَات. جمع جُسَيْم.

جُسَيْمٌ. corpusculum (= corpuscle) (ج: جُسَيْمَات).

cortex قَشْرَة. الطبقة الخارجية للعضو أو للبنية الجسدية.


- agranular c. القَشْرَة اللَامُحَبَبِيَّة. منطقة مخية تكون فيها الطبقتان الحبيبتان الثانية والرابعة صغيرتين نسبياً كما هو الحال في التلفيف أمام المركزي.

- association c. قَشْرَة تَرَابُطِيَّة. القشرة الترابطية العامة في المخ أو في المناطق القشرية الترابطية الخاصة بالقشرة الترابطية البصرية.

- auditory c. القَشْرَة السَّمْعِيَّة. منطقة

التلفيف الصدغي العلوي في الإنسان (باحثاً برودمان 41 و 42) التي تستقبل الإسقاط القوقعي خلال الجسم الركبي الإنسي وهي منطقة حسية سمعية

- calcarine c. (= area striata): الباحة المخططة: القشرة المَهْمَازِيَّة.
- cerebellar c. القشرة المَخِيخِيَّة. الطبقة السنجابية السطحية للمخيخ.



cortex, cerebral

رسم يبين الباحات الحسية والحركية في قشرة المخ أمام وخلف الشق المركزي.

- **striate c.** القَشْرَةُ المَحْطَطَةُ. القشرة البصرية الأولية، وهي قسم من قشرة الفص القذالي يستلم الشع البصري من الجسم الثفني الوحشي وهي مركز الحس البصري الأولي.

- **visual c.** القَشْرَةُ البَصْرِيَّة. باحة الفص القذالي المسؤولة عن حس البصر وتتكون من القشرة البصرية الأولية (باحة برودمان 17) والباحتين البصريتين الثانويتين (18 و 19).

cortical قَشْرِيّ. متعلق بالقشرة أو منسوب لها.

corticifugal صادر من القشرة. ينقل أو يتجه بعيداً عن القشرة.

corticipetal وارد للقشرة. ينقل أو يتجه نحو القشرة.

corticoafferent وارد للقشرة. ما ينقل الدفقات العصبية من المستويات السفلية للجهاز العصبي المركزي نحو قشرة المخ.

corticobulbar قَشْرِيّ بَصْلِيّ. منسوب إلى قشرة المخ والنخاع المستطيل أو يربط بينهما.

corticocerebral قَشْرِيّ مَخِيّ. منسوب لقشرة المخ.

corticodiencephalic قَشْرِيّ دِمَاعِيّ بَيْنِيّ. منسوب لقشرة المخ والدماع البيني أو يربط بينهما.

corticoefferent صَادِرٌ مِنَ القَشْرَةِ. ما ينقل الدفقات العصبية من قشرة المخ إلى المراكز السفلية من الجهاز العصبي المركزي.

corticopontine قَشْرِيّ جِسْرِيّ. منسوب لقشرة المخ والجسر أو يوصل بينهما.

corticospinal قَشْرِيّ نَخَاعِيّ. منسوب لقشرة المخ والنخاع الشوكي أو يوصل بينهما.

costa cervicalis (= rib, cervical) الضِّلْع الرّقِيَّة.

costalgia أَلَمُ الأَضْلاع. ألم في الأضلاع.

coup (= stroke) ضَرْبَةٌ.

- **c. de fouet** ضَرْبَةٌ الأَخْمَص. تمزق العضلة الاخمصية مع ألمها الشديد.

- **c. de sang** ضَرْبَةٌ إِحْتِقَانِيَّة. احتقان الدماغ.

- **c. de soleil (= sunstroke)** ضَرْبَةُ الشَّمْس.

coxalgia وَرَاك. ألم في منطقة الورك.

coxodynia (= coxalgia) وَرَاك. وجع الورك.

cramp مَقْصَص. تقلص عضلي تشنجي مؤلم وخصوصاً التشنج التوتري.

- **accessory c.** مَقْصَصُ الإِضَافِيّ. صَغَرٌ تولده آفة العصب الإضافي.

- **heat c.** مَقْصَصُ الحَرِّ. نوع من إنهك الحر يتصف بتشنج عضلي مؤلم مع توسع الحدقة وضعف النبض ويشاهد في العمال الذين يعملون في جو حار جداً أو في المناجم مع التعرق الشديد وفقدان الأملاح.

- **muscle c.** مَقْصَصٌ عَضَلِيّ. تقلص فجائي لإرادي لمجموعة من الألياف العضلية مع ألم موضعي شديد يتلو ارتخاء بطيء ثم يزول الألم. وهو ينتج عن تعب العضلة أو إقفارها أو نقص الملح.

- **nocturnal c.** مَقْصَصٌ لَيْلِيّ. معص يحدث أثناء الليل وغالباً أثناء النوم.

- **occupational c.** مَقْصَصٌ مِهْنِيّ. تشنج مؤلم في بعض العضلات التي تقوم بحركات مهنية معينة كمعص الموسيقيين أو الكتاب أثناء قيامهم بأعمالهم وحركاتهم.

- **recumbency c.** مَقْصَصُ الإِسْتِلْقَاء. تشنج مؤلم في عضلات القدم والساق يحدث أثناء الراحة والاستلقاء وغالباً ما يحدث أثناء النوم الخفيف.

- **writer's c.** مَقْصَصُ الكَاتِب. تشنج عضلات اليد عند استعمالها بالكتابة لمدة طويلة.

craniad نَحْوُ القَحْف؛ قَحْفِيًّا. متجه نحو القحف.

cranial قَحْفِيّ. متعلق بالقحف أو منسوب إليه.

craniamphitomy قَطْعُ مَحَاطِ القَحْف. قطع محيط القحف لتخفيف الضغط عن داخله.

craniectomy قَطْعُ القَحْف. قطع جزء من القحف.

craniocoele قَبْلَةُ قَحْفِيَّة. بروز أي قسم من محتويات القحف خلال عيب في أحد أقسامه.

- cranioclasia (= craniotomy)** شَذْحُ القَْخْفِ.
- cranioclast (= craniotome)** مَشْدَاخٌ؛ مَحْجَّاجٌ. آلةٌ جراحيةٌ لحجِّ القحف.
- cranioclasty (= craniotomy)** حَجُّ القَْخْفِ؛ شَذْحُ القَْخْفِ.
- craniograph** مِئْصَافُ القَْخْفِ. آلةٌ لتعيين حدود القحف وأبعاده.
- craniography** تَوْصِيفُ القَْخْفِ. تصوير القحف أو تخطيطه أو رسمه.
- craniomalacia** تَلَيُّنُ القَْخْفِ. تلين القحف الشاذ.
- craniomeningocele** قَيْلَةٌ سَحَائِيَّةٌ قَحْفِيَّةٌ. بروز السحايا من خلال عيب في جدار القحف.
- craniometer** مِقْيَاسُ الْجُمُجْمَةِ. آلةٌ تستعمل لقياس أبعاد الجمجمة.
- craniometry** قِيَاسُ الْجُمُجْمَةِ. قياس أبعاد الجمجمة والوجه.
- craniopathy** اِغْتِلَالُ الْجُمُجْمَةِ. أي مرض يصيب الجمجمة.
- metabolic c.** اِغْتِلَالُ الْجُمُجْمَةِ اِِسْتِقْلَافِيٌّ. مرض يتصف بأفات قبة القحف مع تغييرات استقلابية متعددة فيها يولد الصداع والسمنة واضطرابات البصر.
- craniopharyngioma** وَرَمٌ قَحْفِيٌّ بِلْعُومِيٌّ. ورم يتولد من البقية الأثرية للجراب القحفي البلعومي (جراب راتكة) والذي يتصف بارتفاع ضغط داخل القحف مع ترسب كلسيوم في محفظته أو في داخله ويسبب تخريباً موضعياً ولكنه لا ينتقل إلى باقي أقسام الرأس أو الجسم.
- craniophore** مَاسِكُ القَْخْفِ. آلةٌ تستعمل لمسك القحف وتثبيتها عند قياسه.
- cranioplasty** رَأْبُ القَْخْفِ. عمليةٌ تجرى لرأب القحف أو تقويم أي عيب فيه.
- craniopuncture** بَزْلُ القَْخْفِ. عمليةٌ بزل القحف.
- craniorachischisis** اِنْشِقَاقُ القَْخْفِ والسِّيسَاءِ. شق خلقي في القحف والعمود الفقري.
- cranosacral** قَحْفِيٌّ عَجَزِيٌّ. 1. منسوب للقحف والعجز. 2. منسوب للأعصاب اللاودية.
- cranioschisis** اِنْشِقَاقُ القَْخْفِ. شق خلقي في القحف.
- craniosclerosis** تَصَلُّبُ القَْخْفِ. ثَخَنُ عظام القحف.
- cranioscopy** تَنْظِيرُ القَْخْفِ. تنظير الرأس لتشخيص أمراضه.
- craniostenosis** تَضْيِيقُ القَْخْفِ. تشوه القحف الذي ينتج عن تعظم التداريز المبكر فيتوقف نموه ويتضيق.
- craniostosis** تَعْظُمُ الدُّرُوزِ الخَلْقِيِّ. تعظم الدُّرُوزِ الولادي.
- craniosynostosis** تَعْظُمُ الدُّرُوزِ البَاكِرِ. تعظم دروز القحف المبكر.
- craniotabes** ضُمُورُ القَْخْفِ. ضمور القحف وتلينه الشاذ بسبب نقص مواده اللاعضوية (المعدنية) ويحدث هذا الضمور عادة في المنطقتين القفوية والجدارية.
- craniotome** مَحْجَّاجٌ. آلةٌ تستعمل لقطع القحف.
- craniotomy** حَجُّ القَْخْفِ. 1. أية عملية جراحية تجرى في القحف. 2. عمليةٌ تجرى على رأس الجنين الميت لتصغيره ولتسهيل ولادته وذلك ببزل القحف وإفراغ محتوياته.
- craniotonoscopy** تَنْظِيرُ القَْخْفِ التَّسْمِعِيِّ. قرع القحف والسمع إليه بالسماعة.
- craniotopography** طُوبُوغَرَفِيَّةُ القَْخْفِ. دراسة أقسام سطح القحف وعلاقة كل منها بأقسام الدماغ التي تحته في داخل القحف.
- craniotrypsis** نَقَبُ القَْخْفِ. نقب القحف جراحياً.
- cranitis** اِلْتِهَابُ القَْخْفِ. التهاب عظام القحف.
- cranium** القَْخْفُ؛ الْجُمُجْمَةُ. الهيكل العظمي للرأس ويشمل كل عظام الجمجمة ما عدا الفك السفلي وهي العظام الثمانية التي تكون قبة القحف الذي يحوي الدماغ.

- **c. bifidum** قَحْفُ مَشْقُوق. قلع القحف الخلقي الظاهر.

- **c. bifidum occultum** قَحْفُ مَشْقُوق خَفِي. قلع القحف الخلقي الخفي من دون أن يرافقه أي تشوه في الدماغ أو السحايا ولا يمكن مشاهدته إلا بالتصوير الشعاعي.

- **cerebral c.** القَحْفُ الدِمَاجِي. قسم القحف الذي يكون الصندوق الذي يحوي الدماغ.

- **visceral c.** الجُمُجُمَةُ الحَشَوِيَّةُ: عظام الوجه، أقسام عظام الرأس التي تكون الهيكل العظمي للوجه وهي تشمل أيضاً الفك السفلي والعظم اللامي.

cremnophobia رُهَابُ المَهَاوِي. رهاب المهاوي والوديان والمرتفعات.

crenotherapy المُعَالَجَةُ بالمِياهِ المَعْدَنِيَّةِ. معالجة بالمياه المعدنية من الينابيع.

crest (= crista) عُرْف. بروز أو بنية بارزة أو حرف بارز خصوصاً ذلك الذي يبرز من العظم أو من حوافه.

cretinism قَدَامَةٌ. حالة مزمنة تنتج عن نقص خلقي في إفراز الغدة الدرقية وتتصف بتوقف النمو الجسمي والعقلي الشديد وحثل العظام والأقسام الرخوة وهبوط سرعة الاستقلاب الأساسي.

cribriform مِصْفُوفِي الشَّكْلِ. مثقّب وبشكل مصفاة.

cricoidynia وَجَعُ الغُضُرُوفِ الحَلَقِيّ. ألم في الغضروف الحلقي.

crisis نَوْبَةٌ. 1. تغير مفاجيء في تطور المرض. 2. تردّد انتيابي مفاجيء في أعراض المرض.

- **catathymic c.** نَوْبَةٌ هِياجِ نَفْسِيّ. نوبة هياج عنيف تتولد عن توتر نفسي غير محتمل.

- **cholinergic c.** نَوْبَةٌ كُولِينِيَّةُ الفِعْل. وهن عضلي يتولد عن إحصار بزوال الاستقطاب بسبب فرط جرعة مضاد الكوليستيراز المستعمل في معالجة الوهن العضلي الوبيل.

- **clitoris c.** نَوْبَةٌ بَظْرِيَّة. نوبة هياج جنسي تتولد عند النساء المصابات بالتابس الظهري.

- **laryngeal c.** نَوْبَةٌ حَنَجْرِيَّة. تشنج انتيابي في

الحنجرة في المراحل الأولى من مرض التابس الظهري.

- **myosthenic c.** نوبة ضيق. نوبة فجائية تتولد في الوهن العضلي الوبيل وتستمر النوبة عدة أيام مع حمى.

- **oculogyric c.** نَوْبَةٌ كَبَاتِ المَقْلَّة. نوبة تحدث في التهاب الدماغ الوبائي أو في الباركنسونية التالية لالتهاب الدماغ حيث تثبت العينان في وضع ثابت واحد لمدة دقائق أو ساعات.

- **parkinsonian c.** نَوْبَةٌ بَارِكِنْسونِيَّة. حالة تشاهد أحياناً في داء باركنسون تشبه الصُّمات اللاحركي أو السبات السهري حيث يرقد المريض من دون حركة ومن دون أي تواصل تلقائي مع محيطه.

- **Pel's c's.** نَوْبَاتُ بِل. نوبات ألم عيني شديد ومفاجيء في التابس الظهري.

- **pharyngeal c.** نَوْبَةٌ بَلْعُومِيَّة. نوبة مفاجئة تحدث في التابس الظهري تتصف بحس غريب في البلعوم مع حركات بلعية تلقائية.

- **rectal c.** نَوْبَةٌ مُسْتَقِيمِيَّة. نوبة ألم شديد في المستقيم في التابس الظهري.

- **renal c.** نَوْبَةٌ كَلَوِيَّة. نوبة ألم كلوي شبيه بالمفص الكلوي تحدث في التابس الظهري.

- **tabetic c.** نَوْبَةٌ تَابِسِيَّة. نوبة انتيابية من الألم مع اضطراب وظيفي تحدث في التابس الظهري.

- **vesical c.** نَوْبَةٌ مَثَانِيَّة. نوبة ألم مثاني شديد في مرض التابس الظهري.

- **visceral c.** نَوْبَةٌ حَشَوِيَّة. نوبة ألم برقي حاد في أحد الأعضاء في التابس الظهري.

crispation إِكْتِرَاز. تقلصات عضلية تشنجية أو اختلاجية بسيطة تولد إحساساً زاحقاً.

crista (= crest) عُرْف.

crus ساق؛ سَوِيْقَة. اسم عام يدل على بنية شبيهة بالساق.

- **c. cerebelli ad pontem (= pedunculus cerebellaris medius)** السَوِيْقَةُ المَحَنِيَّةُ الوَسْطِيَّة.

- **c. cerebri (= basis pedunculi cerebri)** قَاعِدَةُ سَوِيْقَةِ المَح.

- c. fornicis سَوِيْقَةُ الْقَبْو. أحد شريطي المادة البيضاء اللذين يتحدان ليكوّنا جسم القبر

cry صَرَخَةٌ. تصويت حنجري عالٍ لإرادي ومفاجئ.

- epileptic c. صَرَخَةُ الصَّرْع. صرخة عالية تطلق غالباً عند بدء نوبة الصرع.

- hydrocephalic c. صَرَخَةُ مَوِّهِ الرَأْس. صرخة عالية يطلقها الطفل المصاب بالتهاب السحايا الدرني الحاد.

cryalgisia أَلَمُ التَّبْرِيد. ألم يتولد عند وضع مادة باردة على الجسم.

cryanesthesia فَقْدَانُ حِسِّ البُرُودَةِ. خدر قري أو فقدان الحس للبرودة.

cryesthesia فَرْطُ حَسَّاسِيَّةِ البُرْد. فرط حس البرودة الشاذ.

crymoanesthesia التَّخْيِيعُ الْقَرِّي. أنظر anesthesia, refrigeration.

crymodynia أَلَمُ التَّبْرِيد. ألم روماتزمي يظهر عند التعرض للبرد أو للرطوبة.

cryotherapy (= cryotherapy) مُعَالَجَةٌ قَرِّيَّة.

cryoanalgesia تَسْكِينٌ قَرِّي. تسكين الألم باستعمال التبريد للأعصاب المحيطية بواسطة مسبار قري.

cryoprobe مِسْبَارٌ قَرِّي. آلة تستعمل لتطبيق البرودة الشديدة على الأنسجة.

cryosurgery جِرَاحَةٌ قَرِّيَّة. تدمير الأنسجة جراحياً باستعمال البرودة الشديدة التي تستعمل أحياناً في داخل القحف.

cryothalamectomy (= cryo-thalamotomy) قَطْعُ المِهَادِ الْقَرِّي.

cryothalamotomy قَطْعُ المِهَادِ الْقَرِّي. قطع جزء من المهاد باستعمال البرودة الشديدة.

cryptanamnesia (= cryptomnesia) تَذَكُّرُ الْخَفَايَا.

cryptesthesia (= clairvoyance) الإِسْتَبْصَارُ؛ إِذْرَاكُ الْخَفَايَا.

cryptic خَبِيْثِي. مخبا أو خفي.

cryptogenic خَفِي الْمَنشَأ. غير معروف أو مشكوك أو مجهول المنشأ أو السبب.

cryptomnesia تَذَكُّرُ الْخَفَايَا. تذكر الذكريات من دون معرفة أصولها القديمة فتظهر للشخص كأنها أفكار مختلفة وليست ذكريات حقيقية قديمة.

cryptophthalmos إِخْتِبَاءُ الْعَيْن. سوء تكون الجلد فوق العين وغياب الشق الجفني وهو عيب خلقي لا يظهر فيه أي أثر لتكون الجفنين.

CSF (= fluid, cerebrospinal) السَّائِلُ الدِّمَاغِي النُّخَاعِي.

cubitus (= elbow) المِرْفَق. المفصل الذي يفصل العضد عن الساعد.

- c. valgus مِرْفَقٌ أَرْوَح. تشوه المرفق الذي يؤدي إلى انحرافه بعيداً عن الخط الوسطي للجسم عند بسط الذراع عندما تكون راحة الكف متجهة للأمام.

- c. varus مِرْفَقٌ أَفْحَج. تشوه المرفق الذي يؤدي إلى انحرافه نحو الخط الوسطي للجسم عند بسط الذراع عندما تكون راحة الكف متجهة للأمام.

cul de sac, dural رُبْدَةُ الْجَافِيَّة. القسم الانتهائي من كيس الجافية.

culmen قُنَّة. قمة أو ذروة.

- c. cerebelli قُنَّةُ الْمُخْيِخ. جزء الفص الرأسي للمخيخ الذي يقع بالجهة الإنسية بين الفصيص المركزي والشق الأولي.

cuneus الإِسْفِين. فصيص إسفيني الشكل في الفص القذالي للمخ وعلى جهته الإنسية بين التلمين الجداري القذالي والمهمازي.

curare (= curari) كُورَارِي. مادة تستخلص من بعض النباتات كانت تستعمل كسم للسهم أما الآن فإنها تستعمل كدواء لتقليل التشنج في الكزاز وفي الشلل التشنجي والحالات المشابهة. وتستعمل كذلك مع بعض المبنجات لتقليل توتر العضلات في التبنج العام.

curaremmimetic مُحَاكِي الْفَعْلِ الْكُورَارِي. مادة تولد تأثيراً مماثلاً لعمل الكوراري.

curariform شَبِيهَةُ الْكُورَارِي. مادة شبيهة بالكوراري.

curarization كَوْرَزَة. إدخال الكوراري للجسم وإشباعه للحد الذي يولد تأثيره الفيزيولوجي فيه.

current تَيَّار. 1. الجريان الكهربائي في السلك أو المجري الموصل له 2. أية مادة تجري.

- abnerval c. تَيَّارُ عَصَبِيٍّ مُعْشَأ. تيار يمر من الليف العصبي إلى العضلة وخلالها.

- action c. تَيَّارُ الْفَعْلِ. التيار الذي يولده جهد الفعل في غشاء الخلية العصبية أو العضلية والذي يعمل على إزالة استقطاب المناطق المجاورة فينبهها وبهذا يعمل على جريان الدفعة العصبية أو العضلية على طول الليف.

- electrotonic c. تَيَّارُ التَّوَثُرِ الْكَهْرَبَائِي. تيار يولده تيار آخر أو جهد الفعل في عصب مجاور يمر خلال القسم الموصل للعصب.

- c. of injury تَيَّارُ الْإِصَابَةِ. التيار الذي يمر بين المناطق المصابة والمزالة الاستقطاب من الأنسجة الهيوجة إلى الأنسجة السوية المستقطبة وتكون الأنسجة المصابة في هذه الحالة سالبة بالنسبة للأنسجة السليمة.

- nerve-action c. (= action c.) تَيَّارُ الْفَعْلِ الْعَصَبِيِّ.

curve مُنْحَنِي. خط لزاوي.

- audibility c. مُنْحَنِي الْمَسْمُوعِيَّة. منحني يبين العلاقة بين ذبذبات الصوت وأقل شدة لها تولد حساً سمعياً.

- strength-duration c. مُنْحَنِي الشِّدَّة - المُدَّة. منحني يبين العلاقة بين شدة المنبه وأقل مدة لازمة له لكي يولد استجابة من العضو أو النسيج المستثار.

cycle دَوْرَة. عمليات أو ظواهر متتالية تعاود في فترات منتظمة وبنفس التتالي.

- estrous c. دَوْرَةُ الْوَدَاق. دورة معاودة الوداق في الإناث البالغات والتغيرات التي ترافقها في الجهاز التناسلي.

- sleep-wakefulness c. دَوْرَةُ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ. دورة النوم واليقظة في اليوم الواحد والتي تختلف باختلاف الأعمار.

cyclobarbital سَيْكْلُو بَارْبِيْتَال.

دواء من مجموعة الباربيتورات، قصير الفعل، يستعمل كمخدر عن طريق الفم.

cyclocephalus (= cyclops) مُصَقِّلَبُ الرَّأْس. مصاب بتصلب الرأس.

cyclocephaly تَصَقُّلَبُ الرَّأْس. عاهة خلقية شاذة تتصف باندماج العينين ونصفي كرة المخ.

cycloid دَوْرِي الْمَزَاج. مصاب يتصف بتعاقب حالاته النفسية المتباعدة من الكآبة التي يعقبها الهياج وهي حالة أخف من الذهان الهوسي الاكتئابي.

cyclopia (= cyclocephaly) تَصَقُّلَبُ الرَّأْس.

cyclothymia دَوْرِيَّةُ الْمَزَاج. حالة تتصف بشذوذ المزاج وتتصف بفترات كآبة تتعاقب مع فترات هوس خفيف.

cyclothymia دَوْرَوِي الْمَزَاج. مصاب بدورية المزاج.

cymbocephalia (= scaphocephaly) تَرَوْرُقُ الرَّأْس.

cynocephalic كَلْبِي الرَّأْس. له رأس شبيه برأس الكلب.

cynophobia رُهَابُ الْكَلَاب. الخوف من الكلاب.

cyst كَيْسَة. (ج: كيسات). كيس مغلق طبيعي أو شاذ مبطن ببطانة ويحوي سائلاً خفيفاً أو كثيفاً أو نصف صلب.

- arachnoid c. كَيْسَةُ الْعَنْكَبُوتِيَّة. كيسة مليئة بالسائل بين طبقات السحايا الرقيقة ومبطنة بغشاء العنكبوتية وتوجد غالباً في شق سلفيان في المخ.

- hydatid c. كَيْسَةُ عُذَارِيَّة. مرحلة الكيسة اليرقية للدودة الشريطية للمشوكة الشريطية وتحوي الكيسة كيسيئات ثانوية تحوي كل منها عدة رويسات، ويمكن

أن تتوضع هذه الكيسات في عدة مواضع أو أعضاء في الجسم وفي الجهاز العصبي المركزي أو في القحف.

- **neural c.** كَيْسَةٌ عَصَبِيَّةٌ. كيسة أو بنية شبيهة بها تتوضع في الجهاز العصبي المركزي.
- **neurenteric c.** كَيْسَةٌ عَصَبِيَّةٌ حَشَوِيَّةٌ. كيسة تتوضع في المنصف الخلفي تحوي أنسجة من الجهاز العصبي ومن أعضاء أخرى وتتصل بالأم الجافية للنخاع.
- **perineurial c.** كَيْسَةٌ ظَهَارَةٌ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّةِ. بروز كيسي من الحيز حول الحزمة العصبية وعلى الجزء خارج الجافية من الجذور الخلفية للأعصاب العجزية والعصعصية عند منطقة اتصال الجذور بالعقد وقد تؤدي إلى ألم أسفل الظهر أو عرق النساء

cystalgia أَلَمُ المَثَانَةِ. ألم في المثانة.

cysticercosis دَاءُ الكَيْسَانِيَّاتِ المَذْنُبَةِ. الإصابة بالكيسانيات المذنبة حيث تخترق يرقاتها جدار الأمعاء وتهاجم مختلف أنسجة الجسم وأعضائه ومنها العين والدماغ فتولد الصرع وارتفاع الضغط داخل القحف والكثير من الأعراض العصبية الأخرى.

cystoplegia شَلْلُ المَثَانَةِ.

cystospasm تَشَنُّجُ المَثَانَةِ.

cytoarchitecture التَّهْنِيسُ الخَلَوِيّ.

تنظيم وترتيب الخلايا المختلفة في العضو وخصوصاً خلايا قشرة المخ.

D

dacryadenalgia (= dacryoadenalgia)
أَلَمُ الغَدَّةِ الدُّمْعِيَّةِ.

dacryocystalgia أَلَمُ كَيْسِ الدَّمْعِ: أَلَمُ المَدْمَعِ.

dactylocampsodynia تَنَبُّصُ الأصَابِعِ المؤَلِمِ.

dactylogy التَّوَاصُلُ بِإِشَارَاتِ اليَدِ. استعمال حركات الأصابع واليدين كواسطة للتواصل والتفاهم مع الآخرين.

dactylophasia (= dactylology)
التَخَاطُبُ بالأصابع.

dactylospasm تَشَنُّجُ الإصْبَعِ. تشنج أو مخص أحد أصابع اليد أو القدم.

dantrolene دَانْتْرُولِين. دواء يستعمل كمرخ للعضلات الهيكلية وكمضاد للتشنج في الصدمات والتصلب المتعدد والشلل المخي.

deaf أَصَمٌّ. (ج: صُمٌّ). مصاب بالصمم أي معدوم السمع أو ثقيله.

deafferntation تَغْطِيلُ الوَاردِ. حصر الدفعات العصبية الواردة بقطع الأعصاب الحسية.

deaf-mute أَكْبَمٌ. (ج: بُكْمٌ). شخص لا يتمكن من السمع أو الكلام.

deaf-mutism بُكْمٌ. فقدان حاسة السمع مع عدم المقدرة على الكلام.

deafness صَمَمٌ. فقدان حاسة السمع.

- acoustic trauma d. صَمَمٌ الرُّضْحِ الصوتي. صمم يتولد عن الإصابة المولدة عن الانفجارات.

- apoplectiform d. صَمَمٌ سَكْنِي الشَّكْلِ. داء ماينر يبدأ فيه الصمم بصورة مفاجئة ثم تتموج شدته

حتى يشتد كثيراً ويؤدي في النهاية إلى الصمم التام الدائم.

- bass d. صَمَمٌ الجَهْدِ. عدم سماع بعض الموجات الصوتية الواطنة النغمية.

- boilermakers d. صَمَمٌ صَانِعِي الغَلَايَاتِ. صمم يصيب العمال الذين يعملون في أمكنة ترتفع فيها شدة الضجيج كعامل صنع الغلايات المعدنية.

- central d. صَمَمٌ مَرْكَزِيٌّ. صمم بسبب آفة في السبل العصبية السمعية المركزية.

- conduction d. صَمَمٌ النَّاقلِيَّةِ. صمم بسبب عيب في السبل الناقلة للصوت أي القناة السمعية الظاهرة والأذن الوسطى.

- cortical d. صَمَمٌ قَشْرِيٌّ. صمم تسببه آفة في المنطقة السمعية في القشرة المخية.

- functional d. صَمَمٌ وَظِيفِيٌّ. صمم ظاهر من دون أية آفة عضوية.

- hysterical d. صَمَمٌ هِسْتِيرِيٌّ؛ صَمَمٌ هُراعيٌّ. صمم يظهر ويختفي في مريض هستيري من دون أي سبب واضح.

- labyrinthine d. صَمَمٌ بَيْهِيٍّ. صمم بسبب آفة في التيه.

- Michel's d. صَمَمٌ مَائِكِل. صمم خلقي بسبب عدم تخلق الأذن الداخلية.

- midbrain d. صَمَمٌ دِمَاعِيٍّ وَسَطِيٍّ. صمم بسبب آفة في السقيفة تصيب السبل السمعية.

- nerve d. (= neural d.) صَمَمٌ عَصْبِيٍّ. صمم بسبب آفة في العصب السمعي أو في السبل العصبية السمعية المركزية.

- organic d. صَمَمٌ عَضْوِيٌّ. صمم بسبب آفة عضوية في الأذن أو في الجهاز السمعي.

- paradoxical d. صَمَمٌ مُتَنَاقِضٌ. صمم جزئي يكون فيه السمع أحسن بوجود الضجيج والصخب العالي.

- perceptive d. (= sensorineural d.) صَمَمٌ الإِدْرَاك. صمم حسّي عَصَبِي. صمم ينتج عن آفة في القسم الحسي السمعي في القوقعة أو في العصب السمعي أو في السبل السمعية المركزية أو في مجموعة من هذه الإصابات.

- postlingual d. صَمَمٌ بَعْدَ التَّكَلُّم. صمم يتولد لدى الشخص بعد تعلمه التكلم.

- prelingual d. صَمَمٌ قَبْلَ التَّكَلُّم. صمم يصيب الطفل خلقياً أو قبل تعلمه التكلم.

- sensorineural d. صَمَمٌ حَسِّي عَصَبِي. صمم ينتج عن آفة في القسم الحسي السمعي في القوقعة أو في العصب السمعي أو في السبل السمعية المركزية أو في مجموعة من هذه الإصابات.

- tone d. صَمَمٌ النَّعْم. amusia, sensory. انظر

- toxic d. صَمَمٌ تَسَمُّمِي. صمم يتولد بالتسمم بإحدى المواد السامة.

- transmission d. (= conduction d.) صَمَمٌ نَاقِلِي. صمم يتولد بالتسمم بإحدى المواد السامة.

- vascular d. صَمَمٌ وَعَائِي. صمم بسبب آفة الأوعية الدموية للأذن الداخلية.

- word d. (= auditory aphasia) صَمَمٌ الكَلِمَات. نوع من الحبسة الإدراكية يسمع فيها المريض الكلمات بوضوح ولكنه لا يدرك مدلولاتها بسبب آفة في المراكز السمعية في المخ.

death مَوْتُ. توقف الوظائف الحيوية بصورة تامة وأبدية.

- apparent d. مَوْتُ ظَاهِرِي. توقف الفعاليات الجسمية بصورة تامة ولكن بالإمكان إنعاش المريض وإعادة الحياة إليه.

- brain d. مَوْتُ الدِّمَاغ. عطب دماغي دائم غير عكوس يتصف بعدم الاستجابة التامة للمنبهات وغياب الفعاليات العضلية الإرادية والتلقائية وحتى التنفسية والارتعاشية وتساوي الكهربية في المخطط الكهربائي للدماغ لمدة 30 دقيقة. ومن الضروري التأكد من أن ذلك كله غير ناتج عن تبريد الجسم أو عن مخدّمات الجهاز العصبي المركزي قبل إصدار القرار بتشخيص موت الدماغ.

- functional d. مَوْتُ وَظِيفِي. تلف الجهاز العصبي المركزي التام والدائم مع الاحتفاظ بالوظائف الحيوية بالطرق الصناعية كالتنفس الاصطناعي.

debility ضَعْفٌ. فقدان القوة الجسمية أو نقصانها.

decerebellation فَصْلُ المُخِيخ. إزالة المخيخ أو إتلافه.

decerebrate فَصْلُ المُخ. 1. توقّف الفعاليات المخية بفصل المخ بقطع جذع الدماغ بين الأكميات العلوية والنوى الدهليزية أو بربط الشرايين السباتية الباطنة والشريان القاعدي عند وسط الجسر. 2. حيوان مفصول المخ. 3. شخص أصيب بتلف دماغي ويظهر أعراضاً شبيهة بتلك التي يظهرها حيوان مفصول المخ.

decerebration فَصْلُ المُخ. عملية فصل المخ.

decibel ديسيبل. وحدة قياس شدة القدرة أو شدة الصوت. وهي عُشر البل.

declive (= declivis) الحَذَرَة. جزء دودة المخيخ على الجهة الذنبية من الشق الأولي.

decompensation لَأْمْعَاوَضَة. في الطب النفسي هي فشل الآليات الدفاعية للفرد التي تولد تداعي الشخصية التدريجي والمتروقي.

decomposition تَفَكُّكُ الحَرَكَات. قلة أو عدم تناسق الحركات العضلية والتي تتصف بعدم انتظام ثني المفاصل وبسطها المتعاقبين عند حركة الأطراف.

decompression تَخْفِيفُ الضَّغْط. إزالة الضغط أو تخفيفه.

- cerebral d. تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ الدِّمَاغ. إزالة سبيلة من القحف وشق الجافية لتخفيف ضغط داخل القحف.

- nerve d. تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ العَصَب. تخفيف أو إزالة الضغط عن العصب جراحياً بإزالة النسيج أو العظم المسبب لذلك الضغط.

- spinal cord d. تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ النُّخَاع. تخفيف الضغط جراحياً عن النخاع الشوكي.

- suboccipital d. تَخْفِيفُ الضَّغْطِ تَحْتَ

- القَذَالِي. تخفيف الضغط داخل القحف بقطع قطعة من العظم القذالي والجافية التي تحتها.
- subtemporal d. تخفيف الضغط تحت الصدغي. تخفيف الضغط داخل القحف بفصل قطعة من العظم الصدغي وفتح الجافية التي تحتها.
- trigeminal d. تخفيف الضغط عن ثلاثي التوائم. تخفيف الضغط عن جذور العصب ثلاثي التوائم وعقده العصبية.
- deconditioning** إزالة الإشرط؛ إزالة التكيف. إزالة المنعكس الشرطي أو الاستجابة الشرطية.
- decortication** تقشير. إزالة قسم أو أقسام من قشرة المخ جراحياً.
- decubitus** استلقاء. حالة أو وضع الاستلقاء.
- d. acutus الناقبة الحادة. ناقبة أو قرحة الاستلقاء الوبيلة التي تتولد على جهة المريض المشلولة.
- dorsal d. استلقاء. الاستلقاء على الظهر.
- lateral d. اضطجاع. الاستلقاء على الجنب.
- d. ulcer الناقبة؛ قرحة الاستلقاء. القرحة التي تتكون عند استلقاء المريض لفترة طويلة في وضع واحد في مناطق الانضغاط كما يحدث في الشلل.
- ventral d. انبطاح. الاستلقاء على البطن.
- decussatio (= decussation)** تصالب.
- decussation** تصالب. (ج: تصالبات). تعابر بنيتين متناظرتين على شكل X.
- d. of cranial cerebellar peduncles تصالب السويقتين المخيخيتين القحفيتين. تعابر ألياف السويقتين المخيخيتين القحفيتين في داخل سقيفة الدماغ المتوسط.
- d. of fillet (= d. of medial lemnisci) تصالب فتيلي. تصالب الفتيل الإنسي.
- Forel's d. تصالب فوريل. التصالب السقيفي البطني للسبيل الحماروي النخاعي والسبيل الحماروي الشبكي في الدماغ المتوسط.
- d. of medial lemnisci تصالب الأفتلة الإنسية. منطقة النهاية الذنبية للنخاع المستطيل حيث تتصلب الألياف الواردة من النواة الإسفينية مع ألياف النواة الناحلة عند عبورهما الخط الوسطي قبل أن تتسلك

باسم الفتيل الإنسي.

- motor d. (= pyramidal d.) التصالب الحركي؛ تصالب الأهرام.
- optic d. (= optic chiasm) التصالب البصري.
- pyramidal d. تصالب السبيلين الهرميين؛ تصالب الأهرام. القسم الأمامي السفلي من النخاع المستطيل (البصلة) حيث يتصلب الهرمان (السبيلان الهرميان) عند عبورهما الخط الوسطي قبل أن يهبطا باسم السبيلين القشريين النخاعيين وهما سبيلان حركيان.
- d. of superior cerebellar peduncles (= d. of cranial cerebellar peduncles) تصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين.
- tegmental d's. التصالبات السقيفية. تعابر الألياف العصبية في الدماغ المتوسط وتشمل التصالبات السقيفية البطنية للسبيل الحماروية النخاعية والحماروية الشبكية والتصالبات السقيفية الظهرية للسبيل السقيفي النخاعي.
- trochlear d. تصالب البكري. تصالب ألياف العصب البكري في الشراع البصلي العلوي.
- dedolation** 1. حس التكدّم 2. جلف.
1. حس شبيه بحس وجود كدمة أو رض في الساق. 2. إزالة شريحة جلدية رقيقة بقطع مائل.
- defatigation** إرهاق؛ فرط الإجهاد. تعب عضلي أو عصبي شديد.
- defect** عيب. فشل أو غياب أو نقص إحدى الوظائف أو البنات.
- neural tube d. غيب القناة العصبية. شذوذ خلقي يؤدي إلى غياب الدماغ أو إلى السنسنة المشقوقة.
- defibrillation** إزالة الرجفان. إزالة الرجفان الأذيني أو البطيني والذي يجري عادة بالصدمة الكهربائية المباشرة.
- deficiency** عوز. (ج: أغواز). نقص أو عيب.
- mental d. قصور عقلي؛ تخلف عقلي. انظر retardation, mental.
- deformity** تشوّه. (ج: تشوّهات). شوه قسم من الجسم أو شوه عام فيه.
- Arnold-Chiari d. تشوّه أرنولد - جيارى. تشوّه خلقي يكون فيه النخاع المستطيل (البصلة) مسطحاً

ومطوياً ويمتد مع المخيخ ليبرز إلى داخل القناة الشوكية من خلال الثقبة الكبيرة، وقد يترافق ذلك مع بعض التشوهات الأخرى في الجهاز العصبي المركزي مثل السنسنة المشقوقة.

degeneracy تَنَكُّسِيَّة. عملية التَنَكُّس أو حالة التَنَكُّس نفسها.

degenerate 1. تَنَكَّسَ 2. مُتَنَكَّسَ. 1. أصيب بالتَنَكُّس 2. شخص مختل عقلياً أو جسمياً أو منحل خلقياً.

degeneration تَنَكُّس. تَرَدُّ من حالة إلى أخرى أوطأ أو أسوأ منها خصوصاً تردي بنية أو شكل أحد الأنسجة أو الأعضاء.

- ascending d. تَنَكُّسٌ صَاعِدٌ. تنكس ولري يصيب عصباً وارداً ويتقدم تدريجياً نحو النخاع الشوكي أو الدماغ. انظر Wallerian d.

- axonal d. تَنَكُّسٌ مِخْوَارِي. استجابة الخلية لإصابة محاورها التي تتكون من انحلال الكروماتين المركزي وانحسار نواتها عن المركز.

- cerebromacular d. تَنَكُّسٌ دِمَاعِيٌّ بَقَعِيٌّ. تنكس بعض الخلايا الدماغية وخلايا بقعة شبكية العين.

- cerebromacular d. (= cerebromacular d.) تَنَكُّسٌ دِمَاعِيٌّ شَبَكَوِيٌّ.

- corticostriatal-spinal d. تَنَكُّسٌ قَشْرِيٌّ مِخْوَارِيٌّ. اعتلال دماغي عدواني يصيب الأشخاص متوسطي العمر يتصف بتنكس جزئي في السبيلين الهرمي وخارج الهرمي مع خرف مترق وضمور العضلات والرعاش والكنع والرتة التشنجية.

- descending d. تَنَكُّسٌ نَازِلٌ. تنكس ولري في الأعصاب النازلة أو الصادرة يتجه من المركز في الأعصاب نحو المحيط. انظر Wallerian d.

- fascicular d. تَنَكُّسٌ حَزَمِيٌّ. تنكس العضلات المشلولة بسبب آفة في الخلايا العصبية الحركية في المادة السنجابية للنخاع.

- gray d. تَنَكُّسٌ سِنْجَابِيٌّ. تنكس مادة النخاع الشوكي البيضاء تفقد فيه نخاعينها فيصبح لونها سنجابياً.

- hepatolenticular d. تَنَكُّسٌ كَبِدِيٌّ دَنَسِيٌّ. انظر disease, Wilson's.

- neurosomatic d. تَنَكُّسٌ عَصَبِيٌّ جَسَدِيٌّ. تنكس دماغي منتشر ينتج عن نوبات صرعية شديدة ومتلاحقة وقد يتولد عن عوز الأكسجين في الدماغ. ويتصف سريرياً بالخرف والتشنج وحالة شبيهة بالباركنسونية.

- Nissl's d. (= axonal reaction) تَنَكُّسٌ نَيْسِل. تنكس الخلية العصبية بعد قطع أليافها العصبية.

- primary progressive cerebellar d. تَنَكُّسٌ مَخِيجِيٌّ أَوَّلِيٌّ مُتَرَقٍ. مرض عائلي يتصف باضطرابات حركية ينتج عن تنكس المخيخ في البالغين بين سن 30-40 عاماً ويتدق تدريجياً حتى نهايته المميتة.

- retrograde d. (= axonal reaction) تَنَكُّسٌ رُجُوعِيٌّ. سلسلة العمليات التَنَكُّسِيَّة التي تتم في الخلية العصبية بعد قطع محاورها.

- secondary d. (= wallerian d.) تَنَكُّسٌ ثَانَوِيٌّ. تَنَكُّسٌ وَلَرِيٌّ.

- spongy d. of central nervous system التَنَكُّسُ الإسْفَنْجِيُّ لِلجِهَازِ العَصَبِيِّ المَرْكَزِيِّ. حثل المادة البيضاء الوراثي الجسدي في الأطفال الذي يتصف بزوال النخاعين المنتشر مع تشكل فجوات في المادة المخية البيضاء مما يولد مظهراً إسْفَنْجِيًّا مع تخلف عقلي شديد وضخامة الرأس ورنى العضلات الرقبية وتشنج الذراع والساق والعمى والموت في حوالي الشهر الثامن عشر من العمر.

- subacute combined d. of spinal cord تَنَكُّسُ النُخَاعِ المُشْتَرَكِ دُونَ الحَادِ. تنكس العمودين الخلفي والرحشي للنخاع الشوكي ينتج عن عوز الفيتامين B₁₂، وهو مرض مترق و يترافق مع فقر الدم الوبيل ويتصف بالمدل والرنج وعدم استقرار المشية واضطرابات عاطفية.

- transneuronal d. تَنَكُّسٌ عَبْرَ العَصَبُونَاتِ. ضمور بعض العصبونات عند قطع المحاويز الواردة لها أو موت العصبونات التي تستلم منها محاويز واردة.

- traumatic d. تَنَكُّسٌ رَضَجِيٌّ. تنكس القسم المحيطي من الليف العصبي المقطوع حتى أقرب عقدة رانفير من موقع القطع.

- **Türck's d.** تَنْكُسُ تُورَك. تنكس متني ثانوي للسبل العصبية للنخاع الشوكي
- **wallerian d.** تَنْكُسُ وَلْرِي. تنكس شحمي ليف العصب الذي قطع عن خليته المغذية له.
- **Wilson** Wilson's disease. تَنْكُسُ وَلْسَن. انظر
- **Zenker's d.** تَنْكُسُ زَنْكِر. موات وتنكس هيايني يصيب العضلات المخططة.

1. تَنْكُسِي 2. مُنْكَس. ما يتصف degenerative بالتتكس أو مصاب به.

delinquent جَانِح. (ج: جَانِحُونَ). شخص غير ملتزم بالقوانين أو مهمل لواجباته القانونية.

- **juvenile d.** حَدَثُ جَانِح. حدث ينتهك القوانين ويخرقها حسب قوانين الأحداث بينما يعتبر انتهاك البالغين لنفس القوانين جرائم عادية.

delirium هَذْيَان. اضطراب عقلي عضوي حاد وعكوس يتصف بعدم القابلية على تركيز الانتباه على المنبهات الخارجية وعدم تناسق التفكير والهذيان وضعف الوعي والتوهم واضطراب النوم وتوهان زمني ومكاني وضعف الذاكرة. وهو يتولد عن اضطراب استقلاب الدماغ بسبب التسمم أو العدوى العامة أو رضح الرأس أو الاضطرابات الاستقلابية أو فشل الكبد أو الكلية.

- **abstinence d.** هَذْيَانُ الْإِمْتِنَاع. هذيان يتولد عن الانقطاع عن تناول الكحول أو المخدرات عند مدمنها.
- **active d.** هَذْيَانُ فَعَال. هذيان يتصف بهياج وفرط الفعاليات النفسية الحركية والتملل وتنفذ الاغذية
- **acute d.** هَذْيَانُ حَاد. هذيان مفاجيء وشديد يدوم لفترة قصيرة.
- **d. alcoholicum (= d. tremens)** هَذْيَانُ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكُحُول.

- **alcohol withdrawal d. (= d. tremens)** هَذْيَانُ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكُحُول: هَذْيَانُ ارْتِعَاشِي.
- **exhaustion d.** هَذْيَانُ الْإِنْهَاق. هذيان يتولد عن الإجهاد أو عن الاضطرابات التغذوية الاستقلابية.
- **febrile d.** هَذْيَانُ الْحُمَى. الهذيان الذي يرافق الحمى العالية.

- **low d.** هَذْيَانُ هَادِيء. هذيان يتصف بالتخليط الفكري وبطء الفعاليات العقلية من دون هيجان.

- **macromaniacal d. (= macroptic d.)**

هَذْيَانُ الضَّخَامَةِ. توهم المصاب بأن جسمه كله أو بعض أقسامه قد تضخم تضخماً كبيراً.

- **micromaniacal d., microptic d.** هَذْيَانُ الصَّغَاوَةِ. توهم المصاب بأن جسمه كله أو بعض أقسامه قد تقلص أو تلاشى كلياً.

- **organic d.** هَذْيَانُ عُضْوِي. هذيان يتولد عن آفة عضوية في الدماغ.

- **post-traumatic d.** هَذْيَانُ بَعْدَ الرُّضْح. هذيان يتلو إصابة الرأس بالرُّضْح.

- **senile d.** هَذْيَانُ شَيْخُوخِي. متلازمة تصيب الشيوخ متقدمي السن تتصف ببداية حادة وتوهان وتملل وارق وهلوسة وقد يترافق ذلك مع الذهان الشيخوخي.

- **toxic d.** هَذْيَانُ تَسْمُمِي. هذيان يتولد عن التسمم بمادة سامة.

- **traumatic d.** هَذْيَانُ رُضْحِي. هذيان يتلو إصابة الرأس الشديدة وقد يظهر المريض لأول وهلة بأنه يقظ ومتنبه ولكنه مصاب بالتوهان الشديد وعيب الذاكرة والتخريف.

- **d. tremens** هَذْيَانُ ارْتِعَاشِي. هذيان ينتج عن التوقف أو الإقلال من تناول الكحول لدى المدمنين عليه لفترة لا تقل عن عشر سنوات وخصوصاً عندما يكون الإدمان مفرطاً. ويتصف بفرط الفعل العصبي الذاتي كتسرع القلب والتعرق وارتفاع ضغط الدم والارتعاش غير المنتظم والشديد والتوهم والهلوسة وسلوك وحشي هيجاني. ويبدأ هذا الهذيان بعد 2-3 أيام بعد الانقطاع عن الكحول كما أنه يدوم لفترة حوالي 3-4 أيام.

delphinine دِلْفِينِين. دواء يستعمل خارجياً لتسكين الآلام في الألم العصبي والشلل والروماتزم.

delusion تَوْهُم. اعتقاد خاطيء لا يمكن تصحيحه بالمنطق والحجة والمناقشة والإقناع بالرغم من عدم مشاركة الآخرين المحيطين بالمصاب في اعتقاده الخاطيء.

- **autopsychic d.** تَوْهُمُ نَفْسِي ذَاتِي. توهم

- الشخص عن أمور تخص جسده وشخصيته ولا تتعلق بالأمور الخارجة عنه.
- **bizarre d.** **تَوْهُمُ التَّفَاهَةِ.** توهم المريض بأنه سخي وناقص
- **control d. (= d. of being controlled)** **تَوْهُمُ السَّيْطَرَةِ.** توهم المريض بوجود شخص أو قوة خارجية مؤثرة تسيطر عليه وعلى كل أفكاره ومشاعره وأعماله
- **depressive d.** **تَوْهُمُ إِكْتِنَابِي.** توهم مترافق مع مزاج كئيب مولد عن الشعور بأنه مضطهد بسبب عدم كفاءته أو أخطائه ويتولد أحياناً عن التوهم بالإصابة بأحد الأمراض أو بالفقر.
- **encapsulated d.** **تَوْهُمُ مُمَحْفَظ.** توهم ذاتي ليس له أي تأثير على سلوك الفرد.
- **expansive d. (= d. of grandeur)** **تَوْهُمُ العَظَمَةِ.**
- **d. of grandeur (= grandiose d.)** **تَوْهُمُ العَظَمَةِ.** توهم الشخص المبالغ بأنه مهم أو ذو سلطة أو معرفة فائقة أو أن له تأثيراً على شخص كبير متنفذ أو له علاقة حميمة معه أو أنه جميل الشكل وجذاب لدرجة لا تضامى ولا تقاوم.
- **d. of guilt** **تَوْهُمُ الذَّنْبِ.** التوهم بالمسؤولية عن أي أذى أو شقاء يصيب الآخرين بسبب أخطائه السابقة.
- **infidelity d.** **تَوْهُمُ الْخِيَانَةِ.** التوهم بخيانة الزوجة أو الرفيق الجنسي له.
- **d. of influence** **تَوْهُمُ السَّيْطَرَةِ.** التوهم بوجود قوى خارجية تسيطر على أفعاله ولا يمكنه مقاومتها.
- **mood congruent d.** **تَوْهُمُ مُنْسَجِمٍ مَعَ الْمَزَاجِ:** توهم مترافق مع المزاج. توهم يظهر كعرض لمزاج الشخص المضطرب.
- **mood incongruent d.** **تَوْهُمُ غَيْرِ مُنْسَجِمٍ** مع المزاج. توهم يظهر كعرض لاضطراب نفسي.
- **d. of negation (= nihilistic d.)** **تَوْهُمُ الْعَدَمِ.** **تَوْهُمُ عَدَمِي:** تَوْهُمُ إِنْكَارِي. توهم مكتب يتصف بأن النفس أو الجسد أو جزء منهما أو الأشخاص الآخرين أو حتى العالم كله توقف عن الوجود أو غير موجودين أصلاً.
- **paranoid d's.** **أَوْهَامٌ زَوْرَانِيَّةٌ.** توهم العظمة أو توهم الاضطهاد.

- **persecution d.** **تَوْهُمُ الإِضْطِهَادِ.** توهم الشخص بأنه مضطهد مهاجم أو ملاحق أو مغشوش أو متآمر عليه.
- **persecutory d. (= persecution d.)** **تَوْهُمُ الإِضْطِهَادِ.**
- **d. of poverty** **تَوْهُمُ الْفَقْرِ.** توهم الشخص بأنه فقير المال والحال أو أنه سيصبح كذلك عاجلاً.
- **d. of reference** **تَوْهُمُ الْعِلَاقَةِ.** توهم المريض وقناعاته بوجود علاقة نوعية خاصة بين الأحداث الجارية حوله وتصرفات الآخرين كأنها تعنيه مباشرة ولها مغزى يشير إليه شخصياً.
- **d. of sin (= delusion of guilt)** **تَوْهُمُ الْخَطِيئَةِ.**
- **somatic d.** **تَوْهُمُ جَسَدِي.** توهم المصاب بوجود تغير في أحد أعضاء جسم المصاب أو في وظائفه
- **systematized d's.** **أَوْهَامٌ مُتَرَابِطَةٌ.** مجموعة من الأوهام مجتمعة ومنسقة حول موضوع خاص.
- **unsystematized d's.** **أَوْهَامٌ غَيْرُ مُتَرَابِطَةٍ.** أوهام غير منطقية ومتفرقة وغير مترابطة ومفلوطة.
- خَرْف. (ج. خَرْفُونَ.) (= demented)** **dement** شخص مصاب بالخرف.
- خَرْف. اضطراب عقلي عضوي** **dementia** يتصف بفقدان عام للنشاط الفكري الذي يشمل ومن الذاكرة وضعف التفكير المجرد وعدم التحكم العقلي مما يولد تغييراً في الشخصية. ولا يتولد أي من هذه الاضطرابات عن تغييم الوعي (كما هو في الهذيان) أو الاكتئاب ولكنه يتولد عن إصابة عضوية أو وظيفية مخية مختلفة.
- **alcoholic d.** **خَرْفٌ كُحُولِي.** خرف يتولد عن الإدمان الطويل والمفرط للكحول.
- **Alzheimer's d.** **خَرْفُ الزَّهَائِمَرِ.** انظر Alzheimer's disease.
- **Binswanger d.** **خَرْفٌ بِنْزَفَانْفَر.** خرف تنكسي يبدأ قبل الشيخوخة وينتج عن زوال النخاعين من مادة الدماغ البيضاء تحت القشرية وتصاحبه تغيرات تصلبية في الأوعية الدموية الدماغية.
- **boxer's d. (= punch-drunk encephalopathy)** **خَرْفُ الْمَلَاكِيمِينِ.** خرف أشد

من الاعتلال الدماغى الرضحى يتولد من تراكم الاضطرابات الدماغى ويتصف بالنسابة وبطء التفكير وعسر التلفظ وبطء واختلال الحركة وخصوصاً فى الساقين.

خَرْفُ الدِّيَالِ. خرف يصيب المرضى **dialysis d.** الذين يعالجون بديال الدم لمدة طويلة (أكثر من ثلاث سنوات) فيولد اعتلالاً دماغياً يتصف بالرتة (عسر التلفظ) وحبسة التسمية والخرف والانتفاض العضلى الرمعى ونوبات الصرع الكبير والذهان وقد ينتج كل ذلك عن وجود نسبة عالية من أيونات الألمنيوم فى محلول الديال.

خَرْفُ الصَّرْعِ. تردُّ عقلى وفكرى **epileptic d.** متروِّق يحصل فى بعض حالات الصرع وقد ينتج عن تنكس العصبونات المولد عن الاضطرابات الدورانية أثناء نوبات الصرع.

خَرْفُ مَوْهِ الرَّأْسِ. الخرف **hydrocephalic d.** الذى يتولد عن موه الرأس المزمن.

خَرْفُ طِفْلِيّ. اضطراب تنموى **infantile d.** دماغى يولد ذهان الأطفال بعد سنتين أو ثلاث من التنامى السوى ويتصف بعسر التلفظ واضطراب عاطفى وسلوكى وبعلاقة سيئة مع الآخرين وعادة ما يترافق مع فرط الحركة والخرف والتردى الفكرى.

خَرْفُ مُتَعَدِّدِ الاِحْتِشَاءَاتِ. **multi-infarct d.** خرف يتطور تدريجياً ويتصف بنوبات متتالية موزعة فى مناطق وظيفية محددة من الجهاز العصبى وينتج عن اختلالات وعائية دماغية.

خَرْفُ الرَّمْعِ العَضَلِيّ. خرف **d. myoclonica** يحدث فى الرمع العضلى المتعدد.

خَرْفُ (= paresis, general) **paralytic d.** شلليّ.

خَرْفُ مُتَعَدِّدِ الرُّؤَاثِيّ. **d. paranoides (= schizophrenia, paranoid)**

خَرْفُ مُبْتَسِرٍ؛ **d. praecox (= schizophrenia)** مُصَامٌّ.

خَرْفُ كَهْلِيّ. خرف تنكسى أولى **presenile d.** يبدأ فى سن مبكرة قبل الشيخوخة وهو من نمط الزهايمر.

خَرْفُ أَوَّلِيّ **primary degenerative d.**

تَنَكُّسِيّ. خرف ذو بداية مخاتلة يتطور تدريجياً ويحدث دائماً بعد سن الخمسين ويشمل الخرف قبل الكهلى والخرف الشيخوخى.

خَرْفُ إِرْتِجَاجِ (boxer's d.) **d. pugilistica** الدماغ. الخرف الذى ينتج عن إصابة الرأس بضربات متكررة مع ارتجاج المخ كما يحصل للملاكمين.

خَرْفُ ثَانَوِيّ. خرف يحصل بسبب **secondary d.** عوامل خارجية كإصابات الرأس والتسمم والعدوى.

خَرْفُ دَلَالِيّ؛ خَرْفُ دَلَالَةِ الرَّمُوزِ. **semantic d.** خرف يتصف بعدم شعور الشخص بالإحساسات العاطفية كالحب والكراهية والحزن والخجل والغرور والعزة والكرامة.

خَرْفُ شَيْخُوخِيّ. خرف تنكسى أولى **senile d.** يصيب المريض فى سن الشيخوخة ويتصف بتردى القوى العقلية والمقدرة على القراءة والكتابة والكلام وبالضمور العام.

خَرْفُ تَسَمُّمِيّ. خرف يتولد عن التعرض **toxic d.** للمزمن لأحد السموم.

خَرْفُ **Wernicke's d. (= presbyophrenia)** فِرْنِيكَّة؛ خَرْفُ شَيْخُوخِيّ.

مَفْسُوس. الاعتقاد القديم بأن **demoniac** الجنون يتولد عن تملك الشياطين لنفس المصاب.

هَوَسُ الشَّيَاطِينِ. توهم **demonomania** المصاب بأن الشياطين تتملكه.

رُهَابُ الشَّيَاطِينِ. الخوف **demonophobia** من الشياطين.

أَزَالُ المِيَالِينِ. أزال الميالين **demyelinate** أو النخاعين من الأعصاب.

رَزَالُ المِيَالِينِ؛ **إِزَالَةُ المِيَالِينِ؛** **demyelination** إزالة النخاعين. إتلاف النخاعين أو إزالته أو فقدانه من الأعصاب.

رَزَالُ المِيَالِينِ؛ **إِزَالَةُ المِيَالِينِ؛** **demyelination (= demyelination)** إزالة النخاعين.

مَنَعَ المُخَذَّرِ. منع العقار عن **denarcotize** المريض عند علاج المدمنين.

تَغْصِنِيّ؛ مُتَغَصِّن. **dendric (= dendritic)**

مُسْتَقْبَلَةُ التَغْصِنِ. نقطة **dendriceptor**

حساسية في نهاية أحد فروع التَغَصَّن يمكن تنبيهها بنهايات محوار عصبون آخر.

dendriform

مُتَغَصَّن. متفرع وشبيه بالأغصان.

dendrite

تَغَصَّن. (ج: تَغَصَّنَات). أحد

الامتدادات الهيولية الخيطية الشكل للعصبون. وهو يشبه شكل المحوار في العصبونات الأحادية والثنائية الأقطاب أما في العصبونات متعددة الأقطاب فإنه يمتد ويتفرع مثل أغصان الشجر ويكون عادة معظم السطح التقبلي للعصبون.

dendritic

تَغَصْنِيّ؛ مُتَغَصَّن. 1. متفرعة مثل الأغصان 2. تمتلك تغصنات.

dendron (= dendrite)

تَغَصَّن.

denervate

يُزِيلُ التَغَصِيب. يزيل التعصيب من النسيج أو العضو.

denervation

إزالة التَغَصِيب. إزالة التعصيب من العضو أو النسيج بقطع العصب أو تدميره.

denial

إنكار. وسيلة دفاعية يدفع فيها الشخص الحقائق المؤلمة أو الكريهة بعيداً عن وعيه فلن يشعر بها.

dentalgia (= toothache)

ألم الأسنان.

dentatohalamic

مُسَنَّنِيّ مَهَادِيّ. متعلق بالنواة المسننة والمهاد.

dentatum (= nucleus dentatus) النواة المُسَنَّنَة.

dependence

1. إِعْتِمَاد 2. تَغْوِيل. حالة الانكال على العقار والاضطرار إلى تناوله باستمرار أو بفترات متقطعة للشعور بتأثيره النفسي المناسب أو للوقاية من تأثير الحرمان منه.

تَغْوِيلٌ عَاطِفِيّ: (**emotional d. (= habituation)**) تَعَوُّد. تعاطي العقار للتفريج عن الكرب النفسي والقلق الذي يولده الحرمان منه.

- physiological d.

تَغْوِيلٌ فِيزِيُولُوجِيّ. تعاطي العقار لاجتناب تأثير الحرمان منه.

التَغْوِيلُ عَلَى **- psychoactive substance d.** المَادَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ نَفْسِيًّا. سوء استعمال الادوية المؤثرة نفسياً والتي تولد أعراض التحمل أو الامتناع.

تَغْوِيلٌ (**psychological d. (= emotional d.)**) نَفْسِيّ؛ تَغْوِيلٌ عَاطِفِيّ.

- substance d.

التغويل على الدواء. التغويل على أحد الادوية المولدة لأعراض التعود أو الامتناع واستعماله لفترة طويلة.

depersonalization تَبَدُّدُ الشَّخْصِيَّة. فقدان حس معرفة الشخص لذاته أو لجسمه أو لجزء منه وشعوره بالاعتراب عن جسمه وعدم الشعور بسيطرته على أفعاله وأقواله.

depolarization

1. زَوَالُ الإِسْتَقْطَابِ 2. إِزَالَةُ الإِسْتَقْطَابِ. عملية إزالة الاستقطاب أو معادلته من النسيج المستقطب كالعصب والعضل. ويستعمل الاصطلاح في فيزيولوجيا الأعصاب للدلالة على عكس استقطاب جهد الراحة من غشاء العصب أو العضل عند تنبيههما.

depressant

1. مُخَفِّد 2. مُكْتَبِب. 1. عامل يقلل الفعالية الوظيفية للعضو أو النسيج أو للجهاز العصبي المركزي 2. عامل يقلل الفعاليات الحيوية في الجسم بصورة عامة ويولد الارتخاء العضلي والتعرق الغزير.

depressed

1. مُكْتَبِب 2. مُنْخَسَف 3. مُنْخَفِض. 1. شخص مصاب بالاكتئاب 2. كسر قحفي منخفض أو هابط تحت مستوى العظام المكسور منها.

depression

1. اِنْخِسَاف 2. خُمُود 3. اِكْتِنَاب. 1. حفرة أو منطقة هابطة للأسفل 2. هبوط أو قلة الفعالية الوظيفية للعضو أو النسيج 3. حالة نفسية تتصف بهبوط المزاج والحزن واليأس والقنوط. وتختلف درجات الاكتئاب كثيراً من حالة الحزن البسيط إلى حالات الاكتئاب الشديد.

اِلِكْتِنَابٌ اِلِهْيَاجِيّ. اكتئاب شديد مع هياج نفسي حركي.

- anacitic d.

اِكْتِنَابٌ اِلِئْتِم. إفساد التنامي والتطور العقلي والجسدي والاجتماعي للوليد بسبب فقدانه للأمومة وتيممه.

- endogenous d.

اِكْتِنَابٌ دَاخِلِيّ اِلْمَشْأ. اكتئاب يتولد بسبب عوامل داخلية وليس بأسباب بيئية أو محيطية فيولد التخلف النفسي الحركي والاستيقاظ

- الصباحي المبكر وفقدان الوزن وضعف الاستجابة للمنبهات الخارجية والشعور بالذنب.
- **involutional d. (= melancholia, involuntional)** إكتئاب أُوْبِي.
- **major d.** الإكتئاب الكبير. اضطراب نفسي يتصف بحدوث نوبات اكتئاب شديد مع غياب أو عدم حدوث أية نوبات هوسية أو دون الهوسية.
- **neurotic d.** إكتئاب عصابي. أي نوع من الاكتئاب غير الذهاني.
- **psychotic d.** إكتئاب ذهاني. اكتئاب كبير مع خواص ذهانية كالهوس والتوهم والصمات أو الذهول.
- **reactive d.** إكتئاب تفاعلي. اكتئاب يتولد عن الحوادث المحيطة المقلقة والكثيرة وهو نوع من الاكتئاب العصابي.
- **retarded d.** إكتئاب التخلف العقلي. اكتئاب مع تخلف نفسي حركي.
- **situational d. (= reactive d.)** إكتئاب تفاعلي. مكتئب. يولد الاكتئاب.
- depressive** مُحَفِّدُ الْحَرَكَةِ. عامل يشبط أو يقلل الفعاليات الحركية.
- depressomotor** مُحَفِّدُ الْحَرَكَةِ. عامل يشبط أو يقلل الفعاليات الحركية.
- depressor** خَافِض. 1. آلة أو عضو يخفض عضو آخر أو بنية أخرى 2. عصب يؤدي تنبيهه إلى خفض ضغط الدم.
- deprivation** حَرَمَان. فقدان أو ضياع أو غياب عضو أو جزء أو فعالية أو عامل يحتاجه الجسم.
- **emotional d.** حَرَمَانٌ عَاطِفِي. حرمان العلاقات الشخصية المناسبة في المحيط أثناء السنوات الأولى من تطور وتنامي الطفل.
- **maternal d.** حَرَمَانُ الْأُمومة. فقدان المبكر للام وحرمان الوليد أو الطفل من رعاية الام وعطفها.
- **sensory d.** حَرَمَانٌ حِسِّي. حرمان المنبهات الحسية السمعية والبصرية اللمسية التجريبي الذي يولد القلق لدى الكائن (الإنسان أو الحيوان) وفقدان القدرة على التركيز وتنظيم الأفكار والهوس المزعج والبهيم. ومن الممكن أن تحصل أعراض مشابهة لذلك في حالات العزل الانفرادي أو العمى أو الصمم أو الشلل أو حتى في الغرف الانفرادية في المستشفيات.

- thought d.** الحَرَمَانُ الفُكْرِي. توقف سلسلة الأفكار المفاجيء لدى الفرد عند وصوله إلى فكرة مؤلمة أو بغیضة مكتوبة.
- deranencephalia** انعدام الرأس والعنق.
- انعدام الرأس المولد لعيب في دماغ المسيح وفي القسم العلوي من نخاعه الشوكي.
- deranged** مُخْتَل. مختل الوظيفة أو مختل عقلياً.
- derangement** 1. إختلال. 2. إختلال عقلي. 1. تشويش ترتيب أو نظام عضو أو جزء منه 2. اضطراب عقلي.
- derealization** عَمَهُ الْوَأَقِع. فقدان الشخص لقدرة إدراكه للعالم الخارجي أو شعور غير حقيقي به.
- derencephalocoele** قَبيلة دِمَاعِيَّة رَقَبِيَّة. انفتاق الدماغ خلال أحد شقوق الفقرات الرقبية.
- derism, dereism** وَهْمٌ وَهَلٌ. تفكير ونشاط عقلي غير واقعي وخيالي وغير متعقل كما يحصل في التوهم.
- dermatome** قِطَاعٌ جِلْدِي. منطقة جلدية يغذيها عصب حسي وارد من أحد الجذور النخاعية الظهرية.
- dermatophobia** رُهاب الجُلَد. رهاب الإصابة بمرض جلدي.
- dermoid** 1. جِلْدَانِي 2. كَيْسَةٌ جِلْدَانِيَّة. 1. شبيه بالجلد 2. ورم الكيسة الجلدية.
- cranial d.** جِلْدَانِيَّةٌ قَحْفِيَّة. كيسة جلدية داخل القحف.
- d. cyst** كَيْسَةٌ جِلْدَانِيَّة. كيسة جلدية خلقية تتوضع على خطوط انغلاق السطوح الجنينية وقد تكون غالباً في الرأس حول العين والرقبة.
- intramedullary d.** جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاع. كيسة جلدية داخل النخاع الشوكي.
- intraspinal d. (= intramedullary d.)** جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاع.
- spinal d. (= intramedullary d.)** جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاع.
- descendens** نَازِل. بنية أو جزء مار من أعلى إلى الأسفل.

عُرْوَةُ رَقَبِيَّة. - d. cervicalis
انظر ansa cervicalis.

إِزَالَةُ التَّحَسُّس. 1. في desensitization
المعالجة السلوكية هي تعريض المريض سواء
بالتصور أو بصورة حقيقية إلى المنبهات المزعجة
التي يرهبها وذلك بغرض معالجة القلق والخوف
منها 2. تقليل التحسس بإعطاء المريض جرعات
صغيرة من المادة الأربعة وزيادتها تدريجياً.

إِزَالَةُ التَّحَسُّس النِّظَامِي. معالجة - systematic d.
نفسية لإزالة رهاب المريض لأي عامل أو مادة بإعطائه
جرعات صغيرة منها مبدئياً سواء بالتصور أو بصورة
حقيقية ومن ثم تزداد تدريجياً حتى يشفى المريض من
رهابه حتى لاشد الجرعات منها

دِيرُومُورْفِين. دواء مسكن desomorphine
مخدر.

زَوَالُ التَّرَافُن. 1. عدم desynchronization
ترافن وعدم تشابه موجات المخطط الكهربائي
للدماغ في نصفي كرة المخ بسبب آفة مرضية في
أحدهما أو في كليهما 2. نمط المخطط الكهربائي
للدماغ الذي تكون موجاته قليلة الارتفاع وسريعة
التردد والذي يشاهد في حالات الانتباه والتركيز أو
في النوم سريع الحركات العينية.

desynchronized sleep (= sleep, REM)
نَوْمُ مَزَالُ التَّرَافُن.

الْحَتْمِيَّة. النظرية التي تقول إن determinism
كل أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية هي ثمرة
عوامل مقررّة لا سلطة للمرء عليها ولا تحدث
بمجرد الصدفة.

الْحَتْمِيَّةُ النَّفْسِيَّة. النظرية التي تنص - psychic d.
على أن كل الحوادث النفسية للمرء لا تحدث بمجرد
الصدفة بل إن لها أسباباً لا شعورية مسبقة ومقررّة
ولا سلطة للمرء عليها حتى الطوارئ وعرثات اللسان
هي عمليات عقلية مقررّة مسبقاً وحتمية.

تَطَوُّر؛ تَنَامِي؛ نُشُوء. عملية development
النمو والتمايز في الكائنات والخلايا والأنسجة
والأعضاء.

تَنَامِي الإِسْتِغْرَاف. عملية تنامي - cognitive d.
الذكاء والتفكير الواعي والمجرد وعملية حل المشاكل
التي تبدأ منذ الطفولة.

التَنَامِي النَّفْسِي الجِنْسِي. - psychosexual d.
عملية التنامي الجنساني خلال دورة حياة الفرد التي
تتأثر بالعوامل البيولوجية والاجتماعية والبيئية
والثقافية والعاطفية منذ فترة قبل الولادة وعبر دورة
حياته ويمر هذا التنامي من الطفولة حتى البلوغ
بالطور الفموي ثم الشرجي ثم التناسلي.

التَنَامِي النَّفْسِي الإِجْتِمَاعِي. - psychosocial d.
تنامي شخصية الفرد واكتسابه خبرة تكوين المواقف
والعلاقات الاجتماعية

مُنَحَرَف؛ شَاذ. شخص غير سوي أو deviant
حالة مختلفة عن الحالة السوية أو المعيارية.

مُنَحَرَف جِنْسِي. شخص شاذ جنسياً. - sexual d.

إِنْحِرَاف. شذوذ عن المقاييس deviation
المعيارية أو السوية.

إِنْحِرَافٌ جِنْسِي. شذوذ جنسي. - sexual d.

إِنْحِرَافٌ تَجَانُفِي. دوران العين للأسفل - skew d.
وللداخل على جهة الإصابة المخيخية وإلى الأعلى
والخارج على الجهة الثانية.

دِكْسِيْتِيْمِيد. دواء يستعمل لعلاج dextimide
الباركنسونية.

دِكْسِيْمَافِن. دواء مضاد deximafen
للاكتئاب.

دِكْسِتْرُو أَمْفِيْتَامِين. dextroamphetamine
دواء منبه يستعمل في علاج الاكتئاب والنوم
الانتيابي وفراط حركية الأطفال والسمنة الخارجية
المنشأ وهو يعمل مثل الأمفيتامين ولكنه أشد منه.

يَمِينِيَّةُ الْمُخ. ذو مخ dextrocerebral
فيه نصف الكرة اليمينية هي السائدة.

مَتَفُوقُ الْيَدِ الْيَمْنِي؛ أَيْمَنُ الْيَدِ. dextromanual
شخص يده وذراعه اليمينيتان أنشط وأكثر مهارة
من نظيرتيهما اليساريتين وأكثر منهما استعمالاً.

مَتَفُوقُ السَّاقِ الْيَمْنِي؛ أَيْمَنُ dextropedal
الْقَدَم. شخص يستعمل قدمه اليمنى أكثر من
اليسرى ويفضلها عليها.

تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَات. وظيفة diadochokinesia
إيقاف دفعات عصبية حركية وتعويضها مباشرة

بدفعات حركية معاكسة لها تماماً مما يولد حركات متناوبة مثل كب وبسط الذراع بصورة متناوبة.

diadochokinesis (= diadoc-hokinesia) تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَاتِ.

diaphemetric بِقِيَاسُ حِسِّ اللَّفْسِ. متعلق بِقِيَاسِ حِسِّ اللَّفْسِ.

diaphemetry قِيَاسُ حِسِّ اللَّفْسِ. قياس إدراك حسّ اللمس وتمييزه.

diaphoresis التَّعَرُّقُ الغَزِيرُ. التعرق وخصوصاً التعرق الغزير.

diaphragmalgia أَلَمُ الحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

diaphragma sellae حِجَابُ السَّرْجِ. حجاب السرج التركي، طية حلقيّة الشكل من الأم الجافية تغطي السرج التركي وتحتوي فتحة صغيرة لمرور قمع الغدة النخامية.

diaphragmodynia (= diaphragmalgia) أَلَمُ الحِجَابِ.

diaschisis انْفِرَاقٌ عَصَبِيّ. فقدان الفعالية الكهربائية والوظيفية لقسم من الجسم بسبب إصابة دماغية وبالرغم من بُعده عن موقع الإصابة الدماغية المسببة لهذا الخلل إلا أنه مرتبط به ارتباطاً عصبياً.

diastematocrania انْشِطَارُ القَحْفِ. شقّ طولي خلقي في القحف.

diastatomyelia انْشِطَارُ النُّخَاعِ. انشطار النخاع الشوكي طولياً وخلقياً بواسطة شويكات عظمية أو رباط ليفي ويحاط كل من النصفين بكيسة جافية منفصلة ويترافق هذا العيب عادة مع السنسنة المشقوقة.

diastomyelia (= diastatomyelia) انْشِطَارُ النُّخَاعِ.

diataxia رَنَحٌ مُزْدَوِجٌ. رنح يصيب جهتي الجسم.

- cerebral d. (= paralysis, infantile cerebral ataxic) شَلَلٌ مُخَيّ رَنَحِيٌّ طِفْليّ.

diathesis أَهْمِيَّةٌ. حالة استعداد الجسم وبنيته للاستجابة بطريقة خاصة لبعض المنبهات

الخارجية وهذا ما يجعله معرضاً لبعض الأمراض المعينة بصورة خاصة.

diazepam دِيَازِپَام. دواء يستعمل كمسكن ومرخٍ للعضلات الهيكلية وكمضاد للاختلاج والذهيان الارتعاشي وأعراض الامتناع عن الكحول ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقن في العضلات أو بالوريد.

dicephalous, dicephalus ذُو رَأْسَيْنِ. مسيخ ذو رأسين.

dicephaly اِزْدِوَاؤُ الرُّأْسِ. حالة المسيخ ذي الرأسين وهي عيب خلقي.

diencephalon الدِّمَاغُ البَيْنِيّ. القسم الذنب من الدماغ المقدم الذي يحوي البطين الثالث ويربط الدماغ المتوسط مع نصفي كرة المخ ويقسم التلم الوطائي كل نصف جانبي منه إلى قسم ظهري يتكون من فوق المهاد والمهاد الظهري والمهاد التالي وإلى قسم بطني يتكون من المهاد البطني (تحت المهاد) والوطاء.

digitalgia أَلَمُ الأصَابِعِ. ألم في الأصابع.

dimercaprol دِيْمَرْكَأَبْرُول. دواء يستعمل كمضاد للتسمم بالزرنيخ والذهب والزنك كما أنه يستعمل في علاج التلوكس الكبدية العدسية.

diphallia اِزْدِوَاؤُ القَضِيبِ. وجود قضيبين لدى الشخص.

diphallus قَضِيبٌ مُزْدَوِجٌ. قضيب مضاعف.

diphenhydramine دِيْفَنْهَيْدْرَامِين. دواء مسكن ومضاد للهستامين ومضاد للفعل الكوليني وللتشنج.

diplegia شَلَلٌ مُزْدَوِجٌ. شلل يصيب الأعضاء المتماثلة على جهتي الجسم.

- atonic d. شَلَلٌ وَأَنْ مُزْدَوِجٌ. شلل مزدوج في الرضع يتصف بنقص التوتر.

- atonic-astatic d. (= atonid d) شَلَلٌ وَأَنْ لا وَقُوفِيّ مُزْدَوِجٌ.

- cerebellar d. شَلَلٌ مُخَيّ مُزْدَوِجٌ. شلل مخي ولكن تظهر فيه علامات وأعراض الشلل المخي أكثر من علامات الشلل المخي.

- cerebral d. (= spastic d.) شَلَلٌ مُخَيِّ مُزْدَوِج.

- congenital facial d. (= syndrome, Mobius) شَلَلٌ وَجْهِيٌّ خَلْقِيٌّ مُزْدَوِج.

- facial d. شَلَلٌ وَجْهِيٌّ مُزْدَوِج. شلل جهتي الوجه.

- infantile d. (= palsy, birth) شَلَلٌ الْوِلَادَةِ.

- masticatory d. شَلَلٌ مَضْغِيٍّ مُزْدَوِج. شلل كل العضلات التي تشارك في عملية المضغ.

- spastic d. (= disease, Little's) 1. شَلَلٌ تَشَنُّجِيٍّ مُزْدَوِج 2. شَلَلٌ سَفَلِيٍّ تَشَنُّجِيٍّ.

diplopia شَفَعٌ؛ إزْدَوَاجُ الرُّؤْيَةِ. رؤية صورتين للجسم الواحد.

dipsomania (= alcoholism) هَوَسُ الشُّرْبِ؛ الكحولية.

dipsophobia رُهَابُ الشُّرْبِ؛ رُهَابُ الْكُحُول. الخوف من تناول الكحول.

disability عَجَزٌ. عدم المقدرة على العمل الفكري أو الجسمي بطريقة سوية.

disc قُرْص. (ج: أَقْرَاص). انظر disk.

discharge 1. نَجِيحٌ 2. تَفْرِيجٌ 3. خُرُوجٌ؛ إِخْرَاجٌ. 1. مادة محسرة 2. تفريغ كهربائي 3. تحرير أية مادة أو إبرازها.

- epileptic d. تَفْرِيجٌ صَرَغِيٍّ. تفريغ كهربائي مرضي لعصبونات في الجهاز العصبي المركزي يشير إلى حدوث نوبة صرعية.

- nervous, d. (= neural d.) تَفْرِيجٌ عَصَبِيٍّ. الاستثارة المنتشرة التي يولدها تنبيه أحد المراكز العصبية المركزية.

discrimination تَمْيِيزٌ. المقدرة على التعرف على الفروق الكمية أو النوعية بين منبهين حسيين أو أكثر وعادة ما يؤدي ذلك إلى استجابة تفرقية خاصة لكل منهما حسب الفروق المميزة.

- one point d. تَمْيِيزُ النُقْطَةِ الْوَاحِدَةِ. المقدرة على تعيين موقع تنبيه إحدى النقاط على سطح الجسم.

- pitch d. تَمْيِيزُ النَغَمِ. المقدرة على تمييز أي تغيير في سرعة تردد الصوت عند سماعه.

- sensory d. تَمْيِيزٌ حَسِّيٌّ. المقدرة على التفریق بين مختلف المنبهات الحسية كميّاً ونوعياً.

- tactile d. تَمْيِيزٌ لَمْسِيٌّ. المقدرة على تمييز مختلف أنواع ودرجات شدة حس اللمس كاللمس الناعم أو الخشن الذي ينبه الجلد.

- two-point d. تَمْيِيزُ النُقْطَتَيْنِ. 1. المقدرة على تمييز حس تنبيه نقطتين لسطح الجسم في وقت واحد 2. أصغر بعد بين النقطتين المنبهتين الذي يمكن أن يميزه الشخص.

discus (= disc) قُرْص.

isidiadochokinesia (= dysdiadochokinesia) خَلَلٌ تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَاتِ.

disease دَاء. (ج: أَدْوَاء)؛ مَرَضٌ (ج: امْرَاض). حالة انحراف أو ابتعاد أو تغير بنية أو وظيفة أحد أقسام الجسم أو أعضائه أو أجهزته عن حالاته السوية والذي يولد أعراضاً وعلامات خاصة.


- Addison's d. دَاءُ إَدِيسُون. مرض ينتج عن سل الغدة الكظرية أو مرضها المناعي الذاتي والذي يولد هبوط ضغط الدم وفقدان الوزن والشاهمية للطعام (القهم) والورني العام وفرط انصبغ الجلد الميلاني.

- Alexander's d. دَاءُ الْإِكْسَنْدَر. حثل المادة البيضاء في الأطفال ويتصف بوجود مادة حمضة (يوزينية) على سطح الدماغ وحول أوعيته الدموية مما يؤدي إلى تضخمه.

- Alzheimer's d. دَاءُ آلْزَايْمَر. مرض دماغي تنكسي متروك غير معروف السببيات يتصف بضمور شامل للقشرة المخية مع تغيرات مرضية نسجية خاصة تسمى «اللويحات الشيوخوخية» ويظهر أن معظم الخلايا المتنكسة هي خلايا كولينية الفعل. وأهم العلامات الأولية للمرض هي بعض اضطرابات الذاكرة وتغير الشخصية ثم تسوء الأعراض تدريجياً حتى الخرف خلال 5-10 سنوات وقد يبدأ المرض في أي سن وهو شبيه بالهرم الشيوخوخية الذي يظهر بعد سن الخامسة والستين. ويصيب هذا المرض النساء ضعف ما يصيب الرجال.

- Aran-Duchenne d. ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ نُخَاعِيٌّ. انظر atrophy, spinal muscular

- autoimmune d. داء المناعة الذاتية؛ دَاءٌ



disease, Addison

علامات واعراض فشل الكظر الأولي (داء أديسون) الذي يتولد عن ضمور قشرة الكظر أو إصابتها بداء السل: (1) انصبغ الغشاء المخاطي (2) انصبغ الجلد (3) اسوداد الشعر (4) النمش (5) البهق (6) زيادة صبغ الحلمة (7) زيادة صبغ مناطق الاحتكاك (8) ترسب الصبغ في بعض المناطق وفي ندبات الجروح (9) ضعف العضلات (10) فقدان الوزن والهزال والقيء والإسهال (11) انخفاض ضغط الدم.

- مَنِعَ لِلذَّاتِ. اضطراب يتولد عن الاستجابة المناعية للمستضدات الذاتية ويشمل امراضاً عديدة مثل الذاب الحمامي والتهاب المفاصل الروماتزمي.
- Behcet's d. (= syndrome, Behcet's) دَاءُ بَهَجَت.
- Billroth's d. دَاءُ بِيلِرُوْث. انفتاق السحايا
- الدماغية خلال كسر في القحف مع تمزق العنكبوتية.
- Bourneville's d. (= tuberous sclerosis) دَاءُ بُورْنِفِيل: التصلب الحدبي.
- Buerger's d. (= thromboangiitis obliterans) داء بُورْغِر.
- Canavan's d. دَاءُ كَنَفَان. تنكس الجهاز العصبي المركزي الإسفنجي.
- central core d. of muscle دَاءُ اللُّبِّ المَرْكَزِيِّ للعضل. داء وراثي جسدي سائد يتصف بوتر عضلي شديد يوقف تنامي العضلات في الأطفال ولكنه يزول حوالي سن السادسة ويمكن الطفل من السير بعد ذلك بصورة طبيعية.
- Charcot's d. (= arthropathy, neuropathic) دَاءُ شَارْكَوْت: اعتلال المفاصل العصبي المنشأ.
- Charcot's-Marie-Tooth d. (= progressive spinal muscular atrophy) التهاب شَارْكَوْت - مَارِي - تُوث: الضمور العضلي الشوكي المتفرقي.
- Creutzfeldt-Jakob d. دَاءُ كَرُوتْزِفِلْد - جَاكُوب. داء معدي ومميت وهو اعتلال دماغي إسفنجي يحدث في متوسط العمر مع تنكس جزئي للجهاز العصبي الهرمي وخارج الهرمي مع خرف متروك وضمور العضلات والرعاش والكنع والرثة التشنجية.
- dancing d. (= choreomania) هَوَس رَقْصِي.
- David's d. دَاءُ دَيفِيد. سل السيساء.
- Dejerine-Sotta d. دَاءُ دِيجِيرِين - سُوْتَا. اعتلال عصبي ضخامي خلالي وراثي.
- demyelinating d. دَاءُ زَوَالِ المَخَاعِين. أية حالة مرضية تتصف بتهتك النخاعين وزواله.
- Devic's d. (= neuromyelitis optica) التهاب النخاع والعصب البصري: دَاءُ دِفِيك.
- Erb-Charcot d. (= Erb's spastic paraplegia) شلل إرب السفلي التشنجي: دَاءُ إِرْب - شَارْكَوْت.
- Erb-Goldflam d. (= myasthenia gravis) الوهن العضلي الوبيل: دَاءُ إِرْب - غُولْدْفَلَام.
- Erb-Landouzy d. (dystrophy, muscular) حَثَلْ عضلي: دَاءُ إِرْب - لَانْدُوْزِي.
- Eulenburg's d. (= paramyotonia congenita) داء التشنج العضلي التوتري الخلقي: دَاءُ أُولِنْبِرْغ.
- extrapyramidal d. دَاءُ خَارِجِ الهَرْمِي. أحد الاضطرابات السريرية التي تتصف بحركات لاإرادية شاذة وتغير التوتر العضلي واضطرابات الوضع وتنتج عن إصابة السبيل خارج الهرمي وتشمل أمراض الباركنسونية والرقص والكنع.
- Fabry's d. دَاءُ فَابْرِي. مرض وراثي مرتبط بالصبغي X وهو مرض استقلابي يؤثر على الجهازين البولي والقلبي الوعائي ويولد أعراضاً متعددة في كل الجسم ومنها الأعراض العصبية التي تشمل الألم المحرق في الراحة والأخمص والبطن ومذل اليدين والقدمين المزمن ومرض الأوعية الدماغية مع بقاء النمو وتخلف البلوغ.
- Farber's d. دَاءُ فَارْبِر. مرض استقلابي يتصف بأعراض جسمية عديدة ومنها التخلف النفسي الحركي.
- focal d. دَاءُ بُؤْرِي. داء متوضع في منطقة محدودة من الجسم.
- functional d. دَاءُ وَظِيفِي. داء يؤدي إلى اختلال إحدى الوظائف أو أكثر من دون أية تغيرات عضوية.
- Gaucher's d. (= glucosylceramide lipidoses) الشُحَامُ الفلوكوزيل سيراميدي: دَاءُ كُوِشَر. داء استقلابي يتصف بالشحام بسبب ترسب الفلوكوسيربروزيد في الكبد والطحال والعقد اللمفية والنتقي، وهناك عدة أنواع منه أحدهما النوع الحاد الطفلي الاعتلالي العصبي الذي يتصف بتضخم الكبد والطحال وتلف الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الموت خلال عام واحد وهناك النوع الطفلي دون

الاعتلالي العصبي الذي يشبه النوع الاول ولكنه يتطور ببطء نسبياً.

- Gerlier's d. (= endemic paralytic

vertigo) دَاءُ غَزْلِير؛ دوار شللي متوطن.

داء يصيب الفلاحين وعمال الإسطبلات يتصف بالدوار وجحوظ العين واضطرابات حركية وقد ينتج عن التهاب العصب الدهليزي.

- hereditary d. دَاءُ وِرَاثِي. مرض ينتقل وراثياً من الآباء للأبناء.

- heredoconstitutional d. دَاءُ وِرَاثِي بُنْيَوِي. حالة مرضية وراثية لا تتطور وغير مترقية.

- heredodegenerative d. دَاءُ وِرَاثِي تَنَكُّسِي. داء وراثي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتصف بفقدان أنسجة عصبية معينة.

- hydatid d. الدَّاءُ الحَبَّارِي. داء مُعْدِي ينتج عن الإصابة ببرقات المشوكة الحبيبية ويولد أكياساً تتضخم تدريجياً ويمكن أن تصيب الدماغ أو نخاع الشوكي.

- hydrocephaloid d. الدَّاءُ الشَّيْبِي بِمَوْه الرَّأْسِ. حالة تشبه موه الرأس ولكن مع انخساف اليافوخ الشديد بسبب الإسهال أو مرض ضموري آخر مع التجفاف.

- idiopathic d. دَاءٌ مَجْهُول السَّبَب. داء غير ناتج عن مرض آخر ولا يعرف له سبب ظاهر.

- Krabbe's d. دَاءُ كِرَابَّ. مرض استقلابي يبدأ في الطفولة بالهيجوية والصمل تتلوهما نوبات توترية واختلاجات وشلل رباعي ثم العمى والصمم وصعوبة البلع وتردي عقلي مترقي وبترافق ذلك كله مع زوال النخاعين الدماغيين المترقي ووجود جسيمات كروية في المادة البيضاء.

- Kuf's d. (= amaurotic idiocy) دَاءُ كُوف؛ البَلَامَةُ الكَمْنِيَّة.

- Kugelberg-Welander d. (= hereditary juvenile muscular atrophy

دَاءُ كُوكِلْبِرْغ - فيلاندر؛ الضمور العضلي البَقَعِي الوراثي. مرض وراثي حديث ينتقل كصفة جسدية متنحية ويتصف بالضمور العضلي الذي ينتج عن آفات في القرون الامامية للنخاع الشوكي ويبدأ بين سني 17-2 عاماً

بوني العضلات العلوية للذراع الأسفل وعضلات الحوض ثم يصيب عضلات الذراع الأخرى مع نفضانها.

- Lafora's d. (= myoclonus epilepsy) صَرَع رمعي عضلي؛ دَاءُ لَافُورَا.

- Leber's d. (= Leber's optic atrophy) ضمور ليبر البصري؛ دَاءُ لِيبر.

- Leigh's d. (= subacute necrotizing encephalomyelopathy) اعتلال دماغي نخاعي نخري؛ دَاءُ لِي.

- Little's d. دَاءُ لِيْتَل. تيبس تشنجي خلقي للأطراف وهو نوع من الشلل المخي التشنجي ويبدأ عند الولادة بسبب عدم تنامي الجهاز الحركي الهرمي وقد ينتج عن بعض الاضطرابات كالاصابات الرضحية الولادية أو عوز الأكسجين الجنيني أو مرض الأم أثناء الحمل. ويتصف سريراً بالونى العضلي وصعوبة السير وغالباً مع الاختلاج والكتع بالجانبين والتخلف العقلي.

- Meniere's d. دَاءُ مَنِير. فقدان السمع مع الطنين والدوار المولد من التهاب التيه اللاتقيحي مع استسقاء لمفي باطني.

- motor neuron d. دَاءُ العَصَبُون الحَرَكَي. أي مرض للعصبون الحركي ويشمل الضمور العضلي النخاعي والشلل البصلي المترقي والتصلب الوحشي والتصلب الوحشي الضموري العضلي.

- Mozer's d. دَاءُ مُوزَر. تصلب النخاع لدى البالغين.

- Niemann's d. دَاءُ نِيَمَان. داء استقلابي متعدد الأنواع وهناك خمسة أنواع رئيسية فيه تختلف بدرجة إصابة الجهاز العصبي وسن بدء الإصابة وشدتها وسن وفاة المريض.

- Niemann-Pick d. (= Niemann's d.) دَاءُ نِيَمَان - بِيك.

- Norrie's d. دَاءُ نُورِي. مرض وراثي مرتبط بالصبغي X ويتصف بعمى العينين مع التخلف العقلي والصمم.

- occupational d. دَاءٌ مِهْنِي. داء يتولد عن عوامل مهنية تتعلق بمهنة المريض.

- Oppenheim's d. (= amyotonia congenita) دَاءُ أُوْبِنَهَايم. الونى العضلي الخلقي.

- **organic d.** داء عضوي. داء ينتج عن تغيرات عضوية في العضو أو النسيج المصاب.
- **Parkinson's d. (= paralysis agitans)** داء باركنسون؛ شلل رُعشي.
- **Pelizaeus-Merzbacher d.** داء بليزاوس - ميرزباخر. حثل المادة البيضاء العائلي المترقي الذي يبدأ عند مقتل العمر ويتطور ببطء حتى سن الشباب ويتصف بالرأرأة والرنح والرعاش والحركات الرقصية الكنعية والسحنة الباركنسونية والتخلف العقلي واختلال النطق وينتج عن زوال نخاعين المادة البيضاء في الدماغ.
- **Pick's d.** داء بيك. مرض تنكسي مترق في الدماغ شبيه في ظواهره السريرية بداء ألزهايمر ولكنه يختلف عنه بنسيجه المرضي. فالضمور القشري محدد في الفصين الصدغي والجبهي وتحتوي العصبونات المتنكسة مشتملات داخل الهيولى كروية خيطية.
- **Pott's d.** داء بوت. سل السيساء.



disease, Parkinson

صورة لمرضى مصاب بداء باركنسون تبين وضعته ومشيته وانحناؤه للأمام

- **Recklinghausen's d. (= neuro-fibromatosis)** ورام ليفي عصبي؛ داء ركلينغهاوزن.
- **Refsum's d.** داء رفسوم. مرض استقلابي يتصف بالتهاب الاعصاب المزمن والتهاب الشبكية الانصباعي والرنح المخيخي وارتفاع نسبة البروتين في السائل الدماغي النخاعي وقد يترافق مع الصمم العصبي.
- **Sandhoff's d.** داء سندھوف. نوع من داء الغنغليوزيد شبيه بداء تاي ساخر سريريا ولكنه يشاهد في غير اليهود.
- **Schilder's d.** داء شيلدر. نوع من اعتلال بيضاء الدماغ في الاطفال والياغمين ويتصف سريريا بالعمى والصمم والتشنج الجانبيين والتردي العقلي المترقي ويشاهد فيه تخريب كتلي في المادة البيضاء المخيخية مع تكهفها والتندب الدبقي فيها.
- **Selter's d. (= acrodynia)** داء سيلتر؛ وَجَع اليَهايات.
- **Simmond's d. (= panhypopituitarism)** قصور النخامية الشامل؛ داء سيموند. قصور النخامية الشامل.
- **Spielmeyer-Vogt d. (= idiocy, amaurotic)** عتة كَفَنِي؛ داء سبيلمير - فوغت.
- **Strumpell's d.** داء شترومبيل. نوع من التصلب الوحشي الوراثي ينحصر فيه الشنّاج (فرط التوتر التشنجي) في الساقين فقط.
- **Sturge-Weber d. (= syndrome, Sturge-Weber)** داء شتورج - ويبر.
- **systemic d.** داء جهازّي. داء يصيب العديد من الأعضاء والأنسجة.
- **Tay-sachs d.** داء تاي - ساكس. داء خزن الغنغليوزيد الذي يصيب اطفال اليهود في الشمال الشرقي من أوروبا ويبدأ بين الشهرين 3-6 من العمر ويتصف بالعمى المبكر وسحنة الدمية وضخامة الرأس ووتى العضلات والنوبات التشنجية ويموت الاطفال المصابين عادة بين السن الثانية والخامسة من العمر.
- **von Hippel-Lindau d. (= retinocerebral angiomas)** الورام الوعائي الشبكيوي الدماغي؛ داء فون هيبيل - لينداو. ورام وعائي وراثي وخلقّي يصيب الشبكية والمخيخ ومن الممكن أيضاً أن

يصيب النخاع الشوكي والبنكرياس والكليتين وتتصف أعراضه العصبية بالنوبات والتدري العقلي.

- von Recklinghausen's d. (= Recklinghausen's d.) دَاءُ قَوْنٍ رَكلِنْغهاَوْزِنْ.

- Werdnig-Hoffmann d. (= atrophy, spinal muscular) ضَمُور عَضَلِي نَخاعي؛ دَاءُ فَرْدِنْغ - هَوْفْمَان.

- Wernicke's d. (Inflammatory hemorrhagic d.) اعتلال الدماغ النزفي الالتهابي؛ دَاءُ فَرْنِيكَة. انظر encephalopathy.

- Whytt's d. دَاءُ وِيْت. التهاب السحايا السلي الذي يولد مره الرأس.

- Wilson's d. دَاءُ وِيلْسُون. داء وراثي يورث كصفة جسمية متنحية وينتج عن اختلال في استقلاب النحاس الذي يترسب في الدماغ والكبد والكلى والقرنية وبعض الأنسجة الأخرى ويسبب تغيرات تنكسية في الدماغ خصوصاً في العقد القاعدية مع تشمع الكبد.

disequilibrium اِخْتِلَالُ التَّوَازُن. اختلال التوازن الجسمي أو العقلي.

disesthesia (= dysesthesia) اِخْتِلَالُ جِسْمِي. اختلال أي من الحواس خاصة حس اللمس.

disinhibition إِزَالَةُ التَّثْبِيْط؛ زَوَالُ التَّثْبِيْط. 1. إزالة التثبيط من قشرة المخ أو تقليلها بواسطة الأدوية كالكحول الإيثيلي أو التقليل من شدة الأنا العليا في العلاج النفسي 2. إحياء منعكس شرطي زائل بتعريض الشخص إلى منبهه اللاشرطي.

disintegration تَفْكُك؛ تَلَأْس. 1. عملية تهشّم أو تفسخ 2. تفكك وظائف الشخصية المتكاملة في الأمراض العقلية.

disk قُرْص. صفيحة مسطحة ومدورة.

- cupped d. قُرْصٌ فِنْجَانِي. قرص بصري متضخم ومنخفض يشاهد غالباً في الزرق المتقدم.

- intervertebral d's. الأَقْرَاصُ بَيْنُ الفَقَرَتَيْن. الأقراس الليفية الفضروفية التي توجد بين الفقرتين المتجاورتين.

- optic d. القُرْصُ البَصَرِي. قسم العصب البصري

داخل العين المكون من الألياف العصبية للشبكية التي تتقارب في منطقة القرص التي لا تغطيها خلايا الشبكية ولذلك لا تكون حساسة للضوء.

- slipped d. قُرْصٌ مُنْزَلِق. قرص منزلق من بين الفقرتين.

disectomy اِسْتِئْصَالُ القُرْص. عملية استئصال قرص ما بين الفقرتين.

disorder اِضْطِرَاب. 1. تشوّه أو اختلال وظيفي 2. حالة اختلال القوى العقلية.

- adjustment d. اِضْطِرَابُ التَّكْيُف. رد فعل غير ملائم لحادثة مكتبة معلومة كالطلاق أو فقدان الوظيفة أو المرض أو مصيبة طبيعية، وتزول هذه الحالة عادة بعد زوال السبب أو بعد تكيف المريض لها.

- affective d's. (= mood d's.) اِضْطِرَابَاتُ المِزَاج.

- amnestic d. اضطراب مفقد للذاكرة؛ اِضْطِرَابُ نَسَاوِي. اضطراب نسائي كحولي يتولد عن إدمان الكحول أو اضطراب نسائي بسبب الاستعمال الطويل لبعض الأدوية كالادوية المزيلة للقلق أو المنومة أو المسكّنة.

- anxiety d's. اِضْطِرَابَاتُ مُقْلَقَة. مجموعة من الاضطرابات العقلية تتصف بالقلق والسلوك الاجتماعي وتشمل العديد من الاضطرابات كالهلج ورهاب الساح ورهاب المجتمع والوسواس القسري والقلق التالي للإصابة أو القلق العام.

- attention deficit hyperactivity d. اِضْطِرَابُ نَاقِصِ الانتباه مُفْرِطُ الفَعَالِيَة. اضطراب عقلي يصيب الأطفال يبدأ قبل سن السابعة ويتصف بالتلمل والارتباك والتضايق وصعوبة بقاء الطفل مستقراً أو جالساً مع شروء البال وسرعة الإجابة عن الأسئلة حتى قبل انتهاء سماعها مع صعوبة التقيد بالإرشادات والثروة والسلوك الفوضوي.

- autistic d. اِضْطِرَابٌ ذَاتَوِي؛ اضطراب اِنْطَوَائِي. اضطراب عقلي وخيم يبدأ في الطفولة المبكرة ويتصف بضعف العلاقات الاجتماعية كعدم التحسس بمشاعر الآخرين وعدم الثقة بهم وعدم الركون إليهم للاستراحة أو الاستشارة وعدم التحدث المتبادل معهم



disk, intervertebral

صورة تبين القرص بين الفقرتين في حالته الطبيعية وفي حالة انزلاقه وتدليه وضغطه على الاعصاب الشوكية القطنية والعجزية.

والكشف عن أفكاره ورغباته أمامهم، ويختلف هذا عن الفصام ببذنه المبكر وعدم اتصافه بالهلوس أو التوهم أو التخلف العقلي.

- **avoidant d.** اضطراب يتصف بتجنب الاختلاط مع الغرباء.

- **behavior d.** اضطراب السلوك. اضطراب عقلي يتصف بسلوك غير مقبول اجتماعياً.

- **bipolar d. (= manic depressive d.)**

اضطراب هلوسي اكتسابي؛ اضطراب ذو قطبين. اضطراب عاطفي يتصف بنوبات هلسية وأخرى مكتبة كالاضطراب الهوسي الاكتسابي.

- **body dysmorphic d.** اضطراب تشوه الجسم. اضطراب عقلي يتصف بانشغال البال بعيب خيالي يشوه مظهره بالرغم من أن مظهره سوي من دون أي عيب.

- **character d. (= personality d.)** اضطراب في الشخصية. اضطراب في علاقة المريض بمجتمعه ورفاقه الذي يفسد عليه أي تبادل إيجابي معهم وعدم استعمال قابلياته في أية فعالية اجتماعية.

- **conduct d.** اضطراب التصرف. اضطراب عقلي في الأطفال والمراهقين يتصف بعدم التقيد أو الاعتراف بحقوق الآخرين الأكبر أو الأصغر سناً منهم.

- **conversion d.** اضطراب تحولي. اضطراب نفسي يتصف بأعراض تحويلية (فقدان أو تغير بعض الوظائف الجسدية التي توحي بوجود مرض عضوي في الجهاز المصاب وعادة هو الجهاز الحسي الحركي والذي يتصف بنوبات الشلل وخلل الحركة والخرير والعمى وفقدان الصوت) ولكنها كلها من دون أي أساس فيزيولوجي واضح، ومما يؤدي أساسها النفسي ما يلي: 1. زيادة الأعراض في حالات الكرب النفسي. 2. التفريق عن التناقضات النفسية والقلق النفسي عند ظهور هذه الأعراض. 3. يكسب المريض كسباً ثانوياً (الاسناد والاهتمام والرعاية وتجنب المسؤوليات البغيضة) عند ظهور هذه الأعراض فيفرج عنها.

- **delusional d. (= paranoia)** اضطراب توهمي؛ ذهان كبريائي.

- **depersonalization d.** اضطراب تبدد الشخصية؛ اضطراب جهل الذات. اضطراب يتصف

بنوبات عدم معرفة الشخص لهويته والشعور بالغربة والابتعاد عن الواقع.

- **dissociative d's.** اضطرابات تفارقة. اضطرابات عصابية هستيرية تفارقية وهي اضطرابات عقلية تتصف بالتغير المفاجيء في الشخصية والذاكرة والوعي وتفارق الشخصية عن هوية المريض.

- **dysthymiac d. (= dysthymia)** اضطراب مكتئب.

- **factitious d.** اضطراب مفتعل. اضطراب عقلي يتصف بتقليد واع ومتكرر لبعض الاعراض الجسمية والنفسية لا لغرض معين إلا للحصول على المعالجة.

- **functional d.** اضطراب وظيفي. اضطراب وظيفي من دون وجود آفة عضوية ويعني ذلك في الطب النفسي اضطراباً نفسي المنشأ. أما في الطب العام فيعني اضطراباً مجهول السبب.

- **generalized anxiety d.** اضطراب قلبي عام. اضطراب عقلي عصابي يتصف بقلق عام من موضوعين حياتيين أو أكثر ويدوم لمدة ستة أشهر أو أكثر.

- **identity d.** اضطراب الهوية. ضائقة شخصية وخيمة تدوم ثلاثة أشهر أو أكثر تتصف بعدم مقدرة المريض على جمع مناحي شخصيته المتعددة وبناء شخصية متكاملة منها وقبوله لذاته مما يولد لديه عدم الثقة بنفسه في اختيار عمله وشريكه الجنسي وسلوكه العام وقيمه الأخلاقية ويحدث هذا الاضطراب غالباً في أواخر مرحلة المراهقة.

- **induced psychotic d.** اضطراب ذهاني محرض. اضطراب توهمي يتولد في الشخص ينتج عن علاقته الوثيقة بشخص آخر مصاب باضطراب نفساني يتصف بتوهم واضح.

- **intermittent explosive d.** اضطراب انفجاري متقطع. اضطراب عقلي وظيفي يتصف بنوبات محددة من فقدان السيطرة والاندفاع الاعتدائي يولد اثناءها عدواناً خطيراً أو تخريباً للممتلكات ولا ينسجم هذا التصرف الشاذ مع أخلاق الشخص الاعتيادية الطبيعية.

- **isolated explosive d.** اضطراب انفجاري منعزل. اضطراب عقلي وظيفي يتصف بنوبة انفجارية

عنفية واحدة من دون سبب ولا علاقة لها بأية اضطراب نفسي أو عضوي.

- **major mood d's.** اضطرابات المزاج الكبيرة. اضطراب ذو قطبين واضطراب اكتئابي كبير.

- **manic-depressive d. (= bipolar d.)** اضطراب هوسي إكتئابي.

- **mental d.** اضطراب نفسي. متلازمة أعراض سلوكية أو نفسية تتصف بأعراض الضائقة المكتبة أو بتري وظيفي عقلي.

- **mood d's.** اضطرابات المزاج. اضطرابات عقلية تتصف بصورة رئيسية باضطراب المزاج الكلي أو الجزئي ويظهر كهوس أو اكتئاب.

- **organic mental d's.** اضطرابات نفسية عضوية. متلازمة دماغية خاصة تنتج عن آفة عضوية دماغية.

- **overanxious d.** اضطراب فرط القلق. اضطراب قلقي في الأطفال أو المراهقين يتصف بالقلق المفرط والسلوك التخوفي ولا علاقة له بأية حالة قلق طارئة أخرى.

- **panic d.** اضطراب الهلع. اضطراب عقلي عصابي يتصف بنوبات هلع متكررة مع الخوف الشديد والرعب مع بعض الأعراض الجسدية كضيق التنفس والخفقان والدوار والدوام والارتعاش والتخوف من الموت أو الجنون، وقد تدوم بعض الأعراض العصبية والتوتر بين النوبات التي قد تترافق مع رهاب السطح.

- **paranoid d. (= paranoia, delusional d.)** اضطراب زوراني.

- **post-traumatic stress d.** اضطراب الكرب بعد الرضخ. اضطراب نفسي يتولد عن حادثة رضحية فوق القدرة البشرية السوية مثل انتهاك العرض والاعتصاب أو معركة عسكرية أو قصف مدني شديد أو طارئ عارض خطر أو التعذيب أو معتقلات الموت ويتصف بمعاودة ذكريات العارضة والشعور بها وبآلامها أو تذكرها الواعي أو بصورة كابوس مما يولد اليقظة وفرط الانتباه والخدر النفساني أو العاطفي والأرق والشعور بالذنب.

- **psychogenic pain d. (= somatoform pain d.)** اضطراب ألمي نفسي المنشأ.

- **psychophysiologic d. (= psycho-somatic d.)** اضطراب نفسي فيزيولوجي.

- **psychosomatic d.** اضطراب نفسي جسدي. اضطراب تسبب معظم أعراضه الجسدية وتضخمها بعض العوامل النفسية مثل صداع الشقيقة أو ألم الظهر السفلي أو القرحة المعدية أو متلازمة الأمعاء الهيجية.

- **schizoaffective d.** اضطراب فصامي عاطفي. اضطراب نفسي يتصف بأعراض فصامية ومزاجية.

- **schizophreniform d.** اضطراب فصامي نفسي. اضطراب عقلي يتصف بأعراض فصامية منذ مدة تقل عن السنة أشهر.

- **seasonal mood d.** اضطراب المزاج الموسمي. اضطراب يتصف بالكآبة مع زيادة الحاجة للنوم وكثرة تناول السكريات، ويحل ذلك في فصل الشتاء.

- **separation anxiety d.** اضطراب قلق الانفراق. ضائقة وتخوف يصيب الأطفال عند افتراقهم عن أبويهم أو عن محيطهم.

- **shared paranoid d. (= induced psychotic d.)** اضطراب ذهاني محرض.

- **sleep terror d.** اضطراب دعر النوم. نوبات متكررة من الاستيقاظ بعد النوم مع القلق الشديد وأعراض عصبية ذاتية مع عدم الاستجابة لمحاولات التهدئة.

- **sleepwalking d.** اضطراب السير النومي. نوبات متكررة من السير النومي.

- **somatization d.** اضطراب الجسدنة. الهستيريا التقليدية، اضطراب نفسي يتصف بشكاوى جسدية متعددة غير ناتجة عن أمراض عضوية جسدية.

- **somatoform d's.** اضطرابات نفسية جسدية الشكل. اضطرابات عقلية تتصف بأعراض تدل على اضطرابات جسدية من أصل نفسي المنشأ ولكنها خارجة عن التحكم الإرادي كالعصاب الهستيري والاضطراب التحويلي واضطرابات تشوه الجسم.

- **somatoform pain d.** اضطراب نفسي مؤلم جسدي الشكل. اضطرابات نفسية تتصف بألم وخيم مزمن. وهو من مجموعة الاضطرابات التحويلية (فالالم لا يتناسب مع التوزيع التشريحي العصبي ولا مع الآلية الفيزيولوجية المرضية إذ أنه أكثر كثيراً من المتوقع من التغيرات العضوية المرضية الموجودة كما

- تظهر علامات تدل على أن الاضطراب هو نفسي المنشأ).
- unipolar d. (= dysthymia)** **إِضْطِرَابٌ أَحَادِي** القطب. عصاب اكتئابي.
- disorientation** **تَوَهَانٌ**. حالة تخليط عقلي للوقت والمحل أو للهوية.
- spatial d.** **تَوَهَانٌ فَضَائِيٌّ**. حالة عدم تمكن الطيار من معرفة موقعه الفضائي بالنسبة للأرض بدقة وقد تحدث عن انخداع دهليزي.
- temporospatial d.** **تَوَهَانٌ زَمَانِيٌّ مَكَانِيٌّ**. حالة عدم تمكن المريض من معرفة وضعه بالنسبة للمكان والوقت في محيطه.
- disseminated** **مُنْتَشِرٌ**. منتشر على مساحة واسعة.
- dissociation** **تَفَارُقٌ؛ إِفْتِرَاقٌ**. 1. عملية فصل أو حالة انفصال. 2. في علم النفس هي عملية دفاعية يتم فيها عزل مجموعة من العمليات الفكرية عن باقي الفعاليات الدماغية كي يتجنب الشخص الضائقة العاطفية ويتم فيها فصل الأفعال عن مدلولاتها العاطفية.
- peripheral d.** **تَفَارُقٌ مُحِيطِيٌّ**. اختلال حسي تقل فيه حواس اللمس والالام السطحي والحرارة في اليدين والقدمين ويشاهد ذلك في التهاب الأعصاب المتعدد.
- syringomyelic d.** **التَفَارُقُ التَّكَهُّفِيُّ النُّخَاعِي**. فقدان جسدي الألم والحرارة مع الاحتفاظ بباقي الحواس نتيجة آفة في القناة المركزية للنخاع الشوكي تصيب السبيل النخاعي المهادي.
- tabetic d.** **التَفَارُقُ التَّابِسِيُّ**. اختلال جسدي الامتزاز والأوتار العضلية نتيجة آفة في السبل النخاعية الخلفية.
- dissonance** **تَنَافُسٌ**. اختلاف أو تعارض أو عدم انسجام.
- cognitive d.** **تَنَافُسٌ مَعْرِفِيٌّ**. الشعور بالقيض الذي ينشأ عند عدم انسجام أفكار الشخص أو معتقداته أو مواقفه مع تجاربه وخبرته.
- distad** **نَحْوُ الْقَاصِي؛ مَقَاصٍ**. متجه باتجاه القاصي.

- distal** **قَاصٍ**. بعيد عن أية نقطة أو مرجع.
- distalis (= distal)** **قَاصٍ**.
- distortion** **تَحْرِيفٌ؛ إِفْتِتَالٌ**. في علم النفس هي عملية تحريف أو تغيير الأفكار اللاشعورية أو دوافعها بطريقة تصبح مقبولة للفكر الواعي.
- paradox d.** **تَحْرِيفٌ مُتَنَافِضٌ**. تحوير الأحكام والمفاهيم خصوصاً في العلاقات الشخصية بطريقة تتلاءم مع حاجات الشخص كي تنسجم مع خبراته السابقة.
- distractibility** **شُرُوبِيَّةٌ**. عدم مقدرة الشخص على تركيز انتباهه على العمل الذي يقوم به وقد يشرد انتباهه إلى أمور تافهة في محيطه.
- distraction** **شُرُودٌ**. حالة انحراف انتباه الشخص عن العمل أو الحالة التي هو فيها أو توزيعها على عدة أعمال في وقت واحد.
- distress** **ضَائِقَةٌ**. (ج: ضَوَائِقُ). معاناة جسدية أو كرب نفسي.
- disturbance** **إِضْطِرَابٌ**. (ج: إِضْطِرَابَاتٌ). انحراف عن السوي.
- emotional d. (= illness, emotional)** **اضطراب انفعالي؛ إِضْطِرَابٌ عَاطِفِيٌّ**.
- transient situational d. (= reaction, acute stress)** **إِضْطِرَابٌ حَادِثِيٌّ عَابِرٌ**.
- diurnal** **نَهَارِيٌّ**. يحدث خلال النهار.
- d. rhythm** **نَظْمٌ نَهَارِيٌّ**.
- d. variation** **تَغْيِيرٌ نَهَارِيٌّ**.
- dizziness** **دَوَامٌ؛ دَوْخَةٌ**. اضطراب حس التوضع في المحيط والحس بعدم ثبات الرأس وحركته.
- dol** **دُولٌ**. وحدة قياس شدة الألم.
- dolichocephalia (= dolichocephaly)** **إِسْتِطَالَةُ الرَّأْسِ**.
- dolichocephalic** **طَوِيلُ الرَّأْسِ**. شخص طويل الرأس، يبلغ عامل طول الرأس عنده 75.9 أو أقل من ذلك.

dolichocephaly اسْتِطَالَةُ الرَّأْسِ. حالة كون رأس الشخص طويلاً.

dolichocranial طَوِيلُ الْقَافِ. من له جمجمة طويلة ويبلغ عامل طولها 74.9 أو أقل من ذلك.

dolor أَلَمٌ. أحد الأعراض الرئيسية للالتهاب.

- d. capitis صداع. انظر headache.

- d. coxae وَرَافُكٍ. انظر coxalgia.

- d. praesagientes أَلَمٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ. الآلام الكاذبة التي تحس بها الحامل أثناء الحمل والشبيهة بتلك التي تحس بها أثناء الحيض والتي تدل على قرب الولادة.

- d. vagus أَلَمٌ مُتَجَوِّلٌ. انظر pain, wandering.

dolores آلام. جمع ألم.

dolorific مُؤْلِمٌ. ما يسبب أو يولد الألم.

dolorimeter مِقْيَاسُ الْأَلَمِ. آلة لقياس شدة الألم.

dolorimetry قِيَاسُ الْأَلَمِ. عملية قياس الألم.

dolorigenic مُؤْلِمٌ. ما يسبب الألم أو يولده.

dominance سِيَادَةٌ. 1. حالة سيادة أحد الأعضاء أو أحد الأقسام على الأقسام الأخرى. 2. في الوراثة، خاصية التعبير التام للنمط الظاهري للجين في الزيجوتين المماثل والمباين على السواء.

- cerebral d. سِيَادَةٌ مُخَيَّةٌ. سيادة أحد النصفين المخيين على النصف الآخر كما تظهر في وظائفهما حيث تكون حركات إحدى جهتي الجسم أنشط من حركات الجهة الثانية.

- lateral d. سِيَادَةٌ جَانِبِيَّةٌ. الاستعمال التفضيلي لإحدى الجهتين في القيام بالحركات الإرادية وخصوصاً بالأعضاء المزدوجة فيهما.

- ocular d. سِيَادَةٌ عَيْنِيَّةٌ. تفضيل استعمال إحدى العينين على العين الأخرى.

- one-sided d. (= lateral d.) سِيَادَةٌ جَانِبِيَّةٌ.

dominant سَائِدٌ. 1. عضو أو بنية تتحكم وتسيطر على أخريات. 2. أَلِيلٌ أو خَلَّةٌ أو صفة سائدة.

dopa دوبا. حمض أميني يعمل كطليعة للدوبامين وكمنتوج وسط في إنتاج الأبينفرين

والنورأبينفرين والميلانين ويستعمل نوعه (دوبا -L) في علاج الباركنسونية.

dopamine دُوبَامِينٌ. مادة وسطية في تركيب النورأدرينالين تعمل كناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي.

dopaminergic دُوبَامِينِيٌّ الْفِعْلُ. يُنَشِّطُ أو ينقل بواسطة الدوبامين.

dormant هَاجِعٌ. نائم أو خامل أو ساكن.

dorsad بِاتِّجَاهِ الظَّهْرِ؛ ظَهْرِيًّا. متجه نحو الظهر.

dorsal ظَهْرِيٌّ. منسوب للظهر أو موجود في منطقة الظهر أو متجه نحوه، ويمائل «خلفي» في تشريح الإنسان و«علوي» في تشريح رباعيات الأرجل.

dorsalgia أَلَمُ الظَّهْرِ. ألم في الظهر.

dorsalis (= dorsal) ظَهْرِيٌّ.

dorsiflexion انْتِفَافٌ ظَهْرَانِيٌّ. ثني نحو الناحية الباسطة للذراع كثني القدم أو اليد.

dorsum ظَهْرٌ. (ج: ظُهُور). ظهر الجسم أو ظهر أحد الأعضاء.

dosage تَقْدِيرُ الْجُرْعَاتِ. تعيين وتنظيم كمية وعدد وأوقات ومرات إعطاء الجرعات.

dose جُرْعَةٌ. كمية العلاج التي تعطى في المرة الواحدة ككمية الدواء مثلاً أو مقدار الأشعة التي تمتصها الأنسجة في المرة الواحدة بالمعالجة الشعاعية.

- average d. جُرْعَةٌ وَسْطَى. كمية من الدواء يمكنها أن تولد التأثير المتوقع من استعماله.

- booster d. جُرْعَةٌ مُعَزِّزَةٌ. جرعة من العامل المناعي التي تعطى لإدامة المناعة، وهي عادة ما تكون أصغر من الجرعة الأولية.

- curative d. جُرْعَةٌ شَافِيَّةٌ. جرعة كافية لشفاء المريض.

- daily d. جُرْعَةٌ يَوْمِيَّةٌ. مجموع كمية الدواء التي تعطى للمريض في الأربع والعشرين ساعة.

- divided d. جُرْعَةٌ مُقَسَّمَةٌ. جزء من كمية الدواء التي تعطى في فترات متباعدة خلال الأربع والعشرين ساعة.

- **effective d.** جُرْعَةٌ مُؤَثِّرَةٌ: جُرْعَةٌ فَعَّالَةٌ. كمية الدواء التي تولد التأثير الذي وصف الدواء من أجله.

- **maintenance d.** جُرْعَةُ الإِدَامَةِ: جرعة المداومة. كمية الدواء اليومية المناسبة لإدامة المستوى الكافي لتوليد التأثير المرغوب في الجسم والذي يبدأ عادة منذ إعطاء الجرعة الكبيرة الأولى.

- **maximum d.** الجُرْعَةُ الْقُصْوَى. أكبر كمية من العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض العادي بسلامة.

- **minimal d. (= minimum d.)** الجُرْعَةُ الدُّنْيَا. أصغر كمية من العلاج التي يمكن أن تولد تأثيراً ملحوظاً في المريض.

- **optimal d. (= optimum d.)** الجُرْعَةُ الْمُثَلَّى. كمية العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض من دون أن تحدث أضراراً غير مرغوبة وتولد تأثيراً علاجياً كافياً.

- **priming d.** جُرْعَةُ الْإِبْتِدَاء. كمية من الدواء أكبر من جرعة الإدامة بكثير تعطى عند البدء بالعلاج كي يصل تركيزه في الدم والأنسجة لمستوى علاجي مؤثر وبسرعة.

- **therapeutic d.** جُرْعَةُ عِلَاجِيَّة. جرعة كبيرة أكبر من جرعة الإدامة تعطى عند المعالجة بالفيتامين في حالات العوز الشديد.

- **tolerance d.** جُرْعَةُ الْحَثَل. أكبر كمية من العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض من دون إحداث أي ضرر له.

- **toxic d.** جُرْعَةُ سَاطَةٍ. كمية العلاج التي تولد أعراضاً سمية.

dosis جُرْعَةٌ. انظر dose.

dream حُلْمٌ؛ مَنَامٌ. ظاهرة نفسية تحدث أثناء النوم يحس فيها المريض بصور وأفكار وعواطف وكأنها تجارب واقعية. وتتم الأحلام خلال فترة النوم السريع الحركات العينية.

- **day d.** أَحْلَامُ الْيَقَظَةِ. تمنيات خيالية من دون اعتبار للواقع.

- **wet d.** إِحْتِلَامٌ لَيْلِي. قذف منوي ليلي أثناء النوم عادة.

dromic مُسَايِرٌ؛ مُسَاوِي. يشير إلى الدفعات العصبية التي تسير بالاتجاه السوي الصحيح، مثلاً

من التخصّنات إلى جسم الخلية ومنها إلى المحوار أو من المستقبلية إلى جسم الخلية العصبية.

dromomania هَوَسُ التَّجَوُّال. الرغبة الملحة في التجوال والسفر.

dromophobia زُهَابُ الْعُبُور. الخوف من الجري أو من عبور الشوارع.

dromotropism تَوَجُّيَةُ التَّوَصِيل. الخاصية أو الخواص التي تؤثر على قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات (التوصيلية).

- **negative d.** التَّوَصِيلِيَّةُ السَّلْبِيَّة. الخاصية التي تقلل من قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات.

- **positive d.** التَّوَصِيلِيَّةُ الْإِجَابِيَّة. الخاصية التي تزيد من قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات.

drop 1. قَطْرَةٌ 2. تَدَلِّي؛ هُطُول. 1. كرية صغيرة من السائل عند سقوطها. 2. هبوط.

- **finger d.** تَدَلِّي الإصْبَع؛ إَصْبَعٌ مَطْرَقَةٌ. انظر finger, mallet.

- **foot d.** تَدَلِّي الْقَدَم؛ إِرْتِخَاءُ الْقَدَم؛ قَدَمٌ سَاقِطَةٌ. انظر footdrop.

- **hand d.** تَدَلِّي الرَّسْغ. انظر wristdrop.

- **d. phalangette** سَقُوطُ السَّلَامِيَّات؛ إِنْثِنَاءُ الإِصْبَع. حالة الانثناء الدائم لسلامي أصابع اليد أو القدم كما هو الحال في الإصبع المطرقي.

- **wrist d. (= wristdrop)** تَدَلِّي الرَّسْغ.

drowsiness نَعَاسٌ. الشعور بالرغبة في النوم.

1. دَوَاءٌ. (ج: أدوية) 2. عَقَّار. (ج: عَقَائِر). **drug** 1. مركب كيميائي يستعمل في الإنسان أو الحيوانات للمساعدة في تشخيص الأمراض أو معالجتها أو الوقاية منها أو لتسكين آلام المرضى أو التخفيف من معاناتهم أو للتحكم في بعض الحالات المرضية أو الفيزيولوجية أو تحسينها 2. مخدر.

- **antagonistic d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ. دواء يعادل أو يصاد فعالية دواء آخر.

- **antianxiety d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلْقَلَقِ. دواء مسكّن أو مهدئ خصوصاً من نوع المهدئات البسيطة.
- **anticonvulsant d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلإِخْتِلَاجِ. دواء مسكّن ومهدئ للاختلاج.
- **antimanic d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلهَوَسِ. أي دواء يعالج أعراض الهوس خصوصاً كربونات الليثيوم.
- **habit-forming d.** دَوَاءٌ مُخَدِّطٌ لِلإِدْمَانِ. دواء يولد استعماله الطويل الإدمان وخصوصاً الادوية المخدرة منها.
- **maintenance d.** دَوَاءٌ الإِدَامَةِ. علاج يستعمل لفترة طويلة ومستمرة لإدامة تأثيره ولمنع نكس المريض.
- **psychotropic d.** دَوَاءٌ نَفْسِيّ التَّأثيرِ. دواء يؤثر على الوظائف العقلية والسلوك والذي يستعمل لمعالجة الأمراض العقلية والنفسانية.
- drug-fast (= drug-resistant)** مُقَاوِمٌ لِلدَّوَاءِ.
- drug-resistant** مُقَاوِمٌ لِلدَّوَاءِ. مقاوم لفعل وتأثير الدواء كالجراثيم التي تقاوم الدواء.
- drunkenness** سُكْرٌ. حالة السكر وهي الكحولية الحادة.
- dualism** ثُنَائِيَّةٌ؛ ثَنَوِيَّةٌ. النظرية التي تنص على أن الإنسان مكوّن من جهازين منفصلين وهما الجسم والنفس وأن الظواهر النفسية والجسمية هما ظواهر منفصلة الواحدة عن الأخرى تماماً.
- duct (= ductus)** قَنَاقَةٌ (ج: قَنَوَات) ممر ذو جدران محددة وهو أنبوب لمرور الإفرازات والإبرازات.
- **acoustic d. (= meatus, external acoustic)** الصَّمَاخُ السَّمْعِيّ الظَّاهِرِ.
- **endolymphatic d.** قَنَاقَةُ اللَّفْفِ البَاطِنِ. قناة تربط القناة القريبية الكييسية مع كيسة اللفف الباطن.
- **utricleosaccular d.** القَنَاقَةُ القُرْبِيَّةُ الكَيْسِيَّةُ. قناة تربط القريب بالكييس.
- ductus (= duct)** قَنَاقَةٌ.
- **d. reuniens** القَنَاقَةُ المُوَحَّدَةُ. قناة صغيرة تمر من الكييس إلى القناة القوقعية.

- dull** 1. اصمّ 2. بليد 3. كليل. 1. غير رنان 2. قليل الذكاء 3. غير مدبب أو غير حاد.
- dumb (= mute)** أخرس. لا يتمكن من النطق.
- dumbness (= mutism = aphasia)** خَرَسٌ؛ حُبْسَةٌ.
- dura (= dura mater)** الجَافِيَّةُ.
- dural** جَافَوِيٌّ. متعلق أو منسوب للجافية.
- dura mater** الأُمُّ الجَافِيَّةُ. الغشاء الخارجي من الأغشية الثلاثة التي تحيط بالدماغ والنخاع وهو أمتنها وأكثرها تليفاً.
- d. m. of brain (d.m.encephali)** الأُمُّ الجَافِيَّةُ الدُّمَاعِيَّةُ.
- d. m. encephali** الأُمُّ الجَافِيَّةُ الدُّمَاعِيَّةُ.
- الأم الجافية التي تغطي الدماغ والمكونة من طبقتين ملتصقتين الطبقة الخارجية داخل العظمية والمبطنة لعظام القحف والطبقة الداخلية السحائية وتوجد الجيوب الوريدية وعقدة ثلاثي التوائم بين هاتين الطبقتين.
- d. m. of spinal cord (= d. m. spinalis)** الأُمُّ الجَافِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ.
- d. m. spinalis** الأُمُّ الجَافِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ.
- الأم الجافية التي تغطي النخاع الشوكي وهي مفصولة عن سمحاق الفقرات المحيطة بالحيز خارج الجافية والذي يحوي الاوعية الدموية وانسجة ليفية وهلمية.
- duraplasty** رَأْبُ الجَافِيَّةِ. أية عملية راب أو غرس تجري على الجافية.
- duroarachnitis** التهاب الجافية والعنكبوتية.
- dwarfism** قَرَامَةٌ. قصور تنامي الجسم أو حالة كون المصاب قزماً صغير الحجم.
- dynamoneuron (= spinal motoneuron)** عَصَبُونٌ حَرَكَيٌّ نُخَاعِيٌّ. عصبون حركي متصل بعضلة ويبدأ من النخاع الشوكي.
- dysacusia (= dysacusis)** خَلَلُ السَّمْعِ. خلل سمعي في استقبال تردد الصوت أو شدته.
- dysanagnosia** خَلَلُ القَرَاءَةِ. عدم المقدرة على إدراك معاني بعض الكلمات أو عدم المقدرة على قراءتها.

dysantigraphia عُسْرُ الْإِنْتِسَاخِ. عدم المقدرة على استنساخ الكلمات المكتوبة بسبب آفة في السبيل الموصل بين مركز إبصار الكتابة ومركز تدوين الكلمات.

dysaphia خَلَلُ اللَّفْسِ. خلل حس اللمس.

dysarthria رُتَّةٌ؛ عُسْرُ التَّلْفُظِ. عدم المقدرة على تلفظ الكلمات بطريقة صحيحة بسبب سوء التحكم في عضلات النطق.

- ataxic d. (= cerebellar d.) رُتَّةٌ زَنْحِيَّةٌ.

- cerebellar d. رُتَّةٌ مُخَيَّخَةٌ. عسر التلفظ المولد عن آفة أو اختلال وظيفي في المخيخ مما يؤدي إلى تقطع وانفصال مقاطع الكلام.

- developmental d. رُتَّةٌ بِنَائِيَّةٌ. رتة خلقية يمكن أن تحدث بمفردها أو مع الشلل المخي.

- d. literalis (= stuttering) تَأْتَأَةٌ.

- spastic d. رُتَّةٌ تَشَنُّجِيَّةٌ. عسر التلفظ الذي يتولد عن تشنج عضلات النطق كما يحصل في بعض حالات الشلل المخي أو في الشلل البصلي المترقي في البالغين حيث تظهر الأصوات بطريقة انفجارية.

- d. syllabaris spasmodica (= stuttering) تَأْتَأَةٌ؛ رتة تشنجية للمقاطع.

dysautonomia خَلَلُ التَّلَقَّائِيَّةِ؛ خلل الوظائف المستقلة. مرض وراثي جسدي متنحي يصيب أطفال اليهود فقط ويتصف بخلل الدمعان وتبقع الجلد والاضطراب العاطفي وعدم التناسق الحركي وغياب حس الألم وفراط الانعكاسية.

dysbasia عُسْرُ الخَطْوِ. صعوبة المشي وخصوصاً تلك التي تتولد عن آفة عصبية.

- d. angiosclerotica (= claudication, intermittent) عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ.

- d. angiospastica (= claudication, intermittent) عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ.

- d. lordotica progressiva (= dystonia musculorum deformans) عُسْرُ الخَطْوِ القَعَسِيِّ المُتَرَقِّي.

dysboulia (= dysbulia) خلل الإرادة.

dyscalculia خَلَلُ الحِسَابِيَّةِ. عدم المقدرة

على حل المسائل الحسابية بسبب آفة أو مرض دماغي.

dyscephaly سُوءُ تَكْوُنِ الجُمُجَةِ. تشوه القحف وعظام الوجه.

dyschesia (= dyschezia) عُسْرُ التَّفَوُّطِ. صعوبة التفوط مع الألم.

dyschiasia خَلَلُ تَوْضِيعِ الإحْسَاسِ. عدم المقدرة على معرفة موضع الحس في الجسم الذي يتولد عن تنبيه الموضع.

dyschiria خَلَلُ تَوْضِيعِ المُنَبِّهِ. عدم المقدرة على معرفة جهة الجسم الملموسة المنبهة.

dyschronism خَلَلُ التَّزَامُنِ. عدم المقدرة على معرفة الفواصل الزمنية.

dyscinesia (= dyskinesia) عُسْرُ الحَرَكَةِ؛ خَلَلُ الحَرَكَةِ.

dysdiadochocinesia (= disdiadochokinesia) خَلَلُ تَنَاقُوبِيَّةِ الحَرَكَاتِ.

dysdiadochokinesia خَلَلُ تَنَاقُوبِيَّةِ الحَرَكَاتِ. خلل في وظيفة تناوبية الحركات حيث لا يتمكن المريض من القيام بحركات تناوبية متتالية مثل الكعب والبسط المتتاليين. أنظر diadochokinesia

dysdipsia عُسْرُ الشَّرْبِ. صعوبة تناول السوائل.

dysequilibrium خَلَلُ التَّوَازُنِ. عدم المقدرة على موازنة الجسم.

dyserethesia, dyserethism ضَعْفُ الحَسَّاسِيَّةِ. خلل الاستجابة للمنبهات الحسية.

dysergia خَلَلُ التَّنَاسُقِ الحَرَكَيِّ. عدم توازن الحركات بسبب آفة في الأعصاب الحركية.

1. ضَعْفُ الحِسِّ 2. تَحَسُّسٌ شاذ. 1. عدم أو ضعف التحسس بالمنبهات الحسية 2. تحسس بغض شاذ يتولد عن المنبهات الحسية السوية.

dysfunction خَلَلٌ وظيفي. اضطراب أو ضعف أو شذوذ وظائف أحد الأعضاء.

- minimal brain d. خَلَلٌ وظيفي دماغي صِغَرِيّ.

- ضعف المقدرة على الانتباه والتركيز مع فرط الحركة الشاذ
- myofascial pain d.** خَلَلٌ وَظِيفِيٌّ عَضَلِيٌّ
لفاسي مُؤَلِّم. انظر -syndrome, temporo-mandibular
- dysgeusia** خَلَلُ الذَّوْق. اختلال حاسة الذوق.
- dysgnosia** خَلَلٌ مَعْرِفِيٌّ. خلل واضطراب الوظائف الفكرية.
- dysgrammatism** عُسْرُ تَرْتِيبِ الْكَلَامِ.
عدم المقدرة على ترتيب مفردات الكلام بصورة صحيحة بسبب مرض أو رضخ دماغي.
- dysgraphia** خَلَلُ الْكِتَابَةِ. عدم المقدرة على الكتابة بصورة صحيحة وقد تكون جزءاً من حبة كلامية عامة أو بسبب آفة في المنطقة الحركية في الفص الجداري.
- dyskinesia** خَلَلُ الْحَرَكَةِ. خلل القدرة على القيام بحركات إرادية مما يولد تفكك الحركات أو نقصها.
- d. intermittens** خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْمُتَقَطِّعِ. عسر حركة الأطراف الذي يحدث بصورة متقطعة بسبب خلل دورتها الدموية.
- tardive d.** خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْآجِلِ. اضطراب خارج الهرمي العلاجي المنشأ الذي يتولد عن استعمال الادوية النفسية التأثير لفترة طويلة ويتصف بعسر الحركة القموي اللساني الحلقى والذي يشبه حركات المضغ المستمر مع إخراج اللسان بفترات متقطعة وحركات رقصية كنعية في الأطراف. ويصيب هذا الاضطراب النساء والشيوخ أكثر من الرجال والاحداث.
- dyskoimesis** عُسْرُ النَّوْمِ. صعوبة النوم والارق.
- dyslalia** خَلَلُ النُّطْقِ. خلل النطق بسبب تشوه أعضاء النطق الخارجية.
- dyslexia** خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. عدم المقدرة على قراءة الكلمات أو تهجيها أو كتابتها بالرغم من قدرته على رؤية الحروف وقراءتها وهو مرض وراثي جسدي سائد يغلب ظهوره في الذكور.
- dyslogia** خَلَلُ الْمَنْطِقِ. اضطراب المقدرة على التسبب والاستنتاج وضعف المنطق مع خلل الكلام بسبب مرض نفسي.
- dysmetria** خَلَلُ الْقِيَاسِ. حالة خلل قياس المسافات في الفعاليات العضلية وعدم المقدرة على تقدير مسافة الحركات العضلية الإرادية والسيطرة عليها.
- dysmimia** خَلَلُ الْإِيْمَاءِ. عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالإيماء.
- dysmnnesia** خَلَلُ الذَّاكِرَةِ. ضعف الذاكرة.
- dysmorphophobia** رُهَابُ التَّشَوُّهِ. الخوف من التشوه أو الاعتقاد الخاطئ بوجوده في الجسم.
- dysmorphosis (= malformation)** تَشَوُّهُ. سوء التكون.
- dysmyotonia** خَلَلُ التَّوَتُّرِ الْعَضَلِيِّ. توتر عضلي شاذ.
- dysnomia** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ. عدم تذكر الأسماء الجزئي.
- dysorexia** خَلَلُ الشَّهْيَةِ. شذوذ الشهية أو ضعفها.
- dysosmia** خَلَلُ الشَّمِّ. شذوذ الشم.
- dyspareunia** عُسْرُ الْجَمَاعِ. صعوبة الجماع أو ألمه.
- dyspepsia** تَخَمُّعٌ؛ عُسْرُ الْهَضْمِ. اضطراب الوظائف الهضمية والشعور بالامتلاء بعد الطعام.
- dysphasia** خَلَلُ الْكَلَامِ. اضطراب النطق الذي يتصف بعدم المقدرة على تنسيق الكلام وترتيب الكلمات بنظام خاص لتؤدي المعنى المقصود منها.
- dysphemia** تَأْتَاةٌ نَفْسِيَّةٌ الْمَنْشَأُ. التأتاة واضطرابات الكلام الأخرى النفسية المنشأ.
- dysphonia** خَلَلُ التَّصَوُّيْتِ. اضطراب أعضاء التصويت وصعوبة النطق.
- dysphoria** انزعاج؛ يَرَمٌ؛ تَحَوُّزٌ. تقلقل وفتر.
- dysphrasia (= dysphasia)** خَلَلُ النُّطْقِ. سوء نطق الكلام بسبب آفة مخية.

dysphylaxia الإِسْتِيقَاطُ المُبَكِّرُ. الاستيقاظ من النوم صباحاً مبكراً.

dysplasia ثَدَنٌ؛ خَلَلُ التَّنَسُّجِ. شذوذ تنامي أحد الأعضاء أو الأنسجة أو تغير في حجم أو شكل أو ترتيب خلايا النسيج.

ثَدَنٌ قَحْفِيٌّ جَذَلِيٌّ. حالة - craniodiaphyseal d. وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تنصف بفرط تعظم القحف وعظام الوجه مما يولد تشوهاً واضحاً.

ثَدَنٌ قَحْفِيٌّ كُرْدُوسِيٌّ. - craniometaphyseal d. خلل التنسج الكردوسي يتصف بفرط تعظم عظام الرأس الذي يؤدي إلى ضخامة الرأس وتشويهه.

dyspragia إِيْلَامُ الأداء. التآلم عند أداء أية وظيفة.

dyspraxia خَلَلُ الأداء. عدم المقدرة على القيام بحركات منسقة.

dysprosody إِخْتِلَالُ التَّصَوُّيت. اضطراب شدة ونغمة ونظم الأصوات عند الكلام.

dysraphia خَلَلُ الرِّفَاء. سوء رفو الرفاء مثل رفاء الأنيوب العصبي.

dysreflexia خَلَلُ المُنْعِكِسَات. اضطراب الاستجابة للمنبهات.

خَلَلُ المُنْعِكِسَات المستقلّة. - autonomic d. أعراض تظهر عند إصابة نخاع بآفة فوق مستوى وسط الصدر وتتصف بارتفاع ضغط الدم وبطء القلب والتعرق الشديد وتبيغ الوجه واحتقان الأنف والصداع وتقلص مقفات الشعر وكلها تظهر كنوبات انتيائية وتنتج عن فرط استجابة الجهاز العصبي الذاتي (المستقل) للمنبهات كتمدد المستقيم أو المثانة الشاذ.

خَلَلُ الرِّفَاء. انظر dysraphia.

dysrhythmia خَلَلُ النِّظْم. خلل الوظائف النظامية للجسم كالنوم والتنفس.

خَلَلُ النِّظْم الدِّمَاغِيّ. خلل نظامية - cerebral d. الموجات الدماغية التي يسجلها التخطيط الكهربائي للدماغ.

خَلَلُ النِّظْم الدِّمَاغِيّ. - electroencephalographic d. (= cerebral d.)

dysomnia إِضْطِرَابُ النَّوْم. اضطراب النوم ونظمه.

عُسْرُ الوُقُوف. عدم استطاعة المريض الوقوف على قدميه.

dyssymbolia خَلَلُ التَّفَكُّر. خلل في إدراك الفكر وصعوبة التعبير عن الأفكار بالكلمات.

dyssymmetry خَلَلُ التَّنَاطُر. حالة فقدان التناظر على الجهتين.

dyssynergia خَلَلُ التَّآزُر. اضطراب تآزر العضلات وتنسيق حركاتها.

خَلَلُ التَّآزُر - d. cerebellaris myoclonica المُخَيِّجِي الرَّمَقِيّ. خلل التآزر العضلي الذي يصاحب الصرع الرمعي.

خَلَلُ التَّآزُر - d. cerebellaris progressiva المُخَيِّجِي المُتَرَقِّي. حالة تنصف بالرعاش القصدي العام والشديد والمترافق مع اضطراب التوتر والتآزر العضلي بسبب اضطراب الوظائف المخيخية.

عُسْرُ الوُقُوف. - dystasia (= dysstasia) صعوبة الوقوف.

عُسْرُ الوُقُوف الرَّجَجِيِّ الوَرَاثِيِّ. - hereditary ataxic d. (= Roussy-Levy syndrome)

رَنَجٌ جُزْئِيٌّ. - dystaxia (= partial ataxia) صعوبة التحكم بالحركات الإرادية.

خَلَلُ غُلْقِ السَّقْف. خلل خلقي يتصف بعدم انغلاق الأنيوب العصبي مما يولد تشوهات الجهاز العصبي كالسنسنة المشقوقة والقبيلة السحائية أو انعدام الدماغ أو مسامية الدماغ.

إِكْتِيَابٌ جُزْئِيٌّ. - dysthymia اضطراب المزاج الذي يتصف بالشعور بالكآبة وفقدان الاهتمام والتلذذ بالأعمال والحوادث الاعتيادية.

خَلَلُ التَّوَثُّر. - dystonia اضطراب التوتر العضلي.

خَلَلُ التَّوَثُّر المُشَوِّه - d. deformans progressiva (= d. musculorum deformans) المُتَرَقِّي.

خَلَلُ التَّوَثُّر العَدَسِيّ. - d. lenticularis خلل التوتر الناتج عن آفة النواة العدسية.

خَلَلُ التَّوَثُّر - d. musculorum deformans العَضَلِيّ المُشَوِّه. مرض جيني مزمن نادر يتصف بتقلصات رمعية لا إرادية غير منتظمة في عضلات

الجذع والأطراف تظهر بصورة خاصة أثناء السير حيث تدير هذه التقلصات الشاذة الجسم إلى الامام والجانب. وتظهر اعراض النوع الجسدي العتني من المرض قبل البلوغ وخاصة بين اليهود أما النوع الجسدي السائد فيظهر بعد البلوغ.

- tardive d. خَلَلُ التَوَثُّرِ الأَجَلِ. نوع من عسر الحركة الأجل الذي يتصف بحركات مختلفة التوتر.

- torsion d. (= d. musculorum deformans) خَلَلُ التَوَثُّرِ الإِلْتَوَائِي.

dystopia خلل التوضع؛ سوء التوضع. سوء توضع أحد الأعضاء.

dystrophia (= dystrophy) خَلَلٌ.

dystrophoneurosis 1. عُصَابٌ سَوٌّ 2. سوء التغذية العصابي 1. أي اضطراب عصبي يسببه سوء التغذية 2. سوء التغذية الذي تولده الاضطرابات العصبية.

dystrophy خَلَلٌ. (ج: خُلُولٌ). أي اضطراب يتولد عن سوء التغذية أو قتلها وخاصة الخلل العضلي.

- adiposogenital d. خَلَلٌ شَخَامِيٌّ تَنَاسُلِيٌّ. حالة تتصف بشحامة انثوية النمط ونقص التنسج التناسلي والذي يترافق مع آفات النخامي.

- distal muscular d. خَلَلُ العضلات القاصية؛ خَلَلٌ عَضَلِيٌّ قَاصٍ. اعتلال عضلي وراثي قاص متأخر.

- Duchenne type muscular d. (= pseudohypertrophic muscular d.) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ نَمَطٌ دُوشِينٍ؛ خَلَلٌ عَضَلِيٌّ تَضَخُمِي كاذب.

- Erb's d. (= pseudohypertrophic muscular d.) خَلَلٌ إِرْبٍ؛ خَلَلٌ عَضَلِيٌّ تَضَخُمِي كاذب.

- infantile neuroaxonal d. خَلَلٌ طِفْلِيٌّ عَصَبِيٌّ مِخَوَارِيٌّ. اعتلال دماغي تنكسي وراثي مترق ينتقل كصفة جسدية متنحية ويبدأ عند الطفولة بوهن عضلي وتوقف النمو ثم يتبعه الخرف والعمى والتشنج والرنح. ويتصف أيضاً بتورم بؤري وتنكسي في محاور عصبونات الدماغ.

- Landozy-Dejerine d. خَلَلٌ لَانْدُوَزِيٌّ - دِيَجِيرِين. خَلَلٌ عَضَلِيٌّ وراثي جسدي سائد يتصف بضمور عضلات الوجه والمنكب والحزام والساعد ويولد سحنة وجهية تسمى «سحنة الاعتلال العضلي».

- limb-girdle muscular d. خَلَلُ جِزَامِ الأَطْرَافِ العَضَلِيَّةِ. خَلَلٌ عَضَلِيٌّ مترقي يبدأ في الطفولة أو عند البلوغ ويتصف بضمور ووهن عضلات الحزامين الحوضي والمنكبي.

- muscular d. خَلَلٌ عَضَلِيٌّ. مجموعة اعتلالات عضلية تنكسية تتصف بوهن العضلات وضمورها من دون إصابة الجهاز العصبي، وهناك ثلاثة أنواع منه وهي الخلل العضلي الضخامي الكاذب والخلل الوجهي الكتفي العضدي وخلل عضلات أحزمة الأطراف.

- myotonic d. خَلَلٌ عَضَلِيٌّ تَوَثُّرِيٌّ. خَلَلٌ عَضَلِيٌّ وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويتصف بالتوتر العضلي الذي يتلوه الضمور (خصوصاً في عضلات الوجه والرقبة) والساد وقصور الغدد التناسلية والصلع الجبهي وشذوذ القلب.

- progressive muscular d. (= muscular d.) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

- pseudohypertrophic muscular d. الخَلَلُ العَضَلِيُّ الضَخَامِيُّ الكَاذِبُ. مرض مزمن مترق يصيب حزامي المنكب والحوض ويبدأ في الطفولة ويتصف بالوهن العضلي الضخامي الكاذب والمترقي والذي يتلوه ضمور العضلات والقعس والمشيّة الاهتزازية مع انفراج الساقين وينتقل المرض كصفة مرتبطة بالصبغي X ويصيب الذكور.

- reflex sympathetic d. الخَلَلُ المُنْعَكِسِيّ الوُدِّيّ. اضطراب الجهاز العصبي الودي الذي يتصف بالاشحوب أو بالاحمرار والالام والتعرق والوزمة وضمور الجلد وهو يتلو عادة الكسور أو رضح العصب أو الاوعية الدموية.

- thyroneural d. الخَلَلُ الدَّرَقِيّ العَصَبِيّ. حالة تتصف بالرقص والكنع والصل والرنح والاعراض الأخرى المترافقة مع إصابات الجهاز العصبي الذاتي مع العيوب العقلية والدرقية.

I

earache (= otalgia) أَلَمُ الأُذُن. وجع الأذن.

earwax (= cerumen) صِفْلَاخ. إفراز شمعي
الشكل يفرز في الصاخ السمعي الظاهر.

ecdysiasm هَوَسُ التَّعَرِّي. الرغبة الشاذة
لخلع الملابس والتعري.

مُخَطَّطُ صَدَى الدِّمَاغِ. **echoencephalogram**
المخطط الذي يحصل عليه بتخطيط صدى الدماغ.

echoencephalograph مِخْطَاطُ صَدَى
الدِّمَاغِ. جهاز تخليط صدى الدماغ.

تَخْطِيطُ صَدَى **echoencephalography**
وسيلة تشخيصية ترسل فيها نبضات فوق
الدماغ.

صوتية من جهتي الرأس ويسجل صداها من بنيات المستوى الوسطي للدماغ كمخطط بياني ويدل أي انحراف عن المستوى الوسطي على وجود ورم فيه.

echographia صُدَاءُ كِتَابِيّ. حبسة يقلد المريض فيها الكتابة ولكنه لا يمكنه التعبير عن أفكاره كتابة.

echokinesis (= echopraxia) صَدَاءَ حَرَكَى.

echolalia صَدَاءٌ لَفْظِيّ. إعادة نمطية كلمات أو مقاطع نطق شخص آخر تشاهد في بعض حالات الفصام وخصوصاً في الفصام الجامودي.

صداء حركي. echomatism (= echopraxia)

صداء حرَكِيّ. echomimia (= echopraxia)

صداء حركي. echomotism (= echopraxia).

echopathy **إِغْتِلَالٌ هُدَائِيٌّ**. تقليد حركات
وأقوال الآخرين.

صداء لفظی. echophrasia (= echolalia)

echopraxia صُدَاءُ حَرَكَيْ. تقليد نمطي
لحركات شخص آخر يشاهد في بعض حالات
الفصام الجامودي.

eclampsia إرتِجاج. اختلاج وغيوبة يحدثان عند الحمل والنفاس.

إرتِعَاجُ نَفَاسِي. ارتعاج يحصل
بعد الولادة.

eclysis (= mild syncope) غشي خفيف.

ecmnesia نَسَاؤُهُ الْجَدِيد. نسيان الأحداث الجديدة مع الاحتفاظ بذاكرة طبيعية للأحداث القديمة.

ecomania هَوَسُ السِّيَادَةِ الْعَائِلِيَّةِ. هوس الهيمنة على أفراد العائلة مع التواضع تجاه الآخرين ذوي السلطة.

ecstasy شَطْح؛ وَجْد. نشوة وابتهاج او
ذهول مبہج.

ECT (= electroconvulsive therapy)
المُعالِجَةُ بالتَّخْلِيلِ الكَهْرَبِيِّ.

ectocinerea السِّنْجَابِيَّةُ الْخَارِجِيَّةُ. القشرة
السِّنْجَابِيَّةُ لِلْمَخ.

ectopia انْتِبَاز. انزياح أو سوء توضع أحد الأعضاء خصوصاً عندما يكون ذلك خلقياً.

edrophonium إيدروفونثيوم. مادة مضادة للكولينستيراز تعمل لمدة عشر دقائق تستعمل للتشخيص التفريقي وتقييم العلاج في الوهن العضلي الوبيل وكمنادة مضادة للمواد المحصرة العصبية العضلية اللامزيلة للاستقطاب.

EEG (= electroencephalogram) مَحْطَطُ كَهْرِبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ.

effect أثر؛ تأثير؛ فعل.

effector مُستَفْعِل. عضو يولد عملاً عند تنبيهه
مثل العضلة التي تتقلص أو الغدة التي تفرز عند
تنبيهها.

efferent صَادِر. ما ينقل بعيداً عن المركز
كالليف العصبي الصادر.

efferential (= efferent) صَادِر.

egersis سُهاد. أرق شديد.

ego الأنا. جزء النظام النفسي الذي يتوسط
بين الذات والعالم الخارجي ووظيفته استقبال
حقائق المحيط وإدراكها والتلاؤم معها والاستجابة
لها بكفاءة.

- auxillary e. الأنا المُساعد. شخص يطابق
شخصيته مع رغبات وأهداف شخص آخر بهدف
تعزيزها وتطويرها مثل الأم التي تعمل كإنسان مساعد
يعزز شخصية ابنها أو بنتها.

- body e. أنا الجسم. التطابق النفسي لانا النفس
مع انا الجسم اللذين يكوّنان شخصية الفرد وصورته
الاجتماعية.

- preschizophrenic e. أنا قبل الفُصام. أنا
تتصف بعدم انسجام تراكيب وظائفها فتولد انفصاماً
كبيراً مع الواقع قد يسبق ذلك الفصام.

egocentric أَنَانِيّ التَّركِيز. شخص منطوي
على الذات ومعجب بنفسه ومغرور ومهتم بها
وباحتياجاته وغير مهتم بالآخرين فهو مركز على
ذاته فقط.

ego-dystonic تَفَارُقُ الذات؛ مرفوض من الأنا.
شعور الشخص بأن أفكاره وحوافزه وتصرفاته
وسلوكه بغيضة ومقلقة وغير مقبولة ولا تتسجم
مع باقي شخصيته فيكون مرفوضاً من الذات.

egoism الأَنَانِيَّة. الاهتمام بالمصالح الذاتية
وتطويرها بصورة واعية.

egomania هُوسُ الأَنَانِيَّة. الانانية المفرطة
والتركيز المفرط على الذات.

ego-syntonic تَجَانُسُ الذات. شعور الشخص
بأن أفكاره وحوافزه وتصرفاته وسلوكه منسجمة
مع باقي شخصيته ومقبولة ومقنعة له فتصبح
مقبولة للذات.

egotism عُزُور؛ أَنَانِيَّة. الغرور والانانية
والتركيز على الذات والتبجح والاعتقاد المبالغ
بأهمية ذات الشخص.

egotropic (= egocentric) أَنَانِيّ؛ مَرْكَزِيّ
الذات.

ejaculatio (= ejaculation) الدَّفَق.

- e. deficiens دَفَقٌ مَعِيب. خلل الدفق وعيبه.

- e. praecox دَفَقٌ مُبَكِّر. دفق المنى بعد ابتداء
الجماع مباشرة.

- e. retardata دَفَقٌ مُتَأَخِّر. تأخر دفق المنى
الطويل.

ejaculation دَفَق. عملية إبراز مفاجيء كدفع
المنى.

- premature e. (= ejaculatio praecox)
دَفَقٌ مُبَكِّر.

elation ابتهاج. هياج عاطفي يتصف بتسريع
الفعاليات العقلية والجسمية.

elbow المِرْفَق. المفصل الذي يفصل العضد
عن الساعد.

- dropped e. (= radial paralysis) مِرْفَقٌ
مُتَدَل؛ شلل العصب الكعبري.

- golfer's e. مِرْفَقٌ لَأَعِبيِ الْغُولْف. ألم ناتج عن
التهاب اللقيمة الإنسية حول أصل العضلات المثنية.

- tennis e. مِرْفَقٌ لَأَعِبيِ التَّنِيس. التهاب مؤلم
موضع في الناحية الوحشية للمرفق حول اتصال
الاورار بلفحة العضد الوحشية.

electroacupuncture الوَخْزُ الإِبْرِيّ الْكَهْرَبِيّ.
وخز إبري تنبّه الإبر فيه كهربائياً.

electroanalgesia تَسْكِينٌ كَهْرَبِيّ.
تسكين الألم بالتنبيه الكهربائي للعصب المحيطي أو
للعמוד الظهري للنخاع.

electroanesthesia تَخْدِيرٌ كَهْرَبِيّ. تخدير
موضعي أو عام بالتحريض الكهربائي.

electrocontractility تَقْلُصِيَّةٌ كَهْرَبِيَّة.
تقلصية تتولد استجابة للتنبيه الكهربائي.

electroconvulsive مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخْلِيلِج
الْكَهْرَبِيّ. توليد الاختلاج بالتنبيه الكهربائي.

electrocorticogram مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ القَشْرَةِ. مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ قَشْرَةِ المَخ.

electrocorticography تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ القَشْرَةِ. تَحْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ قَشْرَةِ المَخ بوضع المَسَارَاتِ على قَشْرَةِ المَخ مباشرة.

electrode مَسْرَى كَهْرَبِي. وسط يستعمل بين ناقل الكَهْرَبَائِيَّةِ والعضو أو الجزء المُنَبَّه أو بالعكس.

electroencephalogram مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. مَحْطَطُ الجهد الكَهْرَبَائِيَّ المَسْجَل من على سطح القحف والذي تولده الخلايا العصبية للدِّمَاغ. والتردد السائد في هذا المَحْطَط هو 8-10 موجات في الثانية وذات ارتفاع 10-100 ميكروفولت.

تحصل بعض التغيرات في سرعة وارتفاع هذه الموجات في بعض الحالات الوظيفية أو المرضية للدِّمَاغ مما يساعد في التشخيص المرضي.

مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ المُسَطَّح. -flat e. مَحْطَط لا تظهر فيه أية موجات كَهْرَبَائِيَّة دماغية مما يدل على عدم وجود أية فعالية دماغية.

مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ المُسَطَّح. -isoelectric e. (= flat e.)


electroencephalograph مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. آلة تسجيل كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ.

electroencephalography تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. تَحْطِيطُ الفعالية الكَهْرَبَائِيَّةِ للدِّمَاغ بوضع المَسَارَاتِ على سطح القحف.



electroencephalogram

مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ الذي يبين موجات ألفا التي تختفي وتستبدل بموجات بيتا عند فتح العين في (1) ثم تعود عند غلقها في (2).



electroencephalogram

مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ يبين أنواع الموجات السوية أثناء مختلف حالات اليقظة والنوم.

electroencephaloscope مَنظَارُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغِ. آلةٌ لتَنْظِيرِ كَهْرَبَائِيَّةِ مَقَاطِعِ مِنَ الدِّمَاغِ بَعْرِضِهَا عَلَى شَاشَةِ مَنظَارِ أَتْنُوبِ الْأَشْعَةِ الْمَهْبُطِيَّةِ.

electromyogram مَخْطَاطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ. المَخْطَاطُ الَّذِي يَسْجَلُ كَهْرَبَائِيَّةَ الْعَضَلِ.

electromyograph مَخْطَاطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ. الْجِهَازُ الَّذِي يَسْجَلُ كَهْرَبَائِيَّةَ الْعَضَلِ.

electromyography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ. تَسْجِيلُ وَدِرَاسَةُ الْخَوَاصِ وَالْفَعَالِيَّاتِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ لِلْعَضَلِ بِوَاسِطَةِ مَسْرَى سَطْحِيٍّ أَوْ إِبْرِيٍّ عِنْدَ تَقْلُصِ الْعَضَلِ أَوْ بَغْرِزِ الْمَسْرَى إِلَى دَاخِلِ الْعَضَلِ لِدِرَاسَةِ جَهْدِ الْفَعْلِ أَوْ الْفَعَالِيَّةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ الْمَوْلَدَةِ فِيهِ عِنْدَ تَنْبِيهِهِ بِمَنْبِهِ كَهْرَبَائِيٍّ إِمَّا مَبَاشَرَةً أَوْ بِتَنْبِيهِ عَصَبِهِ الْحَرَكِيِّ.

electronarcosis تَخَذُّرٌ كَهْرَبِيٌّ. تَنْبِيْجُ يُولَدُ بِإِمْرَارِ تَيَّارٍ كَهْرَبَائِيٍّ خِلَالَ الدِّمَاغِ بِوَضْعِ الْمَسَارِي عَلَى الصَّدْغَيْنِ وَمِنْ دُونِ تَوَلِيدِ أَيَّةِ اخْتِلَاجَاتٍ فِيهِ.

electroneurography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَصَبِ. قِيَاسُ سُرْعَةِ تَوْصِيلِ الدَّفْعَاتِ الْعَصَبِيَّةِ وَكُمُونِ الْأَعْصَابِ الْمَحِيطِيَّةِ.

electroneurolysis فَكُّ الْعَصَبِ كَهْرَبِيًّا. حُلُّ الْعَصَبِ بِوَاسِطَةِ إِبْرَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ.

electroneuromyography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ الْمُكَهْرَبَةِ الْعَصَبِ. تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ تَقْلُصِ الْعَضَلَةِ عِنْدَ تَنْبِيهِ عَصَبِهَا الْحَرَكِيِّ كَهْرَبَائِيًّا.

electronystagmogram مَخْطَاطُ كَهْرَبِيَّةِ الرَّأْرَأَةِ. سَجَلُ التَّخْطِيطِ الْكَهْرَبَائِيٍّ لِلرَّأْرَأَةِ.

electronystagmography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الرَّأْرَأَةِ. تَسْجِيلُ تَغْيِيرَاتِ الْجَهْدِ الْكَهْرَبَائِيٍّ الْقَرْنَوِيِّ الشَّبَكِيِّ أَثْنَاءَ حَرَكَةِ الْعَيْنِ فِي الرَّأْرَأَةِ.

electro-oculogram مَخْطَاطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَيْنِ. سَجَلُ تَخْطِيطِ كَهْرَبَائِيَّةِ الْعَيْنِ.

electro-oculography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَيْنِ. تَسْجِيلُ تَغْيِيرَاتِ الْجَهْدِ الْكَهْرَبَائِيٍّ أَثْنَاءَ حَرَكَةِ الْعَيْنِ بَيْنَ نَقْطَتَيْ تَثْبِيتِ بَصَرِيَّتَيْنِ.

electrophysiology الْفِيزْيُولُوجِيَا الْكَهْرَبِيَّةِ.

الْخَوَاصِ وَالتَّغْيِيرَاتِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ الَّتِي تَحْدُثُ أَثْنَاءَ الْقِيَامِ بِالْوِظَائِفِ الْفِيزْيُولُوجِيَّةِ.

electroplexy (= ECT) صَدْمَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. الْمَعَالِجَةُ بِالتَّخْلِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ.

electroretinography تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّبَكِيَّةِ. تَسْجِيلُ تَغْيِيرَاتِ الْجَهْدِ الْكَهْرَبَائِيِّ فِي شَبَكِيَّةِ الْعَيْنِ عِنْدَ تَنْبِيهِهَا بِمَنْبِهَاتٍ ضَوْئِيَّةٍ.

electroshock (= ECT) صَدْمَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ.

electrosleep تَنْوِيمٌ كَهْرَبِيٌّ. انْظُرْ **electrotherapy, cerebral**.

electrospinoqram مَخْطَاطُ كَهْرَبِيَّةِ النُّخَاعِ. سَجَلُ كَهْرَبَائِيَّةِ النُّخَاعِ الشُّوكِيِّ.

electrotherapy مُعَالِجَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. مَعَالِجَةُ الْأَمْرَاضِ بِالْكَهْرِبَاءِ.

cerebral e. مُعَالِجَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ دِمَاقِيَّةٌ. اسْتِعْمَالُ كَهْرَبَائِيَّةٍ وَاطْنَةِ الشَّدَةِ وَمُسْتَمْرَةٍ فِي مَعَالِجَةِ الْأَرْقِ وَالْكَأَبَةِ الْعَصَابِيَّةِ.

elephantiasis neuromatosa (= neurofibroma) وَرَمٌ لِيْفِي عَصَبِيٌّ.

elurophobia (= ailurophobia) رَهَابٌ الْهَرَزَةِ.

emaciation هُزَالٌ. حَالَةٌ فَقْدَانِ كِمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ وَزْنِ الْجِسْمِ وَالضَّعْفِ الْعَامِ.

embolalia (= embololalia) كَلَامٌ إِنْصِمَامِيٌّ؛ الْإِتْيَاطُ؛ هَذَرٌ.

embolism إِنْصِمَامٌ. انْسِدَادٌ مَفَاجِئٌ لِأَحَدِ الشَّرَائِبِينَ بِجِلْطَةٍ أَوْ بِجِسْمٍ غَرِيبٍ يَصِلُ مَوْقِعَ الْانْسِدَادِ خِلَالَ مَجْرَى الدَّمِ.

air e. إِنْصِمَامٌ هَوَائِيٌّ. انْصِمَامٌ تَوَلَدَهُ فِقَاعَاتُ هَوَائِيَّةٌ تَدْخُلُ الْأَوْرِدَةَ بَعْدَ الرُّضْعِ أَوْ الْمَدَاخِلَةِ الْجَرَاحِيَّةِ أَوْ الْحَقْنِ الْخَاطِئِ.

cerebral e. إِنْصِمَامٌ مُخِّيٌّ. انْصِمَامٌ أَحَدِ شَرَائِبِينَ الْمَخِ.

spinal e. إِنْصِمَامٌ نُّخَاعِيٌّ. انْصِمَامٌ أَحَدِ شَرَائِبِينَ النُّخَاعِ الشُّوكِيِّ.

embololalia كَلَامٌ إِنْصِمَامِيٌّ؛ الْإِتْيَاطُ.

إضافة كلمات أو مقاطع لا معنى لها بين كلمات الكلام العادي.

embolophrasia (= embololalia) كَلَامٌ
إِنْصِمَامِي؛ إِنْصِمَامِي.

embolus صِمَّةٌ. (ج: صِمَّات). 1. جلطة أو سدادة من نوع آخر ينقلها الدم من أحد الأوعية إلى وعاء دموي آخر أصغر منه فتطلق جريان الدم فيه. 2. النواة المخيخية الصمية الشكل.

emesis (= vomiting) قَيْءٌ.

emetic مُقْيٍءٌ. عامل يسبب التقيؤ.

- central e. مُقْيٍءٌ مَوْكَزِيٌّ. مقيء يعمل بتنبيه مركز التقيؤ في الدماغ بعد وصوله إليه عن طريق الدم.

- indirect e. (= systemic e, central e.) مُقْيٍءٌ مَوْكَزِيٌّ.

EMG (= electromyogram) مَحْطَطٌ كَهْرَبِيَّةٌ
الْعَضَل.

eminence بَارَزَةٌ. بروز على سطح العضو أو البنية وخصوصاً في العظام.

- collateral e. of lateral ventricle. الْبَارَزَةُ
الرَّادِفَةُ لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. بروز في قاع القرن الصدغي للبطين الجانبي يولده التلم الوحشي.

- mamillary e. (= corpus mamillare) الْجِسْمُ الْحَلِيمِيّ؛ البارزة الحليمية.

- medial e. of rhomboid fossa الْبَارَزَةُ
الْإِنْسِيَّةُ لِلْحُفْرَةِ الْمُعَيَّنِيَّةِ. بارزة في القسم الإنسي من قاع البطين الرابع يحدها التلم المحدد من الجهة الوحشية وتتكون من الأكمة الوجهية ومثلث العصب تحت اللساني.

- median e. بَارَزَةُ النَّاصِفِ. الباحة المرتفعة على قمع الوطاء عند قاع البطين الثالث للدماغ والتي تستمر في الأسفل مع جذع قمع الغدة النخامية وتحوي الشبكة الشعرية الأولية للجهاز الباطني النخامي.

- occipital e. الْبَارَزَةُ الْقَذَالِيَّةُ. حرف في البطين الجانبي الجنيني يناسب الشق القذالي في البالغين.

- postchiasmatic e. الْبَارَزَةُ خَلْفَ التَّصَالِبَةِ. بارزة على قاع البطين الثالث خلف التصالبة البصرية.

- postfundibular e. (= postchiasmatic e.) الْبَارَزَةُ خَلْفَ التَّصَالِبَةِ.

- vagal e. (= trigonum nervi vagi) بَارَزَةٌ
الْمُبْهَمِ.

eminencia (= eminence) بَارَزَةٌ.

emissarium (= emissary vein) وَرِيدٌ
مِشْبِرِيٌّ.

emotion انْفِعَالٌ؛ عَاطِفَةٌ. حالة إحساس شديد كالتبجح والضائقة والفرح الشديد والسعادة والحزن والحب والكراهية والخوف والغضب.

emotional انْفِعَالِيٌّ؛ عَاطِفِيٌّ. متعلق بالانفعال.

empathy تَقَمُّصٌ عَاطِفِيٌّ؛ تَشَاعُرٌ. تقمص شخصية شخص آخر والتحسس العاطفي والعقلي لمشاعره وأفكاره وسلوكه حتى تلك البغيضة المقلقة منها.

emprosthotos (= episthotonos) تَقَوُّسٌ أَمَامِيٌّ. نوع من التشنج الكزازي يُجذب فيه الرأس والقدمان إلى الأمام فينطوي ويتشنج.

empyema دُبَيْلَةٌ. تجمع قيحي في أحد أجواف الجسم، يستعمل بمفرده للدلالة على دبيلة الصدر.

encelialgia أَلَمٌ حَشَوِيٌّ بَطْنِيٌّ. ألم أحد الأحشاء.

encephalalgia (= headache) أَلَمُ الرَّأْسِ؛
صُدَاعٌ. ألم في داخل الرأس.

encephalatrophy ضُمُورُ الدِّمَاغِ.

encephalaxe ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

encephalemia اخْتِقَانُ الدِّمَاغِ.

encephalic 1. دِمَاجِيٌّ 2. دَاخِلُ الْقَحْفِ.
1. منسوب أو متعلق بالدماغ 2. داخل القحف.

encephalitic مُتَنَهَبُ الدِّمَاغِ. منسوب أو متعلق بالتهاب الدماغ أو مصاب به.

encephalitides انْتِهَابَاتُ الدِّمَاغِ. جمع
التهاب الدماغ.

encephalitis انْتِهَابُ الدِّمَاغِ.

- e. A (= lethargic e.) التهاب الدماغ الوَسْئِيّ.
- acute disseminated e. (= encephalomyelitis) التهاب الدماغ المُتَنَشِّر الحاد.
- acute necrotizing e. التهاب الدماغ النّاجِر الحاد. التهاب الدماغ المترافق مع تفاعلات تخريبية فيه.
- e. B (= Japanese B e.) التهاب الدماغ الياباني.
- benign myalgic e. (= epidemic neuromyasthenia) التهاب الدماغ الحميد المؤلم للعضل.
- e. C (= st. Louis e.) التهاب الدماغ السَّنْت لويي.
- cortical e. (= e. conticalis) التهاب قشرة الدماغ. التهاب يصيب قشرة الدماغ فقط.
- Economo's e. (= lethargic e.) التهاب الدماغ الوَسْئِيّ.
- epidemic e. التهاب الدماغ الوَبَائِيّ. التهاب دماغي فيروسي وهناك أنواع متعددة منه.
- Hayem's e. (= e. hyperplastica) التهاب الدماغ مُفْرَط التَّنَسُّج.
- hemorrhagic e. التهاب الدماغ النّزْفِيّ. التهاب دماغي يتصف بوجود بؤر نزفية مع نضح خارج الأوعية.
- hemorrhagic arspenamine e. التهاب الدماغ النّزْفِيّ الأَرَسْفِينَامِينِيّ. التهاب الدماغ النزفي الذي يحصل بعد المعالجة بالآرسفينامين.
- herpes e. التهاب الدماغ الهربسيّ. التهاب الدماغ الذي يلده فيروس الهربس.
- e. hyperplastica التهاب الدماغ مُفْرَط التَّنَسُّج. التهاب الدماغ اللاقيحي الحاد.
- infantile e. التهاب الدماغ الطِّفْلِيّ. التهاب الدماغ في الأطفال الذي يتكون من مرض عدواني.
- Influenzal e. التهاب الدماغ النّزْلِيّ. التهاب الدماغ الذي يحدث كمضاعفة للنزلة.
- Japanese B e. التهاب الدماغ اليابانيّ. التهاب الدماغ الذي ينتشر في اليابان في مناطق الشرق الأقصى ويمكن أن يكون من دون أية أعراض أو

- كالتهاب سحائي دماغي نخاعي مع إصابات قشرية ونخاعية شبيهة بالتهاب سنجابية النخاع.
 - lead e. التهاب الدماغ الرصاصي. التهاب الدماغ الذي يتولد عن التسمم بالرصاص.
 - Leichtenstern's e. (= hemorrhagic e.) التهاب الدماغ النّزْفِيّ.
 - Lethargic e. (= e. lethargica) التهاب الدماغ الوَسْئِيّ. نوع من التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بالوهن والضعف والخمول والتعاس الذي يتطور إلى الوسن.
 - e. neonatorum التهاب الدماغ الوليديّ. التهاب الدماغ في الولدان.
 - postinfectious e. (= acute disseminated encephalomyelitis) التهاب الدماغ بعد العدواني.
 - postvaccinal e. (= postinfectious e.) التهاب الدماغ التالي للتلقيح.
 - purulent e., pyogenic e. (= suppurative e.) التهاب الدماغ القيحيّ.
 - St. Louis e. التهاب الدماغ السَّنْت لويي. التهاب الدماغ الذي لوحظ أولاً في سنت لويس ينتشر في الصيف والخريف وينتقل بواسطة البعوض ويمكن أن يكون عدوى بسيطة أو مرضاً وخيماً.
 - e. siderans التهاب الدماغ الحديديّ. نوع من التهاب الدماغ الوبائي الذي ينتهي بالموت خلال بضع ساعات.
 - subacute inclusion body e. (= subacute sclerosing panencephalitis) التهاب الدماغ الشامل المُصَلَّب دُونَ الحاد.
 - e. subcorticalis chronica (= Bin-swanger's dementia) التهاب الدماغ تَحْتَ القشرة المزمن.
 - suppurative e. التهاب الدماغ القيحيّ. التهاب الدماغ الذي يترافق مع التقيح وتوليد الخراج.
 - toxoplasmic e. التهاب الدماغ بالمقوسات. التهاب الدماغ بالعدوى بالمقوسات.
- مُحْدَث لالتهاب الدماغ؛
مُلْهَبٌ لِلدَّماغ. أي عامل يولد التهاب الدماغ.
encephalization عملية التطور

التي تتم بها سيطرة قشرة الدماغ على المراكز العصبية السفلية (النخاعية).

encephalo-arteriography تصوُّيرُ الدِّماغِ والشرَائِين. تصوير الدماغ المشترك مع تصوير أوعيته لمشاهدة انتشارها فيه.

encephalocele قَيْلَة دِمَاعِيَّة. فتق دماغي يبرز فيه جزء من الدماغ خلال فتحة خلقية أو رضحية في القحف.

encephalocoele 1. جَوْفُ القحف 2. جَوْفُ الدِّماغِ. 1. الجوف الكلي للقحف 2. بطينات الدماغ وتجاويفه الأخرى.

encephalocystocele قَيْلَة دِمَاعِيَّة كَيْسِيَّة. فتق دماغي يمتلأ جزؤه البارز من الدماغ بسائل ويتصل بالبطين ويولد بروزاً كيسياً الشكل.

encephalodialysis تَلْيِينُ الدِّماغِ.

encephalodysplasia خلل تنسُّج الدِّماغِ. أي شذوذ خلقي في الدماغ بسبب خلل في تنسجه.

encephalogram صُورَة الدِّماغِ. فيلم تصوير الدماغ.

encephalography تصوُّيرُ الدِّماغِ. تصوير الدماغ الشعاعي الذي يبين الأحياز الحاوية على سوائل داخل الدماغ بعد سحب السائل الدماغي النخاعي وإدخال الهواء أو غاز آخر محله.

- air e. (= pneumoencephalography) التَّصَوُّيرُ الهَوَائِيُّ لِلدِّماغِ.

- fractional e. التَّصَوُّيرُ المُجَزَّأ لِلدِّماغِ. نوع من التصوير الهوائي للدماغ لدراسة مختلف أقسام الأحياز تحت العنكبوتية القحفية والبطينات الدماغية تحقن فيه كميات متزايدة من الهواء أو الأكسجين في تحت العنكبوتية وخلال البزل القطني ويصور القحف بعد كل مرة تحقن فيها كمية من الهواء.

encephaloid (= medullary carcinoma) 1. دِمَاعَانِي 2. سَرَطَانَة نخاعية. 1. شبيه بالدماغ. 2. سرطانة تتكون بصورة رئيسية من عناصر ظهارية فيها القليل من السدى.

encephalolith حَصَاةُ الدِّماغِ. حصاة أو تحصي في الدماغ أو في أحد البطينات.

encephalology عِلْمُ الدِّماغِ. مجموع الدراسات والمعلومات الخاصة بتشريح ووظائف الدماغ وأمراضه.

encephaloma (2. = medullary carcinoma) وَرَمٌ دِمَاعِي. 1. أي تورم أو ورم في الدماغ 2. سرطانة نخاعية.

encephalomalacia تَلَيُّنُ الدِّماغِ.

- periventricular e. تَلَيُّنُ الدِّماغِ حَوْلَ البُطَيْنِ. تلين المادة البيضاء في المخ حول البطينات المخية يشاهد في الكثير من الأطفال المصابين بالشلل المخي.

- thalamic e. تَلَيُّنُ الدِّماغِ المِهَادِي. تنكس المهاد الذي يولد العديد من الاعراض الحسية مثل المذل والخرف الذي يتصف بفقدان المبادرة الحركية.

encephalomeningitis (= meningo-encephalitis) اِلْتِهَابُ الدِّماغِ والسَّحَائِيَا.


encephalomeningocele (= meningo-encephalocele) قَيْلَة دِمَاعِيَّة سَحَائِيَّة.

encephalomeningopathy اِغْتَالَأُ الدِّماغِ والسَّحَائِيَا. (= meningoencephalopathy)

encephalomere قَسَمٌ دِمَاعِي. أي من الشدافات المتتالية التي تكون دماغ الجنين.

encephalomyelitis اِلْتِهَابُ الدِّماغِ والنَّخَاعِ. التهاب يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

- acute disseminated e. اِلْتِهَابُ الدِّماغِ والنَّخَاعِ المُنتَشِرُ الحَاد. التهاب الدماغ الحاد أو دون الحاد الذي يتصف بالارتشاح اللمفاوي والخلايا أحادية النواة مع زوال النخاعين. ويحصل المرض غالباً بعد الإصابة بعدوى فيروسية خصوصاً الحصبة وقد يحصل من دون أية إصابة مسبقة ظاهرة. وقد كان يتولد سابقاً كمضاعفة للتلقيح ضد الجدري. ويتصف المرض سريرياً بالصداع والقيء والنعاس الذي يتطور إلى الوسن والغيبوبة. كما قد يحدث الرعاش والشلل والنوبات، ومعدل الوفيات فيه حوالي 20-5% ولكن معظم الناجين منه يصابون ببعض العاهات العصبية.



1

encephalography

مقطعان للدماغ بالمرنان resonator (1) سهمي و (ب) جبهي لنفس المريض يبينان ورماً سحائياً تظهر فيه أوعيته وعلاقته السحائية بالأم الجافية.



1



ب

encephalography

التصوير الشعاعي للدماغ:
(1) صورة امامية خلفية
(ب) صورة جانبية

- allergic e. التهاب الدماغ والنخاع الأُرْجِي. التهاب الدماغ والنخاع الذي يتولد عن الأرجية أو فرط الحساسية للتلقيح مثلاً.

- benign myalgic e. (= epidemic neuro-myasthenia, chronic fatigue syndrome) التهاب الدماغ والنخاع الحميد المؤلم للعضل.

- Crucket subacute e. (= encephalitis lethargica) التهاب الدماغ الوَسْئِي.

- granulomatous e. التهاب الدماغ والنخاع الورمي الحُبَيْبِي. الالتهاب الذي ترافقه أورام حبيبية ونخر جدران البطينات المخية والنخاعية.

- postinfectious e. (= acute disseminated e.) التهاب الدماغ والنخاع التالي للعدوى.

- postvaccinal e. (= acute disseminated e.) التهاب الدماغ والنخاع التالي للتلقيح.

- toxoplasmic e. التهاب الدماغ والنخاع بالمَقُوسَات. التهاب الدماغ والنخاع بالعدوى بالمقوسات.

- viral e. (= virus e.) التهاب الدماغ والنخاع الفيروسي. التهاب ناجم عن بعض الفيروسات.

encephalomyelocele قَيْلَةُ الدماغ والنخاع والسَّحَايَا. شذوذ خلقي في الثقبية العظمى وغياب النواتئ والصفيحات الشوكية للفقرات العنقية والذي يولد انفتاق السحايا وبعض الأنسجة الدماغية والنخاعية.

encephalomyeloneuropathy اعتلال دِمَاعِيّ نخاعِيّ عَصَبِيّ. مرض يشمل الدماغ والنخاع الشوكي وبعض الأعصاب المحيطية.

encephalomyelopathy اعتلال دِمَاعِيّ نخاعِيّ. مرض أو حالة مرضية تصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

- postinfection e. اعتلال دِمَاعِيّ نخاعِيّ تالٍ للعدوى. زوال النخاع الثانوي للأمراض الفيروسية الشائعة كالحصبة والحصق والحصبة الألمانية والنكاف والنزلة الوافدة.

- postvaccinal e. اعتلال دِمَاعِيّ نخاعِيّ تالٍ للتلقيح. زوال الميالين الذي يضعف الاستجابة للتلقيح ضد الجدري.

- subacute necrotizing e. اعتلال دِمَاعِيّ نَخَاعِيّ نَاجِز دُونَ الحَاد. اعتلال دِمَاعِيّ غير محدد المرضيات السريرية والذي يولد مرضيات عصبية وأضراراً في جذع الدماغ مثل تلك التي تتولد في متلازمة فرنيكة - كورساكوف. وهناك نوعان منه أحدهما طفلي حيث تنتكس فيه المادة السنجابية مع بؤر نخزية في ساق الدماغ ويتصف بنقص الشهية والقيء وبطء النمو أو توقفه والوهن العضلي والنوبات والحركات الشاذة واضطرابات في التنفس والرؤية والخرف والذي ينتهي بالموت قبل سن الثالثة، أما النوع الذي يصيب البالغين فإنه يتصف بالضمور البصري بالعينين والعمى المركزية وعمى الألوان. ويظهر بعد سن الثلاثين الرنح والخزل التشنجي والنفضات الرمعية ونوبات الصرع الكبير والخرف.

encephalomyeloradiculitis التهاب الدماغ والنخاع والجذور. التهاب الدماغ والنخاع والجذور العصبية الشوكية.

encephalomyeloradiculoneuritis التهاب الدماغ والنخاع والجذور والأعصاب. التهاب الدماغ والنخاع والجذور العصبية الشوكية والأعصاب المحيطية.

encephalomyeloradiculopathy اعتلال دِمَاعِيّ نخاعِيّ جَذَرِيّ. مرض يصيب الدماغ والنخاع الشوكي والجذور العصبية الشوكية.

encephalomyocarditis التهاب الدماغ والقلْب. مرض فيروسي يتصف بتغيرات التهابية وتنكسية في العضلات الهيكلية والقلبية وآفات في الجهاز العصبي المركزي شبيهة بالتهاب سنجابية الدماغ.

encephalon (= the brain) الدماغ. قسم الجهاز العصبي المركزي الموجود في داخل القحف والمكون من الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر والذي يتطور في الجنين من القسم الأمامي من الأنبوب العصبي.

encephalonarcosis تخدير دِمَاعِيّ المنشأ. ذهول بسبب مرض دِمَاعِيّ.

encephalopathia (= encephalopathy) اعتلال دِمَاعِيّ.

- e. alcoholica (= polioencephalitis hemorrhagica superior) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كُحُولِيٌّ.

encephalopathy إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ. أي مرض تنكسي في الدماغ.

- addisonian e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ أَدِيسُونِيٌّ. ذهان عضوي يترافق مع السحرة الحادة لداء أديسون.

- alcoholic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كُحُولِيٌّ. أي اختلال وظيفي للدماغ يترافق مع تناول الكحول سواء ذلك الذي يحدث من الانسمام الحاد أو من التغيرات المزمنة التي ترافق الإدمان مثل ذهان فرنيكة - كورساكوف.

- anoxic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِعَوَزِ الأَكْسِجِينِ. اضطراب دماغي يتولد عند التعرض لعوز الأكسجين.

- biliary e. (= hepatic e.) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المُنْشَأُ.

- boxer's e. (= traumatic e.) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَضَحِيٌّ.

- demyelinating e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ مُزِيلٌ لِلْمِيَالِينِ. مرض تنكسي دماغي يتصف بزوال النخاعين.

- dialysis e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ دِيَالِيٌّ. مرض تنكسي دماغي يترافق مع الاستعمال الطويل للديال الدموي والذي يتصف باضطراب الكلام وانتفاضات عضلية رمعية مستمرة ويتطور إلى خرف عام وتغييرات نفسية وتلين العظام.

- hepatic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المُنْشَأُ. حالة تتطور كمضاعفة ثانوية لمرض الكبد المتقدم وقد تشاهد في الأمراض الشديدة الموحمة وتتصف باضطراب الوعي الذي يتطور إلى الغيبوبة العميقة (السبات الكبدي) واضطرابات ذهانية بمختلف الدرجات والرعاش والتشنج الكبدي.

- hypernatremic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِفَرْطِ صَوْدِيُومِ الدَّمِ. اعتلال دماغي نزفي وخيم يحدث في الأطفال بسبب الإفراط في تناول الملح أو في البالغين بسبب آفة وطائية كالورم.

- hypertensive e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِارْتِفَاعِ الضَّغْطِ. مجموعة من أعراض الاضطرابات الدماغية كالصداع والاختلاج والغيبوبة التي تتولد من ارتفاع ضغط الدم الوبيل.

- hypoglycemic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِنَقْصِ السُّكَّرِ. اعتلال دماغي استقلابي يتولد عن نقص سكر الدم الشديد كالذي يحصل في داء خزن الغليكوجين ويتصف بالاختلاج واضطرابات الفعاليات المخية كالتفكير والذاكرة ثم الغيبوبة.

- lead e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَصَاصِيٌّ. اضطراب دماغي يتولد عن التسمم بالرصاص.

- metabolic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ إِسْتِقْلَالِيٌّ. اضطرابات عصبية نفسانية تنتج عن أمراض استقلابية دماغية وقد تنتج في البدء عن عوز الأكسجين أو الإقفار أو نقص سكر الدم أو كمضاعفة ثانوية لأمراض أعضاء أخرى كالكلية أو الكبد أو الرئة.

- myoclonic e. of childhood إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَضَحِيٌّ غَضَلِيٌّ طِفْلِيٌّ. اضطراب عصبي غير معروف السببية يصيب الأطفال بين سني 1-3 سنوات ويتصف بالرمع العضلي في الأطراف والجذع والعين والرنح ورعاش الحركة.

- portal-systemic e. (= hepatic e.) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المُنْشَأُ.

- progressive punch-drunk e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ تَرَنَحِيٌّ بِاللَّكَمَاتِ. اعتلال دماغي يصيب الملاكمين نتيجة الاصابات الدماغية المتراكمة والذي يتصف بالنسوة وبطء التفكير والرئة الكلامية والحركات غير المنتظمة خصوصاً في الساقين.

- saturnine e. (= lead e.) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَصَاصِيٌّ.

- spongiform e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ إِسْفَنْجِيٌّ الشَّكْلُ. اعتلال دماغي يتصف بتفجي القشرة الدماغية المنتشر ويشمل أمراضاً دماغية عديدة كمتلازمة كروتزفيلد- جاكوب.

- traumatic e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَضَحِيٌّ. اضطراب دماغي يتولد عند الملاكمين نتيجة تعرضهم المستمر لرضوح دماغية متلاحقة يتصف ببطء الفعاليات الدماغية والفكرية والنسوة والتخليط.

- Wernicke's e. إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِيٌّ. اضطراب عصبي يتصف بالتخليط والخمول والنعاس ورنح السير والرائة وشلل العين وكان يعتقد بأن المرض يتولد عن آفات نزفية في المادة السنجابية للدماغ ولكنه يعرف الآن بأنه يتسبب عن نقص في الثيامين

ويتولد غالباً عن الادمان للكحول وغالباً ما ينتهي بمتلازمة كورساكوف (النسابة العضوية).

encephalopuncture

بَزْلُ الدِّمَاغِ. البزل الجراحي للدماغ.

encephalopyosis

تَقْيُحُ الدِّمَاغِ. خراج الدماغ أو تقيحه.

encephalorachidian

(= cerebrospinal) دِمَاعِي نَحَاعِي.

encephaloradiculitis

إِثْتَابُ الدِّمَاغِ والجُذُور. التهاب جذور النخاع الشوكي والدماغ.

encephalorrhagia

نَزْفُ دِمَاعِي. نزف في داخل الدماغ أو من الدماغ وخصوصاً النزف المخي حول الشعيرات.

encephalosclerosis

تَصَلُّبُ الدِّمَاغِ.

encephaloscope

مِنظارُ الدِّمَاغِ. آلة لتظهير أي تجويف (مثل تجويف الخراج) في داخل الدماغ.

encephaloscopy

تَنْظِيرُ الدِّمَاغِ. فحص أو مشاهدة الدماغ.

encephalosepsis

إِثْنَانُ الدِّمَاغِ. موات الأنسجة الدماغية.

encephalosis

دِّمَاغ؛ دَاءٌ دِمَاعِي. أي مرض عضوي يصيب الدماغ ويستعمل خاصة للأمراض التنكسية التي تصيب الدماغ.

encephalospinal

دِمَاعِي نَحَاعِي. نسبة للدماغ وللعمود الفقاري.

encephalothlipsis

إِنْضِغَاطُ الدِّمَاغِ.

encephalotome

مِبْضَعُ الدِّمَاغِ. آلة تستعمل لإتلاف الدماغ أو لشقه.

encephalotomy

1. إِتْلَافُ الدِّمَاغِ 2. بَضْعُ الدِّمَاغِ. 1. إتلاف دماغ الجنين لتسهيل ولادته في الحالات المستعصية 2. شق الدماغ.

endarteritis

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ. التهاب طبقة بطانة الشريان.

- e. deformans

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ المَشْوَّه. التهاب بطانة الشريان المزمن الذي يتصف بتنكس شحمي في أنسجة الشريان مع ترسب أملاح كلسية فيه.

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ المُسَدِّ. - e. obliterans التهاب بطانة الشرايين الصغيرة التي تضيق ثم تنغلق نتيجة تكاثر أنسجة بطانتها.

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ التَّكَاثُرِي. - e. proliferans فرط نمو الأنسجة الليفية في الطبقات الداخلية للأبهر.

endbrain (= telencephalon)

الدِّمَاغُ الإِنْتِهَائِي.

end-feet (= bouton terminal)

البَرَاغِمُ الإِنْتِهَائِيَّة. الأقدام أو الأزرار أو التضخمات الانتهازية للألياف العصبية الحرة التي تنتهي عند العصبونات الأخرى وتغصناتها وتسمى أيضاً الأزرار الانتهازية.

end-flake (= end-plate)

الصَّفِيحَةُ الإِنْتِهَائِيَّة. النهاية الطرفية الانتهازية للليف العصبي.

- annulospiral e's.

النِّهَائِيَّاتُ الحَلَقِيَّةُ اللُّوَلِيَّة. نهايات عصبية حسية عريضة وشريطية الشكل تلتف حول الياق المغزل العضلي.

- club e. of Bartelmez

نِّهَائِيَّةُ نَبُوتِيَّة لِبَارْتَلْمَز. نوع من النهايات العصبية التي توجد في الجهاز العصبي المركزي وتنتهي بصورة حادة على تغصنات العصبونات الأخرى.

- encapsulated nerve e's. (= terminal

nerve corpuscle) نِّهَائِيَّاتُ عَصْبِيَّة مُمَحْفَظَةٌ. انظر corpuscle.

- epilemmal e's.

نِّهَائِيَّاتُ فَوْقُ الغَمْد. نهايات عصبية حسية في العضلات المخططة حيث تكون النهايات العصبية بتماس مباشر مع الألياف العضلية ولكن من دون أن تخرق غمدها العضلي.

- flower spray e's.

نِّهَائِيَّاتُ عُنُقُودِ الزَّهْرِ. نهايات عصبية حسية دقيقة ومتفرعة تنتهي على الغمد العضلي لألياف المغزل العضلي.

- free nerve e's.

نِّهَائِيَّاتُ عَصْبِيَّة حُرَّة. نهايات عصبية متقبلة حسية لها شكل بسيط حيث ينتهي الليف العصبي بتفرعات عديدة تنتهي في النسيج الضام أو في الظهارة أو البطانة.

- nerve e's.

النِّهَائِيَّاتُ العَصْبِيَّة. نهايات الفروع الحرة للمحاور.

end-nuclei النوى الإنتهائية.
أنظر terminal nuclei.

endocranitis التهاب بطانة القحف. التهاب طبقة بطانة القحف.

endocranium بطانة القحف. الطبقة السحاقية الباطنة للطبقة الخارجية لجافية الدماغ.

endolabyrinthitis التهاب التيه الغشائي.

endolymph اللُفُفُ الباطن. السائل الذي يوجد في التيه الغشائي للأذن.

endoneural ضِفْنُ العَصَب. متعلق بداخل العصب أو متوضع فيه.

endoneuritis التهاب غِمدُ اللُفُفِ العَصَبِي.

endoneurium غِمدُ اللُفُفِ العَصَبِي. النسيج الخلالي الضام الذي يوجد حول الليف العصبي المحيطي والذي يفصل الالياف العصبية الواحد عن الآخر في العصب المحيطي.

endoneurolysis (= hersage) تَفْشِيطُ ألياف العَصَب. شق ألياف العصب المحيطي جراحياً وتفريق اليافه.

end-organ عُضْوُ إنتهائي. إحدى النهايات العصبية الحسية الكبيرة المحفوظة وهناك أنواع متعددة منها وتسمى أيضاً الجسيمات العصبية الانتهائية.

endorphin إندورفين. أحد المركبات الببتيدية العصبية الموجودة في الدماغ والمرتبطة بالمستقبلات الأفيونية ولها فعل مسكن شديد. وهناك ثلاثة أنواع مهمة منها هي ألفا وبيتا وغاما، ويوجد الإندورفين بيتا في النخامى الغدية والوطاء ومواقع أخرى في الدماغ. وكلها تقوم بوظائف مهمة في إدراك حس الألم.

end plate (= end-plate) صَفِيحَةُ إنتهائية. نهاية عصبية مسطحة.

- motor e.p. الصَفِيحَةُ الإنتهائية الحركية. النهاية المسطحة لفرع انتهائي من فروع محوار العصبون الحركي الذي يقابل الصفيحة الاخصية لليف العضلي ليكون الاتصال العصبي العضلي.

endyma (= ependyma) بَطَانَةُ عَصَبِيَّة.

energizer مُنَشِّط. عامل يعطي أو يوفر أو ينشط أو يشحن الطاقة.

- psychic e. مُنَشِّطُ نَفْسَانِي. دواء يحسن المزاج كالادوية مضادة الكآبة أو محاكية الودي.

enervation 1. نَزْعُ العَصَب؛ قطع العصب
2. عَوَزُ الطاقة العَصَبِيَّة. 1. نزع العصب أو قطعه
2. قلة الطاقة العصبية، وهن أو كسل.

engram إنطباع. الاثر الدائم الذي يخلفه التنبيه في النسيج أو العضو العصبي، وفي علم النفس هو الأثر الذي تتركه في النفس أية تجربة نفسية يمر بها الشخص.

enkephalin إنكيفالين. ببتيدات توجد في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي ومنها الليو - انكيفالين والمت - انكيفالين وهي تعمل كناقلات عصبية في مناطق متعددة من الدماغ والنخاع ولها دور مهم في وظائف إدراك حس الألم وفي المزاج والسلوك والوظائف الحركية والسيطرة العصبية الصماوية. كما أنها توجد في الضفائر العصبية والغدد الخارجية الإفراز في القناة المعدية المعوية.

enkephalinergic إنكيفاليني الفِعل. يشير إلى التوصيل المشبكي بالانكيفالين.

enlargement ضَخَامَةٌ. 1. زيادة في حجم الجزء أو العضو 2. في التشريح هو بروز أو تورم أو تضخم.

enophthalmos خَوْصٌ. انزياح المقلة إلى الخلف في الحجاج.

enophthalmus (= enophthalmos) خَوْصٌ.

entasia (= entasis) تَشَنُّجٌ مُضَيِّقٌ. تقلص عضلي تشنجي مضيق.

enteralgia أَلَمُ الأمعاء. ألم الأمعاء أو ألم عصبي معوي.

enteroneuritis التهاب الأغصاب المعوية.

enuresis سَلَسٌ البَوْل؛ بَوْلُ الْفِرَاش. التبول اللاإرادي للأطفال بعد السن الذي يفترض فيه التمكن من السيطرة على عملية التبول ويستعمل الاصطلاح للتبول الليلي اللاإرادي بالفراش.

enuretic (متعلق) بِبَوْل الْفِرَاش. 1. متعلق

ببول الفراش 2. عامل يحفز بول الفراش 3. شخص مصاب ببول الفراش.

بيئة. مجموع الظروف والعوامل **environment** التي تحيط بالكائن أو أعضائه أو أنسجته والتي تؤثر على فعالياته وتنميه.

البيئة الخارجية. البيئة التي تحيط **- external e.** بالكائن من الخارج والتي يعيش فيها ويتنفس منها.

البيئة الداخلية. السائل الموجود في **- Internal e.** داخل الجسم والذي يحيط بأعضائه وأنسجته وخلاياه.

البيئة المهنية. الظروف **- occupational e.** والعوامل التي توجد في محيط عمل الكائن الحي.

ألم الإزهاق. اضطراب مؤلم يتولد **eparsalgia** عن إزهاق أي عضو من أعضاء الجسم كإزهاق القلب أو إزهاق الفتق أو السعال.

1. **المُخَيخ 2. الدَّمَاعُ التَّالِي.** **epencephalon**

بطانة عَصِيَّة. بطانة بطينات **ependyma** الدماغ والقناة المركزية للنخاع الشوكي.

التهَابُ البِطَانَةِ العَصِيَّة. **ependymitis**

أُرُومَةُ البِطَانَةِ العَصِيَّة. **ependymoblast** خلية البطانة العصبية الجنينية.

الورم الأرومي البطاني **ependymoblastoma** العصبي؛ وَرْمُ أُرُوماتِ البِطَانَةِ العَصِيَّة. ورم خبيث يتكون من خلايا البطانة العصبية البدائية.

خَلِيَّةُ البِطَانَةِ العَصِيَّة. **ependymocyte**

ependymocytoma (= endymoma) وَرْمُ البِطَانَةِ العَصِيَّة.

وَرْمُ البِطَانَةِ العَصِيَّة. ورم **ependymoma** خلايا البطانة العصبية وهو ورم حميد عادة ولكن هناك بعض أنواعه الخبيثة.

إِغْتِلَالُ البِطَانَةِ العَصِيَّة. أي مرض يصيب البطانة العصبية. **ependymopathy**

مَلَمَسٌ؛ لِمَاسٌ. نقطة تلامس جانبية **ephapse** (غير المشبك) بين الألياف العصبية تمر عبرها الدفعات العصبية من ليف لآخر مباشرة ومن دون أي تشابك بينهما.

لماسي؛ مَلَمَسِي. انتقال الدفعات **ephaptic** العصبية عبر الملمس وهو غير الانتقال المشبكي.

بُلُوغِيَّة. التطورات الجسمية **ephebo-genesis** التي تتم في مرحلة البلوغ.

إِفِيدِرِين. دواء أدريناليني الفعل **ephedrine** يستعمل لإزالة احتقان الغشاء المخاطي للأنف في الحالات الأرجية أو لإرخاء عضلات القصبات في الربو القصبي أو كمنبه للجهاز العصبي المركزي في النوم الانتيابي أو كمضاد للأدوية المكثبة أو لمنع هبوط ضغط الدم في التبنيخ النخاعي.

فَرْطُ التَغَرُّق؛ تَغَرُّاق. **ephidrosis (= hyperhidrosis)**

السُرْجُ الثَّرَكِي. **ephippium (= sella turcica)**

أَلَمُ اللُّقْمَةِ. ألم العضلات **epicondylalgia** أو الأوتار المرتكزة في لقيمة العضد.

الشَّوَاة. غطاء القحف أو لحافته **epicranium** وسفاقه وامتداد العضلات التي تغطيه.

دَقِيقُ التَّغْيِين. ما يتعلق بالتعيين **epicritic** الدقيق والمميز ويطلق على الألياف العصبية الجلدية التي تستقبل حسي للمس أو الحرارة المميزين والدقيقين جداً.

1. **وَبَاء 2. وَبَائِي.** مرض ينتشر **epidemic** بصورة فجائية بأعداد أكبر من حالات انتشاره الاعتيادية أو المتوقعة.

فَوْقُ الجَافِيَّة. خارج الجافية أو فوقها. **epidural**

تَصْوِيرٌ فَوْقَ الجَافِيَّة. تصوير **epidurography** العمود الفقري بعد زرق مادة عتمة للأشعة حول الجافية.

غُدُّ اللِّئْفِ العَصَبِي. **epilemma (= endoneurium)**


متعلق بِغُدِّ اللِّئْفِ العَصَبِي. **epilemmal**

صَرْع. **epilepsia (= epilepsy)**

صَرْعُ رَكْضِي. **- e. cursiva (= cursive epilepsy)**

صَرْعُ كَبِير. **- e. gravior (= grand mal epilepsy)**

صَرْعُ كَبِير. **- e. major (= grand mal epilepsy)**



environment

صورة تبين العلاقة بين المحيطين الداخلي والخارجي للجسم وتأثيرهما في جسم الإنسان حيث تثير تغيرات المحيط استجابة الجهاز العصبي المحيطي والمركزي للتفاعل مع هذه التغيرات.

- صَرْعٌ صَغِيرٌ. (e. minor = minor epilepsy)
 - صَرْعٌ صَغِيرٌ. (e. mitior = minor epilepsy)
 - صرع إيمائي. نوبات أو إيماءات الرأس e. nutans
 في الأطفال وهي نوع من نوبات تعذر الثبات.
 - نَوَبَاتٌ جُزْئِيَّةٌ متواصلة. e. partialis continua
 نوبات حركات رمعية مستمرة لجزء من الجسم بسبب
 موجات دفعات عصبية شاذة.
 - صَرْعٌ e. procursiva (= cursive epilepsy)
 ركضي.
 - صَرْعٌ دَوْرَانِيٌّ. نوبة سرعية يدور e. rotatoria
 بها الجسم ويلتف.
 - صَرْعٌ آجَلٌ. صرع يبدأ عند منتصف e. tarda
 العمر أو بعد ذلك.
 صَرْعٌ. اضطرابات انتيائية عابرة epilepsy
 في وظيفة المخ تولد تغييم الوعي أو فقدانه العارض
 مع ظواهر حركية شاذة واضطرابات حسية أو
 نفسية أو اختلال الجهاز العصبي المستقل وتنتج
 هذه العوارض عن اختلال كهربائية الدماغ الانتيائي
 وهناك أنواع عديدة من الصرع.
 - صَرْعٌ بَطْنِيٌّ. ألم بطني انتيائي abdominal e.
 يتولد عن صدور دفعات عصبية شاذة من الدماغ.
 - صَرْعٌ مُكْتَسَبٌ. صرع يتولد عن مرض acquired e.
 مخي يصيب المريض بعد ولادته.
 - صَرْعٌ مُنَشَّطٌ. نوبات سرعية تحفز activated e.
 بالتهبيه الكهربائي أو بالادوية لأغراض مشاهدة
 أعراضها السريرية الاستجابات الكهربائية الدماغية
 المولدة فيها.
 - صَرْعٌ تَدْوِيرِيٌّ. صرع بؤري يتصف adversive e.
 بتدوير الرأس والعينين والجذع أحياناً إلى الجهة
 المعاكسة لجهة الإصابة في الفص الجبهي للدماغ
 والباحة الجبهية البصرية فيه.
 - صَرْعٌ عَاطِفِيٌّ. صرع بؤري يتصف affective e.
 بأعراض عاطفية كالخوف والقلق والاكتئاب ويتولد عن
 آفة بؤرية في أحد الفصين الصدغيين.
 - صَرْعٌ لَأَحْرَكِيٌّ. (e. aknetic = atonic e.)
 - صَرْعٌ كُحُولِيٌّ. نوبة صرع يحفزها alcoholic e.
 تناول الكحول.
 - صَرْعٌ مُتَنَاقِبٌ. نوبات صرع alternating e.

تتناوب في جهتي الجسم فتحدث في كل مرة في إحدى
 الجهتين أو تبدأ في إحدى الجهتين ثم تنتشر للجهة
 الثانية ولا يعرف سبب لذلك.


- صَرْعٌ سَيْرِيٌّ. نوبة صرع تتولد ambulatory e.
 تلقائياً تتصف بسير المريض من دون وعي ولن يتذكر
 ذلك بعد انتهاء النوبة وتسببها آفة في الفص الصدغي.
 - صَرْعٌ لَوَزِيٌّ. نوبة صرع تتولد amygdaloid e.
 عن آفة النواة اللوزية وتتصف بحركات مضغية نظمية
 مع قضم الشفتين.
 - صَرْعٌ حُسْبَوِيٌّ؛ صَرْعٌ حُسْبِيٌّ. نوبة aphasic e.
 صرع تتصف بفترة حبسة تامة بالرغم من احتفاظ
 المريض بوعيه.
 - صَرْعٌ وَإِنْ. نوع من الصرع يتصف atonic e.
 بفقدان ثوتر عضلات الوضع مما يؤدي إلى الوهط وقد
 يكون ذلك مفاجئاً وسريعاً فيسقط المريض على
 الأرض وقد يصاب بأذى ولكن من دون اختلاج وقد
 يكون الوهط تدريجياً مصحوباً بنفضات متتالية
 - صَرْعٌ هَلُوسِيٌّ. auditory hallucinatory e.
 سَمْعِيٌّ. نوبة صرع تترافق مع سماع اصوات
 موسيقية أو كلام سابق من الذاكرة وتنتج عن آفة في
 الفص الصدغي للمخ.
 - صَرْعٌ تَلَقَّائِيٌّ. نوبة صرع تتولد automatic e.
 تلقائياً وغالباً ما تكون سيرية شبه قصدية ولكن
 المريض لا يتذكرها بعد حصولها.
 - صَرْعٌ مُسْتَقِلٌّ. نوبة صرع تترافق autonomic e.
 مع أعراض أغلبها ناتج عن تهيج الجهاز العصبي
 المستقل مثل تسرع القلب وارتفاع ضغط الدم وتوسع
 الحدقة والتعرق المفرط واضطراب التنفس.
 - Bravais-jacksonian e. (= jacksonian e.)
 صَرْعٌ جَكْسُونِيٌّ.
 - صَرْعٌ الدَّمَاعِ المَرْكَزِيٌّ. centrencephalic e.
 صرع نتيجة دفعات عصبية تصدر من التكوين الشبكي
 للدماغ المتوسط والمهاد وتنتشر إلى الجهتين وإلى
 القشرة المخية.
 - صَرْعٌ رَمْعِيٌّ. صرع عام يصيب الأطفال clonic e.
 الصفار وتدمر نوبته لمدة دقيقة واحدة تقريباً
 ويتصف سريرياً بفقدان الوعي مع تقلصات رمعية
 نظمية في جهتي الجسم وفي كل أقسامه.

- **conscious e.** صَرْعٌ وَاعٍ. صرع لا يفقد المريض فيه وعيه أثناء النوبات.
- **cortical e.** صَرْعٌ قَشْرِيٌّ. نوبات صرعية بؤرية تبدأ من قشرة المخ.
- **cryptogenic e. (= idiopathic e.)** صَرْعٌ مَجْهُولُ السَّبَبِ.
- **cursive e. (= procursive e.)** صَرْعٌ رَكْضِيٌّ.
- **cyclical e.** صَرْعٌ دَوْرَوِيٌّ. صرع يتصف بنوبات صرعية تلقائية تعاد بفترات منتظمة متوقعة ولا علاقة لها بأي عامل مؤهب.
- **delayed e.** صَرْعٌ آجَلٌ. صرع يظهر بعد الإصابة بالرضح بفترة طويلة قد تمتد إلى شهور أو سنوات عديدة.
- **diencephalic e. (= centrencephalic e.)** صَرْعٌ الدِّمَاغِ البَيِّنِيِّ.
- **diurnal e.** صَرْعٌ نَهَارِيٌّ. نوبات صرعية تحدث أثناء النهار أو عندما يكون المريض مستيقظاً.
- **essential e. (= idiopathic e.)** صَرْعٌ مَجْهُولُ السَّبَبِ.
- **focal e.** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ. نوبات صرعية صغيرة تكون في جهة واحدة من الجسم أو في منطقة ضيقة منه أو تولد أعراضاً موضعية وتنتج عن آفة بؤرية موضعية في المخ.
- **focal e., chronic (= epilepsia partialis continua)** صَرْعٌ جُزْئِيٌّ مُتَوَاصِلٌ.
- **focal e., minor** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ صَغِيرٌ. نوبة صرعية تتكون من الآورة فقط ومن دون أي اختلاج.
- **gelastic e.** صَرْعٌ ضَحْكِيٌّ. صرع تصاحبه نوبة شديدة من الضحك قبيل نوبة الصرع أو خلالها.
- **generalized e.** صَرْعٌ عَامٌ. صرع يتصف بنوبات عامة شاملة وقد تبدأ النوبة من نقطة واحدة ثم تنتشر أو تكون النوبة شاملة منذ أول ابتدائها.
- **generalized flexion e. (= hypsarrhythmia = infantile massive spasm)** صَرْعٌ انْتِنَائِيٌّ عَامٌ.
- **grand mal e. (= major e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- صرع تسبقه عادة الآورة ويتصف بفقدان الوعي المفاجيء الذي يتلوه الاختلاج العام.
- **haut mal e. (= grand mal e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- **hysterical e.** صَرْعٌ هِسْتِيرِيٌّ. نوبات هستيرية تحاكي نوبات الصرع.
- **ideational e.** صَرْعٌ اِفْتِكَارِيٌّ. صرع افتكاري يبدأ من المنطقة الجبهية الصدغية يشعر فيه المريض بأفكار إجبارية متكررة لا علاقة لها بمحيطه وواقعه ولكنها تكون موجودة في فكره من قبل بدء نوبة الصرع.
- **Idiopathic e.** صَرْعٌ مَجْهُولُ السَّبَبِ. صرع غير معروف السبب وقد يكون مرتبطاً مع استعداد بنيوي وراثي للنوبات.
- **illusional e.** صَرْعٌ اِنْخِدَاعِيٌّ. صرع بؤري يبدأ من المنطقة الصدغية ويولد نوبة يشعر فيها المريض بانخداع حسي ولكنه يحتفظ بوعيه وقد يشعر بصور بصرية ممسوخة أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي وما شاكل ذلك.
- **jacksonian e.** صَرْعٌ جَاكْسُونِيٌّ. صرع يتصف بحركات رمعية بجهة واحدة من الجسم ويبدأ من إحدى المجموعات العضلية ثم ينتشر بصورة منتظمة للمجموعات المجاورة مما يعكس تقدم الفعالية الصرعية خلال المنطقة الحركية القشرية. وتتسبب هذه النوبات عن بؤرة قشرية في نصف كرة المخ المعاكس لجهة النوبة.
- **Koshevnikoff's e. (= epilepsia partialis continua)** صَرْعٌ جُزْئِيٌّ مُتَوَاصِلٌ.
- **larval e.** صَرْعٌ خَافٍ. نوبات صرعية غير ظاهرة تتمثل فقط بظهور موجات متميزة في مخطط كهربائية الدماغ.
- **Laryngeal e. (= tussive syncope)** صَرْعٌ حَنْجَرِيٌّ؛ غَشَشِيٌّ سَعَالِيٌّ. صرع مع آورة سعال ومن المشكوك فيه أن تكون نوبة صرعية.
- **latent e. (= larval e.)** صَرْعٌ كَامِنٌ؛ صَرْعٌ يَرَقِيٌّ.
- **localized e. (= focal e.)** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ.
- **major e. (= grand mal e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- **matutinal e.** صَرْعٌ صَبَاحِيٌّ. نوبات صرعية تحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

- **menstrual e.** صَرْعٌ حَيْضِيّ. نوبات صرعية تترافق مع الحيض.
- **mental e. (= psychic e.)** صَرْعٌ نَفْسِيّ.
- **metabolic e.** صَرْعٌ اسْتِقْلَابِيّ. صرع يتولد عن اضطرابات استقلابية في الدماغ مثل تلك التي تحدث نتيجة عوز الأكسجين أو اليوريمية أو انقطاع المدمنين عن تناول العقار.
- **minor e.** صَرْعٌ صَغِير. نوبة صرعية خفيفة تتكون من غشية خفيفة أو فقدان الوعي الكامل أو أعراض حسية أو حركية موضعية كما يحدث مثلاً في الصرع النفسي الحركي.
- **morning e. (= matutinal e.)** صَرْعٌ صَبَاحِيّ.
- **musicogenic e.** صَرْعٌ مُوسِيقِيّ التَّنْبِيهِ. صرع انعكاسي يتولد استجابة للتيه الموسيقي.
- **myoclonus e.** صَرْعٌ رَمَعِيّ عَضَلِيّ. صرع مترقي بطيء وهو وراثي جسدي متنحٍ يبدأ عند الأطفال ويتصف بنوبات متقطعة من رمع مستمر لمجموعات عضلية مما يولد صعوبة الحركة الإرادية ويرافق ذلك التخلف العقلي الذي قد يتطور إلى الخرف.
- **nocturnal e.** صَرْعٌ لَيْلِيّ. نوبات صرعية تحدث في الليل أثناء نوم المريض.
- **nonconvulsive e.** صَرْعٌ لَا إِخْتِلَاجِيّ. صرع لا تترافق نوباته مع الاختلاج ولكنه يتكرر بكثرة أكثر من نوبات الصرع الاختلاجي.
- **oculoclonic e.** صَرْعٌ رَمَعِيّ عَيْنِيّ. نوبات تولد حركات نظمية في العينين تنتهي عادة بانحراف العينين الرمعي إلى إحدى الجهات وتسبب عن آفة في الفص القذالي للجهة المعاكسة.
- **oculogyric e.** صَرْعٌ مُدَوِّرُ الْعَيْنَيْن. نوبة تولد انحراف العينين التوتري المتقارن.
- **olfactory e.** صَرْعٌ شَمْعِيّ. صرع يولد هلساً أو انخداعاً شميماً وعادة ما يكون لرائحة كريهة.
- **organic e. (= symptomatic e.)** صَرْعٌ عَضْوِيّ.
- **petit mal e.** صَرْعٌ النَّوْبَةِ الصَّغِيرَةِ. صرع يتصف بفقدان الوعي مع نفضات رمعية عضلية خفيفة. يشاهد غالباً عند الأطفال ويترافق مع موجات كهربائية دماغية تتردد ثلاث مرات بالثانية ومن نمط السهم والموجة.
- **photogamic e.** صَرْعٌ ضَوْئِيّ التَّنْبِيهِ. صرع يتولد عن التنبيه الضوئي.
- **physiologic e.** صَرْعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. صرع بيولوجي يتولد عن وظائف دماغية فيزيولوجية وليس عن شذوذ بنيوي أو مرض عضوي في الدماغ.
- **posthemiplegic e.** صَرْعٌ بَعْدَ الْفَالَج. نوبات صرعية تتولد عند مريض مصاب بالفالج وعادة ما تبدأ في منطقة محددة في الطرف المشلول.
- **post-traumatic e.** صَرْعٌ بَعْدَ الرِّضْح. نوبات اختلاجية متكررة تحدث بعد إصابات الرأس الرضحية.
- **procursive e. (= cursive e.)** صَرْعٌ رَكْضِيّ. صرع نفسي حركي يتصف بتلقائية سيرية تخطيطية يسير المريض خلالها بضع خطوات حتى يصطدم بالعوائق في طريقه.
- **progressive familial myoclonic e.** صَرْعٌ رَمَعِيّ عَضَلِيّ عَائِلِيّ (= myoclonus e.) مُتَرَقٍ.
- **psychic e.** صَرْعٌ نَفْسِيّ. نوبات صرعية تتغلب فيها الأعراض النفسية.
- **psychomotor e.** صَرْعٌ نَفْسِيّ حَرَكَتِيّ. نوبات صرعية تترافق مع آفات الفص الصدغي للدماغ وتتصف بدرجات مختلفة من فقدان الوعي ويقوم المريض خلالها بحركات منسقة ولكنها بدون هدف وفي غير موضعها ولا تخدم أي غرض وينسى القصد من حركاته هذه.
- **pubertal e.** صَرْعٌ الْبُلُوغ. صرع يبدأ عند البلوغ أو حواليه وعادة ما تبدأ في هذا السن نوبات الصرع العام التي تنتج عن إصابات الرأس عند الولادة.
- **reading e.** صَرْعٌ الْقِرَاءَةِ. نوبات صرعية تظهر عند القراءة وتكون عادة نوبات اختلاجية وتتخفف من التنبيه البصري المتقطع عند حركات العين القفزية أثناء القراءة.
- **reflex e.** صَرْعٌ انْعِكَاسِيّ. نوبات صرعية تتولد استجابة للمنبهات الحسية (اللمسية والبصرية والسمعية والموسيقية).
- **rolandic e. (= jacksonian e.)** صَرْعٌ جَاكْسُونِيّ.
- **self-induced e.** صَرْعٌ مَحْرَضٌ ذَاتِيّاً. صرع يحرض المريض على توليده ذاتياً ويحدث ذلك عادة عند الأطفال الذين يولدون نوبات الصرع الصغير ذاتياً بطريقة تنبيه بعض المنعكسات البصرية.

- **sensory e.** صَرْعٌ حِسِّيٌّ. نوبات صرعية تتصف بأهلاس بصرية أو ذوقية أو شمعية.
- **serial e.** صَرْعٌ تَسْلُسُلِيٌّ. نوبات صرعية تحدث بصورة متسلسلة مع عودة الوعي بين نوبات السلسلة الصرعية.
- **spinal e.** صَرْعٌ نَخَاعِيٌّ. متتاليات من تشنجات رمعية وتوترية تحصل في الشلل السفلي التشنجي.
- **symptomatic e.** صَرْعٌ أَعْرَاضِيٌّ. نوبات صرعية مكتسبة تنسب عن أمراض الجهاز العصبي المركزي نفسه أو عن الاضطرابات الجهازية العامة كنقص سكر الدم أو اليوريمية أو التسمم بالرصاص. يسمى أيضاً الصرع العضوي.
- **tardy e. (= epilepsia tarda)** صَرْعٌ أَجَلٌ.
- **temporal lobe e. (= psychomotor e.)** صَرْعٌ الْفَصِّ الصَّدْعِيِّ: صَرْعٌ نَفْسِيٌّ حَرَكِيٌّ.
- **thalamic e.** صَرْعٌ مَهَادِيٌّ. نوبات صرعية تتولد عن أمراض المهاد.
- **tonic e.** صَرْعٌ تَوَثُّرِيٌّ. صرع يتصف بالصلل العام.
- **traumatic e.** صَرْعٌ رَضَجِيٌّ. نوبات صرعية تحدث نتيجة إصابات الدماغ (الجرح الناري أو الرضحي).

- **uncinate e.** الصَرْعُ الشُّصِيُّ. نوبة صرعية تتولد عن إصابة المنطقة المعقفة للفص الصدغي والتي تتصف بأهلاس شمعية وذوقية.
- **waking e. (= matutinal e.)** صَرْعٌ صَبَاحِيٌّ. متعلق أو منسوب للصرع أو شخص مصاب به.
- **epileptic** صَرْعِيٌّ. متعلق أو منسوب للصرع أو شخص مصاب به.
- **epileptiform** صَرْعِيٌّ الشَّكْلُ. 1. شبيه بالصرع أو بأعراضه 2. ما يحدث بنوبات شديدة أو مفاجئة.
- **epileptogenic (= epileptogenous)** مُحْدِثُ الصَّرْعِ؛ مُصَرِّعٌ. عامل يولد الصرع.
- **epileptoid (= epileptiform)** صَرْعِيٌّ الشَّكْلُ؛ صَرْعَانِيٌّ.
- **epinephrine (= adrenaline)** إِبِينَفْرِينٌ. هرمون يفرزه لب الغدة الكظرية استجابة لتنبيه العصب الحشوي ويخزن في الحبيبات اليفة الكروم كما أنه يفرز في حالة نقص سكر الدم، وهو منبه قوي للجهاز العصبي الودي (المستقبلات الأدرينالينية الفعل). وهو موثر وعائي شديد يرفع ضغط الدم ويسرع القلب وينبه العضلة القلبية ويزيد من النتاج القلبي ومن الفعاليات الاستقلابية ومن تحلل الغليكوجين وتحرير الغلوكوز. يسمى أيضاً الأدرينالين.



epilepsy, minor

مخطط كهربائية الدماغ لمرضى يعاني من حالة صرع صغير وتظهر فيه موجات دلنا التي تتكرر ثلاث مرات في الثانية.

epinephrinemia وَجُودُ الإبينفرين في الدَّم.
epineural فَوْقَ القَوَسِ العَصَبِيَّةِ. يقع فوق أحد الأقواس العصبية.

epineurial غَمْدِيٌّ عَصَبِيٌّ؛ غِلَافِيٌّ عَصَبِيٌّ. منسوب إلى الغمد العصبية.

epineurium الغَمْدُ العَصَبِيٌّ؛ غَمْدُ العَصَبِ؛ غِلَافُ العَصَبِ. طبقة النسيج الضام التي تحيط بكامل العصب المحيطي ويحوي أوعيته الدموية واللمفاوية.

epiphysis cerebri (= pineal body) الجِسْمُ الصَّنَوْبِرِيُّ.

epipial فَوْقَ الحَنُونِ. يقع فوق الأم الحنون.

episode نَائِبَةٌ؛ عَارِضَةٌ. حادثة مهمة أو سلسلة حوادث تحدث في سلسلة تطور المرض.

- acute schizophrenic e. (= acute schizophrenia) فُصَامٌ حَادٌّ.

- hypomanic e. عَارِضَةٌ دُونَ الهَوَسِيَّةِ. اضطراب المزاج الشبيه بالهوس ولكنه أقل شدة منه.

- major depressive e. عَارِضَةٌ مُكْتَبَةٌ كَبِيرَةٌ. فترة اكتئاب المزاج مع فقدان الاهتمام العام وعدم التلذذ بالعمل والفعاليات مع اضطراب الشهية والنوم وتغير الوزن واضطرابات نفسية حركية وصعوبة التفكير أو التركيز والوهن والتعب والشعور بالذنب والرغبة بالموت أو الانتحار.

- manic e. عَارِضَةٌ هَوَسِيَّةٌ. حالة هياج مزاجي مصحوب بأعراض هوسية كالشعور بالعظمة وقلة الرغبة بالنوم وكثرة الكلام وتطاير الأفكار وعدم الانتباه وهياج نفسي حركي وفرط النشاط الجنسي وسلوك مضطرب.

- psycholeptic e. نَوْبَةٌ ذُهَانِيَّةٌ. حادثة نفسية واضحة مفاجئة يعتقد المريض فيها بأنها كانت بداية مرضه العقلي ويعتقد بأنه لا يمكنه التغلب عليها أو إزالتها من ذاكرته.

epispinal 1. فَوْقَ النُّخَاعِ 2. فَوْقَ العُصْبِ الفَقْرِيّ.

epithalamus المِهَادُ الفَوْقِيّ؛ المِهْدُ. الجزء

الذنب لسقف البطين الثالث وجدرانه الوحشية المجاورة له في الدماغ البيني وهو يشمل نوى العنان وصوارها وجسم النخامية وصوار المهيد.

epithelioceptor المُسْتَقْبِلَةُ الظَّهَارِيَّةُ. منطقة في الخلية الغدية تستلم التنبيه العصبي من العضو الانتهائي من الليف العصبي.

equilibrium تَوَازُنٌ. الحالة التي تتساوى فيها العوامل المتضادة أو المتعاكسة.

eremophobia رُهابُ الوَحْدَةِ. الخوف من الانفراد والانعزال.

erethism هَيْوُجٌ. مفرط الاستثارية خصوصاً للمنبهات الجنسية.

ergasiophobia رُهابُ العَمَلِ. كراهية العمل الشديدة.

ergasthenia وَهْنُ العَمَلِ. الوهن الشديد العام الذي يتولد عن الاستغراق في العمل لفترة طويلة متواصلة.

ergotamine إِرْغُوْتَامِينٌ. دواء قلواني يستعمل في علاج الشقيقة.

ergotoxine إِرْغُوْتُوْكْسِينٌ. مزيج قلواني يعمل كعامل محصر للفعل الأدريناليني.

erotic شَبَقِيٌّ؛ شَبَقِيٌّ. مشبع بالرغبة الجنسية.

eroticism (= erotism) شَبَقِيٌّ. الرغبة الجنسية.

eroticomania (= erotomania) هَوَسٌ شَبَقِيٌّ.

erotism شَبَقِيٌّ. الغريزة أو الرغبة الجنسية أو إظهار الشخص لرغباته الجنسية الغريزية.

- anal e. الشَّبَقُ الشَّرْجِيّ. تركيز الشبق على مرحلة التطور الجنسي الطفلي الشرجي.

- oral e. الشَّبَقُ الفَمَوِيّ. 1. تركيز الشبق على مرحلة التطور الجنسي الطفلي الفموي 2. التلذذ باستعمال الفم لغير التغذي.

erotogenesis تَوَلِيدُ الشَّبَقِ؛ إِشْبَاقٌ. توليد الشعور الجنسي الشبقي.

erotomania هَوَسٌ شَبَقِيٌّ. الانشغال المرضي بالفعاليات الجنسية.

erotophobia رُهابُ العِشق. الخوف من العشق ومن العمليات الجنسية والشعور الجنسي.

erratic 1. تائه 2. شاذ. 1. ضال 2. شاذ وغريب الأطوار في أفكاره وتصرفاته.

eructatio nervosa تَجَشُّؤٌ عَصَبِيٌّ. اخراج الغاز من المعدة عن طريق الفم بصورة خاصة.

erythromelalgia (= red neuralgia) إَحْمَرَارُ الأطراف المُؤَلِم.

erythrophobia رُهابُ الأحمر. 1. الخوف من اللون الأحمر والمتراقب غالباً مع الخوف من الدم 2. الخوف من الاحمرار وغالباً ما يترافق مع احمرار الخجل حتى للمؤثرات البسيطة.

eserine (= physostigmine) أُذِيرِين.

esophagalgia أَلَمُ المَرِيء.

ESP (= extrasensory perception) إِذْرَاكَ خَارِجِ الجِسْمِي.

essential 1. أساسي؛ ضروري 2. مجهول السبب. 3. مكوّن أساسي. 1. يكون القسم الأساسي أو الضروري من الشيء أو المادة ويعطيها صفاتها وشكلها المميز 2. مجهول السبب وليس له أي سبب خارجي واضح أو معروف (ويقال ذلك بصورة خاصة عن المرض) 3. مادة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في الطعام كالحموض الأمينية أو الدهنية الضرورية.

esthesia حِسٌّ؛ إِذْرَاكَ؛ شُعُور.

esthesic إِذْرَاكِيٌّ؛ حِسِّيٌّ. ما يتعلق بالإدراك النفسي للحس.

esthesiogenic مُؤَلِّدُ الحِسِّ. عامل يولد الحس.

esthesiometer (= factometer) مِقْيَاسُ حِسِّ اللُّمَسِّ. آلة لقياس حس اللمس.

esthesioneure عَصَبُونٌ حِسِّيٌّ. خلية عصبية حسية.

esthesioneuroblastoma وَرَمٌ أَرُومِيٌّ عَصَبِيٌّ حِسِّيٌّ. ورم دبق حساس للراديويم ويتكون في التجويف الأنفي.

esthesioneurosis عَصَابٌ حِسِّيٌّ. أي اضطراب للأعصاب الحسية.

esthesionosis (= esthesioneurosis) عَصَابٌ حِسِّيٌّ.

esthesiophysiology فِيزِيُولُوجِيَا الحَوَاسِّ. فيزيولوجيا الحس والأعضاء الحسية.

esthesodic نَاقِلُ الحِسِّ. ناقل الدفعات الحسية أو متعلق بها.

1. حِسِّيٌّ 2. جَمَالِيٌّ. 1. متعلق بالحس 2. متعلق بالجمال أو بتجميل المظهر.

etat dysmyelinique حالة اختلال تَكَوُّن الميالين؛ حَالَةٌ إِنْحِلَالِ الميالين.

etat marbre (= status marmoratus) قَرُوطٌ تَنَحُّعُ الجِسْمِ المُخَطَّط.

etat vermoulu تَفْرُحٌ سَطَحِ الدِّمَاغِ. حالة تفرح سطح الدماغ غير المنتظم الذي يشاهد أحياناً في تصلب الشرايين المتقدم.

ethical أَخْلَاقِيٌّ. منسجم مع الأسس والقواعد التي تتحكم بالسلوك الصحيح.

ethics أَخْلَاقِيَّاتٌ؛ آدَابٌ. القواعد والأسس التي تعين السلوك الصحيح.

آدَابُ الطَّبِّ. القيم والتعاليم التي يسترشد بها في الممارسة الطبية الصحيحة.

ethocaine (= procaine hydrochloride) إِيثُوكَايْنِيْن.

ethoheptazine citrate سِتِرَاتُ الإِيثُوهِبَتَازِين. دواء مسكّن للألم.

ethosuximide إِيثُوسُكْسِيمِيد. دواء يستعمل في علاج الصرع الصغير ويؤخذ عن طريق الفم.

ethybenztropine إِيثِبِنْزَتْرُوبِين. دواء يستعمل كعامل مضاد للباركنسونية وفي علاج متلازمة خارج الهرمي المحرّضة بالدواء.

etidocaine hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ الإِتِيدُوكَايْنِيْن. مخدر موضعي يستعمل كمحصر عصبي محيطي وكمحصر خارج الجافية أو محصر ذنب.

eucatropine hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ اليُوكَاتْرُوبِين. دواء مضاد للفعل

الكوليني ويستعمل كموسع للحدقة ويوضع موضعياً في العين.

eugnosia سَوَائِيَةُ الإِدْرَاك. القدرة على معرفة المنبهات الحسية وتركيبها وإدراكها إدراكاً صحيحاً.

eugnostic سَوِيَّ الإِدْرَاك. شخص يتمتع بإدراك سليم.

eukinesia, eukinesis سَوَائِيَةُ الحَرَكَةِ. حالة سواء حركات الجسم وسلامتها.

eukinetic سَوِيَّ الحَرَكَةِ. شخص يتمتع بحركة سوية.

eunoia سَوَائِيَةُ العَقْل. سلامة العقل والتحكم بالإرادة.

euphoretic 1. شَمِيقٌ 2. مُشَمِّقٌ. متعلق أو منسوب للشمق أو عامل يولده.

euphoria شَمَقٌ. حالة الشعور بالنشوة وراحة الجسم وخلوه من الألم والشعور بالسعادة المفرطة والمبالغة التي تحصل في بعض الأمراض العقلية.

euphoriant (= euphoretic) 1. شَمِيقٌ 2. مُشَمِّقٌ؛ شَمَقِيٌّ.

euphoric شَمِيقٌ. متعلق أو منسوب للشمق.

euphorigenic, euphoristic مُشَمِّقٌ. عامل يولد الشمق.

eupractic سَوِيَّ الأداء. شخص سوي في أدائية الحركات والوظائف.

eupraxia سَوَائِيَةُ الأداء. حالة توليد حركات سوية متناسقة.

eupraxis (= eupractic) سَوِيَّ الأداء.

eusitia سَوَائِيَةُ الشَّهْيَةِ. شهية سوية للطعام.

eusthenia سَوَائِيَةُ القُوَّة. حالة سواء نشاط وقوة الجسم.

euthanasia قَتْلُ المَرْحَمَةِ. 1. الموت السهل غير المؤلم 2. قتل الشفقة وهو القتل المقصود لمرضى في المراحل النهائية من مرضه أو عندما يعاني من الآلام مبرحة شفقة ورحمة به.

exacerbation سَوْرَةٌ. (ج: سَوَرَات). ازدياد وطأة المرض وشدته أو أي من أعراضه.

exanimation (= unconsciousness, = coma) غَيْبُوبَةٌ؛ فَقْدُ الوَعْي؛ سَبَات.

excerebration إِسْتِخْرَاجُ الدِّمَاغ. إزالة الدماغ، وخصوصاً إزالة دماغ الجنين لتيسير الولادة.

excitability الإِسْتِثَارِيَّة. استعداد النسيج أو العضو للاستجابة للمنبهات.

excitable يُسْتَثَار. مستعد للاستثارة، أي مستعد للاستجابة للمنبهات.

excitant مُثِير. أي عامل يولد استثارة الفعاليات الحيوية أو الدماغية.

excitation إِسْتِثَارَةٌ؛ إِثَارَةٌ. عملية إثارة النسيج أو العضو أو استجابتهما للمنبهات وقد يكون ذلك بإضافة طاقة لهما.

- direct e. إِثَارَةٌ مُبَاشِرَةٌ. التنبيه الكهربائي للعضلة بوضع المسرى الكهربائي عليها مباشرة.

- ephaptic e. إِثَارَةٌ تَمَاسِيَّةٌ. إثارة محوار العصبون مباشرة بتماسه مع محوار عصبون آخر.

- indirect e. إِثَارَةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ. التنبيه الكهربائي للعضلة بوضع المسرى الكهربائي على عصبها الحركي.

excitatory إِسْتِثَارِيٌّ. ما يمكنه أن يستثير أو ينبه.

excitomotor مُثِيرُ الحَرَكَةِ. 1. ما يمكنه أن يولد استجابة أو فعالية حركية 2. عامل ينبه وظيفة أو فعالية حركية.

excitomuscular مُثِيرُ عَضَلِيٍّ. عامل يستثير العضلات.

exencephalia (= exencephaly) اخْتِرَاجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِيَّةُ الدِّمَاغ.

exencephalous (= exencephalus)

مَخْتَرَجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِي الدِّمَاغ. مسيخ ذو دماغ براني.

exencephaly اخْتِرَاجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِيَّةُ الدِّمَاغ. شذوذ خلقي نمائني يتصف بغييب في القحف وخروج الدماغ منه للخارج.

exhaustion إِنْهَاطٌ. حالة تعب فكري أو جسمي شديد.

- heat e. **إِنْهَآكٌ حَرَارِيّ.** حالة اضطراب جسمي يتصف بالصداع والدوران واختلال درجة حرارة الجسم والغثيان والهبذان والإغماء في بعض الحالات نتيجة للتعرض للحرارة العالية لفترة طويلة.

- nervous e. (= nervous asthenia) **وَهْنٌ عَصَبِيّ.**

exhibitionism **الِاسْتِعْرَاء.** شذوذ جنسي يتصف بهياج جنسي متكرر ويستثير المصاب للتعري واستعراض أعضائه التناسلية.

exhibitionist **الْمُسْتَعْرِيّ.** شخص مصاب بداء الاستعراء.

exhilarant **مُنْعِش.** عامل مفرح أو منشط.

exophthalmos (= exophthalmus, proptosis) **جُحُوظ.** بروز مقلة العين الشاذ للآمام.

exploration **إِسْتِقْصَاء.** البحث والتحري أو الفحص لأغراض التشخيص.

exploratory **إِسْتِقْصَائِيّ.** متعلق بالاستقصاء والبحث والتحري.

expression **1. تَغْيِير. 2. عَضْر.** 1. مظهر الوجه وملامحه التي تولدها حالة الشخص العاطفية أو الجسدية. 2. تفريغ بالضغط.

expressive **مُعْبِر.** حالة أو وجه ذو ملامح معبرة عن الانفعال العاطفي أو الجسدي.

extension **1. تَمْدِيد. 2. بَسْط.** 1. الحركة التي يتم فيها سحب العاملين الملتصقين بعيداً عن بعضهما. 2. حركة يتم فيها وضع أقسام الذراع بوضع مستقيم أو تحريكها لذلك الاتجاه.

extensor **بَاسِط.** إصطلاح عام للعضلة التي تبسط المفصل.

exteroceptive **إِسْتِقْبَالِيّ خَارِجِيّ.** ساحة السطح الخارجي للجسم التي تنتشر عليها المستقبيلات الحسية الخارجية.

exteroceptor **مُسْتَقْبِلٌ خَارِجِيّ.** نهاية عصبية حسية في سطح الجسم تتنبه بالمنبهات الموجودة في البيئة الخارجية المباشرة التي تحيط بالجسم كمستقبلات الجلد أو الأغشية المخاطية.

exterofection **الِاسْتِجَابَةُ لِلْمُنْبَهَاتِ الْخَارِجِيَّة.** استجابة الجسم لمنبهات البيئة الخارجية والتي يولدها الجهاز العصبي الدماغي النخاعي.

exteroffective **مُسْتَجِيبٌ لِلْمُنْبَهَاتِ الْخَارِجِيَّة.** صفة الجهاز العصبي الدماغي النخاعي الذي يستجيب للمنبهات الخارجية.

extracranial **خَارِجُ الْقَاف.** متوضع أو يحدث خارج القحف.

extradural **خَارِجُ الْجَافِيَّة.** متوضع أو يحدث خارج الجافية.

extramedullary **خَارِجُ النُّخَاع.** متوضع أو يحدث خارج أي نخاع وخصوصاً خارج النخاع المستطيل.

extrameningeal **خَارِجُ السَّحَايَا.** متوضع خارج السحايا أو يحدث أو يحقن خارج السحايا.

extrapsychic **خَارِجُ النَّفْس.** ما يحدث خارج النفس بين العقل والبيئة الخارجية.

extrapyramidal **خَارِجُ الْهَرَمِيّ.** خارج السبيل الهرمي.

extroversion **إِنْبِسَاطُ نَفْسِيّ.** انفتاح الشخص وتوجيه اهتماماته نحو العالم الخارجي.

extrovert **مُنْبِسِطُ النَّفْس.** شخص منفتح باهتماماته نحو العالم الخارجي.

F

تَخْرِيف: fabrication (= confabulation) تَلْفِيق.

1. وَجْه 2. سَخْنَة. 1. الوجه الامامي facies للرأس أو للعضو أو البنية التشريحية 2. التعبير أو مظهر الوجه.

السَخْنَةُ الْبَقْرِيَّة. اصطلاح يطلق على - f. bovina مظهر وجه المصاب بسوء التعظم القحفي الوجهي.

الْوَجْهُ الْمُخَيُّ f. cerebri alae majoris للجَنَاحِ الْكَبِير. القسم الاملس الموجه من الجناح الكبير للعظم الورتدي الذي يكون القسم الامامي من قاع الحفرة الوسطية للقحف.

السَخْنَةُ الْبِقْرَاطِيَّة. الوجه - f. hippocratica المتفغنن الذائوي والشاحب الذي يسبق الوفاة أو يدلل عليها.

السَخْنَةُ الْهَنْشِنْسُونِيَّة. سحنة Hutchinson's f. على وجه المصاب بشلل العين الخارجي تتصف بثبات المقلة وارتفاع الحاجب وتدلي الاجفان.

الْوَجْهُ السُّفْلِي لِلْمُخ. قاعدة - f. inferior cerebri المخ أو وجهه السفلي.

الْوَجْهُ f. inferior hemispherii cerebelli السُّفْلِي لِئِنْصِفَ كُرَّةُ الْمُخِيخ. الوجه المكون من الفصيص الهملاي واللوزة وندفة المخيخ.

سَخْنَةُ الْوَهْنِ الْعَضْلِي. التعبير - myasthenic f. الوجهي المميز الذي يشاهد في الوهن العضلي الوبيل والذي يتولد عن تدلي عضلات الوجه وضعفها.

سَخْنَةُ الْإِعْتِلَالِ الْعَضْلِي. التعبير - myopathic f. الوجهي الخاص الذي يولده ارتخاء عضلات الوجه في حالة حثل العضلات.

- Parkinson's f. (= parkinsonian f.)

السَخْنَةُ الْبَارْكِنْسُونِيَّة. التعبير الصلب القناعي الشكل مع قلة طرف العين وهو السحنة المميزة لداء باركنسون.

تَيْسِير. تعجيل أو تسهيل أية facilitation عملية طبيعية وهو عكس التثبيط وخصوصاً بالنسبة لتأثير الدفعة العصبية عبر المشبك والذي يسهل مرور الدفعات العصبية المارة عبره.

تَيْسِيرٌ وَدِنْسْكِي. تسهيل مرور - wedensky's f. الدفعات العصبية عبر الإحصار حيث تنخفض عتبة العصب في قسمه أسفل الإحصار.

أَلَمُ الْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ. ألم faciocephalgia عصبي في الوجه والرقبة بسبب اضطراب الجهاز العصبي المستقل.

شَلْلُ الْوَجْهِ (= facial paralysis) facioptegia الوجه.

حَثَلٌ وَجْهِيٌّ كَنَفِيٌّ عَضْدِي. facioscapulohumeral dystrophy

إِخْتِيَارِي. غير اجباري أو متمكن facultative من التلاؤم مع مختلف الظروف.

1. مَلَكَة. (ج: مَلَكَات). 2. كَلِيَّة. faculty (ج: كليات) أي طاقة أو وظيفة سوية خصوصاً الوظائف الفكرية والعقلية.

عَشِيَّة. انظر syncope faint.

عَشِيٌّ؛ إَغْمَاء. فقد الوعي المفاجيء fainting بسبب نقص الدورة الدموية الدماغية العام والعاير.

مَنْجَل. عضو أو بنية منجلية الشكل. falx

مَنْجَلُ الْمُخِيخ. طية الام الجافية - f. cerebelli

- الصغيرة في الخط الوسطي للحفرة القحفية الخلفية التي تبرز للأمام نحو دودة المخيخ.
- f. cerebri** - مِنْجَلُ الْمَخ. طية الام الجافية التي تمتد للأسفل في الشق المخي الطولاني والتي تفصل نصفي كرة المخ عن بعضهما.
- familial** عائلي. يحدث بين أفراد العائلة ويصيب عدداً كبيراً منهم أكبر مما يتوقع أن يكون ذلك بالصدفة.
- fantasy (= phantasy)** الْمُخَيَّلَة؛ اِخْلَامُ الْيَقَظَة. حالة خيالية أو تخيل حوادث متعاقبة عند الشخص اليقظ الواعي.
- fascicle (= fasciculus)** حُرْمَة.
- fascicular** حُرْمِي. 1. متعلق بالحزمة 2. محزم أو ذو حزم.
- fasciculated** 1. مُحْرَم 2. تَحْرُم. 1. متجمع بشكل حزمة 2. مربوط بشكل حزمة.
- fasciculation** 1. تَحْرُم 2. إِزْتِجَافٌ حُرْمِي. 1. تكوين الحزم 2. تقلص عضلي يشاهد من خلال الجلد ويمثل تقلصاً تلقائياً لعدد من الألياف العضلية التي يغذيها ليف عصبي واحد.
- fasciculi** حُرَم. مجموع حزمة.
- fasciculus** حُرْمَة. (ج: حُرَم). مجموعة من الألياف عصبية أو عضلية مترافقة وظيفياً وتسير سوية.
- f. aberrans of Monakow (= tractus rubrospinalis)** السَّبِيلُ الحَمْرَاوِي النُّخَاعِي.
- f. acusticus (= striae medullares ventriculi quarti)** السُّطُورُ البَصَلِيَّةُ لِلْبُطْنِ الرَّابِعِ.
- f. anterior proprius** الحُرْمَة المَخْصُوصَة الأَمَامِيَّة. حزمة الياف عصبية في المادة البيضاء الامامية تحيط بالمادة السنجابية للنخاع الشوكي وتتكون من الياف ترابطية قصيرة صاعدة ونازلة.
- f. arcuatus (= f. longitudinalis superior cerebri)** الحُرْمَة الطَوْلَانِيَّةُ العُلْوِيَّةُ للمَخ. الحزمة المقوسة.
- f. of Burdach (= 1. f. longitudinalis superior cerebri) (= 2. pars temporalis**

1. الحُرْمَة radiationis corporis callosi) الطَوْلَانِيَّةُ العُلْوِيَّةُ لِلْمَخ 2. الجُرْمُ الصُّدْغِي لِشَعِّ الثَّنْيِي.
- cuneate f. of Burdach (= f. cuneatus medullae spinalis)** الحُرْمَة الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع.
- cuneate f. of medulla oblongata (= f. cuneatus medullae oblongatae)** الحُرْمَة الإسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَة.
- cuneate f. of spinal cord (= f. cuneatus = medullae spinalis)** الحُرْمَة الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع.
- f. cuneatus medullae oblongatae** الحُرْمَة الإسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَة. استمرار الحزمة الاسفينية للنخاع الشوكي التي تصعد إلى النخاع المستطيل (البصلة).
- f. cuneatus medullae spinalis** الحُرْمَة الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع. القسم الوحشي من الحبل الظهري للنخاع الشوكي والمكون من الياف صاعدة تنتهي في النواة الاسفينية للنخاع المستطيل.
- dorsolateral f. (= f. dorsolateralis tractus dorsolateralis)** السَّبِيلُ الظَّهْرِي الوَحْشِي.
- extrapyramidal motor f. (= rubrospinal tract)** السَّبِيلُ الحَمْرَاوِي النُّخَاعِي.
- Flechsig's f. (= f. proprii medullae spinalis)** الحُرْمَة المَخْصُوصَة لِلنُّخَاع.
- f. of Foville (= tractus spinocerebellaris posterior)** السَّبِيلُ النُّخَاعِي المَخِيخِي الخَلْفِي.
- f. of Goll (= f. gracilis medullae spinalis)** الحُرْمَة الدَّقِيقَة لِلنُّخَاع.
- Gower's f. (= tractus spinocerebellaris ventralis)** السَّبِيلُ النُّخَاعِي المَخِيخِي البَعْثَنِي.
- f. gracilis medullae oblongatae** الحُرْمَة النَاحِلَة لِلْبَصَلَة. استمرارية الحزمة الناحلة للنخاع التي تصعد إلى النخاع المستطيل (البصلة).
- f. gracilis medullae spinalis** الحُرْمَة النَاحِلَة لِلنُّخَاع. القسم الناصفي من عمود النخاع الشوكي

والمكوّن من الياف صاعدة تنتهي في النواة الناحلة للبصلة.

- interfascicular f. (= f. interfascicularis)

الحُرْمَةُ بَيْنَ الحُرْمِ. مجموعة من الالياف العصبية التي تمتد بين الحزمتين الدقيقة والإسفينية والتي تحوي بعض الفروع النازلة من الياف القسم الناصفي للجذور الخلفية للأعصاب الشوكية.

- intersegmental fasciculi of spinal cord (= fasciculi proprii medullae spinalis)

الحُرْمُ المَخْصُوصَةُ لِلنَّخَاعِ.

- f. lateralis plexus brachialis الحُرْمَةُ

الوَحْشِيَّةُ لِلضَفِيرَةِ العَضْدِيَّةِ. الحبل الجانبي للضفيرة العضدية التي تتكون من اتحاد الأقسام الأمامية من الجذوع العلوية والوسطية للأعصاب الشوكية العنقية 5-7 والذي تتبع منه الأعصاب الصدرية الوحشية والعضلية الجلدية والجذور الوحشية للعصبين الناصف والزندي.

- lenticular f. (= f. lenticularis) الحُرْمَةُ

العَدَسِيَّةُ. حزمة من الالياف العصبية المبتعدة عن الكرة الشاحبة والتي تبدأ من سطحها الظهري لتمر خلال المحفظة الداخلية وتعتبر تختلط مع الياف العروة العدسية وتستمر حتى النوى البطنية للمهاد.

- f. longitudinalis dorsalis الحُرْمَةُ الطُولَانِيَّةُ

الظَهْرِيَّةُ. حزمة الياف قليلة الميالين تمر في المادة السنجابية حول البطنية على طول الدماغ المتوسط وبالقرب من الحزمة الطولانية الإنسية.

- f. longitudinalis inferior cerebri الحُرْمَةُ

الطُولَانِيَّةُ المَخْتِةُ السُّفْلِيَّةُ. حزمة من الياف ترابطية تربط القشرتين القذالية والصدغية وتمتد خلال الفصين القذالي والصدغي وتتكون بصورة خاصة من الالياف الركبية المهمازية الإسقاطية.

- f. longitudinalis medialis الحُرْمَةُ الطُولَانِيَّةُ

الإنْسِيَّةُ. سبيل ليفي عصبي يمتد بين الدماغ المتوسط والقسم العلوي من النخاع الشوكي ويقع بالقرب من المستوى الناصف وبالجهة البطنية من المادة السنجابية ويربط النوى الدهليزية مع النوى الحركية للأعصاب القحفية الثالث والرابع والسادس والحادي عشر بصورة خاصة.

- f. longitudinalis medialis medullae

الحُرْمَةُ الطُولَانِيَّةُ الإنْسِيَّةُ للبصلة.

قسم الحزمة الطولانية الإنسية الذي يمر في البصلة (النخاع المستطيل).

- f. longitudinalis, medialis pontis الحُرْمَةُ

الطُولَانِيَّةُ الإنْسِيَّةُ للجسر. قسم الحزمة الطولانية الإنسية الذي يمر في الجسر.

- fasciculi longitudinalis pontis

(= fasciculi longitudinalis (pyrami-

dales) pontis) الحُرْمُ الطُولَانِيَّةُ للجسر. وتشمل السبيل القشري الجسري والالياف القشرية النووية والقشرية الجسرية للسبيل الهرمي والتي تمر في الجهة البطنية للجسر.

- f. longitudinalis superior cerebri الحُرْمَةُ

الطُولَانِيَّةُ المَخْتِةُ العُلْوِيَّةُ. حزمة من الياف ترابطية تمتد من الفص الجبهي إلى النهاية الخلفية للتلم الوحشي وترتبط قشرة الفصوص الجبهية والصدغية والجدارية والقذالية.

- maculary f. الحُرْمَةُ البُقْعِيَّةُ.

مجموعة الياف عصبية تبدأ من البقعة الصفراء يتصالب بعضها الذي يوجد على الجهة الأنفية للشبكية ولا يتصالب بعضها الآخر الذي يوجد على الجهة الصدغية للشبكية.

- mamillotegmental f. (= f. mamilloteg-

mentalis) الحُرْمَةُ الحَلْمِيَّةُ السَّقِيْفِيَّةُ. حزمة

من الالياف تبدأ من الجسم الحلمي، تمر إلى النواة الأمامية للمهاد.

- f. marginalis ventralis الحُرْمَةُ الهَامِشِيَّةُ

البَطْنِيَّةُ. حزمة مكونة من السبيلين السقفي النخاعي والداهليزي النخاعي.

- medial prosencephalic f. (= f. prosen-

cephalicus medialis) حُرْمَةُ الدِّمَاغِ المَقْدَمِ

الإنسية. جملة الياف عصبية تكون السبيل الرئيسي للارتباط الطولاني في الوطاء الذي يسير خلال المنطقة الوطائية الوحشية ويربط سقيفة الدماغ المتوسط مع أقسام الجهاز الحوفي.

- medial telencephalic f. (= f. prosenceph-

alicus medialis) حُرْمَةُ الدِّمَاغِ المَقْدَمِ

الإنْسِيَّةُ.

- f. medialis plexus brachialis الحُرْمَةُ

الإنْسِيَّةُ لِلضَفِيرَةِ العَضْدِيَّةِ. الحبل الإنسي للضفيرة العضدية الذي يتكون من القسم الأمامي من الجذع

السفلي للعصبيين الشوكيين الرقبى الثامن والصدرى الاول والذي تبدأ منه الاعصاب الصدرى الإنسى والعصبي الجلدي الإنسى والامام الصدرى الجلدي الإنسى والجذرين الإنسيين للعصبيين الرنذى والناصف.

- Meyhert's f. (= tractushabenula-

Interpeduncularis) السَّبِيلُ العَنَانِي بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.

- Monakow's f. (= tractus rubrospinalis)

السَّبِيلُ الحُمْرَاوِي الخُخَاعِي.

- f. occipitofrontalis inferior الحُرْمَةُ القَذَالِيَّةُ الجَنْبِيَّةُ السُّفْلَى.

مجموعة من الالياف الترابطية في القسم السفلي من المحفظة المحيطية قرب الحزمة المعقفة تربط التلافيف السفلية المختلفة للفصين الصدغي والجبهي.

- f. occipitofrontalis superior (= f. subcallosus) الحُرْمَةُ القَذَالِيَّةُ الجَنْبِيَّةُ العُلْوَى.

- olivocochlear f. (= tractus olivocochlearis) السَّبِيلُ الرِّيْتُونِي القَوَقَعِي.

- oval f. الحُرْمَةُ الَيْضَوِيَّةُ. منطقة الياف نازلة في الحبل الخلفي للنخاع بالقرب من الحاجز الخلفي.

- f. parieto-occipitopontinus الحُرْمَةُ

الجَذَارِيَّةُ القَذَالِيَّةُ الجِسْرِيَّةُ. حزمة الياف عصبية تبدأ في الفصين الجداري والقذالي وتمر خلال القسم خلف العدسي للذراع الخلفي للمحفظة الداخلية وتنتهي في نوى الجسر.

- f. posterior plexus brachialis الحُرْمَةُ

الخَلْفِيَّةُ لِلضَفِيرَةِ العَضْدِيَّةِ. الحبل الخلفي للضفيرة العضدية الذي يتكون من اتحاد الاقسام الخلفية للجذوع العلوية والمتوسطة والسفلية من الاعصاب الشوكية الرقبية 5-8 واحياناً الصدرى الاول وتنبع منه الاعصاب تحت الكتفية والصدرية الظهرية والكعبري والإبطي.

- fasciculi proprii dorsalis medullae

spinalis الحُرْمُ المَخْصُوصَةُ الظَهْرِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.

حزم من الالياف العصبية في القسم العميق من الحبل الظهري للنخاع مكونة من الياف بين الشدفية تصدر من خلايا الحبل السنجابي الظهري والتي تنقسم إلى الياف ترابطية صاعدة ونازلة قبل أن تعود ثانية إلى المادة السنجابية حيث تنفرع فيه.

- fasciculi proprii lateralis الحُرْمُ المَخْصُوصَةُ الوُحْشِيَّةُ. الحزم الليفية في المادة البيضاء للحبل الوحشي للنخاع مكونة من الياف بين الشدفية التي جاء بعضها من الجهة المعاكسة وهي الياف شبكية نخاعية واليااف مستقلة.

- fasciculi proprii medullae spinalis (f.

anterior proprius) الحُرْمُ المَخْصُوصَةُ للنَّخَاعِ.

- fasciculi proprii ventralis medullae

spinalis الحُرْمُ المَخْصُوصَةُ البطنية للنخاع.

حزم المادة البيضاء الموجودة في الحبل البطنى للنخاع والمكونة من الياف بين الشدفية يأتي بعضها من الجهة المعاكسة من النخاع وتحتوي اليافاً شبكية نخاعية والياافاً مستقلة نازلة.

- f. prosencephalicus medialis حُرْمَةُ

الدَّمَاعِ المُقَدَّمِ الإنْسِيَّةِ. جملة الياف تكون السبيل الرئيسي للارتباط الطولاني للوطاء تسير في المنطقة الوطائية الوحشية وترتبط سقيفة الدماغ المتوسط مع اقسام الجهاز الحوفي.

- f. pyramidalis medullae oblongatae

الحُرْمَةُ الهَرَمِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ. الالياف القشرية النووية والقشرية النخاعية اللتان تعتبران سوية نظيرتين للسبيل الهرمي.

- f. retroflexus (= tractus habenula-

interpeduncularis) السَّبِيلُ العَنَانِي بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.

- f. rotundus (= tractus solitarius medul-

lae oblongatae) السَّبِيلُ المُفَرَّدُ لِلْبَصَلَةِ.

- semilunar f. (= f. semilunaris, f. Inter-

fascicularis) الحُرْمَةُ بَيْنَ الحُرْمِ.

- septomarginal f. الحُرْمَةُ الحَاجِزِيَّةُ الهَامِشِيَّةُ.

حزمة الياف عصبية تقع على المحيط الظهري للحبل الظهري للنخاع في المنطقة الصدرية الذي يجاور الحاجز الناصف الظهري في المنطقة القطنية.

- solitary f. (= tractus solitarius medu-

lae oblongatae) السَّبِيلُ المُفَرَّدُ لِلْبَصَلَةِ.

- f. subcallosus الحُرْمَةُ تَحْتَ التَّقْنِيَّةِ. مجموعة

من الالياف الترابطية الموجودة داخل التقاطع بين المحفظة الداخلية والجسم التفتني والتي تربط قشرة

- الفصين القذالي والصدغي مع قشرة الجزيرة والفص الجبهي وتكون جزء مهماً من البساط.
- **f. subthalamicus** **الْحُرْمَةُ تَحْتَ الْمِهَادِيَّةِ.** حزمة الألياف عصبية تمر خلال المحفظة الداخلية وترتبط نوى تحت المهاد مع الكرة الشاحبة وقشرة النواة العدسية.
- **f. sulcomarginalis** **الْحُرْمَةُ التَّلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ.** طبقة من فروع نازلة من سقف الدماغ المتوسط تقع في الحبل البطني للنخاع على طول حافة الشق الناصف البطني.
- **f. telencephalicus medialis (= f. prosencephalicus medialis)** **حُرْمَةُ الدِّمَاغِ الْمَقْدَمِ الْإِنْسِيَّةِ.**
- **f. teres (= f. longitudinalis medialis pontis)** **الْحُرْمَةُ الطَّوَلَانِيَّةُ الْجَسْرِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ.**
- **thalamomamillary f. (= f. mamillothalamicus)** **الْحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ.**
- **f. thalamicus** **الْحُرْمَةُ الْمِهَادِيَّةُ.** حزمة من الألياف العصبية تصعد لتمر إلى الجهة الظهرية خلال ساحة فوريل والمنطقة المبهمة وتعتبر لتصل إلى بعض نوى المهاد البطينية وهي تحوي استمرارية العروة العدسية والحزمة العدسية والألياف المسننية المهادية والحرارية المهادية والمهادية المخططة.
- **f. of Turck (= tractus pyramidalis anterior)** **السَّبِيلُ الْهَرْمِيُّ الْأَمَامِيُّ.**
- **unciform f. (= f. uncinatus)** **الْحُرْمَةُ الشَّصِيَّةُ.** مجموعة من الألياف الترابطية التي تربط قشرة السطح الحجاجي للفص الجبهي مع التلفيف حول الحصيني ومع اللوزة.
- **f. of Vicq d'Azyr (= f. mamillothalamicus)** **الْحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ.**
- fastigium** 1. **الْبُرْخَاءُ 2. نِزْوَةُ الْبُطَيْنِ.** 1. شدة الحمى 2. أعلى نقطة في البطن الرابع للدماغ بين الملتقى بين الشراع البصلي العلوي والمُقْبِدَةِ.
- fatigue** **تَعَبٌ؛ كَلَالٌ.** حالة زيادة عدم الراحة وقلة الكفاءة الفكرية والجسمية بسبب الإرهاق الشديد والطويل الذي يقلل القدرة على الاستجابة للمنبهات.

- combat f.** **تَعَبُ الْمَعْرَكَةِ.** اصطلاح يطلق على حالات الإصابات النفسانية في المعارك والتي تنتج عن التعرض الطويل والشديد للكراب ويسمى أيضاً الاضطراب الكربي بعد الرضحي.
- **pseudocombat f.** **تَعَبُ الْمَعْرَكَةِ الْكَاذِبِ.** حالات الكرب النفساني الذي يتولد في المعارك ولكنه يعود لاضطرابات نفسية سابقة لدى المصاب.
- **stimulation f.** **تَعَبُ التَّنْبِيهِ.** ارتفاع عتبة الليف العصبي بسبب تنبيهه المتواصل والمستمر.
- fear** **خَوْفٌ.** حالة عاطفية مزعجة تتكون من استجابات نفسية ونفسية فيزيولوجية للتهديد بالخطر المحدق.
- feeble-mindedness** **تَخَلُّفٌ عَقْلِيٌّ.** تخلف عقلي كان يقسم إلى ثلاث درجات: معتوه ذو سن عقلي أقل من سنتين، وأبله بين السنتين والسبع سنوات، والمأفون بين السبع سنوات والإثنتي عشرة سنة.
- feedback** **إِرْتِجَاعٌ؛ تَغْذِيَّةٌ رَاجِعَةٌ.** عودة جزء من نتاج النظام إليه ليعمل كمدخل له ويقوم عند ذلك بالتحكم في عمل النظام.
- **negative f.** **إِرْتِجَاعٌ سَلْبِيٌّ.** عملية المحافظة على ثبات نتاج النظام بواسطة تحكم تنبيطي يولده نتاج النظام على دخله.
- **positive f.** **إِرْتِجَاعٌ إِيْجَابِيٌّ.** حالة يعمل فيها نتاج النظام على زيادة فاعليته باستمرار.
- feed-forward** **تَغْذِيَّةٌ مُسَابِرَةٌ.** التنبيه الذي يقوم به عامل متوسط في أحد الأنظمة على العوامل المتوسطة التي تسبقه في مراحل سلسلة النظام.
- feet, end** **أَقْدَامٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ.** أنظر end-feet.
- fenestra** **نَافِذَةٌ.** اسم تشريحي لفتحة أو لمنطقة منفحة.
- **f. cochlea (= f. rotunda)** **النَّافِذَةُ الْقَوَاعِيَّةُ.** فتحة دائرية في الجدار الداخلي للأذن المتوسطة والتي يغطيها غشاء رقيق هو الغشاء الطبلي الثاني.
- **f. vestibuli (= f. ovalis)** **النَّافِذَةُ الدَّهْلِيْزِيَّةُ.** فتحة بيضوية في الأذن الداخلية تغطيها قاعدة العظم الركابي.

festination هَرَوَلَة؛ مَشْيَة تَسَارُعِيَّة. المشية القصيرة الخطى المتسارعة واللاإرادية خلال السير تحدث في الشلل الرعاشي (داء باركنسون) وفي بعض الأمراض العصبية.

fever حُمى. (ج: حُمَيَات). 1. ارتفاع درجة الحرارة أعلى من المستوى السوي 2. أي مرض يتصف بارتفاع درجة الحرارة.

brain f. حُمى دِمَاعِيَّة. التهاب الدماغ أو سحايه أو كليهما معاً.

central f. حُمى مَرَكَزِيَّة. حمى تتولد عن إصابة مراكز تنظيم حرارة الجسم في الوطاء.

cerebrospinal f. حُمى دِمَاعِيَّة شَخَاعِيَّة. التهاب السحايا الدماغية النخاعية الوبائي.

fiber (= fibre) لَيْف. بنية طويلة خيطية الشكل.

A f's. أَلْيَاف A. ألياف عصبية نخاعية في الجهاز العصبي الجسدي ذات أقطار تتراوح بين 1 و 22 ميكروناً وسرعة توصيل تتراوح بين 5 و 120 متراً في الثانية وتشمل الألياف ألفا وبيتا وجاما.

accelerating f's. (= accelerator f's.) الأَلْيَاف المُسَرَّعَة. الألياف أدرينالينية الفعل تنقل دفعات عصبية تسرع القلب.

adrenergic f's. أَلْيَاف أَدْرِينَالِينِيَّة الفَعْل. ألياف عصبية تحرر مواد أدرينالينية (أو إبينفرينية) عند نهاياتها وأثناء توصيلها للدفعات العصبية.

afferent f's. (= afferent nerve f's.) أَلْيَاف عَصْبِيَّة وَّارِدَة. الألياف عصبية تنقل الدفعات من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي وهي إما أن تكون أليفاً واردة جسدية أو أليفاً واردة حشوية.

alpha f's. أَلْيَاف ألفا. ألياف حركية واستقبالية حسية حركية من النوع داء لها سرعة توصيل تتراوح بين 70 و 120 متراً في الثانية وأقطارها تتراوح بين 13 و 22 ميكروناً.

anastomosing f's. (= anastomotic f's.) أَلْيَاف تَفَاعُرِيَّة. الألياف تمتد من إحدى الحزم العصبية أو الجذوع العصبية إلى الحزم أو الجذوع الأخرى.

arcuate f's., anterior external الأَلْيَاف المُقَوَّسَة الأَمَامِيَّة الظاهرة. الألياف تبدأ من النواة

المقوسة وتبرز من الشق البطنى الناصف وتسير إلى الجهة الوحشية وإلى الخلف والأعلى فوق النخاع المستطيل (البصلة) حتى تصل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية).

arcuate f's., dorsal external الأَلْيَاف المُقَوَّسَة الظَهْرِيَّة الظاهرة. الألياف تبدأ من النواة الإسفينية الإضافية وتدخل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية) في نفس الجهة.

arcuate f's., internal الأَلْيَاف المُقَوَّسَة الغائرة. الألياف تبدأ من النواتين الإسفينيتين والناحلة وتسير إلى الجهة البطنية الإنسية حول المادة السنجابية المركزية للبصلة (النخاع المستطيل) لتكون تصالب الافتلة الإنسية.

arcuate f's. of cerebrum الأَلْيَاف المُقَوَّسَة لِلْمُخ. الألياف ترابطية قصيرة في داخل قشرة المخ تربط التلافيف المتجاورة.

arcuate f's., posterior external الأَلْيَاف المُقَوَّسَة الخَلْفِيَّة الظاهرة. الألياف تبدأ من النواة الإسفينية الإضافية وتدخل المخيخ خلال السويقة المخيخية السفلية (الذنبية) على نفس الجهة.

arcuate f's., ventral external الأَلْيَاف المُقَوَّسَة البَطْنِيَّة الظاهرة. الألياف تبدأ من النوى المقوسة وتظهر من الشق الناصف البطنى وتسير إلى الجهة الوحشية والخلفية والعلوية فوق النخاع المستطيل (البصلة) لتصل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية).

association f's. (= association nerve f's.) أَلْيَاف عَصْبِيَّة تَرَابُطِيَّة. الألياف عصبية تربط أجزاء من القشرة المخية في نفس نصف كرة المخ الواحدة ومنها الألياف الترابطية القصيرة التي تربط أجزاء في تلافيف متجاورة وهناك الألياف الترابطية الطويلة التي تربط أجزاء متباعدة من القشرة وتنظم في حزم طويلة.


augmentor f's. (= accelerating f's.) أَلْيَاف مُسَرَّعَة.

axial f. لَيْف مَحَوْرِي. محاور الخلية العصبية.

B f's. أَلْيَاف B. محاور نخاعية مستقلة قبل العقدية يبلغ قطرها حوالي 3 ميكرونات وتوصل بسرعة 3 و 15 متراً في الثانية الواحدة.

- **الْأَيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الْجَسْرِيَّةُ. corticopontine f's.** الألياف عصبية تبدأ من قشرة فصوص المخ الجبهية والجدارية والصدغية والقذالية وتنزل إلى المحفظة الداخلية والسويقة المخية وتنتهي في النوى الجسرية عند مختلف مستوياتها حيث تترحل بصورة رئيسية إلى نصف الكرة المخيخية المعاكسة.
- **الْأَيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الشَّبَكِيَّةُ. corticoreticular f's.** الألياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من الباحات الحسية الحركية لقشرة المخ وتنزل مع الألياف القشرية النخاعية وتتشابك مع خلايا التكوين الشبكي خاصة في الجسر والبصلة (النخاع المستطيل).
- **الْأَيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الحَمْرَائِيَّةُ. corticorubral f's.** الألياف عصبية تنزل من قشرة الفص الجبهي خلال الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية وتنتهي في النواة الحمراء.
- **الْأَيَافُ الْقَشْرِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ. corticospinal f's.** الألياف طولانية تبدأ من قشرة المخ وتنزل في المحفظة الداخلية والدماغ المتوسط والجسر وأهرام البصلة وتكون عند وصولها إلى النخاع الشوكي السبيلين القشريين النخاعيين الوحشي والبطني.
- **الْأَيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الجَسْرِيَّةُ. corticothalamic f's.** الألياف عصبية تنتشر من قشرة المخ خلال الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في المهاد.
- **الْأَيَافُ تَغْصُنِيَّةُ. dendritic f's.** تسير بشكل أغصان الشجرة من قشرة المخ إلى المادة البيضاء.
- **الْأَيَافُ الْمُسَنَّنَةُ الحَمْرَائِيَّةُ. dentatorubral f's.** الألياف عصبية واردة تصل إلى النواة الحمراء من النواة المسننة في الجهة المعاكسة.
- **الْأَيَافُ الْمُسَنَّنَةُ. dentatohalamic f's.** المهادية. الألياف عصبية في السويقة المخيخية العلوية تكون السبيل المسنني المهادي.
- **الْأَيَافُ خَافِضَةٌ. depressor f's.** 1. الألياف عصبية تثبط انعكاسياً عند تنبيهها التوتر الوعائي الحركي وبذلك تخفض ضغط الدم 2. الألياف عصبية تبطئ سرعة القلب.
- **الْأَيَافُ صَادِرَةٌ. efferent f's.** الألياف عصبية توصل بعيداً عن مركز الجهاز العصبي المركزي إلى أطراف الجسم وهي الألياف صادرة جسمية أو حشوية.
- **الْأَيَافُ بَرْغَمَان. Bergmann's f's.** تنتشر من الطبقة الجزيئية للمخيخ وتدخل الأم الحنون.
- **الْأَيَافُ بَرْنْهَيْمَر. Bernheimer's f's.** الألياف عصبية تربط السبيل البصري بجسم «لاي».
- **الْأَيَافُ بَيْتَا. beta f's.** الألياف حس للمس والحرارة من نوع الألياف «أ» توصل بسرعة 30-70 متراً في الثانية وتتراوح أقطارها بين 8 و 13 ميكرون.
- **الْأَيَافُ C. C f's.** الألياف عصبية مستقلة بعد العقدة عديمة الميلين توجد في الجذور الخلفية للأعصاب الشوكية وفي النهايات العصبية الحرة وتنقل بسرعة 0.6-2.3 متر في الثانية وتتراوح أقطارها بين 0.3-1.3 ميكرون.
- **الْأَيَافُ مُحَفَظِيَّةُ. capsular f's.** التي توجد في المحفظة الداخلية للدماغ.
- **الْأَيَافُ الْمُخَيَّةُ الْمُخَاعِيَّةُ. cerebrospinal f's.** الألياف العصبية الموجودة في المحفظة الداخلية للدماغ والتي تبدأ من المنطقة الحركية لقشرة المخ لتتنزل إلى أهرام البصلة ومن ثم إلى النخاع.
- **الْأَيَافُ كُولِينِيَّةُ الْفَعْل. cholinergic f's.** عصبية تحرر الأسيتيل كولين عند نهاياتها الحرة أو من نهاياتها عند المشابك.
- **الْأَيَافُ مُتَسَلِّقَةٌ. climbing f's.** الألياف واردة تبدأ من السويقة المخيخية الوسطى تمر خلال الطبقة الحبيبية لقشرة المخيخ لتنتهي حول تغصنات خلايا بركنجي.
- **الْأَيَافُ مُتَسَلِّقَةٌ. (= climbing f's.) clinging f's.** الألياف صَوَارِيَّةُ. commissural f's. عصبية تربط مناطق قشرية على جهتي المخ وتعبر من أحد نصفيه للنصف الآخر وكذلك الألياف العصبية التي تعبر بين جهتي جذع الدماغ أو النخاع الشوكي.
- **الْأَيَافُ عَصْبِيَّةُ صَوَارِيَّةُ. (= commissural commissural nerve f's.)** الألياف عَصْبِيَّةُ صَوَارِيَّةُ. corticobulbar f's. (= corticonuclear f's.) الألياف قَشْرِيَّةُ نَوَوِيَّةُ.
- **الْأَيَافُ قَشْرِيَّةُ نَوَوِيَّةُ. corticonuclear f's.** الألياف طولانية في السبيل الهرمي تبدأ من قشرة المخ الحركية وتنزل إلى المحفظة الداخلية وتتشابك في مختلف النوى الحركية للدماغ المتوسط والجسر والبصلة وتكون مجموعها السبيل القشري النووي.

- والقشرية الشبكية والقشرية الجسرية والجسرية المخيخية والالياف المستعرضة للجسر.
- **endogenous f's.** الياف دَاخلِيَّة المَنشَأ. الياف عصبية في النخاع الشوكي توجد أجسام خلاياها داخله.
- **exogenous f's.** الياف خَارِجِيَّة المَنشَأ. الياف عصبية في النخاع الشوكي تبدأ من خلايا عصبية موجودة في خارجه.
- **extrafusal f's.** الياف خَارِج المِفْزَل. الالياف العضلية الاعتيادية التي توجد في العضلات ولكن خارج مغازلها.
- **frontopontine f's.** الالياف الجَبْهِيَّة الجَسْرِيَّة. الياف عصبية تبدأ في الفص الجبهي وتعتبر المحطة الداخلية وتنتهي في نوى الجسر.
- **gamma f's.** الياف غَامَا. نوع من الياف (A) العصبية توصل دفعات جسدي للمس والضغط كما أنها تقذي الالياف العضلية داخل المغازل العضلية وتوصل بسرعة 15-40 متراً في الثانية وتتراوح أقطارها بين 3-7 ميكرونات.
- **Goll's f's.** الياف غُول. الياف عصبية تمتد من نواة «غول» (النواة الناحلة) إلى دودة المخيخ.
- **gray f's.** الياف سَنجَابِيَّة. الياف عصبية غير نخاعية توجد بصورة خاصة في الاعصاب الودية.
- **heterodesmotic f's.** الياف تَرَابُط البنى المتغايرة. الياف عصبية بيضاء تربط مناطق عصبية سنجابية متباينة.
- **homodesmotic f's.** الياف تَرَابُط البنى المتماثلة. الياف عصبية بيضاء تربط مناطق عصبية سنجابية متماثلة.
- **Internuncial f's.** الياف بَيْنِيَّة؛ الياف بين العصبونات. الياف عصبية توصل بين الخلايا العصبية.
- **Intrafusal f's.** الياف دَاخِل المِفْزَل. الياف عضلية محورة ومحاطة بوسائل ومغلقة بغلاف نسيجي ضام على شكل مفزل.
- **longitudinal f's. of pons** الياف الجَسْرِي الطُولَائِيَّة. مجموعة من الالياف العصبية الطولانية تبدأ من سويقة المخ وتسير إلى القسم البطني من الجسر حيث تتوزع إلى حزم صغيرة تفصلها نوى الجسر الصغيرة واليافه المستعرضة وتشمل هذه المجموعة الالياف القشرية النخاعية والقشرية النووية والقشرية الشبكية والقشرية الجسرية والجسرية المخيخية والالياف المستعرضة للجسر.
- **Mauthner's f.** ليف مُوثْنَر. محوار يمتد من الدماغ التالي إلى النهاية الذنبية للنخاع في الاسماك ويكون السبيل الانتهاضي المشترك للدفعات التي تنزل إلى الذنب.
- **medullated f's. (= myelinated f's)** الياف مِيَالِيْنِيَّة.
- **moss f's. (= mossy f's.)** الياف أَشْبِيَّة. الياف عصبية سمكية تبدأ من السويقة المخيخية السفلية وتمر إلى قشرة المخ لتنتهي فيه بتفرعات عديدة ذات زوائد اشنية الشكل حول خلايا الطبقة الحبيبية.
- **motor f.** ليف حَرَكِي. أحد الالياف في العصب الذي ينقل دفعات عصبية حركية إلى إحدى العضلات.
- **myelinated f's. (= myelinated nerve f's.)** الياف عَصْبِيَّة مِيَالِيْنِيَّة. الياف عصبية بيضاء سنجابية تغطي محاورها أعماد نخاعية تغطي هذه بدورها بأعماد ليفية عصبية.
- **nerve f.** ليف عَصْبِي. ناتئ دقيق من الخلية العصبية خصوصاً محوارها الطويل الذي ينقل الدفعات العصبية بعيداً عن جسم الخلية وتصنف الالياف العصبية مبدئياً على أساس احتوائها على الطبقة المياليينية أو عدمها.
- **neuroglial f's.** الياف دَبَقِيَّة عَصْبِيَّة. بنية خيطية مفروسة في هيولى وامتدادات الخلايا العصبية الدبقية.
- **nonmedullated f's. (= unmyelinated f's.)** الياف عَدِيمَة المِيَالِين.
- **paraventricular f's.** الياف حَوْل البُطَيْن. الالياف الصادرة الموجودة في السبيل الوطائي النخامي والتي تبدأ في النواة حول البطن والتي تكون السبيل حول البطن النخامي.
- **parietotemporo-pontine f's.** الياف الجَذَارِيَّة. الياف عصبية تبدأ من قشرة الفصين الجداري والصدغي وتنزل في قسم تحت عدسي الشكل في الذراع الخلفي من المحطة الداخلية لتكون جزءاً من القسم البطني من قاعدة السويقتين المخيتين ومن ثم تمر لتنتهي في نوى الجسر.



fibre, nerve


مقطع طولي في ليف عصبي نخاعي محيطي بين مختلف النخاع:
1. الغمد النخاعي 2. ليفات المحوار 3. متقدرات المحوار 4. نواة خلية غمد الليف العصبي 5. غمد الليف العصبي 6. عقدة رانغيه 7. فليح شميت - لانترمان.

- **periventricular f's.** الألياف حول البطينية. الألياف تبدأ من الرطاء ثم تنزل في المادة السنجابية المركزية خلال سقيفة الدماغ المتوسط والتكوين الشبكي للجسر والبلصلة
- **pilomotor f's.** الألياف مُحركة للشعر. ألياف عصبية غير ميالينية تغذي العضلات الصغيرة لجريبات الشعر.
- **pontocerebellar f's.** الألياف الجسرية. الألياف طولانية في القسم البطني من الجسر وتنتهي في دودة المخ.
- **postcommissural f's.** الألياف الصوار الخلفي. الألياف الصوار الخلفي الموجودة خلف الجسم الصنوبري.
- **postganglionic f's.** الألياف قَبْلَ العقدة. محاور العصبونات قبل العقدة.
- **pressor f's.** الألياف رَافعة للضغط. ألياف مُحركة. 1. الألياف عصبية يؤدي تنبيهها إلى رفع ضغط الدم 2. الألياف محفزة للقلب.
- **projection f's.** الألياف إسقاطية. ألياف عصبية تربط قشرة المخ بالمراكز تحت القشرية وجذع الدماغ والنخاع.
- **radicular f's.** الألياف جذرية. ألياف عصبية توجد في جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.
- **Rasmussen nerve f's.** الألياف راسموسين. الألياف صادرة من القسمين الدهليزي

- والقوقعي للعصب القحفي الثامن تنبع في الجهتين من جوار الزيتونة العلوية.
- **Reissner's f.** ليف راسنر. ليف طولاني في القناة المركزية للنخاع.
- **short association f's.** الألياف ترابطية قصيرة. ألياف عصبية قصيرة تربط مناطق متجاورة في قشرة المخ.
- **somatic f's. (=somatic nerve f's.)** الألياف عصبية جسمية. الألياف عصبية واردة أو صادرة تنشط العضلات الهيكلية والأنسجة الجسدية وتنقل الإحساسات منها.
- **f's. of stria terminalis** الألياف السطري المنتهائي. الألياف العصبية الميالينية التي تكون السطر المنتهائي.
- **sudomotor f's.** الألياف المعركة. الألياف اللاميالينية التي تغذي الغدد العرقية والتي يؤدي تنبيهها إلى إفراز العرق.
- **supraoptic f's.** الألياف فوق البصرية. الألياف صادرة تمر في السبيل الوطائي النخامي وتبدأ من النواة فوق البصرية وتكون السبيل فوق البصري النخامي.
- **T f.** ليف عصبي يتفرع بزوايا قائمة من محوار الخلية العصبية.
- **tangential f's.** الألياف تماسية. ألياف عصبية مرتبة بشكل خطوط تماسية في الطبقات السطحية للحصين والقشرة المخية.

- **temporopontine f's.** الألياف الصدغية
الجسرية. الألياف عصبية تبدأ من الفص الصدغي
وترى في الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في
نوى الجسر.
- **tendrils (= climbing f's.)** الألياف مُتسلِّقة.
- **thalamocortical f's.** الألياف مهادية قشرية.
الألياف عصبية حسية تربط المهاد الظهري بالقشرة
المخية وتكون سويقات المهاد.
- **thalamoparietal f's.** الألياف الجدارية المهادية.
الألياف عصبية تهبط من الفص الجداري وترى خلال
الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في المهاد.
- **transverse f's. of pons** ألياف الجسر
المستعرضة. الألياف في القسم البطني من الجسر
تنتهي في دودة المخ.
- **ultraterminal f.** ليف فوق الإنتهائي. فرع صغير
عديم الميالين يتشعب من فروع المحوار الإنتهائي في
الصفحة الحركية.
- **unmyelinated f's. (= unmyelinated
nerve f's.)** ألياف عصبية عديمة الميالين. الألياف
عصبية أو محاور لا يغطيها غمد مياليني ولكنها
مغطاة عادة بغمد الليف العصبي.
- **varicose f's.** ألياف ذوالية. بعض الألياف
الميالينية التي لا تملك غمداً ليفياً عصبياً ويتجمع بعد
موتها سائل بين غمدها النخاعيني والمحوار فيعطيه
شكل الدوالي.
- **vasomotor f's.** ألياف مُحركة وعائية. الألياف
عصبية لا ميالينية تغذي عضلات الشريانات.
- **visceral f's. (= visceromotor nerve f's.)**
ألياف عصبية حشوية. ألياف عصبية صادرة أو
واردة تنبه أو تنشط العضلات الملساء في الأحشاء أو
خلايا الغدد وتنقل الإحساسات منها.
- fibra (= fibre)** ليف.
- fibrae (= fibres)** ألياف. جمع ليف.
- fibril** ليف (ج: ليفات). ليف دقيق أو خيط.
- **fibroglia f. (= fibroglia)** ليف ليفي.
- **muscle f. (= myofibril)** ليف عضلي.
- **nerve f. (= axon)** محوار.
- **side f. of Golgi** ليف غولجي الجانبي.

- فرع صغير يتفرع بزاوية قائمة من المحوار العصبي
قرب اتصاله مع خلية عقدية.
- fibrillation** رجفان. تقلص عضلي
موضعي صغير ولا إرادي تحت الجلد وغير منظور
يتولد عن التنشيط التلقائي للألياف العضلية.
- fibroblastoma** ورم أرومي ليفي؛ ورم الأرومة
الليفية؛ أروم ليفي. ورم يتكون من الأرومات
الليفية.
- **perineural f.** ورم الأرومة الليفية حول العصب.
ورم ليفي يتكون من النسيج الضام حول العصب مثل
العصب السمعي.
- fibrogloma** ورم ليفي ليفي. ورم دبق
يحوي كمية كبيرة من النسيج الليف.
- fibroneuroma (= neurofibroma)** ورم
ليف عديمي.
- field** ساحة. (ج: ساحات)؛ حقل. (ج: حقول)؛
ميدان. (ج: ميادين). باحة أو فضاء مفتوح
كالساحة البصرية.
- **Flechsig's f. (= myelinogenetic f.)** ساحة
مكونة للميالين. ساحة تكوين الميالين في المحوار
العصبي للجنين.
- **f's. of Forel (= Forel's f's.)** ساحات فوريل.
ثلاث باحات في القسم البطني من المهاد غنية بالألياف
العصبية المرتبطة بمجموعات من الخلايا وتسمى
ساحات هـ 1، هـ 2. فالساحة هـ تقع على الجهة
الإنسية للنواة تحت المهادية وبالجهة الراسية من
نواة الحمراء وتتميز فيها الألياف المبتعدة عن الكرة
الشاحبة والمسنية المهادية والحمراوية المهادية. أما
الساحة هـ 1 فهي التي تحتلها الحزمة المهادية، كما
تقع الساحة هـ 2 على طريق الحزمة العنسية.
- **myelinogenetic f.** ساحة مكونة للميالين.
مجموعة من الألياف في المحوار العصبي تتكون فيها
الأغمد النخاعية في أحد أطوار تنامي الجنين.
- **visual f.** الساحة البصرية. الساحة التي
تولد المنبهات البصرية عندما تكون العين في وضع
النظر الأمامي.
- fila** خيوط. جمع خيط.
- filament** خيط. (ج: خيوط). ليف دقيق.



fibroblastoma

بعض أنواع أورام القناة الشوكية والفقار التي تضغط على النخاع: (1) ساركومة عظمية للفقرة *osteosarcoma*, (2) ورم الأرومة الليفية خارج الجافية *fibroblastoma*, (3) ورم وعائي دموي خارج الجافية *hemangioma*, (4) وحمه «أرجوانية» مرافقة للورم الوعائي الدموي وتحدث في القطاع العصبي المناسب مع موقع الورم.

- meningeal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**
الْإِنْتِهَائِي. خيط سحائي.
- root f's. of spinal nerves (= fila
radicularia nervorum spinalium) **الخُيُوطُ**
الْجَذَرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ.
- spinal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**
الْإِنْتِهَائِي.
- terminal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**
الْإِنْتِهَائِي.
- filamentum (= filament) **خَيْطٌ**.
- filum (= filament) **خَيْطٌ**.
- fila anastomotica nervi acustici **الخُيُوطُ**
التَّفَاعُغِيَّةُ لِلْعَصَبِ السَّمْعِيِّ. خيوط تفاغرية بين
العصبيين القوقعي الدهليزي والوجهي في الصماخ
السمعي الباطن.
- f. durae matris spinale (= f. terminale
externum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الظَّاهِر.
- f. meningeal (= f. meningeum; f.
terminale) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ.
- f. olfactoria (= olfactory nerve) **العَصَبُ**
السَّمْعِيُّ.
- fila radicularia nervorum spinalium **الخُيُوطُ**
الْجَذَرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ. خيوط
الجذور الظهرية والبطنية التي تتصل بواسطتها
الأعصاب النخاعية بالنخاع الشوكي.
- f. spinale (= f. terminale) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ.
- f. terminale **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ. خيط رقيق من
نسيج ضام ينزل من مخروط النخاع إلى قاعدة
العصعص.
- f. terminale durum (= f. terminale
externum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الظَّاهِر.
- f. terminale externum **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ
الظَّاهِر. الاستطالة السفلية للام الجافية النخاعية التي
تمتد من الحافة السفلية للفقرة العجزية الثانية إلى
الشفة العصبية الأولى.
- f. terminale Internum **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ
الغائر. استطالة الام الحنون النخاعية المحاطة
- باستطالات سحايا الجافية والعنكبوتية من المخروط
النخاعي إلى الحافة السفلية من الفقرة العجزية الثانية.
- f. terminale pialis (= f. terminale
internum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الْغَائِر.
- fimbria **خَمَلٌ**. حافة مشرشرة.
- f. hippocampi **خَمَلُ** الْخُصِينِ. شريط من
المادة البيضاء على طول الحافة الإنسية للسطح
البطني للخصين.
- fingeragnosia **عَمَّةٌ** إصْبَعِيَّةٌ. عدم المقدرة
على معرفة الأصابع أو الإشارة إليها عند السؤال
عنها أو تسميتها أو التعرف على أحد أصابع يديه
أو أصابع أيادي الآخرين.
- finger, dead **إِصْبَعٌ** مَيِّتٌ. إصبع متنمل
وزرأقي كما يشاهد في زراق النهايات.
- finger, drop (= mallet finger) **إِصْبَعٌ**
مُطْرَقِيَّةٌ. إصبع ساقطة.
- finger, mallet **إِصْبَعٌ** مُطْرَقِيَّةٌ. انثناء دائم
للسلامي الطرفي لليد.
- fingerprint **بَصْمَةٌ**. (ج: بَصَمَات). انطباع
الحروف الجلدية للأقسام الطرفية للأصابع.
- fissura (= fissure) **شَقٌّ**. (ج: شُقُوق). فلق
أو أخدود أو طية عميقة خصوصاً في القشرة
المخية حيث تمتد عميقاً فيها لتشمل كل سمكها.
- fissure (= fissura) **شَقٌّ**.
- adoccipital f. **الشَّقُّ** جَوَارِ الْقَذَالِيِّ. شَقٌّ غير
ثابت الوجود يعبر القسم الذنبي من الطلل ويتصل
بالشق القذالي.
- amygdaline f. **الشَّقُّ** اللُّوزِيِّ. أخدود يوجد
أحياناً بالقرب من طرف الفص الصدغي.
- angular f. (= sphenopetrosal f.) **الشَّقُّ**
الرَّأَوِيِّ.
- basilar f. (= sphenop-occipital f.) **الشَّقُّ**
القَاعِيَّةِي.
- basilyian f. **الشَّقُّ** القَاعِيَّةِي السِيلْفِيَّانِيَّةِي.
قسم الشق الجانبي بين الفص الصدغي والسطح
الحجاسي للفص الجبهي.
- f. of Bichat (= transverse f. of cerebrum)
الشَّقُّ الْمُخِّي الْمُسْتَقَرِّض.

- Broca's f. شَقُّ بَرْوَكَا. اصطلاح يطلق على الفرعين الأمامي والمساعد للشق الوحشي للتلفيف الجبهي السفلي الأيسر.
- Burdach's f. شَقُّ بُورْدَاخ. الأخدود بين السطحين الوحشي للجزيرة والداخلي للوصاد.
- calcarine f. (= sulcus calcarine) الشَقُّ المِهمَازِي؛ الشَقُّ المِهمَازِي.
- callosal f. (= sulcus corpus callosum) شَقُّ الجِسْمِ الثَّقَنِي.
- callosomarginal f. (= sulcus cinguli) الشَقُّ الجِزَامِي.
- central f. (central cerebral sulcus) الشَقُّ المَرْكَزِي المَخِي.
- cerebral f's. (= cerebral sulci) الشقوق المَخِيَّة.
- cerebral f., lateral (= lateral cerebral sulcus) الشَقُّ المَخِي الوحشي.
- collateral f. (= collateral sulcus) الشَقُّ الجَانِبِي.
- dentate f. (= s. hippocampi) الشَقُّ الحُصِينِي.
- dorsolateral f. of cerebellum الشَقُّ الظَهْرِي الوحشي المَخِيخي. الشق الذي يفصل العقيدة عن لهة الدودة ويفصل الندفة عن لوزة نصف كرة المخيخ.
- Ecker's f. (= sulcus occipitatus transversus) الشَقُّ القَذَالِي المُسْتَعْرِض.
- great f. of cerebrum (= transverse f. of cerebrum) الشَقُّ المَخِي المُسْتَعْرِض.
- great horizontal f. (= horizontal f. of cerebellum) الشَقُّ المَخِيخي الأفقي.
- hippocampal f. (= sulcus hippocampi) الشَقُّ الحُصِينِي.
- horizontal f. of cerebellum الشَقُّ المَخِيخي الأفقي. الشق الذي يفصل الفصيصين الهلاليين القحفي عن الذنبي.
- inferofrontal f. (= inferior frontal sulcus) الشَقُّ الجَبْهِي السُّفْلِي.
- interparietal f. (= sulcus intra-parietalis) الشَقُّ دَاخِل الجِدَارِي.
- lateral f. of cerebrum (= sulcus lateralis cerebri) الشَقُّ المَخِي الوحشي.
- longitudinal f. (= longitudinal cerebral f.) الشَقُّ الطُولَانِي المَخِي.
- longitudinal cerebral f. الشَقُّ الطُولَانِي المَخِي. الشق العميق بين نصفي كرة المخ والذي يمتد عميقاً حتى الجسم الثفني.
- longitudinal f. of cerebellum (= vallecula cerebelli) أَخْدُودُ المَخِيخ.
- median f. of medulla oblongata, anterior الشَقُّ النَّاصِفِ الأَمَامِي للبلصلة. الشق الطولاني في المستوى الناصف للناحية البطنية من البلصلة والمتواصل مع الشق البطني الطولاني للنخاع الشوكي وهو يفصل الهرمين ويفلق جزئياً عند موضع اتصاليهما.
- median f. of medulla oblongata, dorsal (= sulcus medianus dorsalis medullae oblongatae) الشَقُّ النَّاصِفِ الظَهْرِي للبلصلة.
- median f. of medulla oblongata, ventral (= anterior median f. of medulla oblongata) الشَقُّ النَّاصِفِ البَطْنِي للبلصلة.
- median f. of spinal cord, anterior (ventral) الشَقُّ النَّاصِفِ البَطْنِي لِلنَّخَاع. الشق الطولاني العميق في المستوى الناصف وفي الناحية البطنية للنخاع والذي يحوي الشريان النخاعي الأمامي.
- median f. of spinal cord, dorsal (posterior) (= sulcus medianus dorsalis medullae spinalis) الشَقُّ النَّاصِفِ الظَهْرِي لِلنَّخَاع.
- f. of Monro (= sulcus hypothalamicus) الشَقُّ الوِطَائِي.
- occipital f. (= sulcus parieto-occipitalis) الشَقُّ الجِدَارِي القَذَالِي.
- occipitospheoidal f. الشَقُّ القَذَالِي الوُتْدِي. الشق بين القسم القاعدي من العظم القذالي وجسم العظم الوتدي.

- parieto-occipital f. (= sulcus parieto-occipitalis) الشق الجداري القذالي.
- postcentral f. (= sulcus postcentralis) الشق خلف المركزي.
- posterolateral f. of cerebellum الشق الظهري الجانبي للمخيخ. الشق الذي يفصل العقيدة عن لهما الدودة ويفصل الذفة عن نصف كرة المخيخ.
- postpyramidal f. (=secondary f. of cerebellum)m الشق الثانوي للمخيخ. شق يقع بين لهما المخيخ والهرم.
- precentral f. (= sulcus precentralis) الشق أمام المركزي.
- precuneal f. (= precuneal sulcus) الشق الطللي.
- prepyramidal f. الشق أمام الهرمي. الشق بين هرم الدودة ولهاتها.
- presylvian f. الشق أمام السيلفياني. الفرع الامامي للشق المخي الوحشي.
- primary f. (=primary f. of cerebellum) الشق الأولي للمخيخ. الشق الذي يفصل بين الفصين القحفي والذنب في المخيخ ويقع بين قنة الدودة وحديثها وبين الفصيصين الرباعي والبسيط في نصفي كرة المخيخ.
- f. of Rolando (= sulcus centralis cerebri) الشق المركزي المخي.
- secondary f. الشق الثانوي. الشق الذي يقع بين لهما المخيخ والهرم.
- subfrontal f. (= sulcus frontalis inferior) الشق الجبهي السفلي.
- subsylvian f. الشق تحت السيلفياني. الفرع الخلفي للشق الوحشي المخي.
- subtemporal f. الشق الصدغي السفلي. شق يشاهد أحياناً في القسم السفلي من الفص الصدغي.
- superfrontal f (= sulcus frontalis superior) الشق الجبهي العلوي.
- supertemporal f. (= sulcus temporalis superior) الشق الصدغي العلوي.
- sylvian f., f. of Sylvius (= sulcus lateralis cerebri) الشق الوحشي المخي.

- tentorial f. (sulcus collateralis) الشق الجانبي الشق الخيمي.
- transverse f. of cerebrum الشق المستعرض المخي. الشق بين السطح الظهري للدماغ البيني والسطح البطني لنصفي كرة المخ المولد من انطواء نصفي كرة المخ للخلف أثناء التطور الجنيني.
- fistula ناسور. (ج: نواسير). ممر أو اتصال شاذ عادة بين عضوين حشويين أو بين أحدهما وسطح الجسم.
- craniosinus f. ناسور قحفي جبلي. ناسور بين الحيز داخل القحف وأحد الجيوب الانفية مما يسمح بمرور السائل الدماغي النخاعي وتسربه إلى الأنف.
- fit نوبة. (ج: نوبات أو نوب). 1. عارضة تتصف بفعالية حركية أو نفسية شاذة ولا إرادية 2. نوبة صرع.
- cerebellar f. (= tonic f.) نوبة مخيخية.
- jacksonian f. نوبة جاكسونية. نوبة صرع بؤري.
- running f. نوبة سارية. 1. داء الرهبة 2. صرع ركضي.
- tonic f. (= tonic epileptic attack) نوبة صرع توترية.
- flaccid رخو. ضعيف ولين.
- flaccidity رخاوة. حالة الضعف واللين وخصوصاً في العضل.
- flatfoot قدام رخاء. حالة يستوي فيها قوس القدم.
- spastic قدام رخاء تشنجية. نوع مؤلم من القدم الرخاء بسبب تشنج العضلات الشظوية.
- flat simian hand يد رخاء قريضة. شلل يصيب اليد عند إصابة العصب الناصف ويسبب عدم انثناء أصابع الإبهام والسبابة والوسطى.
- flecion (= flexion) ثني؛ انثناء.
- flexibilitas (= flexibility) المرونة؛ الانثنائية. صفة الجسم القابل الانثناء.
- f. cerea (= waxy flexibility) المرونة الشمعية؛ الانثنائية الشمعية.

flexibility المرونة؛ الإنشائية؛ الطواعية. قابلية الجسم على الانثناء.

waxy f. المرؤنة الشمعية؛ الإنشائية الشمعية. تشاهد في الحالات الشديدة من الفصام الجامودي وهي حالة تتصف بإبقاء المريض على أي قسم من جسمه في الوضع الذي يوضع فيه.

flexible (= flexile) قابل. طليع. قابل للثني أو الانثناء من دون أن ينكسر.

flexion ثني. عملية الثني أو حالة الانثناء. سحبٌ إنشائي. انثناء الجسم عند الورك والركبة مع الانثناء الخلفي لأصابع القدم عند تنبيه سطح الجسم ويشاهد ذلك في أورام النخاع الشوكي الانضغاطية.

flexor مُثنية. أية عضلة تثني أحد المفاصل.

flexure ثنية. جزء منثنٍ من العضو أو البنية.

basicranial f. (= pontine f.) الثنية الجسرية.

cephalic f. الثنية الرأسية. الانحناء في الدماغ المتوسط للجنين.

cerebral f. إنثناء مخي. أحد انثناءات المخ في الجنين.

cervical f. الإنثناء الرقبى. انثناء في الأنبوب العصبي للجنين في موضع اتصال الدماغ بالشوكي.

cranial f. (= cephalic f.) الإنثناء الراسي.

mesencephalic f. إنثناء الدماغ المتوسط. انثناء في الأنبوب العصبي للجنين في منطقة الدماغ المتوسط.

nuchal f. (= cervical f.) الإنثناء الرقبى.

pontine f. الإنثناء الجسري. انثناء في الدماغ المؤخر للجنين.

flight of ideas تشارُد الأفكار. جريان

الكلام المهرول المستمر والقفز به من موضوع لآخر عادة ما يكون بينها بعض الترابط أو التلاعب بالأفكار والكلمات من دون أن يكون بينها في الحالات الوخيمة أية علاقة أو ترابط فيكون الكلام غير متناسق أو غير مفهوم ويحدث ذلك في حالات

نوبات الهوس الشديد. وقد يحدث أيضاً في الاضطرابات النفسية أو النفسانية العضوية.

flocculus نُذفة. أحد الفصيصين الصغيرين الوحشيين المزدوجين والمنفصلين جزئياً والمتواصلين مع عقيدة المخيخ. ويفصل كلا منهما عن نصف كرة المخيخ الشق الظهري الوحشي ويشكلان سوياً جزءاً من الفص الندفي العقيدي للمخيخ.

floppy مُقَرَّهَل. شخص رخو الجسم من كثرة ترسب الشحوم في أقسام جسمه فيتدلى الجلد ويترهل.

fluid, cerebrospinal (CSF) السائل الدماغي النخاعي. السائل الذي يملأ بطينات الدماغ الأربعة والحيز تحت العنكبوتية والقناة المركزية للنخاع.

flush بَيَغ. احمرار الوجه والرقبة الطارئ والعارض الذي تولده بعض الأمراض أو بعض الأدوية أو الحرارة أو بعض العوامل العاطفية أو الإجهاد الجسمي الشديد.

atropine f. بَيَغ أتروپيني. بيغ جلد الوجه والرقبة وجفافه الذي يتولد عن جرعة الأتروپين المفرطة.

focus بُؤرة. 1. المركز الرئيسي للفعالية المرضية. 2. نقطة تقارب الأشعة الضوئية.

epileptogenic f. بُؤرة مُولدة للصرع. منطقة صغيرة في قشرة المخ تبدأ منها نوبة الصرع ويشاهد ذلك في مخطط الدماغ.


fold طية؛ ثنية. حافة رقيقة معقوفة أو مثناة.

medullary f. (= neural f.) الطية العصبية.

neural f. الطية العصبية. إحدى الطيتين الواقعتين على حافتي الصفيحة العصبية واللتين تكونان الأنبوب العصبي في الجنين.

folium وَرَقَة. اصطلاح عام للبنية الورقية الشكل خصوصاً لورقات القشرة المخيخية.

folia cerebelli (= folia of cerebellum) وَرَقَاتُ الْمُخَيخ. الطيات العديدة الطويلة والضيقة للقشرة المخيخية المفصولة عن بعضها بالأتلام والتي تسندها صفيحات المادة البيضاء، وتتجمع هذه الأوراق بمجموعات لتوليد الأقسام الثانوية للمخيخ.



الحيز تحت العنكبوتي
الغشاء العنكبوتي
الأم الجافية
الجمجمة

الجيب السهمي العلوي
الحبيبات العنكبوتية

السائل الدماغي الشوكي
الضفيرة المشيمية للبطين الثالث
الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي

الضفيرة المشيمية للبطين الرابع
النخاع الشوكي

fluid, cerebrospinal

السائل الدماغي الشوكي ودورانه بين بطينات الدماغ والحيز تحت العنكبوتي.

- **f. vermis** وَرَقَّة الدَّوْدَة. جزء دودة المخيخ الذي يقع بين الحدة وحدة الدودة.
- fontanel (= fontanelle)** يَافُوخ.
- fontanelle** يَافُوخ. نقطة لينة كالأحيار المغطاة بالأغشية المتبقية في بعض مناطق القحف والمناطق غير المتعظمة عند الولادة.
- **anterior f.** اليَافُوخ الأمامي. باحة القحف غير المتعظمة والواقعة عند اتصال الدروز الجبهي والاكلياني والسهمي.
- **anterolateral f. (= sphenoidal f.)** اليَافُوخ الأمامي الوحشي. اليافوخ الودي.
- **bregmatic f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الهامي. اليافوخ الامامي.
- **casserian f. (= Casser's f. = mastoid f.)** اليَافُوخ الخشائي.
- **cranial f's. (= fonticuli cranii)** اليَافُوح القحفية.
- **frontal f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الجبهي. اليافوخ الامامي.
- **Gerdy's f. (= sagittal f.)** اليَافُوخ السهمي.
- **major f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الكبير. اليافوخ الامامي.
- **mastoid f.** اليَافُوخ الخشائي. منطقة القحف غير المتعظمة عند نقطة اتصال الدروز اللامي والجداري الخشائي والقذالي الخشائي.
- **f. minor (= posterior f.)** اليَافُوخ الصغير. اليافوخ الخلفي.
- **occipital f. (= posterior f.)** اليَافُوخ القذالي. اليافوخ الخلفي.
- **posterior f.** اليَافُوخ الخلفي. منطقة القحف غير المتعظمة عند نقطة التقاء الدرزين السهمي واللامي.
- **posterolateral f. (= mastoid f.)** اليَافُوخ الخلفي الجانبي؛ اليافوخ الخشائي.
- **quadrangular f. (= anterior f.)** اليَافُوخ المربع. اليافوخ الامامي.
- **sagittal f. (= Gerdy's f.)** اليَافُوخ السهمي.
- **sphenoidal f.** اليَافُوخ الودي. المنطقة القحفية غير المتعظمة عند اتصال العظمين الجبهي والجداري والعظم الصدغي.
- **triangular f. (= posterior f.)** اليَافُوخ المثلث. اليافوخ الخلفي.
- footdrop** قَدَمٌ مُتَدَلِّية، قَدَمٌ سَاقِطَة. سقوط القدم بسبب شلل عضلات الساق الامامية.
- foot, flat (= flatfoot)** قَدَمٌ رَحَاء.
- foot, tabetic** قَدَمٌ تَابِيسِيَّة. القدم الرحاء المشوهة التي تشاهد في التابيس.
- foramen** ثُقْبَة. (ج: ثُقُب). فتحة أو ممر طبيعي خصوصاً في العظام.
- **f. caecum medullae oblongatae** الثُقْبَة العَوْرَاءُ لِلْبَصْلَة. توسع مثلث صغير يوجد في الحافة السفلية للجسر يتكون من نهاية الشق الواسط الامامي للبصلة.
- **emissary f.** ثُقْبَة مِشْبَرِيَّة. اية ثقبه في القحف تمرر وريداً مشبرياً.
- **foramina ethmoidalia** الثُقُبُ الغِزْبَالِيَّة. ثقب في العظم الغربالي تمرر الفرع الانفي للعصب العيني والاوعية الغربالية.
- **Infraorbital f.** الثُقْبَة تَحْتَ الْحَاجِجِيَّة. فتحة القناة تحت الحاجبية التي تمرر العصب والاوعية تحت الحاجبية.
- **intervertebral f.** الثُقْبَة بَيْنَ الْفَقَرَتَيْن. ثقبه تتكون بين الفقرتين المتجاورتين تمرر العصب والاوعية النخاعية الشوكية.
- **Jugular f.** الثُقْبَة الْوُدَاجِيَّة. الثقبه الموجودة في قاعدة القحف بين العظمين القذالي والصدغي وتتمرر العديد من الاوعية والاعصاب.
- **f. lacerum posterior (= Jugular f.)** الثُقْبَة الْمُفَرَّقَة الْخَلْفِيَّة. الثقبه الوداجية.
- **f. of Luschka (= apertura lateralis ventriculi quarti)** ثُقْبَة لُوشْكَا. الفتحة الوحشية للبطين الرابع.
- **f. of Magendie (= apertura mediana ventriculi quarti)** ثُقْبَة مَاجَنْدِي. الفتحة الانسية للبطين الرابع.

- **f. magnum** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ** الفتحة الكبيرة في القسمين الامامي والسفلي للعظم القذالي والتي توصل القناة الفقرية بتجويف الفحف.
- **f. of Monro (= interventricular f.)** **ثُقْبَةُ مُونَرُو** الثقب بين البطينات، يمر يتصل خلاله البطين الجانبي بالبطين الثالث.
- **occipital f., great (= f. magnum)** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ**
- **occipital f., inferior (= f. magnum)** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ**
- **olfactory f.** **ثُقْبَةُ شَمِيَّةُ** اي من الثقب العديدة في الصفيحة المصفوية للعظم الغربالي التي تمرر أحد فروع العصب الشمي.
- **optic f. of sphenoid bone (= canalis opticus)** **القَنَاة البَصَرِيَّةُ**
- **f. ovalis basis cranii** **الثُقْبَةُ البَيضَوِيَّةُ** لِقَاعِدَةِ الفَحْف. الفتحة الموجودة في القسم الخلفي من الجزء الإنسي للجناح الكبير للعظم الوتدي والتي تمرر الفرع الفكي السفلي للعصب ثلاثي التوائم وبعض الاوعية الدموية.
- **f. rotundum ossis sphenoidalis** **الثُقْبَةُ الدَائِرِيَّةُ** للعظم الوتدي. ثقب دائرية في الجزء الإنسي من الجناح الكبير للعظم الوتدي والتي تمرر الفرع الفكي العلوي للعصب ثلاثي التوائم.
- **sphenopalatine f.** **الثُقْبَةُ الوتديَّة الحَنَكِيَّةُ** فتحة على الجدار الإنسي للحفرة الجناحية الحنكية والتي توصلها بالتجويف الأنفي والتي تمرر الشريان الوتدي الحنكي والعصب الأنفي.
- **f. spinosum** **الثُقْبَةُ الشوكِيَّةُ** ثقب في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمرر بها الشريان السحائي المتوسط.
- **stylomastoid f.** **الثُقْبَةُ الإِبْرِيَّةُ الخُشَائِيَّةُ** فتحة في القسم السفلي للعظم الصدغي بين النائتين الإبري والخشائي والتي تمرر العصب الوجهي والشريان الإبري الخشائي.
- **suborbital f. (= infraorbital f.)** **الثُقْبَةُ تَحْتَ الحَجَاجِيَّةُ**

- **supraorbital f.** **الثُقْبَةُ فَوْقَ الحَجَاجِيَّةُ** ثقب في العظم الجبهي على الحافة فوق الجفنية والتي تمرر العصب والشريان فوق الحجاجي.
- **vertebral f.** **الثُقْبَةُ الفِقْرِيَّةُ** الثقب الكبيرة التي تتكون بين جسم الفقرة وقوسها والتي تمرر النخاع الشوكي.
- foraminotomy** **بَضْعُ الثُقْبَةِ** عملية إزالة سقف الثقب بين الفقرتين لتخفيف الضغط عن جذور العصب النخاعي الشوكي.
- forceps** **مِلْقَطٌ** (ج: مَلَاظِق). 1. آلة جراحية لالتقاط ومسك الأنسجة أو الضغط عليها أو تثبيت الضماد المعقم 2. أي عضو ملقطي الشكل وبصورة خاصة يطلق على الالياف الانتهازية للجسم الثقبني.
- forebrain (= prosencephalon)** **الدُمَاغُ المَقْدَمُ**
- foreconscious** **مَقْدَمُ الوَعْيِ**، الفعالية العقلية التي تتضمن تذكر التجارب التي يمكن استحضارها لمستوى الوعي عند الحاجة إليها في الحالات الخاصة.
- forehead** **الجَبْهَةُ**، قسم الوجه فوق العينين.
- form** **شَكْلٌ**، خاصية البنية التي يعينها تكوينها وحجمها وصفاتها الظاهرة الأخرى.
- formatio (= formation)** **تَشَكُّيلٌ؛ تَشَكُّلٌ**.
- formation** **تَشَكُّيلٌ؛ تَشَكُّلٌ** 1. عملية تكوين شكل أو بنية ذات شكل محدد 2. بنية ذات شكل معين.
- **coffin f.** **التَشَكُّلُ القَابُوتِيّ**، محيط الخلية العصبية الميتة الذي يتكون من خلايا تابعة في البلعميات العصبونية.
- **compromise f.** **تَشَكُّيلٌ تَوْفِيقِيّ**، في التحليل النفسي هي الفكرة أو الفعل المقنع الذي يسمح بالتعبير الجزئي عن الفكرة المكبوتة.
- **gray reticular f.** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيّ السِّنْجَابِيّ**، المادة الشبكية السنجابية للنخاع المستطيل (البصلة).
- **reticular f. of medulla oblongata** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيّ لِلْبَصْلَةِ**، القسم القديم تطورياً من البصلة له بنية شبكية مكونة من تجمعات خلوية غير محدودة لكنها تنتشر في وسط الالياف العصبية الغزيرة وغير

المحددة وتملأ المساحات بين الألياف بصورة غير منتظمة.

reticular f. of mesencephalon **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.** قسم الدماغ المتوسط ذو البنية الشبكية الشبيهة بالتشكيل الشبكي في البصلة والذي يقع بين المادة السوداء والمادة السنجابية المركزية.

reticular f. of pons **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلْجِسْرِ.** قسم الجزء الظهري من الجسر أمام المادة السنجابية المركزية الذي له تشكيل شبيه بالتشكيل الشبكي للبصلة.

reticular f. of spinal cord **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلنُّخَاعِ.** جزيرات صغيرة من المادة السنجابية تقاطع مع الياف عصبية بيضاء ويكونان سوية جزءاً من المادة السنجابية للنخاع الشوكي. ويقع هذا التشكيل في المنطقة الصدرية من النخاع خلف القرن الوحشي مباشرة.

white reticular f. **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ الْأَبْيَضُ.** المادة الشبكية البيضاء في النخاع المستطيل (البصلة).

formication **تَتَعَلُّقٌ؛ تَمَلَّانٌ.** هلس لمسي يشعر فيه المريض بوجود حشرات صغيرة تترحف على جلده ويشاهد ذلك غالباً في التسمم بالكوكائين أو الأمفيتامين.

fornix **قَبْوٌ.** 1. اصطلاح يصف بنية قوسية الشكل أو الحيز الذي يولد بداخلها 2. قبو المخ.

f. cerebri **قَبْوُ الْمَخِّ.** السبيل الصادر للحصين والذي يسقط بصورة رئيسية على الأجسام الحلمية ونوى الغنان. وهناك إثنان منها يتكون كل منهما من سبيل مقوس يتحد تحت الجسم الثفني مع القبو الآخر وبهذا يكونان عمودين وجسم وساقين.

fossa **حُفْرَةٌ.** (ج: حُفَرٌ). انخفاض أو منطقة منخفضة ومجوفة.

cerebellar f. (= posterior cranial f.) **الحفرة المخيخية؛ حُفْرَةُ الْقَحْفِ الْخَلْفِيَّةِ.**

cerebral f. **الحُفْرَةُ الْمُخَيَّةُ.** انخساف في السطح الباطن للعظم القذالي إلى الخلف من الحفرة المخيخية يحوي الفصين القذاليين للمخ.

cranial f., anterior **الحُفْرَةُ الْقَحْفِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ.** القسم الأمامي من قاع تجويف القحف الذي يسند الفصين الجبهيين ويتكون من أجزاء من العظام الثلاثة الغربالي والجبهي والوتدي.

cranial f., middle **الحُفْرَةُ الْقَحْفِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ.** القسم الوسطي من قاع جوف القحف الذي يسند الفصين الصدغيين والغدة النخامية ويتكون من جسم العظم الوتدي وجناحيه الكبيرين والقسمين الصخري والصدفي من العظم الصدغي.

cranial f., posterior **الحُفْرَةُ الْقَحْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ.** القسم الخلفي من قاع جوف القحف الذي يحوي المخيخ والجسر والبصلة (النخاع المستطيل) ويتكون من أجزاء من العظام الوتدي والصدغي والجداري والقذالي.

hypophyseal f. **الحُفْرَةُ النُّخَامِيَّةُ.** حفرة عميقة في وسط السرج التركي للعظم الوتدي، وهي تحوي الغدة النخامية.

interpeduncular f. **الحُفْرَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.** حفرة بين السويقتين المخيتين يكون قاعها المادة المثقبة الخلفية.

f. lateralls cerebri **الحُفْرَةُ الْمُخَيَّةُ الْوُحْشِيَّةُ.** حفرة تظهر في الجنين على السطح الوحشي لنصف كرة المخ وتقع الجزيرة في قاعها ثم تغلق على الوصاد وتكون حوافها التلم الوحشي للمخ.

pituitary f. (= hypophyseal f.) **الحُفْرَةُ النُّخَامِيَّةُ.**

sellar f. (= hypophyseal f.) **الحُفْرَةُ النُّخَامِيَّةُ.**

fovea **نُقْرَةٌ.** (ج: نُقَرٌ). حفرة صغيرة في سطح العضو أو البنية.

f. centralis retinae **نُقْرَةُ الشَّبَكِيَّةِ الْمَرْكَزِيَّةِ.** نقرة صغيرة في مركز البقعة الصفراء التي تكون بدورها حفرة صغيرة في الشبكية والتي تحوي المخاريط وهي منطقة حس الإبصار المميز لأن طبقات الشبكية فيها مزاحة عن المخاريط فيقع ضوء الصورة عليها مباشرة فتولد أوضح صورة وأوضح إبصار.

fracture **كَسْرٌ قَاعٌ الْجُمُوعَةِ.** كسر عادة ما يكون خطياً في قاع الجمجمة يتصف بثُرْ انفخي دموي وتجمع دموي في الجوف الطبلي.

- depressed f. كَسْرٌ مُنْخَسِفٌ. كسر قحفي
تنخسف فيه شدة عظمية إلى داخل القحف.

- neurogenic f. كَسْرٌ عَصَبِيٌّ الْمَنْشَأُ. كسر يتولد
بسبب ضعف العظام الناتج عن مرض عصبي كالتابيس
الظهري.

frigidity برودة. برودة وخصوصاً البرودة
الجنسية وبالأخص عند النساء.

frigotherapy (= cryotherapy) مُعَالِجَةٌ
قَرْوِيَّةٌ. المعالجة بالبرودة.

frustration خَيْبَةٌ: إِحْبَاطٌ. منع أو إيقاف
تحقيق الرغبات أو الأغراض أو الأفعال أو الدوافع
النفسية مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر بسبب هذا
الفشل.

fugue سُرَادٌ. حالة مرضية تتصف بتغير الوعي
بشكل يعمل فيه المصاب وكأنه واع ولكن أعماله لا
توجهها شخصيته الحقيقية السوية وبعد انتهاء
النوبة لا يتذكر شيئاً عنها أبداً.

- epileptic f. سُرَادٌ صَرْعِيٌّ. حالة شرود تتصف
بالجري والتجول التي تحدث أحياناً أثناء نوبة الصرع
النفسي الحركي (الصرع الصدغي) أو بعدها.

- hysterical f. سُرَادٌ هِسْتِيرِيٌّ. عارضة نساوة
تتصف بفقدان حس الذات ومعرفة الهوية الشخصية
وتحدث نوبة الهستيريا هذه في محاولة للهروب من
حالة كرب أو تناقض نفسياني وعادة ما يتجول
المريض لمسافات طويلة من دون هدف ولن يتذكر عن
ذلك شيئاً بعد زوال النوبة.

fundus oculi قَاعُ الْعَيْنِ. القسم الخلفي من
داخل العين الذي يشاهد عند تنظير العين.

funduscopy (= ophthalmoscopy)
تَنْظِيرُ قَاعِ الْعَيْنِ.

funiculitis اَلْتِهَابُ الْحَبْلِ. التهاب قسم جذر
العصب النخاعي الذي يقع في القناة بين الفقرتين.

funiculus حَبْلٌ. (ج: حَبَالٌ). اسم عام لبنية أو
جزء حبل الشكل.

- f. anterior medullae spinalis الحَبْلُ الْأَمَامِي
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء للنخاع التي توجد في الجهتين
بين الشق الناصف البطني والجذور البطنية للنخاع.

- cuneate f. (= cuneate fasciculus of
spinal cord) الحُرْمَةُ الْإِسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاعِ.

- f. cuneatus lateralis الحَبْلُ الْإِسْفِينِي الْجَانِبِي.
حرف طولاني على البصلة بين جذور العصب الإضافي
النخاعي والحزمة الإسفينية.

- f. cuneatus medullae oblongata
(= fasciculus cuneatus medullae
oblongatae) الحُرْمَةُ الْإِسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ.

- f. dorsalis medullae spinalis الحَبْلُ الظَّهْرِيّ
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء في جهتي النخاع الشوكي التي
تقع بين الشق الناصف الخلفي والجذور الظهرية
للأعصاب النخاعية الشوكية.

- lateral f. of medullae oblongata الحَبْلُ
الْجَانِبِيّ لِلْبَصَلَةِ. استمرارية السبل العصبية للحبل
الجانبى للنخاع الشوكي إلى النخاع المستطيل ما عدا
السبل الهرمي.

- f. lateralis medullae spinalis الحَبْلُ الْجَانِبِي
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء للنخاع الشوكي الموجودة
بالجهتين بين الجذور الظهرية والبطنية للأعصاب
النخاعية الشوكية.

- funiculi medullae spinalis حَبَالُ النُّخَاعِ.
الحزم الكبيرة للسبل العصبية التي تكون المادة
البيضاء للنخاع الشوكي.

G

GABA (= gamma aminobutyric acid) غَابَا: حمض الغاما أمينو بيوتيريك.

gait مَشْيَة. طريقة أو أسلوب السير.

- **antalgic g.** مَشْيَة تَضَادُّ الأَلَم. مشية عرجاء
يمشيها المريض كي يتجنب الألم في البنيات حاملات
الوزن المصابة (كمفصل الورك)، وتتصف بخطوات
قصيرة مضطربة.

- **ataxic g.** مَشْيَة رَنْحِيَّة. مشية غير منسقة وغير
مستقرة وذات قاعدة واسعة تقذف فيها القدم للخارج
وتهبط على العقب أولاً ثم على الأباخس.

- **calcaneus g.** مَشْيَة عَقْبِيَّة. المشية التي تتبع
عند شلل العضلة النعلية وعضلة الساق مع ضعف قوة
الدفع في الساق وزيحان الظنوب فوق العقب عند
نهاية طور الخطو.

- **cerebellar g.** مَشْيَة مُخَيَّخِيَّة. مشية سدرية
تمايلية تدل على مرض مخيخي.

- **Charcot's g.** مَشْيَة شَارْكَوَت. مشية خاصة في
رنح فريديرايخ.

- **double step g.** مَشْيَة الخطوة المزدوجة؛ مَشْيَة
ثَنَائِيَّة الخطوات. مشية تختلف فيها أطوال الخطوات
المتعاقبة وتوقيتها بصورة ملحوظة.

- **drag-to g.** مَشْيَة سَحَبِ القَدَم. مشية تسحب
فيها القدم نحو العكازات بدلاً من رفعها عن الأرض.

- **drop foot g. (= steppage g.)** مَشْيَة القَدَم
السَّاقِطَة. مشية حردية.

- **drunken g.** مَشْيَة السِّكْر. المشية الرنحية التي
تشاهد عند التسمم بالكحول أو بالادوية الأخرى،
كالباربيتورات.

- **duck g. (= myopathic g.)** مَشْيَة الإِغْتَالَال
الْعَضَلِي؛ مَشْيَة البطة.

- **dystrophic g. (= myopathic g.)** مَشْيَة
حَثَلِيَّة. التناوب المبالغ لحركات الجذع الجانبية مع
الرفع المبالغ للحوض الذي يشبه مشية القطة أو
البطريق التي تظهر في الحثل العضلي المترقى.

- **equine g.** مَشْيَة حَيْلِيَّة. مشية تتم بصورة
رئيسية بثني مفصل الورك وتشاهد في شلل تعابر
الساقين.

- **festinating g.** مَشْيَة هَرَوَلَة؛ هَرَوَلَة. مشية
يخطو فيها المريض بصورة لا إرادية خطوات قصيرة
ومتسارعة وعادة على رؤوس الأصابع والتي تشاهد
في الشلل الرعاشي وبعض الأمراض العصبية الأخرى.

- **four-point g.** مَشْيَة النِّقَاطِ الأَرْبَع. مشية للامام
تتم بتقديم أحد العكازين أولاً تليه خطوة الساق
المعاكسة ثم تقديم العكاز الثاني تتلوه خطوة الساق
الثانية وهكذا.

- **gluteal g.** مَشْيَة الْوَيْثَة. مشية تنتج عن شلل
العضلة الألوية الوسطية تتصف بميلان الجذع نحو
الجهة المصابة عند كل خطوة.

- **heel-toe g.** مَشْيَة العَقْب - الأصابع. مشية تتم
بنزول العقب أولاً على الأرض ومن ثم تنزل الأباخس.

- **helicopod g.** مَشْيَة مَرَوِجِيَّة. مشية تدور فيها
القدم نصف دائرة كما يحدث في الحالات الهستيرية.

- **hemiplegic g.** مَشْيَة الْفَالِج. مشية تشمل انثناء
الورك بسبب تدلي القدم وحركة الساق الدورانية.

- **hypotonic g.** مَشْيَة نَاقِصَة التَوَتُّر. مشية
الاعتلال العضلي في المرضى ناقصي التوتر العضلات
الوركية الفخذية.

- **intermittent double-step g.** مَشْيَة الْخَطْوَة
الْمُرْدَوِجَة الْمُتَقَطِّعَة. مشية فالجية تحدث فيها

- فاصلة بعد الخطوة القصيرة للقدم السليمة وفي بعض الحالات بعد خطوة القدم المصابة.
- **myopathic g.** **مِشْيَةُ** الاعتلال العضلي. تناوب الحركات المبالغ للجزع مع الرفع المبالغ للحوض مما يولد مشية شبيهة بمشية البط أو البطريق ويحصل ذلك في الامراض العضلية.
- **Oppenheim's g.** **مِشْيَةُ** أوبنهايم. مشية تتصف بتذبذب الرأس والاطراف والجسم غير المنتظم والذي يشاهد في بعض حالات التصلب المتعدد.
- **pendular g. (= Oppenheim's g.)** **مِشْيَةُ** فواسية. مشية أوبنهايم.
- **scissor g.** **مِشْيَةُ** المقص. مشية تمر فيها إحدى القدمين أمام القدم الثانية في كل خطوة مولدة مشية تعابر الساقين.
- **spastic g.** **مِشْيَةُ** تشنجية. مشية تتصف بالتشنج وعدم تناسق الحركات يسحب فيها المريض قدميه بدلاً من رفعهما.
- **staggering g.** **مِشْيَةُ** دوامية. مشية تمايلية دورانية رنحية يظهر فيها المريض وكأنه يوشك على السقوط إلى الخلف أو يفقد توازنه وتشاهد في حالات التسمم بالكحول والباربيتورات.
- **stamping g. (= tabetic g.)** **مِشْيَةُ** الدفع؛ **مِشْيَةُ** تابسية.
- **steppage g.** **مِشْيَةُ** حربية. مشية تشاهد في حالة القدم المتدلية حيث ترفع القدم المتقدمة عالياً كي تبعد الأصابع عن الأرض، وتتولد عن شلل العضلات الظنبوبية والشنطوية وتشاهد في حالات إصابة العصبون الحركي السفلي كالتهاب الأعصاب وإصابات خلايا القرن الامامي.
- **swaying g. (= cerebellar g.)** **مِشْيَةُ** تارزجية.
- **swing through g.** **مِشْيَةُ** التارزج البيني. مشية تقدم فيها الكارتان إلى الامام ثم تخطو القدم من بينهما.
- **swing-to g.** **مِشْيَةُ** التارزج الإنتهائي. مشية تقدم فيها الكارتان ثم تخطو القدم لتنتهي عندهما.
- **tabetic g. (= ataxic g.)** **مِشْيَةُ** تابسية. مشية رنحية تحدث في التابس الظهري.
- **Trendelenburg g. (= gluteal g.)** **مِشْيَةُ** ألوية.
- **waddling g. (= dystrophic g.)** **مِشْيَةُ** متهادية؛ **مِشْيَةُ** حنطية.
- galeophilia (= ailurophilia)** **هُوسُ** الهررة.
- galeophobia (= ailurophobia)** **رُهابُ** الهررة.
- gamma-aminobutyric acid (GABA)** **خَمَضُ** الغاما أمينوبيوتيريك. حمض أميني يعمل كناقل مثبط رئيسي في الدماغ.
- ganglia** **عُقَدُ** جمع عقدة.
- gangliated (= ganglionated)** **مُعَقَّدُ**؛ **دُو** **عُقَدُ**.
- gangliocytoma (= ganglioneuroma)** **وَرَمٌ** عصبي عُقدي.
- ganglioform** **عُقْدِي** الشكل. ذو شكل يشبه العقدة.
- ganglioglioma** **وَرَمٌ** ببقِي عُقدي. ورم دبقي عقدي.
- ganglioglioneuroma** **وَرَمٌ** عصبي عُقدي.
- (= ganglioneuroma)** **شالٌ** عُقدي.
- gangliolytic (= ganglioplegic)** **شالٌ** عُقدي.
- ganglioma (= ganglioneuroma)** **وَرَمٌ** عُقدي؛ **وَرَمٌ** عصبي عُقدي.
- ganglion** **عُقْدَةُ**. (ج: عُقَد). 1. كتلة عقدية الشكل. 2. اصطلاح يدل على مجموعة من اجسام خلايا عصبية موجودة خارج الجهاز العصبي المركزي. ويستعمل الاصطلاح أحياناً للدلالة على مجموعة منها داخل الدماغ أو النخاع الشوكي كالعقد القاعدية. 3. ورم كيسي حميد يقع في الوتر أو السفاق في المرفق مثلاً أو في ظهر القدم ويتكون من غلاف ليفي رقيق يحوي سائلاً مخاطينياً.
- **accessory ganglia (= ganglia intermedia)** **عُقَدُ** إضافية. العقد المتوسطة.
- **acousticofacial g.** **العُقْدَةُ** السمعية الوجهية.

عقدة تظهر في المراحل الجنينية الاولى يبقى قسم منها مكوناً العقدة الركبية.

- Andresch's g. (= inferior glossopharyngeal g.) **العُقْدَةُ اللُّسَانِيَّةُ البَلْعُومِيَّةُ السفلية.**
- aorticorenal g. **العُقْدَةُ الأَبْهَرِيَّةُ الكُلَوِيَّةُ.** قسم منفصل تقريباً من العقد البطنية.
- auditory g. (= ventral & dorsal cochlear nuclei) **العُقْدَةُ السَّمْعِيَّةُ.** النوى القوقعية البطنية والظهرية.
- Auerbach's g. **عُقْدَةُ أَوْرِبَاح.** إحدى العقد العصبية الصغيرة في ضفيرة أورباخ.
- autonomic ganglia **العُقْدُ المُسْتَقَلَّةُ.** عقد الجهاز العصبي المستقل التي توجد على طول الجذع الودي وفي الضفائر المحيطية وفي جدران بعض الأعضاء المجهزة بأعصاب مستقلة، وهناك نوعان منها متشابهان بنويًا ومختلفان وظيفيًا وهما العقد الودية والعقد اللاودية.
- ganglia of autonomic plexuses **عُقْدُ الضَّفَائِرِ المُسْتَقَلَّةُ.** مجموعات من أجسام خلايا عصبية توجد في الضفائر المستقلة وتتكون بصورة رئيسية من خلايا ودية بعد العقدية.
- azygous g. **الكَبَّةُ العُضْغُصِيَّةُ.** انظر glomus coccygeum.
- basal ganglia **النُّوى القَاعِيَّةُ.** انظر basal nuclei.
- Bezold's g. **عُقْدَةُ بِيْرُولْد.** سلسلة من خلايا عقدية توجد في الحاجز بين الأذنين.
- Bidder's ganglia **عُقْدُ بِيْدِر.** عقد على الأعصاب القلبية تقع في النهاية السفلية للحاجز الأذيني.
- Blandin's g. (= submandibular g.) **عُقْدَةُ بَلَنْدِين.** تحت الفك السفلي.
- Bochdalek's g. (= superior dental plexus) **الضَفِيرَةُ السِّنِّيَّةُ العُلْوِيَّةُ.**
- Bock's g. (= carotid g.) **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ.**
- cardiac ganglia **العُقْدُ القَلْبِيَّةُ.** عقد الضفيرة القلبية التي توجد بالقرب من الرباط الشرياني.
- carotid g. **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ.** عقد الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في الجيب الكهفي.
- carotid g., inferior **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.**

عقدة الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في القسم السفلي من القنال السباتي.

- carotid g., superior **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.** عقد الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في القسم العلوي من النفق السباتي.
- caudal g. of glossopharyngeal nerve **العُقْدَةُ الذَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللُّسَانِي البَلْعُومي.** العقدة السفلية لعقدتي العصب اللساني البلعومي عند مروره بالثقب الوداجية وتحوي العقدتان خلايا عصبية واردة لهذا العصب.
- caudal g. of vagus **العُقْدَةُ الذَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهِم.** عقد العصب المبهم الواقعة أسفل الثقب الوداجية مباشرة أمام النتوء المستعرض للفقرتين الرقبيتين الأولى والثانية وتحوي أجسام خلايا عصبية واردة للمبهم.
- celiac ganglia **العُقْدُ البَطْنِيَّةُ.** عقدتان غير منتظميتين في شكلهما كل واحدة منهما على أحد ساقى الحجاب الحاجز وضمن الضفيرة البطنية وتحويان خلايا عصبية ودية والياًفاً عصبية ودية قبل العقدية من العصبين الحشويين الكبير والصغير. كما تمر خلال العقد ألياف نظيرة الودي والألياف عصبية حسية.
- cephalic g. **العُقْدَةُ الرُّأْسِيَّةُ.** مجموعة العقد اللاودية التي توجد في الرأس وتتألف من العقد الهدبية والأذنية والجناحية الحنكية وتحت الفك السفلية.
- cerebrospinal ganglia **العُقْدُ الدُّمَاعِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ.** العقد المرتبطة بالأعصاب القحفية والنخاعية.
- cervical g., inferior **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.** قسم من العقد الرقبية الصدرية.
- cervical g., middle **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ الوُسْطَى.** عقد متغيرة غالباً ما تكون مندمجة مع العقدة الفقرية على الجذع الودي في مستوى الغضروف الحلقي وتتوزع أليافها بعد العقدية بصورة رئيسية إلى القلب والمنطقة الرقبية والأطراف العلوية.
- cervical g., superior **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.** أعلى عقدة في الجذع الودي تقع خلف الشريان السباتي الباطن وأمام الفقرتين الرقبيتين الثانية والثالثة وتوزع أليافها بعد العقدية إلى القلب خلال

- الأعصاب الرقبية القلبية وإلى الضفيرة البلعومية ومنها إلى الحنجرة والبلعوم وإلى الرأس خلال الضفيرتين السباتيتين الظاهرة والباطنة.
- **cervical g. of uterus** عقدة عُقْ الرُحِم. عقدة عصبية تقع بالقرب من عنق الرحم.
- **cervicothoracic g.** العُقْدَةُ الرَقَبِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ. عقدة في الجذع الودي بمستوى الفقرتين، الرقبية السابعة والصدرية الأولى، وأمام العصبين، الرقبية الثامن والصدرية الأول، ولها قسمان العقدة الرقبية السفلية والصدرية الأولى الملتحمتان عادة بصورة جزئية أو كاملة. وتتوزع أليافها بعد العقدة إلى القلب والرأس والرقبة والأطراف العليا.
- **cervicouterine (= cervical g. of uterus)** عقدة عُقْ الرُحِم. العقدة الهُدْبِيَّة. عقدة لا ودية توجد في القسم الخلفي من الحجاج تستلم الألياف قبل عقدة من العصب محرك العين وتجهز أليافها البعد عقدية إلى العضلة الهدبية محركة العين وتجهز أليافها البصرية العقدية إلى العضلة الهدبية ومصرة الحدقة. كما تمر خلال العقدة بعض الألياف الحسية وبعد العقدة الودية.
- **Cloquet's g.** عُقْدَةُ كَلُوكْ. تضخم في العصب الأنفي الحنكي في القناة الحنكية الأمامية.
- **cochlear g.** العُقْدَةُ القَوِّعِيَّةُ. العقدة الحسية الموجودة في داخل القناة اللولبية لعماد القوقعة وتتكون من خلايا ثنائية الأقطاب التي ترسل الألياف إلى الجهة المحيطية للعضو اللولبي خلال الثقب العصبية وإلى الجهة المركزية إلى النوى القوقعية لجذع الدماغ خلال الصماخ السمعي الباطن.
- **g. cocliaca (= celiac g.)** العُقْدَةُ البَطْنِيَّةُ.
- **collateral ganglia (= prevertebral g.)** العُقْدُ الجَانِبِيَّةُ: العقد أمام الفقرات.
- **Corti's g. (= cochlear g.)** العُقْدَةُ القَوِّعِيَّةُ.
- **craniospinal ganglia** العُقْدُ القَحْفِيَّةُ النُخَاعِيَّةُ. مجموعات من العصبونات الحسية التي تولد تضخمات عقدية في الجذور الحسية للأعصاب النخاعية (العقد النخاعية الشوكية) والجذور الحسية للأعصاب القحفية (العقد الحسية للأعصاب القحفية).
- **dorsal root g. (= soinal g.)** عُقْدَةُ الجَذَرِ الظَهْرِيّ. عقدة نخاعية.
- **Ehrenritter's g. (= superior g. of glossopharyngeal nrv)** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيّ البُلْعُومِيّ العُلْوِيّ.
- **encephalospinal ganglia (= carnospinal ganglia)** العُقْدُ القَحْفِيَّةُ النُخَاعِيَّةُ.
- **false g.** عُقْدَةُ كَاذِبَةٍ. ضخامة على العصب ليست لها بنية عقدية.
- **Ganser's g. (= Interpeduncular g.)** العُقْدَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.
- **gasserian g. (= trigeminal g.)** عُقْدَةُ ثَلَاثِيّ التَّوَائِمِ. عقدة غاسير.
- **geniculate g.** العُقْدَةُ الرُّكْبِيَّةُ. العقدة الحسية للعصب الوجهي الواقعة على ركبية العصب الوجهي.
- **g. of glossopharyngeal nerve, inferior (= caudal g. of glossopharyngeal nerve).** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيّ البُلْعُومِيّ السُّفْلِيّ.
- **g. of glossopharyngeal nerve, superior (= rostral g. of glosso-pharyngeal nerve)** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيّ البُلْعُومِيّ العُلْوِيّ.
- **hepatic g.** العُقْدَةُ الكَبِدِيَّةُ. عقدة عصبية تقع بالقرب من الشريان الكبدي.
- **hypogastric g.** العُقْدَةُ الخَثَلِيَّةُ. إحدى العقدتين العصبيتين الواقعتين على جهتي عنق الرحم والمتصلتين بالضفيرتين العجزية والخثلية.
- **hypoglossal g.** عُقْدَةُ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. عقدة العصب تحت اللساني ونادراً ما تشاهد في الإنسان إلا في أجنته.
- **g. Impar** العُقْدَةُ المُفَرَّدَةُ. العقدة التي توجد عادة أمام العصعص حيث يتحد الجذعان الوديان فيها.
- **intermediate ganglia** العُقْدُ المُتَوَسِّطَةُ. مجموعات صغيرة من خلايا عصبية ودية توجد على الأعصاب النخاعية والأعصاب الموصلة خصوصاً في المناطق الرقبية والصدرية السفلية والقطنية العلوية.

- jugular g. of glossopharyngeal nerve
(= rostral g. of glossopharyngeal nerve)
عُقْدَةُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الرَّاسِيَةِ.
- jugular g. of vagus nerve (= rostral g. of vagus nerve)
عُقْدَةُ الْعَصَبِ الْمُهَيِّمِ الرَّاسِيَةِ.
- Laumonier's g. (= 1. carotid g., inferior carotid g.)
الْعُقْدَةُ السَّيَّاتِيَّةُ: الْعُقْدَةُ السَّيَّاتِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.
- lesser g. of Meckel (= g. submandibularis.)
عُقْدَةُ مِيكَل الصَّغِيرَى: الْعُقْدَةُ تَحْتَ الْفَكِّ.
- Lobstein's g. (= g. thoracicus splanchnicum)
عُقْدَةُ لُونِشْتَاين. عُقْدَةٌ عَلَى الْعَصَبِ الْحَشَوِيِّ الصَّدْرِيِّ الْكَبِيرِ فَوْقَ الْحِجَابِ الْحَاجِزِ وَمِنْ الْمَحْتَمَلِ أَنَّهَا الْعُقْدَةُ الْحَشَوِيَّةُ.
- Ludwig's g.
عُقْدَةُ لُودْفِيغ. عُقْدَةٌ مُرْتَبِطَةٌ مَعَ الضَّفِيرَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَتَقَعُ قَرَبَ الْأَذِينَ الْيَمَنِ لِلْقَلْبِ.
- lumbar ganglia
الْعُقْدُ الْقَطَنِيَّةُ. عُقْدُ الْقِسْمِ الْقَطَنِيِّ مِنَ الْجَذَعِ الْوَدِيِّ وَعَادَةً مَا تَكُونُ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ عُقَدٍ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ.
- Luschka's g. (= glomus coccygeum)
الْكَبَّةُ الْعُصْعُصِيَّةُ.
- lymphatic ganglia (= lymph nodes)
الْعُقْدُ اللَّفْظَاوِيَّةُ.
- Meckel's g. (= g. pterygopalatinum)
الْعُقْدَةُ الْجَنَاحِيَّةُ الْحَنَكِيَّةُ.
- Meissner's g.
عُقْدَةُ مَيْسْنَر. إِحْدَى مَجْمُوعَاتِ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي ضَفِيرَةِ مَيْسْنَرِ تَحْتَ الْمُخَاطِيَّةِ.
- mesenteric g., inferior
الْعُقْدَةُ الْمَسَارِيْقِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. عُقْدَةٌ وَدِيَّةٌ فِي الضَّفِيرَةِ الْمَسَارِيْقِيَّةِ السُّفْلِيَّةِ بِالْقَرَبِ مِنْ مَنَاطِقَةِ ابْتِدَاءِ الشَّرِيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ السُّفْلِيِّ.
- mesenteric g., superior
الْعُقْدَةُ الْمَسَارِيْقِيَّةُ الْعُلَوِيَّةُ. عُقْدَةٌ وَدِيَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى جَانِبِي الشَّرِيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ الْعُلَوِيِّ أَوْ تَحْتَهُ مَبَاشَرَةً وَعَادَةً مَا تَكُونُ مُنْدَمِجَةً مَعَ الْعُقْدَةِ الْبَطْنِيَّةِ.
- Muller's g. (= superior glossopharyngeal g.)
عُقْدَةُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الْعُلَوِيَّةِ.
- nodose g. (= caudal g. of vagus)
الْعُقْدَةُ الدَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُهَيِّمِ.
- olfactory g.
الْعُقْدَةُ الشَّمِيَّةُ. كِتْلَةٌ نَسِيجِيَّةٌ فِي الْجَنِينِ تَتَطَوَّرُ لِتَكُونَ الْعَصَبَ الشَّمِيَّ.
- otic g.
الْعُقْدَةُ الْأُذُنِيَّةُ. عُقْدَةٌ لَا وَدِيَّةٌ فِي الْخَفْرَةِ تَحْتَ الصَّدْغَةِ بِالْجِهَةِ الْإِنْسِيَّةِ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ وَتَحْتَ الثَّقْبَةِ الْبَيْضَوِيَّةِ مَبَاشَرَةً وَتَأْتِي الْيَافِهَا قَبْلَ الْعُقْدَةِ مِنَ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ خِلَالِ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الصَّغِيرِ وَتَغْذِي الْيَافِهَا بَعْدَ الْعُقْدَةِ الْغَدَّةِ النَّكَفِيَّةِ. وَتَمُرُّ خِلَالِ الْعُقْدَةِ أَلْيَافٌ حَسِيَّةٌ وَوَدِيَّةٌ.
- parasympathetic g.
عُقْدَةٌ لَا وَدِيَّةٌ. إِحْدَى مَجْمُوعَاتِ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ الْكَوْلِينِيَّةِ الْفَعْلِ فِي الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ الْإِلَادِيِّ وَالتِّي تَوْجَدُ بِالْقَرَبِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تُغْذِيهَا أَوْ مَفْرُوسَةٌ فِي جَدْرَانِهَا.
- pelvic ganglia
الْعُقْدُ الْحَوْضِيَّةُ. عُقْدُ وَدِيَّةٌ وَلَا وَدِيَّةٌ تَوْجَدُ ضَمْنَ الضَّفَائِرِ الْحَوْضِيَّةِ.
- petrosal g. (= caudal g. of glossopharyngeal nerve)
الْعُقْدَةُ الصَّخْرِيَّةُ: عُقْدَةٌ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الدَّنْبِيَّةِ.
- phrenic g.
الْعُقْدَةُ الْحَبَابِيَّةُ. عُقْدَةٌ وَدِيَّةٌ صَغِيرَةٌ تَوْجَدُ غَالِبًا ضَمْنَ الضَّفِيرَةِ الْحَبَابِيَّةِ عِنْدَ اتِّصَالِهَا مَعَ الضَّفِيرَةِ الْبَطْنِيَّةِ.
- prevertebral ganglia
الْعُقْدُ أَمَامَ الْفَقَّارِ. عُقْدُ وَدِيَّةٌ (وَهِيَ غَيْرُ الْعُقْدِ الْوَدِيِّ) تَوْجَدُ فِي الضَّفَائِرِ أَمَامَ الْفَقَّارِيَّةِ فِي الْمَنَاطِقَتَيْنِ الصَّدْرِيَّةِ وَالْبَطْنِيَّةِ.
- pterygopalatine g.
الْعُقْدَةُ الْجَنَاحِيَّةُ الْحَنَكِيَّةُ. عُقْدَةٌ لَا وَدِيَّةٌ تَوْجَدُ فِي الْخَفْرَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ وَتَأْتِي الْيَافِهَا قَبْلَ الْعُقْدَةِ مِنَ الْعَصَبِ الْوَجْهِِيِّ خِلَالِ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الْكَبِيرِ وَعَصَبِ الْقَنَاةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ وَتَغْذِي الْيَافِهَا بَعْدَ الْعُقْدَةِ الْغَدَّةِ الدَّمْعِيَّةِ وَالْأَنْفِيَّةِ وَالْحَنَكِيَّةِ. وَتَمُرُّ خِلَالَهَا بَعْضُ الْأَلْيَافِ الْحَسِيَّةِ وَالْوَدِيَّةِ.
- Remak's g. (= sinoatrial g.)
عُقْدَةُ رِيْمَاكْ: الْعُقْدَةُ الْجَبِيْبِيَّةُ الْأَذُنِيَّةُ. عُقْدَةٌ وَدِيَّةٌ فِي جِدَارِ الْقَلْبِ بِالْقَرَبِ مِنَ الْوَرِيدِ الْأَجُوفِ الْعُلَوِيِّ وَتَسْمَى أَيْضًا الْعُقْدَةُ الْجَبِيْبِيَّةُ الْأَذُنِيَّةُ. كَمَا تَوْجَدُ كَذَلِكَ عُقْدُ وَدِيَّةٌ فِي الْفَتْحَةِ الْحَبَابِيَّةِ لِلْوَرِيدِ الْأَجُوفِ السُّفْلِيِّ أَوْ فِي الضَّفِيرَةِ الْمَعْدِيَّةِ وَتَسْمَى بِهَذَا الْأَسْمَ أَيْضًا.

- renal g. العُقْدَةُ الكُلَوِيَّةُ. عقدة ودية صغيرة توجد ضمن الضفيرة الكلوية.
- rostral g. of glossopharyngeal nerve عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْعُومِيِّ المنقارية. أعلى العقدتين الموجودتين على العصب اللساني البلعومي عند مروره خلال الثقبه الوداجية واللثان تصدران له اليافهما.
- rostral g. of vagus nerve عُقْدَةُ العَصَبِ المَبْهِمِ المنقارية. عقدة صغيرة على العصب المبهم عند الثقبه الوداجية والتي تعطي فرعاً سحائياً وآخر اذنيّاً كما تحوي خلايا عصبية تصدر أليافها للعصب المبهم.
- sacral ganglia العُقْدَةُ العَجْزِيَّةُ. عقد القسم العجزي من الجذع الودي وعادة ما تكون ثلاث أو أربع عقد على كل من الجهتين.
- Scarpa's g. (= vestibular g.) العُقْدَةُ الدِهْلِيْزِيَّةُ.
- Schacher's g. (= ciliary g.) العُقْدَةُ الهُدْبِيَّةُ.
- Schmiedel's g. (1. carotid g., 2. inferior carotid g.) 1. العُقْدَةُ السَّبَاتِيَّةُ. 2. العقدة السباتية السفلية.
- semilunar g. (= trigeminal g.) العُقْدَةُ الهَلَالِيَّةُ. عقدة ثلاثي التوائم.
- sensory ganglia (= craniospinal ganglia, = spinal ganglia) العُقْدَةُ الحَسِّيَّةُ. 1. العقد القحفية النخاعية 2. العقد النخاعية الشوكية.
- sinoatrial g. (= Remak's g.) العُقْدَةُ الجَنْبِيَّةُ الأذينيَّةُ. عقدة ريماك.
- sinus g. العقدة الجَنْبِيَّةُ. مجموعة من الخلايا العصبية توجد حول منطقة اتصال الجيب الإكليلي والأذين القلبي الأيمن.
- sphenomaxillary g. (= pterygopalatine g.) العُقْدَةُ الوَتْدِيَّةُ الحَنْكِيَّةُ. العقدة الجناحية الحنكية.
- sphenopalatine g. (= pterygopatatine g.) العُقْدَةُ الوَتْدِيَّةُ الحَنْكِيَّةُ. العقدة الجناحية الحنكية.
- spinal ganglia العُقْدَةُ النُّخَاعِيَّةُ. العقد التي توجد على الجذور الخلفية للأعصاب النخاعية الشوكية والتي تتكون من خلايا عصبية أحادية الفرع.
- spiral g. (= cochlear g.) العُقْدَةُ الحَلْزُونِيَّةُ. العقدة القرقعية.
- splanchnic g. (= thoracic splanchnic g.) العُقْدَةُ الحَشَوِيَّةُ. العقدة الصدرية الحشوية.
- stellate g. (= cervicothoracic g.) العُقْدَةُ النُجْمِيَّةُ. العقدة الرقبية الصدرية.
- sublingual g. العُقْدَةُ تَحْتَ اللِّسَانِ. عقدة خلايا عصبية توجد أحياناً على الألياف العصبية المارة من العقدة تحت الفك السفلي إلى العصب اللساني.
- submandibular g. العُقْدَةُ تَحْتَ الفَكِّ. عقدة لا ودية توجد في أعلى القسم العميق من الغدة تحت الفك السفلية وعلى السطح الوحشي للعضلة تحت اللسانية. وتأتي أليافها قبل العقدية من العصب الوجهي خلال العصبين اللساني والحبلي الطبلي وتغذي أليافها بعد العقدية الغدتين تحت اللسانية وتحت الفك السفلية وتمر خلال العقد ألياف عصبية حسية ودية بعد العقدية.
- submaxillary g. (= submandibular g.) العُقْدَةُ تَحْتَ الفَكِّ.
- suprarenal g. العُقْدَةُ الكُظْرِيَّةُ. عقدة ودية صغيرة توجد ضمن الضفيرة الكظرية.
- sympathetic ganglia العُقْدُ الوُدِّيَّةُ. مجموعات من خلايا عصبية أدرينالينية الفعل في الجهاز العصبي الودي وهي مرتبة بشكل سلسلتين على جهتي النخاع الشوكي.
- sympathetic plexus ganglia (= ganglia of autonomic plexus) عُقْدُ الضَفِيرَةِ المُسْتَقِلَّةُ.
- ganglia of sympathetic trunk عُقْدُ الجَذْعِ الوُدِّي. مجموعات من أجسام خلايا عصبية توجد على طول الجذع الودي وتوجد منها حوالي 20-23 عقدة على كل جهة.
- terminal g. العُقْدَةُ الإِنْتِهَائِيَّةُ. مجموعة من الخلايا العصبية توجد على طول الأعصاب الانتهازية على الجهة الإنسية للصلة الشمية.
- thoracic ganglia العُقْدُ الصَّدْرِيَّةُ. العقد الموجودة في القسم الصدري من الجذع الودي وعادة هي 11-12 عقدة على كل جهة.

- thoracic g., splanchnic العُقْدَةُ الصَّدْرِيَّةُ
الْحَشَوِيَّةُ. عقدة صغيرة توجد على العصب الحشوي
الصدري الكبير بالقرب من الفقرة الصدرية الثانية
عشرة.
- trigeminal g. عُقْدَةُ ثَلَاثِي التَّوَانِمِ. عقدة على
الجذر الحسي للعصب القحفي الخامس توجد في فلق
في الأم الجافية (كهف ثلاثي التوائم) على السطح
الامامي للجزء الصخري من العظم الصدغي وتعطي
العصبين العيني والفكي العلوي وجزءاً من الفكي
السفلي وهي تحوي خلايا معظم الألياف الحسية
للعصب ثلاثي التوائم.
- tympanic g. of Valentin العُقْدَةُ الطَّبَنِيَّةُ
الْفَالْتِينِيَّةُ. عقدة على العصب السني العلوي.
- g. of vagal nerve, inferior (= caudal
g. of vagus) العُقْدَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهِمِ.
العقدة الذنبية للعصب المبهم.
- g. of vagal nerve, superior (= rostral
g. of vagus) العُقْدَةُ الْعُلَوِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهِمِ.
العقدة الرأسية للعصب المبهم.
- ventricular g. (= Bidder's g.) العُقْدَةُ
البُطْنِيَّةُ. عقدة بيدر.
- vertebral g. عُقْدَةُ قَعَارِيَّةُ. عقدة صغيرة توجد
دائماً تقريباً بين العقدتين الوديتين الوسطية والسفلية
والى الامام من الشريان الفقري وتشارك في عروة
تحت الترقوة وترسل أليافاً إلى العصب الفقري وإلى
الضفيرة العضدية.
- vestibular g. العُقْدَةُ الدِّهْلِيْزِيَّةُ. العقدة الحسية
الموجودة في القسم العلوي من النهاية الجانبية
للصماخ السمعي الباطن وتعطي خلاياها العصبية
ثنائية الأقطاب أليافاً للعصب الدهليزي.
- visceral ganglia (= autonomic
ganglia) العُقَدُ الْحَشَوِيَّةُ. العقد المستقلة.
- visceral plexus ganglia (= ganglia of
autonomic plexuses) عُقَدُ الضَّفَائِرِ الْحَشَوِيَّةُ. عقد
الضفائر المستقلة.
- ganglionated عُقْدِيّ: ذو عُقْدٍ. مجهز بعقد.
- ganglionectomy إِسْتِئْصَالُ العُقْدَةِ. قطع
إحدى العقد.

- ganglioneure عَصَبُونُ عُقْدِيّ. خلية عصبية
عقدية.
- ganglioneuroblastoma وَرَمُ الْأَزْوَمَةِ
العَصْبِيَّةِ العُقْدِيَّةِ. ورم مكون من خلايا عصبية
عقدية وأرومات عصبية.
- ganglioneurofibroma (= ganglioneu-
roma) وَرَمٌ لِيْفِيّ عَصْبِيّ عُقْدِيّ.
- ganglioneuroma وَرَمٌ عَصْبِيّ عُقْدِيّ. ورم
حميد يتكون من ألياف وخلايا عصبية ناضجة
ويعتبره الكثيرون ورماً أرومياً عصبياً مميزاً.
- ganglionic عُقْدِيّ. منسوب للعقدة.
- ganglionitis إِنْتِهَابُ العُقْدَةِ. التهاب إحدى العقد.
- acute posterior, g. (= herpeszoster)
إِنْتِهَابُ العُقْدِ الْخَلْفِيَّةِ الْحَادِ. الهريس النطاقي.
- gasserian g. (= herpeszoster
ophthalmicus) إِنْتِهَابُ العُقْدِ الْفَاسِيَرِيَّةِ.
الهريس النطاقي العيني.
- ganglionoplegic (ganglioplegic) شَالُ
عُقْدِيّ.
- ganglioplegic شَالُ عُقْدِيّ. عامل يحصر
انتقال الدفعات العصبية خلال العقد الودية
واللاودية.
- gangliosympathectomy إِسْتِئْصَالُ
العُقْدَةِ الْوُدِيَّةِ. استئصال إحدى العقد الودية.
- gangrene مَوَاتٌ؛ غَنَيرِيَّةٌ. موت الأنسجة
ويكون عادة بكتل كبيرة ويطرافق مع توقف التغذية
الدموية الذي تتلوه عدوى جرثومية ثم التفسخ.
- gargalanesthesia فُقْدَانُ جِسِّ الدَّغْدَغَةِ.
- gargalesthesia جِسُّ الدَّغْدَغَةِ.
- gargoylism (= syndrome, Husler's,
= mucopolysaccharidosis) حَثَلٌ مُتَعَدِّدٌ؛
غُرَقْلِيَّةٌ: داء عديد السكريد المُخَاطِيّ.
- gaze حَمَلَقَةٌ. تثبيت النظر باتجاه واحد.
- gegenhalten مَقَاوِمَةُ التَّخْرِيكِ. المقاومة
اللاإرادية للحركة المنفصلة كالتى تحصل في
اضطرابات القشرة المخية.

gelasmus ضَحْكٌ هِسْتِيرِيٌّ. الضحك الهستيري اللاإرادي.

generalization, stimulus تَغْمِيمُ الْمُنْبَه. الاستجابة الشرطية للمنبهات الشبيهة بالمنبه الشرطي.

geniculum رُكْبِيَّة. انثناء حاد في بنية أو عضو صغير كالعصب.

- g. of facial nerve رُكْبِيَّةُ الْعَصَبِ الْوَجْهِ. قسم العصب الوجهي في النهاية الجانبية للصماخ السمعي الباطن حيث تنتهي اليافه العصبية بصورة حادة باتجاه خلفي سفلي في موضع وجود العقدة الركبية.

genophobia رُهابُ الْجِنْس. التخوف المرضي من الجنس.

genu رُكْبَة. 1. محل ارتفاق الفخذ بالساق 2. اصطلاح تشريحي يدل على أية بنية مثنية مثل الركبة.

- g. of corpus callosum رُكْبَة الْجِسْمِ الْفَقْصِي. الانثناء البطني الحاد في النهاية الامامية لجذع الجسم الفقسي.

- g. extrorsum (= g. varum) رُكْبَة فَحْجَاء.

- g. of facial canal (= geniculum of facial canal رُكْبَة قَنَاةِ الْوَجْهِ. ركبة قناة الوجهي التي تحوي ركبة العصب الوجهي.

- g. of facial nerve رُكْبَة الْعَصَبِ الْوَجْهِ. ثنية الالياف التي تنبع من النواة الوجهية والتي تكون الاكيمة الوجهية في قاع البطين الرابع حيث تدور الالياف حول نواة المبعد.

- g. of internal capsule رُكْبَة الْمُحْفَظَة. الزاوية المكونة من اتصال ذراعي المحفظة الداخلية والواقعة خلف النواة المذنبة وامام المهاد وعلى الجهة الوحشية للنواة العدسية.

- g. introrsum (= g. valgum) رُكْبَة رَوْحَاء.

- g. recurvatum رُكْبَة طَرْقَاء. فرط تمديد مفصل الركبة.

- g. valgum رُكْبَة رَوْحَاء. تشوه يتصف بتقارب الركبتين الشاذ مع زيادة المسافة بين الكاحلين.

- g. varum رُكْبَة فَحْجَاء. تشوه يتصف بابتعاد

الركبتين الشاذ عن بعضهما وانحناء الاطراف السفلية الشاذ للدخل ويمكن ان يكون هذا الانحناء في الفخذين او الساقين.

geophagia أَكْلُ التُّرَاب. عادة اكل التراب او الطين.

geophagism, geophagy أَكْلُ التُّرَاب. (= geophagia)

geratic شَيْخُوخِي. متعلق بالشيخوخة.

geratology (geratolgy) عِلْمُ الشَّيْخُوخَة. العلم الذي يُعنى بالشيخوخة وجوانبها.

geriatric (متعلق) بِطِبِّ الشُّيُوخ.

geriatrics طِبُّ الشُّيُوخ. فرع الطب الذي يعنى بمعالجة الشيوخ وأمراضهم وبمشاكل الشيخوخة لديهم.

gerontology عِلْمُ الشَّيْخُوخَة. العلم الذي يدرس مشاكل الشيخوخة والهرم من كل نواحيها السريرية والبيولوجية والاجتماعية والتاريخية.

gerophilia حُبُّ الشُّيُوخ. الحب الخاص للشيوخ.

gerophobia رُهابُ الشيوخ؛ رُهابُ الشَّيْخُوخَة.

gestalt التَّكُونُ الإدْرَاقِي؛ التَّكُونُ الجِشْتَالْتِي. تشكيل إدراكي يضم المدارك وينسقها بطريقة تولد إدراكاً عاماً يزيد كثيراً عن مجموع مفردات هذه المدارك ويؤدي تجمعها هذا إلى تكاملها مما يولد إدراكاً كلياً عاماً متكاملًا (كُلَانِي).

gestaltism التَّكُونِيَّةُ الإدْرَاقِيَّة؛ الجِشْتَالْتِيَّة. النظرية التي تنص في علم النفس بأن أعمال العقل التي توجّه الفعاليات تظهر ككل متكامل لا يمكن فصله إلى أجزاء متفرقة، ويسمى هذا بنظرية التَّكُونِ الإدْرَاقِي.

gesture إِيْمَاءَة. حركة الجسم التعبيرية كطريقة لنقل المشاعر أو الأفكار ويتم أغلبها في الإنسان بواسطة اليدين والذراعين.

gibbous أَخْذَب. ذو حذبة.

gibbus حَذْبَة. انحناء الظهر بسبب انثناء العمود الفقري ويتسبب غالباً عن خراج في الفقرات أو في القرص بين الفقرات يؤدي إلى انهيار الفقرة للأمام مما يسبب انحناء الظهر.

دُوَام؛ دُوَحَة. giddiness (= dizziness)

عَمَلَقَة. فرط الضخامة الشاذ. gigantism

عَمَلَقَة ضَخْمَة النهايات. عملقة - acromegalic g. ضخامية تتصف أيضاً بضخامة العظام القصيرة والمسوحة وعظام النهايات القصوية كما هو في ضخامة النهايات.

عَمَلَقَة مُخَيَّة. عملقة لا تتولد عن - cerebral g. زيادة مستوى هرمون النمو بل يولدها مرض دماغي ويكون فيها الولدان ضخاماً في أحجامهم وينمون بسرعة كبيرة خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الأولى من أعمارهم ثم يعود نموهم ليصبح سوياً وتكون اليدين والقدمان كبيرتان أما الرأس فيكون كبيراً وطويلاً وتميل العينان ميلاناً مضاداً للمنغولية وتكونان متباعدين كما يكون الطفل أرقاً ومتخلفاً عقلياً.

عَمَلَقَة سَوِيَّة. عملقة تكون فيها نسب - normal g. أحجام الأعضاء والأجزاء سوية ومتناسقة مع سواء التطور الجنسي.

pituitary g. (= syndrome, Launois)

عَمَلَقَة نُخَامِيَّة. مجموعة خلايا متخصصة في gland توليد مادة إفرازية أو إيزرازية لا علاقة لها باحتياجاتها الاستقلابية الخاصة بها.

العُذَّة الصُّم. غدد عديمة القناة - endocrine g's. تفرز مواد معينة خاصة تسمى الهرمونات التي تحرر مباشرة إلى جهاز الدوران وتؤثر على استقلاب الجسم وبعض وظائفه الأخرى.

عُذَّة خَارِجِيَّة الإفراز. غدد ذات - exocrine g's. أقتنية وتحرر إفرازاتها خلال الاقتنية التي تفتح على سطح الجسم الخارجي أو الداخلي.

العُذَّة النُخَامِيَّة. غدة توجد في قاع - pituitary g. الدماغ في السرج التركي وتتصل بالوطاء بواسطة سويقة أو قمع الوطاء وتستلم منه أليافاً عصبية وأوعية دموية مهمة، وتتكون الغدة من قسمين رئيسيين، النخامية الغدية والنخامية العصبية. وتفرز هذه الغدة العديد من الهرمونات التي تؤثر على بعض وظائف الجسم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق تأثيرها على الغدد الصماء الأخرى فيه.

عُذَّة الكُظُر. - suprarenal g. (= adrenal g.)

غدة توجد في النسيج خلف الصفاق وفوق الكلية مباشرة وهي غدة مزدوجة توجد واحدة منها فوق كل كلية وتتكون من قسمين قشرة الكظر ولب الكظر وهما تحت سيطرة الغدة النخامية. ويفرز لب الكظر الأدرينالين والنورأدرينالين.

عُذَّة. (ج: عُذَد). glandula (= gland)

دَبْقُ عَصَبِي. glia (= neuroglia)

دَبْقُ عَصَبِي أَمِيْبَانِي. دبق عصبي - ameoboid g. متنكس أميبي الشكل غني بجبلية شاحبة اللون فيها بعض النواتئ والنوى غامقة اللون.

دَبْقُ عَصَبِي هَيُولِي. خلية دبق - cytoplasmic g. عصبي ضخمة وغنية بالهيولي، وفيها بعض الليفيات والفجوات وتشاهد في حالة تنكس النخاع الشوكي.

دَبْقُ عَصَبِي فَنَانِي. نوع من الدبق - g. of Fananas العصبي الذي يوجد في الطبقة الجزيئية من قشرة المخ.

دَبْقُ عَصَبِي لَيْفِي. دبق عصبي - fibrillary g. متنكس يحوي الكثير من الليفيات.

خَلِيَّة دَبْقِيَّة عَصَبِيَّة. خلية الدبق gliocyte العصبي.

أَرْوْمَة. glioblast (= spongioblast) أرومة الإسفنجية.

وَرَمٌ أَرْوَمِي دَبْقِي. مصطلح glioblastoma عام للأنواع الخبيثة من ورم النجميات.

وَرَمٌ أَرْوَمِي دَبْقِي مُتَعَدِّد. - g. multiforme لأشكال. أنواع خبيثة من ورم النجميات عادة ما تصيب نصفي كرة المخ وتتكون من خليط من خلايا الأرومة الإسفنجية والأرومة النجمية والأرومة الدبقية.


خَلِيَّة دَبْقِيَّة عَصَبِيَّة. gliocyte (= gliocyte)

وَرَمٌ دَبْقِي. gliocytoma (= glioma)

وَرَمٌ دَبْقِي. ورم مكون من نسيج glioma دبق عصب في الجهاز العصبي المركزي ويطلق أحياناً على كل أنواع الأورام الدبقية.


وَرَمٌ دَبْقِي. - astrocytic g. (= astrocytoma) نَجْمِي الخلايا.

وَرَمٌ دَبْقِي نَمَائِي بَاطِنِي. ورم - g. endophytum في الشبكية الذي يبدأ من طبقاتها الباطنة ثم ينتشر إلى مركز العلة.



gland, pituitary

أقسام الغدة النخامية وبعض اتصالاتها وعلاقاتها: (1) الجسم الحلمي (2) البارزة الإنسية (3) الجذع القمعي (4) السويقة العصبية (5) النائي القمعي (6) النخامي العصبية (7) الفص الخلفي (8) الفص الأمامي (9) نسيج ضام (تربيق) (10) الجزء القاصي (11) الجزء المتوسط (12) الجزء الحديبي (13) النخامي الخفية (14) السويقة النخامية (15) قسم من التصالبة البصرية (16) السبيل الفوق البصري النخامي (17) السبيل الحديبي النخامي (18) السبيل الوطائي النخامي.




gland, pituitary

تشريح الغدة النخامية وعلاقتها: (1) الغدة الصنوبرية (2) المهاد (3) الضفيرة المشيمية للبطين الثالث (4) القيو (5) الدقبة بين البطينين (6) الجسم الدفني (7) التلم الوطاني (8) الصوار الأمامي (9) الصليحة الإنتهائية (10) الحنية الرمائية (11) الجسم الحلمي (12) صهريج التصلابة (13) التصلاب البصري (14) حجاب السرج (15) الغدة النخامية (16) الجيب الوتدي (17) حاجز الأنف (18) الصهريج بين السويقتين (19) البلموم الأنفي (20) صهريج الجسر.




gland pituitary

الغدة النخامية وعلاقتها في السطح السفلي للدماغ: (1) العصبان البصريان (2) الذروة الصغوية للدماغ (3) التصلابة البصرية (4) السبيل البصري الأيمن (5) الغدة النخامية (6) العصب المحرك للعين (7) الحدية الرمادية (8) الجسمان الحليميان (9) العصب البكري (10) العصب ثلاثي التوائم (11) العصب المبعد (12) الجسر.



ب



ا

glia

صورتان للخلايا الدبقية في الدماغ (ا) ارتكاز نهاياتها على وعاء في المخ. (ب) خلايا دبقية نجمية في الطبقة الحبيبية في المخيخ.

- ependymal g.** ورم دُبَقِيّ بَطْنَانِيّ عَصَبِيّ. ورم ضخّم وصلب ووعائي يصيب البطين الرابع.
- g. exophytum** ورم دُبَقِيّ يَمَانِيّ ظَاهِرِيّ. ورم دُبَقِيّ يتولد في الشبكية ويبدأ من طبقاتها الظاهرة ثم ينتشر بعيداً عن مركز العقلة.
- ganglionic g.** ورم دُبَقِيّ عُقْدِيّ. ورم عصبي يحوي خلايا عقدية ناضجة.
- mixed g.** ورم دُبَقِيّ مُخْتَلِط. ورم يحوي خلايا من أنواع دبقية متعددة وفيه جزر من الدبقيات قليلة التفرص ومن الدبقيات النجمية.
- nasal g.** ورم دُبَقِيّ أَنْفِيّ. كتلة شبيهة بالورم تتكون من نسيج عصبي متنبذ تتولد في تجويف الأنف.
- optic g.** ورم دُبَقِيّ بَصَرِيّ. ورم العصب البصري أو التصلب البصري وهو بطيء النمو ويؤدي إلى فقدان البصر مع جحوظ العين وفقدان حركتها.
- peripheral g. (= schwannoma)** ورم دُبَقِيّ محيطيّ؛ ورم شفاني.
- g. retinae (= retinoblastoma)** ورم أَرُومَة الشبكيّة.
- g. sarcomatosum (= gliosarcoma)** ساركومة دُبَقِيّة.
- telangiectatic g.** ورم دُبَقِيّ مُتَوَسِّع الشعيرات. ورم دُبَقِيّ يحوي الكثير من الاوعية الدموية وخاصة الشعيرات.
- gliomatosis** تَكَثُّر الدُبَق. كثرة تنامي الدبق العصبي خصوصاً في النخاع الشوكي في بعض حالات تكهف النخاع.
- glioneuroma** ورم دُبَقِيّ عَصَبِيّ. ورم دُبَقِيّ يحوي خلايا دبقية عصبية وخلايا دبقية أخرى.
- gliophagia** بَلْعَمَة الدُبَق. بلعمة الخلايا الدبقية.
- gliosarcoma** ساركومة دبقية. ورم دُبَقِيّ خلوي مغزلي.
- gliosis** دُبَاق. كثرة الدبقيات النجمية في المناطق المصابة من الجهاز العصبي المركزي.
- basilar g.** دُبَاق قَاعِدِيّ. دباق يصيب جذع الدماغ والمهاد والجسم المخطط.
- cerebellar g.** دُبَاق مُخَيَخِيّ. دباق يصيب المخيخ.
- diffuse g.** دُبَاق مُنْتَشِر. دباق يصيب كل أنسجة الدماغ وينتشر خلالها.
- hemispheric g.** دُبَاق نَصْف كُرَوِيّ. دباق يصيب أحد نصفي كرة المخ فقط.
- hypertrophic modular g.** دُبَاق ضَخَامِيّ عُقْدِيّ. دباق يتصف بتضخم الدماغ بشكل متناظر بسبب فرط تنسج دبقه العصبي.
- isomorphic g.** دُبَاق إِسْوِيّ الشَّكْلِ. دباق يتصف بترتيب منتظم ومتوازٍ للألياف الدبقية.
- lobar g.** دُبَاق فُصِّيّ. دباق يصيب أحد فصوص الدماغ.
- perivascular g.** دُبَاق حَوْل الأَوْعِيّة. نوع من تصلب شرايين الدماغ يتصف بزيادة الدبق حول الاوعية.
- spinal g.** دُبَاق نَخَاعِيّ. دباق النخاع الشوكي.
- unilateral g. (= hemispheric g.)** دُبَاق وَحِيد الجَانِب.
- uteric g.** دُبَاق رَحْمِيّ. تكاثر الأنسجة الدبقية العصبية في بطانة الرحم أو بطانة عنق الرحم.
- gliosome** جُسيم دُبَقِيّ. إحدى الذريرات الهيولية الصغيرة التي تشاهد في الخلايا الدبقية العصبية.
- globus hystericus** لُفْعَة هِسْتِيرِيّة. الحس الشخصي المزعج بوجود كتلة في البلعوم.
- globus pallidus** الكُرَة الشَّاحِبَة. القسم الأصفر والإنسي من النواة العدسية للدماغ والمفصول عن قشرتها بالصفحة النخاعية الوحشية كما تنقسم الصفحة النخاعية الإنسية للكرة إلى قسمين وحشي وإنسي ويرتبط كلاهما بارتباطات عديدة مع المهاد والجسم المخطط والدماغ المتوسط.
- g. p. lateralis** الكُرَة الشَّاحِبَة الوَحْشِيّة. القسم الأكبر والحشي من الكرة الشاحبة والمفصول عن قشرتها بالصفحة النخاعية الوحشية وعن القسم الإنسي بالصفحة النخاعية الإنسية.
- g. p. medialis** الكُرَة الشَّاحِبَة الْإِنْسِيّة. القسم الأصغر والوَحْشِيّ من الكرة الشاحبة والمفصول عن قشرتها بالصفحة النخاعية الإنسية.

القسم الأصغر والإنسي من الكرة الشاحبة والمفصول عن قسمها الوحشي بالصفحة النخاعية الإنسية.

glomerulus, nonencapsulated

nerve كُبَيْبَةُ عَصَبِيَّةٍ غَيْرُ مَحْفُظَةٍ. نهاية عصبية توجد في الأنسجة الضامة للكثير من الأعضاء تكون فيها للفروع الانتهازية للليف العصبي بنية كروية أو بيضوية تشبه الكبيبة.

glomerulus, olfactory كُبَيْبَةُ شَمِيَّةٍ. كتلة كروية صغيرة مكونة من لبد عصبي كثيف يحوي التشابك الأول في السبيل الشمي.

glossalgia أَلَمُ اللِّسَانِ. ألم في اللسان.

glossodynia (= glossalgia) أَلَمُ اللِّسَانِ.

glossokinesthesia جِسُّ حَرَكََةِ اللِّسَانِ. الشعور والإدراك بحركة اللسان.

glossoplegia شَلْلُ اللِّسَانِ. شلل اللسان وعادة ما يكون بجهة واحدة بسبب إصابة العصب تحت اللسان ويؤدي إلى انحراف اللسان إلى جهة الإصابة عند إبرزاه.

glossoptosis تَدَلِّي اللِّسَانِ. تدلي اللسان إلى الخلف والأسفل.

glossospasm تَشَنُّجُ اللِّسَانِ. تشنج عضلات اللسان.

glutethimide غُلُوثِيثِيمِيد. دواء مسكن ومنوم يستعمل عن طريق الفم.

glycine غَلِيْسِين. حمض أميني يوجد في العديد من البروتينات ويظن بأنه ناقل كيميائي ومثبط عصبي في الجهاز العصبي المركزي.

gnathalgia أَلَمُ الْفَكِّ. ألم في الفك.

gnathodynia (= gnathalgia) أَلَمُ الْفَكِّ.

gnosia الإِدْرَاكُ؛ الْمَعْرِفَةُ. قابلية الشعور بالإحساسات ومعرفة نوعها.

gnosis الإِدْرَاكِيَّةُ؛ الْعَرَفَانِيَّةُ. قابلية الشعور بالإحساسات وعواملها المرافقة لها والتعرف على أنواعها ومعانيها، وهي من وظائف القشرة المخية.

gonalgia أَلَمُ الزُّبْنَةِ.

gradient مَدْرُوجٌ؛ مُنْحَدَرٌ. سرعة زيادة أو نقصان أية فعالية متغيرة.

مَدْرُوجُ التَّرْكِيزِ. تباين تركيز. **concentration g.** بعض الشوارد على جهتي غشاء الخلية أو الليف العصبي مما يؤدي إلى انتقالها من الجهة الأكثر تركيزاً إلى الجهة الأخرى.

مَدْرُوجٌ كَهْرَبَائِيٌّ. تباين الشحنات. **electrical g.** الكهربائية لبعض الشوارد التي توجد على جهتي غشاء الخلية أو العصب مما يؤدي إلى اندفاعها عبر الغشاء من جهة لأخرى.

1. طُعْمٌ. 2. غَرَسٌ. 1. أي نسيج أو عضو يستعمل للغرس أو الاغتراس 2. غرس، أو قام بعملية الغرس.

طُعْمٌ عَصَبِيٌّ. إبدال جزء من عصب تآلف **nerve g.** بآخر سليم.

زَرْعُ الطُعْمِ. القيام بعملية الغرس. **grafting**

مَهْوُوسُ الْعَظْمَةِ. شخص يبالغ بالاعتقاد بأهميته وعظمته وبالتوهم غالباً بثراته وقوته وشهرته وعظمته.

مَهْوَسُ الْعَظْمَةِ. حالة الإصابة **grandiosity** بالتوهم بالعظمة.

الصُّرْعُ الْكَبِيرُ. انظر epilepsy. **grand mal**

1. تَحَبُّبٌ. 2. كُبَيْبَةٌ. **granulation** 1. عملية تكوين النسيج الحبيبي أو الحبيبات الهيولية 2. مادة حبيبية على سطح النسيج أو العضو أو في الهيولى.

حُبَيْبَاتُ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ. **arachnoidal g's.** ارتفاعات صغيرة على سطح العنكبوتية تشاهد بالعين المجردة يعتقد البعض بأنها ضخامات الزغابات العنكبوتية التي تبرز في الجيب السهمي العلوي والأوردة المتصلة به وتكون هذه الزغابات البنيات التي يعود عن طريقها امتصاص السائل الدماغي النخاعي إلى الأوردة.

حُبَيْبَاتُ (= **arachnoidal g.**) **cerebral g's.** العَنْكَبُوتِيَّةِ.

حُبَيْبَاتُ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ. **pacchionian g's. (= arachnoidal g.)**

حُبَيْبَاتُ فِيرشَاو. حبيبات **Virchow's g's.** تحوي الياقاً دبقية وبطانية عصبية توجد في جدران البطينات المخية في داء الشلل العام.

graphesthesia جسُّ الكِتَابَةِ عَلَى الْجِلْدِ؛
حَسُّ الْأَخَاطِيطِ. التَّحَسُّسُ بِالْكِتَابَةِ وَالْأَرْقَامِ الَّتِي
تَكْتُبُ عَلَى سَطْحِ الْجِلْدِ وَمَعْرِفَتُهَا وَإِدْرَاكُهَا.

graphoanalysis تَحْلِيلُ الشَّخْصِيَّةِ مِنْ
الْكِتَابَةِ. تَحْلِيلُ شَخْصِيَّةِ الْمَرْءِ وَأَخْلَاقِهِ وَقَابِلِيَّاتِهِ
بِدْرَاسَةِ خَطِّهِ وَأَسْلُوبِ كِتَابَتِهِ.

graphocatharsis هَرُورٌ كِتَابِيٌّ؛ التَّرْوِيجُ
بِالْكِتَابَةِ. إِطْلَاقُ الْفِكَارِ وَالْمَشَاعِرِ الْمَكْبُوتَةِ لَا
شُعُورِيًّا عِنْدَ إِغْرَاءِ الْمَرِيضِ عَلَى كِتَابَةِ أَفْكَارِهِ
بِطَرِيقَةٍ تُولِّدُ لَدَيْهِ رَاحَةً نَفْسِيَّةً كَبِيرَةً.

graphokinesesthesia جسُّ حَرَكَاتِ الْكِتَابَةِ.
حَسُّ حَرَكَاتِ الْكِتَابَةِ وَإِدْرَاكُهَا.

graphomania هَوَسُ الْكِتَابَةِ. الرِّغْبَةُ الْمَلْحَةُ
فِي الْكِتَابَةِ دُونَ أَيِّ اعْتِبَارٍ لِمَحْتَوَاهَا.

graphophobia رُهَابُ الْكِتَابَةِ. التَّخَوُّفُ
الْمَرَضِيُّ مِنَ الْكِتَابَةِ خُصُوصًا فِي حَالَاتِ الْقَلْقِ
الشَّدِيدِ كَالطَّلَبِ مِنَ الْمَرِيضِ كِتَابَةَ اسْمِهِ أَوْ تَوْقِيعِهِ.

graphorrhea ثَرٌّ كِتَابِيٌّ. كِتَابَةُ الْمَرِيضِ
لِصَفَحَاتٍ عَدِيدَةٍ بِكَلَامٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا أَيْةَ تَرَابُطٍ
وَيَسْتَمِرُّ فِيهِ لِمَجْرَدِ الْكِتَابَةِ.

graphospasm (= cramp, writer's)
تَشَنُّجُ الْكِتَابِ. مَعْصُ الْكَاتِبِ.

gray, central السَّنْجَابِيَّةُ الْمَرْكَزِيَّةُ. الْمَادَّةُ
السَّنْجَابِيَّةُ غَيْرُ الْمَتَمِيزَةِ الَّتِي تَحَافِظُ عَلَى مَوْقِعِهَا
الْبَدَائِيِّ حَوْلَ الْبُطِينَاتِ وَالْقَنَاةِ الْمَرْكَزِيَّةِ.

groove أُخْدُودٌ؛ مِيزَابَةٌ؛ تَلَمٌّ. انْخِفَاضُ ضَحْلٍ
وَطَوْلَانِيٍّ خُصُوصًا ذَلِكَ الَّذِي يَظْهَرُ أَثْنَاءَ التَّطَوُّرِ
الْجَنِينِيِّ وَالَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي بَعْضِ الْعِظَامِ
أَوْ الْأَسْنَانِ.

- **anterolateral g. of medulla oblongata**
(= **anterior ventrolateral sulcus of**
medulla oblongata) الْأُخْدُودُ الْأَمَامِيُّ
الْوَحْشِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- **anterolateral g. of spinal cord**
(= **anterior ventrolateral sulcus of**
spinal cord) الْأُخْدُودُ الْأَمَامِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلنَّخَاعِ.

- **basilar g. (= basilar pontine sulcus)**
التَّلَمُّ الْقَاعِيٌّ لِلْجَسْرِ.

- **neural g. (= medullary g.)** الْأُخْدُودُ الْعَصَبِيُّ.
الْأُخْدُودُ الَّذِي يَتَوَلَّدُ عَنْ انْفِلَاقِ الصَّفِيحَةِ الْعَصَبِيَّةِ فِي
الْجَنِينِ أَثْنَاءَ تَكْوِينِ الْأَنْبُوبِ الْعَصَبِيِّ فِيهِ.

- **trigeminal g.** أُخْدُودٌ ثَلَاثِيٌّ التَّوَاتُمِ. الْأُخْدُودُ
الْجَنِينِيُّ الَّذِي يَتَطَوَّرُ لِيَكُونَ عَقْدَةُ ثَلَاثِيٍّ التَّوَاتُمِ.

guanidine hydrochloride هَيْدُرُوكُلُورِيدُ
الْغُوَانِيدِينِ. مَرْكَبٌ يَسْتَعْمَلُ فِي عِلَاجِ الْوَهْنِ
الْعَضْلِيِّ الْوَبِيلِ.

gustation الذُّوقُ. حَسُّ الذُّوقِ أَوْ عَمَلِيَّةُ
التَّذَوُّقِ.

gustatism ذُّوقٌ مُحَرَّضٌ. حَسُّ الذُّوقِ الَّذِي
يَتَوَلَّدُ بِصُورَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ بِمُنْبَهَاتٍ لَا ذُوقِيَّةٍ.

gustatory ذُوقِيٌّ. مَنْسُوبٌ أَوْ مُتَعَلِّقٌ
بِحَسِّ الذُّوقِ.

1. **gynandria (= gynandrisim)** خُنُوْتَةٌ.
2. أَنْثَى خُنُوْتِيَّةٌ كَاذِبَةٌ.

1. **gynandrisim** خُنُوْتَةٌ 2. أَنْثَى خُنُوْتِيَّةٌ
كَاذِبَةٌ 3. حَالَةٌ تَزَاجُلِ الْمَرْأَةِ.

gynecomania (satyriasis) شَبَقٌ.

gynephilia (= satyriasis) شَبَقٌ.

gynephobia رُهَابُ الْبِنَاءِ. التَّخَوُّفُ الْمَرَضِيُّ
وَالْإِبْتِعَادُ عَنِ النِّسَاءِ.

gyrectomy قَطْعُ التَّلْفِيفِ. قَطْعُ أَوْ اسْتِنْصَالِ
أَحَدِ تَلَاوِيفِ الْمَخِ أَوْ جُزْءٍ مِنَ الْقَشْرَةِ الْمَخِيَّةِ.

- **frontal g.** قَطْعُ التَّلْفِيفِ الْجَبْهِيِّ. قَطْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ
مِنَ الْقَشْرَةِ الْجَبْهِيَّةِ فِي عِلَاجِ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ.

gyri تَلَاوِيفٌ. جَمْعُ تَلْفِيفٍ.

gyrospasm تَشَنُّجٌ دَوْرَانِيٌّ. تَشَنُّجُ الرَّأْسِ
الدَّوْرَانِيِّ.

gyrus تَلْفِيفٌ. (ج: تَلَاوِيفٌ). أَحَدُ الِارْتِفَاعَاتِ
الْمَتَعَرِّجَةِ مِنْ سَطْحِ الدِّمَاغِ وَالْمَوْلَدَةِ عَنْ انْطَوَاءِ
الْقَشْرَةِ إِلَى دَاخِلِهِ.

- **angular g.** التَّلْفِيفُ الزَّائِي. تَلْفِيفٌ فِي الْفَصِصِ
الْجِدَارِيِّ السُّفْلِيِّ الَّذِي يَتَقَوَّسُ فَوْقَ النِّهَايَةِ الْخَلْفِيَّةِ

- للتلم الصدغي الخلفي والمتصل بالتلفيف الصدغي الوسطي.
- **annectant gyri (= transitive gyri)** تَلَفِيفٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ؛ تَلَفِيفٌ عَابِرَةٌ.
- **gyri brevis insulae (= short gyri of insula)** التَّلَافِيفُ الْقَصِيرَةُ لِلْجَزِيرَةِ. التَلَفِيفُ الْقَصِيرَةُ الْمُتَوَضِّعَةُ فِي الْجِهَةِ الرَّاسِيَةِ مِنَ الْجَزِيرَةِ.
- **Broca's g. (= Broca's convolution)** تَلَفِيفٌ بَرْوُكَا.
- **callosal g. (= cingulate g.)** التَّلَفِيفُ الْجَزَامِيّ؛ التَّلَفِيفُ الثَّقَنِيّ.
- **central g., anterior (= precentral g.)** التَّلَفِيفُ أَمَامَ الْمَرْكَزِيّ؛ التَّلَفِيفُ الْمَرْكَزِيّ الْأَمَامِيّ.
- **central g., posterior (= postcentral g.)** التَّلَفِيفُ خَلْفَ الْمَرْكَزِيّ؛ التَّلَفِيفُ الْمَرْكَزِيّ الْخَلْفِيّ.
- **cerebellar g. (= folia cerebelli)** تَلَفِيفٌ مُخِيخِيّ. الْوَرَقَاتُ الْمُخِيخِيَّةُ.
- **cerebral gyri** تَلَفِيفُ الْمَخ. الْارْتِفَاعَاتُ الْمُتَعَرِّجَةُ عَلَى سَطْحِ الْمَخِ وَالْمَوْلُودَةُ عَنْ طَيَّاتٍ قَشَرَتِهَا وَالْمَفْصُولَةُ عَنْ بَعْضِهَا بِالْأَتْلَامِ الْمُخِيَّةِ وَالْكَثِيرِ مِنْهَا ثَابِتَةٌ وَأَعْطِيَتْ أَسْمَاءَ خَاصَّةً بِهَا.
- **cingulate g.** التَّلَفِيفُ الْجَزَامِيّ. تَلَفِيفٌ مَقْوَسٌ مُرْتَبِطٌ بِسَطْحِ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ وَمَفْصُولٌ عَنْهُ بِالتَّلَمِ الثَّقَنِيِّ.
- **dentate g.** التَّلَفِيفُ الْمُسَنَّ. شَرِيطٌ مُسَنَّ مِنْ الْمَادَّةِ السَّنَجَابِيَّةِ تَحْتَ الْحَافَةِ الْإِنْسِيَّةِ لِلْحَصِينِ وَفِي أَعْمَاقِهِ. وَهُوَ قَشْرَةٌ بِدَائِيَّةٍ تَطَوَّرَتْ بِجَانِبِ الشَّقِّ الْحَصِينِيِّ وَيَتَكُونُ مِنْ طَبَقَاتٍ جَزِيئِيَّةٍ وَحَبِيبِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةِ الْأَشْكَالِ.
- **fasciolar g.** التَّلَفِيفُ الشَّرِيطِيّ. أَمْتَادٌ خَلْفِيٌّ وَعُلَوِيٌّ لِلتَّلَفِيفِ الْمُسَنَّ الَّذِي يَكُونُ مَنطَقَةً انْتِقَالِيَّةً بَيْنَ التَّلَفِيفِ الْمُسَنَّ وَالسَّرِّ السَّنَجَابِيِّ.
- **fornicate g.** التَّلَفِيفُ الْمُقْوَسُ. الْجُزْءُ الْهَامِشِيُّ مِنَ الْقَشْرَةِ الْمُخِيَّةِ عَلَى الْجَانِبِ الْإِنْسِيِّ مِنْ نِصْفِ كُرَةِ الْمَخِ وَالَّذِي يَشْمَلُ التَّلَفِيفَ الْحَزَامِيَّ وَالتَّلَفِيفَ الْمَجَاوِرَ لِلْحَصِينِ وَالْبَرْزُخَ وَالْمَعْقِفَ وَهُوَ يَكُونُ الْجُزْءَ الرَّئِيسِيَّ لِلْجِهَازِ الْحَوْفِيِّ.
- **frontal g., ascending (= precentral g.)** التَّلَفِيفُ الْجَنْبِيُّ الصَّاعِدُ؛ التَّلَفِيفُ أَمَامَ الْمَرْكَزِيّ.
- **frontal g., inferior** التَّلَفِيفُ الْجَنْبِيُّ السُّفْلِيّ. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ أَسْفَلَ التَّلَمِ الْجَبْهِيِّ السُّفْلِيِّ وَيَقْسِمُهُ الْفُرْعَانُ الْأَمَامِيَّ وَالصَّاعِدَ مِنَ التَّلَمِ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْأَقْسَامِ الْحَاجَبِيَّةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَالْوَصَادِيَّةِ.
- **frontal g., medial** التَّلَفِيفُ الْجَنْبِيُّ الْإِنْسِيّ. السَّطْحُ الْإِنْسِيُّ لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ الْمَفْصُولِ عَنِ التَّلَفِيفِ الْحَزَامِيِّ بِالتَّلَمِ الْحَزَامِيِّ وَالْمُتَّصِلِ بِالتَّلَفِيفِ الْجَبْهِيِّ الْعُلَوِيِّ مِنَ الْأَعْلَى وَالتَّلَفِيفِ الْمُسْتَقِيمِ مِنَ الْأَسْفَلِ.
- **frontal g., middle** التَّلَفِيفُ الْجَنْبِيُّ الْوَسْطِيّ. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ بَيْنَ التَّلَمَيْنِ الْجَبْهِيَيْنِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ التَّلَفِيفِ أَمَامَ الْمَرْكَزِيّ.
- **frontal g. superior** التَّلَفِيفُ الْجَنْبِيُّ الْعُلَوِيّ. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ فَوْقَ التَّلَمِ الْجَبْهِيِّ الْعُلَوِيِّ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ التَّلَفِيفِ أَمَامَ الْمَرْكَزِيّ.
- **fusiform g.** التَّلَفِيفُ الْمُغَزَلِيّ. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الصَّدْغِيِّ وَعَلَى السَّطْحِ السُّفْلِيِّ مِنْ نِصْفِ كُرَةِ الْمَخِ بَيْنَ التَّلَفِيفِ الصَّدْغِيِّ السُّفْلِيِّ وَالتَّلَفِيفِ الْمَجَاوِرِ لِلْحَصِينِ.
- **geniculate g.** التَّلَفِيفُ الرُّكْبِيّ. تَلَفِيفٌ آثَارِيٌّ يَوْجَدُ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.
- **Heschl's gyri (= transverse temporal gyri)** التَّلَافِيفُ الصَّدْغِيَّةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ.
- **hippocampal g. (= parahippocampal g.)** التَّلَفِيفُ الْحَصِينِيّ؛ التَّلَفِيفُ الْمَجَاوِرُ لِلْحَصِينِ.
- **Infracalcarine g. (= lingual g.)** التَّلَفِيفُ تَحْتَ الْمَهْمَازِيّ؛ التَّلَفِيفُ اللِّسَانِيّ.
- **Insular gyri** تَلَفِيفُ الْجَزِيرَةِ. التَّلَافِيفُ الَّتِي تَوْجَدُ عَلَى سَطْحِ الْجَزِيرَةِ وَالَّتِي تَشْمَلُ تَلَفِيفَ الْجَزِيرَةِ الطَّوِيلِ وَتَلَفِيفَ الْجَزِيرَةِ الْقَصِيرَةِ.
- **Insular g., long** تَلَفِيفُ الْجَزِيرَةِ الطَّوِيلِ. التَّلَفِيفُ الطَّوِيلُ عَلَى سَطْحِ الْجَزِيرَةِ وَالْمَتَّجِهَ نَحْوَ النَاحِيَةِ الْقَذَالِيَّةِ.
- **insular gyri, short** تَلَفِيفُ الْجَزِيرَةِ الْقَصِيرَةِ. التَّلَافِيفُ الْقَصِيرَةُ الَّتِي تَوْجَدُ فِي الْجِهَةِ الرَّاسِيَةِ مِنَ الْجَزِيرَةِ.

- limbic g. (= fornicate g.) . التَلْفِيفُ الحَوْفِيّ .
التلفيف المقوس.
- lingual g. . التَلْفِيفُ اللِّسَانِيّ . تلفيف في الفص
القذالي وعلى السطح السفلي لنصف كرة المخ ويكون
الحافة السفلية للتمل المهادي كما يكون بالاشتراك مع
الإسفين القشرة البصلية.
- marginal g. (= medial frontal g.)
التلفيف الهامشي: التَلْفِيفُ الجَبْهِيُّ الإنْسِيّ .
- occipital g., inferior . التَلْفِيفُ القَذَالِي السُّفْلِيّ .
تلفيف على الجهة الخارجية من الفص القذالي يفصله
التمل القذالي الوحشي عن التلفيف القذالي العلوي.
- occipital g., superior . التَلْفِيفُ القَذَالِي العُلْوِيّ .
تلفيف على الجدار الخارجي للفص القذالي يفصله التمل
القذالي الوحشي عن التلفيف القذالي السفلي.
- occipitotemporal g., lateral . التَلْفِيفُ القَذَالِي
الصُّدْغِيّ الوَحْشِيّ . الجزء الوحشي من التلفيف
المغزلي على السطح السفلي من نصف كرة المخ
وفصله التمل القذالي عن القسم الإنسي ويتصل على
جهته الوحشية بالتلفيف الصدغي السفلي.
- occipitotemporal g., middle . التَلْفِيفُ القَذَالِي
الصُّدْغِيّ الوَسْطِيّ . الجزء الإنسي من التلفيف المغزلي
وعلى السطح السفلي من نصف كرة المخ ويفصله
التمل الجانبي عن التلفيف المجاور للحصين.
- olfactory gyri, lateral & medial . التَلْفِيفُ
الشَّمْعِيّ الوَحْشِيّ والإنْسِيّ . طبقات المادة السنجابية
التي تغطي السطور الشمعية الوحشية والإنسية.
- orbital gyri . التَلْفِيفُ الحَجَاجِيّ . التلافيف
المتعرجة وغير المنتظمة الموجودة بالجهة الوحشية
من التمل الشمعي على السطح الحجاجي للفص الجبهي.
- paracentral g. (= paracentral lobule)
الفُصَيْصُ المجاور للمُزَكَّر .
- parahippocampal g. . التَلْفِيفُ المجاور
للْحَمِصِيّن . تلفيف على السطح السفلي لنصف كرة
المخ واحد على كل من الجهتين ويقع بين الحصين
والأتلان الجانبية.
- paraterminal g. . التَلْفِيفُ المجاور لِلْإِنْتِهَائِيّ .
صفحة رقيقة من مادة سنجابية تقع أمام ركبة الجسم
الثقني وعلى جهته البطنية.

- parietal g. . التَلْفِيفُ الجِدَارِيّ . واحد من
تلافيف الفص الجداري.
- parietal g., ascending (= postcentral g.)
التَلْفِيفُ الجِدَارِيّ الصَّاعِدُ: التلفيف خلف المركزي.
- postcentral g. . التَلْفِيفُ خَلْفَ المَرْكَزِيّ .
تلفيف في الفص الجداري يقع بين التلمين المركزي
وخلف المركزي وهو الباحة الحسية الأولية لقشرة
الدماغ.
- precentral g. . التَلْفِيفُ أَمَامَ المَرْكَزِيّ . تلفيف
الفص الجبهي الذي يقع بين التلمين المركزي وأمام
المركزي وهو الباحة الحركية الأولية لقشرة الدماغ.
- preinsular gyri (= short insular gyri)
التلافيف أمام الجزيرة: التَلْفِيفُ القَصِيرَةُ لِلْجَزِيرَةِ .
- g. rectus . التَلْفِيفُ المُسْتَقِيم . تلفيف على السطح
الحجاجي للفص الجبهي على الجهة الوحشية من التمل
الشمي ومتصل مع التلفيف الجبهي الإنسي على الوجه
الإنسي للفص.
- subcallosal g. (= paraterminal g.)
التَلْفِيفُ تَحْتَ الثَّقْنِيّ: التلفيف المجاور للانتهازي.
- supracallosal g. (= indusium griseum)
التَلْفِيفُ فَوْقَ الثَّقْنِيّ . السَتر السنجابي.
- supramarginal g. . التَلْفِيفُ فَوْقَ الهَامِشِيّ .
تلفيف الفص الجداري السفلي الذي يدور حول النهاية
العلوية للفرع الخلفي من الشق الوحشي والمتصل في
الخلف مع التلفيف الصدغي العلوي.
- temporal g. . تَلْفِيفُ صُدْغِيّ . أي من تلافيف
الفص الصدغي.
- temporal g., inferior . التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ
السُّفْلِيّ . تلفيف الفص الصدغي الذي يقع بين التمل
الصدغي السفلي والتلفيف القذالي الصدغي الوحشي
ويتصل هذان التلفيفان في الحافة السفلية الوحشية
من الفص الصدغي ببعضهما.
- temporal g., middle . التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ
الْوَسْطِيّ . تلفيف الفص الصدغي الذي يقع بين التلمين
الصدغيين العلوي والسفلي والذي يتصل في الخلف
مع التلفيف الزاوي.
- temporal g., superior . التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ
العُلْوِيّ . تلفيف الفص الصدغي الذي يقع بين التلمين

الصدغي العلوي والوحشي والذي يتصل في الخلف مع التلافيف فوق الهامشي.

- temporal gyri transverse التَلَاوِيفُ
الْصُّدْغِيَّةُ الْمُسْتَقْرِضَةُ. تلافيف الفص الصدغي التي
تؤشر النهاية الخلفية للتلافيف الصدغي العلوي وغالبا
ما تقع في التلم الوحشي وأوضح هذه التلافيف هو

التلافيف المستعرض الأمامي (تلافيف هيشل) والذي
يمثل المركز القشري للسمع.

- transitive cerebral gyri تَلَاوِيفُ الْمَخْجُ
العابرة. طيات صغيرة متعددة على سطح المخ، غير
ثابتة، ولذلك لا تكتسب أسماء معينة خاصة بها.
- uncinat g. (= uncus) تَلَاوِيفُ الْمِعْقَفِ.
المعقف.

H

habenula العِنَان. أحد مكونات المهيد وهو البارزة الصغيرة فوق البارزة الظهرية الإنسية للمهاد وتقع أمام الصوار الظهري مباشرة وعلى الحافة الوحشية لمثلث العنان.

habit عَادَة. عملية ثابتة يمارسها الشخص ويكثر من تكرارها.

habitus 1. وَضْعَة 2. بِنْيَة؛ خِلْقَة. 1. وضع الجسم 2. بنية الجسم ومظهره.

hallucination هَلُوسَة؛ هَلَس. إدراك حسي داخلي دون وجود أي منبه له في المحيط الخارجي، أو الحس بوجود شيء في البيئة الخارجية دون وجود أثر لها.

- auditory h. هَلُوسَة سَمْعِيَّة. هلس يمكن أن يكون لأصوات موسيقية أو لأصوات حديث يدور بين عدة أشخاص أو هلس فكري.

- gustatory h. هَلُوسَة ذَوْقِيَّة. حس تذوق بعض المواد مع عدم وجودها في الفم.

- haptic h. هَلُوسَة لَمْسِيَّة. إحساس بحس لمسي أو حس تنبيهات كهربائية لأقسام من الجسم.

- hypnagogic h. هَلُوسَة نَنُويَمِيَّة. هلس غالباً ما يكون سمعي قبيل البدء بالنوم مباشرة أو عند الاستيقاظ منه.

- hypnopompic h. هَلُوسَة إِسْتَيْقَاطِيَّة. هلس يحدث عند أول الاستيقاظ من النوم وقبل الصبح التام منه.

- induced h. هَلُوسَة مُحْدَثَة. هلس محرّض من قبل شخص آخر مثل المنوم المغنطيسي.

- kinesthetic h. هَلُوسَة جِسْمِيَّة حَرَكِيَّة. هلس إحساس بحركة بعض أقسام الجسم.

- lilliputian h. هَلُوسَة تَصْغِيرِيَّة. هلس يحس المصاب به بأن الأجسام والأشياء الموجودة في محيطه تبدو أصغر من حجمها الحقيقي.

- olfactory h. هَلُوسَة شَمِيَّة. هلس شم روائح غير موجودة.

- h. of perception هَلُوسَة إدراكية. هلس صوتي يتصف بسماع أصوات من خارج الجسم.

- psychomotor h. هَلُوسَة نَفْسِيَّة حَرَكِيَّة. هلس يتصور المصاب به انتقال أجزاء من جسمه من مواضعها إلى مواضع أخرى فيه.

- reflex h. هَلُوسَة إِنْعَكَاسِيَّة. الحس بإحساس خاص في قسم من الجسم يختلف عن طبيعة المنبه المولد له فيتولد مثلاً حس رؤية أشخاص مجتمعين حول الشخص عند حقنه بمادة ما داخل عضله.

- sexual h. هَلُوسَة جِنْسِيَّة. حس تهيج جنسي عند تنبيه قسم لا جنسي من أقسام الجسم كالقدم مثلاً.

- somatic h. هَلُوسَة جَسَدِيَّة. هلس يشمل إدراك حركة أو فعالية جسمية تحدث في قسم من أقسام الحس.

- stump h. (= phantom limb) هَلُوسَة الْجَذْمُور؛ طَرَفٌ شَبَحِيّ.

- tactile h. هَلُوسَة لَمْسِيَّة. هلس يشمل حس اللمس.

- visual h. هَلُوسَة إِنْصَارِيَّة. هلس يشمل حس البصر.

hallucinative, hallucinatory هَلُوسِيّ؛ هَلَسِيّ. يتصف بالهلوسة.

hallucinogen هَلُوسِيّ. عامل يولد الهلوسة.

hallucinosis هَلُاس. حالة تتصف بوجود هلوسة من دون أي فقدان للوعي.

- **organic h.** هَلَأَسْ عُضْوِيّ. حالة وجود هلوسة ناتجة من مرض عضوي معين في الدماغ من دون حدوث أي هذيان، ومن أسباب ذلك الكحولية المزمنة واستعمال العقاقير المهلوسة، وبؤر النوبات الدماغية.

haloperidol هَالُوْبِرِيدُول. دواء يستعمل في علاج بعض أنواع الذهان والعزات.

halothane هَالُولْثَان. مخدر استنشاقى قوي يستعمل لبدء التخنيج وإدامته.

hand يَد. (ج. أيدي). القسم الأسفل من الذراع العلوي أسفل الساعد.

- **ape h.** يَدُ قُرْبِيَّة. يد يكون إبهامها مبسوطاً دائماً.

- **benediction h.** يَدُ التَّبَرُّك. يد يكون فيها الخنصر والبنصر منتصبين مع ضعف التقريب والتباعد في الوسطى والسبابة ولكن يمكن بسطهما بصورة طبيعية كما يبقى الإبهام سوياً ويشاهد ذلك في شلل العصب الزندي وفي تكهف النخاع.

- **claw h.** يَدُ مَخْلَبِيَّة. انظر clawhand.

- **club h.** حَنْقُ الْيَد. انظر clubhand.

- **dead h.** يَدُ مَيِّتَة. اضطراب مهني يصيب العمال الذين يستعملون أدوات أو آلات هزازة مما يولد ارتجاج اليد المستمر مع المها وازرقاقها الفامق ولكنها تشحب عند تعرضها للبرد.

- **drop h. (=wristdrop)** تَدْلِي الرُّسْغ. يظهر الرسغ متدلياً. وينتج ذلك من

- **flat h. (=manus plana)** يَدُ رَحَاء.

- **frozen h.** يَدُ مُتَبَيِّسَة. تيبس اليد الذي بسبب وذمتها التي تنتج عن رضحها.

- **phantom h.** يَدُ شَبَحِيَّة. حس مذلي يشعر به المريض المقطوع اليد ويحس كأنها لا زالت في موضعها.

- **preacher's h. (=benediction h.)** يَدُ الْوُعَاظ.

- **skeleton h.** يَدُ هَيْكَلِيَّة. يد مصابة بضمور شديد وتبقى بوضع البسط وتشاهد في الضمور العضلي المترقى.

- **trench h.** يَدُ الْخَنَادِق. تقعع عضلات اليد وعجزها بسبب عضّة الصقيع التي تحدث في الخنادق كما حدثت في خنادق الحرب العالمية الأولى.


- **writing h.** يَدُ الْكِتَابَة. يد تأخذ وضع الكتابة وتشاهد في الشلل الرعاشي.

handedness يَدَوِيَّة. حالة تفضيل استعمال إحدى اليدين للقيام بالحركات الإرادية.

- **left h.** أيسرية؛ أعسرية. تفضيل استعمال اليد اليسرى عند القيام بالحركات الإرادية.

- **right h.** أَيْفَنِيَّة. تفضيل استعمال اليد اليمنى عند القيام بالحركات الإرادية.

handicap مَعْعُوق. أي عيب جسدي أو عقلي أو خاصية خلقية أو مكتسبة تمنع المرء أو تحدّد قيامه بفعالياته وأعماله الطبيعية.



hand, drop

شلل العصب الكعبري حيث يتعثر على المريض بسط رسغه أو أصابعه أو إبهامه ويظهر الرسغ متدلياً. وينتج ذلك من انضغاط أو قطع هذا العصب.

haphalgesia أَلَمٌ لَمَسِيٌّ. حس الألم عند لمس أجسام غير مخدشة أو عند مجرد لمس الجلد.

haphophobia رُهابُ اللَّفْس. تخوف المريض من أن يلمسه أحد.

haut-mal grand mal. انظر الكَبِير.

headache (= cephalalgia) صُدَاع. ألم في الرأس.

- anemic h. صُدَاعُ فَقْرِ الدَّم. صداع يتولد عن فقر الدم العام أو الموضعي في الرأس.

- bilious h. صُدَاعُ صَفْرَاوِيٍّ. صداع يترافق مع أعراض معدية معوية وعادة ما يكون صداعاً شقيقياً.

- blind h. (=migraine) الشَّقِيقَةُ.

- cluster h. (=migrainous neuralgia) صداع عنقودي: أَلَمٌ عَصَبِيٌّ شَقِيقِيٌّ.

- congestive h. صُدَاعُ إِحْتِقَانِيٍّ. صداع يتولد عن احتقان الرأس أو فرط تبغفه.

- cough h. صُدَاعُ السَّعَال. صداع وخزي يتولد عن السعال الذي يشد على الأنسجة الحساسة للآلم.

- dynamite h. صُدَاعُ الْمُتَفَجِّرَات. الصداع الشديد الذي يصيب الأشخاص الذين يستعملون المتفجرات.

- exertional h. صُدَاعُ الإِرْهَاق. صداع يتلو الإرهاق المولد من كثرة الحركات الشديدة ولا يدوم طويلاً.

- functional h. صُدَاعٌ وَظِيفِيٌّ. صداع يتولد عن التوتر العاطفي أو عن أي من الاضطرابات العاطفية الأخرى.

- helmet h. صُدَاعُ خُوْذِيٍّ. صداع يصيب النصف الأعلى من الرأس.

- histamine h., Horton's h. (=migrainous-neuralgia) أَلَمٌ عَصَبِيٌّ شَقِيقِيٌّ.

- hyperemic h. (=congestive h.) صُدَاعُ إِحْتِقَانِيٍّ.

- lumbar puncture h. صُدَاعُ الْبَزْلِ الْقَطَنِيٍّ. صداع يحدث عند انتصاب الجسم يزول عند الاستلقاء يتولد بعد البزل القطني بسبب هبوط الضغط داخل القحف لتسرب السائل الدماغي النخاعي عن طريق إبرة البزل.

- migralne h. (=migraine) الشَّقِيقَةُ.

- miners' h. صُدَاعُ عُقَالِ الْمَنَاجِم. الصداع الذي يصيب العمال في المناجم بسبب الغازات المولدة عن انفجار النتروغليسرين فيها.

- Monday morning h. صُدَاعُ صَبَاحِ الْإِثْنَيْن. صداع يطلق على شكوى المتمارضين أو المصابين بالسكر المعلق.

- organic h. صُدَاعٌ عُضْوِيٌّ. صداع يتولد عن آفة عضوية في داخل القحف.

- postcoital h. الصُدَاعُ التَّالِي لِلْجَمَاع: صُدَاعُ الْجَمَاع. صداع يحدث أثناء الجماع أو بعده ويصيب الذكور في الغالب وقد يدوم لعدة ساعات.

- postspinal h. (=lumbar puncture h.) الصُدَاعُ التَّالِي لِلْبَزْلِ.

- puncture h. (=lumbar puncture h.) الصُدَاعُ التَّالِي لِلْبَزْلِ.

- pyrexial h. صُدَاعُ الْحُمَّى. الصداع الذي يتولد عن الحمى.

- reflex h. صُدَاعٌ إِنْعَكَاسِيٌّ. صداع يترافق مع مرض بعض الأعضاء كالعدة أو العين.

- rhinogenous h. صُدَاعُ أَنْفِي الْمَنْشَأ. صداع يتولد عن مرض في الأنف.

- sick h. (=migraine) صُدَاعُ مَرَضِيٍّ؛ الشَّقِيقَةُ.

- spinal h. (=lumbar puncture h.) الصُدَاعُ التَّالِي لِلْبَزْلِ الْقَطَنِيٍّ.

- symptomatic h. (=reflex h.) صداع أعراضي: صُدَاعٌ إِنْعَكَاسِيٌّ.

- tension h. صُدَاعُ التَّوْثُر. صداع يتولد عن العمل المرهق الطويل أو الإجهاد العاطفي أو كليهما والذي يؤثر بصورة خاصة على المنطقة القذالية.

- toxic h. صُدَاعُ تَسَمُّمِيٍّ. صداع يتولد عن التسمم العام في الجسم.

- vacuum h. صُدَاعُ الْفَرَاغ. صداع يتولد عن انسداد مخرج الجيب الجبهي.

- vasomotor h. (=migrainous neuralgia=cluster h.) صُدَاعٌ وَعَائِي حَرَكي: أَلَمٌ عَصَبِيٌّ شَقِيقِيٌّ.

hearing سَمْع. حس إدراك الأصوات.

- color h. (=chromesthesia) سَمْعٌ لَوْنِيٌّ.

جسُّ لوني. ارتباط بعض الإحساسات الوهمية لبعض الألوان مع الإحساسات السمعية أو الذوقية أو الشمية الحقيقية.

سمِعْ إبصارِي؛ قِرَاءَةُ - visual h. (lip reading) الشِّفَاه.

فَقْدَانُ السَّمْعِ؛ صَمَمٌ. فقدان السمع الجزئي أو الكلي. hearing loss

صَمَمٌ توصيلي. - conductive h.l. (= conduction deafness)

صَمَمٌ توصيلي؛ صَمَمٌ النَّاقِلِيَّة. - paradoxical h.l. (= paradoxical deafness)

فَنَدٌ؛ فَصَامٌ سَادَج. مرض عقلي hebephrenia (= hebephrenic schizophrenia) يتصف بتصرفات عاطفية بدائية كالضحك أو البكاء أو السلوك الشاذ.

ثُقْبُ القَوَقعة. ممر يصل سقالة الطبلية بسقالة الدمليز عند قمة القوقعة. helicotrema

أَلَمٌ شَقِيٌّ. ألم في جهة واحدة hemalgia من الجسم.

نَزَفٌ دِمَاعِي. نزف hematoencephalon في الدماغ أو حوالبه.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ. تجمع موضعي hematoma للدم وعادة ما يكون متخثراً في عضو أو حيز أو نسيج أو بنية بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ فَوْقَ الجَافِيَّة. تجمع - epidural h. دموي متخثر في الحيز فوق الجافية بسبب تخريب الشريان السحائي الوسطي مما يولد ضغطاً على الجافية وعلى الدماغ نفسه وقد ينفثق خلال الخيمة ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يزال مبكراً.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ (= epidural h.). خارج الجافية. - extradural h.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ دَاخِلَ الدِّمَاغ. تجمع دموي داخل الدماغ قد يؤدي إلى الموت وذلك حسب حجمه وموقعه في الدماغ. - intracerebral h.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ دَاخِلَ القَحْف. ورم - intracranial h. دموي داخل أي منطقة في القحف.

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ تَحْتَ الجَافِيَّة. ورم - subdural h. دموي في الحيز تحت الجافية يتكون في الحالات

الحادة الناتجة عن رضح الدماغ من مزيج من الدم والسائل الدماغي النخاعي فيؤدي إلى انضغاط الدماغ. أما في الحالات المزمنة فيكون الورم مكوناً من الدم فقط ويتولد عادة نتيجة انقطاع أحد الأوردة عند إصابات الرأس المغلفة ويتكون النزف تدريجياً فيؤدي بعد فترة إلى الصداع والذهول والشلل النصفي في الجهة المعاكسة يتبعه توسع الحدقة وهذه علامة من علامات الانفتاق في الخيمة.

تَدَمِّي النُّخَاع. نزف في داخل hematomyelia النخاع الشوكي وعادة ما يكون في مادته السنجابية وينتج غالباً عن رضح النخاع ويتصف بشلل رخو مع اضطرابات حسية واسعة.

التَّهَابُ النُّخَاعِ الدُّمِّي. hematomyelitis التهاب النخاع الشوكي مع انصباب دموي في داخله.

تَقَنِّي النُّخَاعِ النَّزْفِي. hematomyelopore مرض يتسبب بتوليد آقنية في داخل النخاع بسبب النزف المولد فيه.

رَهَابٌ (= hemophobia) hematophobia الدَّم.

فَقْدَانُ الذَّوْقِ الشَّقِي. فقدان hemiageusia حس الذوق في أحد نصفي اللسان.

أَلَمٌ شَقِيٌّ. ألم في أحد نصفي hemialgia الجسم.

وَهَنٌ عَضَلِيٌّ شَقِيٌّ. وهن hemiamyosthenia عضلي في أحد نصفي الجسم.

صَمَمٌ أَحَادِيٍّ؛ صَمَمٌ شَقِيٌّ. hemianacusia صمم في إحدى الأذنين.

تَسْكِينٌ شَقِيٌّ. تسكين في hemianalgesia أحد نصفي الجسم.

لَا دِمَاعِيَّةٌ شَقِيَّة. غياب hemianecephaly أحد نصفي الدماغ خلقياً.

خَدَرٌ شَقِيٌّ. خدر يصيب hemianesthesia أحد نصفي الجسم.

خَدَرٌ شَقِيٌّ (= h. cruciata) - alternate h. تبادلي.


خَدَرٌ شَقِيٌّ مُخِّي. خدر شقي ينتج - cerebral h. عن إصابة المحفظة الداخلية للنواة العدسية.



hematoma, epidural


صورة تبين بعض الأورام الدموية حوالى للدماغ:

- ١- ورم دموي في الحفرة الخلفية: ورم دموي يتولد من الإصابات أو الكسور القفوية مما يسبب خلل القياس ونقص التوتر والرنح وأحياناً وذمة الحليمة البصرية والسبات المترقي.
- ب - ورم دموي تحت الجبهي: ورم يولد الصداخ خلف الحاجبي وضعف الافتهام والتفكير وضعف الذاكرة والتوهان المتقطع.




hematoma, epidural

ورم دموي فوق الجافية في الناحية الصدغية الجدارية: (1) انخساف شريان المشيمية الأمامي (2) انضغاط الشريان المخي الخلفي (3) انزياح جذع الدماغ للجهة المعاكسة وانضغاط الخيمة (4) انضغاط السبل القشرية النخاعية والسبل المرافقة الأخرى الذي يؤدي إلى خزل شقي بالنصف المقابل مع فرط المنعكسية الوترية وعلامة بابنسكي الموجبة (5) انفتاح اللوزة المخيخية مع انخساف الشريان المخيخي السفلي الخلفي (6) انضغاط العصب القحفي الثالث الذي يؤدي إلى توسع الحدقة والأطراف وشلل العصب الثالث (7) انفتاح الفص الصدغي إلى تحت الخيمة المخيخية (8) انزياح الاوعية المخية ونقطة سلفيان للجهة الإنسية.



hematoma, Intracerebral

- نزف داخل المخ يولد أوراماً دموية فيه، وهي تتولد
 (1) بالإصابة المباشرة.
 (2) بالاصطدام أو برجع الضربة.
 (3) بالنزف «التلقائي» بسبب امراض الشرايين او الدم.



hematoma, subdural

نزح الورم الدموي من تحت الجافية. لاحظ انزياح المخ والبطينات إلى الجهة المعاكسة.

- crossed h.(=h. cruciata)

خَذَرٌ شَقِيٌّ
مُتَصَالِبٌ.

- h. cruciata خَذَرٌ شَقِيٌّ مُتَصَالِبٌ. فقدان الحس من إحدى جهتي الوجه مع فقدان حسي الألم والحرارة على الجهة المعاكسة من الجسم ويتولد عن آفة وحشية في الجسر أو البصلة (النخاع المستطيل) تصيب الجذر الحسي لثلاثي التوائم والسبيل النخاعي المهادي.

- mesencephalic h., pontile h.

خَذَرٌ شَقِيٌّ

بِمَاغِيٍّ مُتَوَسِطِيٍّ؛ خَذَرٌ شَقِيٌّ جَسْرِيٍّ. الخدر الشقي الذي يتولد عن إصابة الجسر أو الدماغ المتوسط.

- spinal h.

خَذَرٌ شَقِيٌّ نَخَاعِيٍّ. الخدر الشقي الذي يتسبب عن إصابة النخاع الشوكي.

hemianopia

عَمَى شَقِيٍّ. نقص الإبصار

أو العمى التام في نصف الساحة البصرية لإحدى العينين أو لكليتهما وقد تستعمل للدلالة على العمى في إحدى نصفي الساحة البصرية أو في كليتهما.

- absolute h.

عَمَى شَقِيٍّ مُطْلَقٌ. عمى كامل

للضوء واللون والشكل في نصف الساحة البصرية.

- altitudinal h. (=horizontal h.)

عَمَى شَقِيٍّ

أَفْقِيٍّ. عمى كامل في نصف الساحة البصرية العلوية أو السفلية.

- bilateral h.

عَمَى شَقِيٍّ بِالْجِهَتَيْنِ. عمى شقي بالعينين.

- binasal h.

عَمَى شَقِيٍّ بِالْأَنْفَيْتَيْنِ. عمى

شقي بنصفي الساحة البصرية الأنفيتين.

- binocular h. (= bilateral h.) عَمَى شِقَائِي بِالْجَهْتَيْنِ.
- bitemporal h. عَمَى شِقَائِي بِالصُّدْغَتَيْنِ.
عمى شقي بنصفي الساحة البصرية الصديغيتين.
- complete h. عَمَى شِقَائِي تَامَ. عمى شقي يصيب
نصفي الساحة البصرية لكلا العينين.
- congruous h. عَمَى شِقَائِي مُتَطَابِق. عمى شقي
مماثل حيث يكون العيب في نصفي الساحة البصرية
للعينين المتناظرتين في الشكل والموقع والحجم
والشدة.
- crossed h. عَمَى شِقَائِي مُتَصَالِب. عمى شقي
أفقي يصيب نصف الساحة البصرية العلوية لإحدى
العينين والنصف السفلي للعين الثانية.
- heteronymous h. عَمَى شِقَائِي مُفَايِر. عمى
شقي يصيب نصفين متعاكسين من الساحتين
البصريتين للعينين فيصيب مثلاً النصف الأيسر
لإحدهما والنصف الأيمن للثانية.
- homonymous h. عَمَى شِقَائِي مُمَازِل. عمى
شقي يصيب نفس نصف الساحة البصرية لكل من
العينين إما النصف الأيمن أو الأيسر لكل منهما.
- incomplete h. عَمَى شِقَائِي نَاقِص. عمى
شقي يصيب أقل من نصف الساحة البصرية.
- incongruous h. عَمَى شِقَائِي غَيْر مُتَطَابِق. عمى
شقي مماثل ولكن العيب في أحد الشقين لا يشابه عيب
الشق الثاني إما بالموقع أو بالسعة أو بالشدة.
- lateral h. (= homonymous h.) عَمَى شِقَائِي
وَحْشِي. عمى شقي مماثل.
- nasal h. عَمَى شِقَائِي أَنْفِي. عمى شقي في
النصفين الأنفيين للساحتين البصريتين.
- quadrant h., quadrant h. (= qua-
drantanopia) عَمَى شِقَائِي رُبْعِي.
- relative h. عَمَى شِقَائِي نِسْبِي. عمى شقي
للألوان أو للشكل مع الاحتفاظ بالإبصار للضوء.
- temporal h. عَمَى شِقَائِي صُدْغِي. عمى شقي
في النصفين الصديغيين للساحتين البصريتين.
- unilateral h. عَمَى شِقَائِي بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ.
عمى شقي في إحدى العينين فقط.
- hemianopic أَعْمَى شِقَائِي. متعلق بالعمى
الشقي أو مصاب به.

- hemianopsia (= hemianopia) عَمَى
شِقَائِي.
- hemianosmia فَقْد حَسَن الشَّم الشَّقِي؛
خُشَامٌ شِقَائِي. فقدان حس الشم في أحد المنخرين.
- hemipraxis تَعَذُّرُ الأَدَاءِ الشَّقِي. لا أدائية
تصيب إحدى جهتي الجسم.
- hemiasynergia فَقْد التَّأَزُّرِ الشَّقِي. لا
تآزرية في إحدى جهتي الجسم.
- hemiataxia رَنَحٌ شِقَائِي. رنح يصيب إحدى
جهتي الجسم.
- hemiatheiosis كَنَعٌ شِقَائِي. كنع يصيب
إحدى جهتي الجسم.
- hemiatrophy ضُمُورٌ شِقَائِي. ضمور يصيب
إحدى جهتي الجسم أو نصف أحد الأعضاء أو
الأجزاء.
- facial h. ضُمُورٌ شِقَائِي وَجْهِي. ضمور أحد نصفي
الوجه والذي يكون مترقياً أحياناً ولا يعرف له سبب
واضح.
- progressive lingual h. ضُمُورٌ شِقَائِي لِسَانِي
مُتَرَقِّ. ضمور أحد نصفي اللسان الجانبيين المترقي.
- hemiballism (= hemiballismus)
رَفَنٌ شِقَائِي.
- hemiballismus رَفَنٌ شِقَائِي. تملعل حركي
شديد يشمل أحد جانبي الجسم وخاصة في الطرف
العلوي منه ويتولد عن إصابة مخربة لنوى الوطاء.
- hemicephalia (= hemicephalia) انْبِعْذَامُ
الْمُخِّ. لا مخية خلقية حيث يندم وجود المخ ومن
الممكن أن توجد العقد القاعدية ولكن جذع الدماغ
والمخيخ يكونان موجودين بصورة سوية.
- hemicerebrum (= cerebral
hemisphere) نِصْفُ كُرَّةِ الْمَخِّ.
- hemichorea رَقَصٌ شِقَائِي. رقص يصيب
إحدى جهتي الجسم.
- hemichromatopsia (= hemiachromat-
opsia) عَمَى الأَلْوَانِ الشَّقِي. عمى ألوان
يصيب نصف ساحة إحدى العينين أو نصفين
متماثلين في ساحتي العينين.

hemicorticectomy قَطْعُ نِصْفِ كُرَةِ المَخ. قطع نصف كرة المخ من دون العقد القاعدية كعلاج للصرع المستعصي.

hemicrania 1. صُدَاعُ نِصْفِيٍّ؛ الشَّقِيقَةُ. 2. انعدام شيق الدماغ. 1. صداع في إحدى جهتي الرأس. 2. الانعدام الخلقي لقسم من الدماغ.

hemicraniectomy قَطْعُ نِصْفِ القَحْف. قطع نصف قُبُ القحف عند الخط الناصف ومن الامام للخلف وقلبه للجانب للكشف عن أحد نصفي كرة المخ.

hemicraniosis فَزْطُ تَعْظُمِ نِصْفِ القَحْف. فرط تعظم أحد نصفي القحف أو الوجه مع إصابة الدماغ والذي قد يتولد عن الورم البطاني (ورم بطانة) للجافية.

hemicraniotomy (hemicraniectomy) قَطْعُ نِصْفِ القَحْف.

hemidecortication تَقْشِيرُ نِصْفِ المَخ. إزالة نصف القشرة المخية.

hemidysergia فَقْدُ التَّأَوُّرِ الشَّقِيقِي. خلل حركي في أحد جانبي الجسم.

hemidysesthesia خَلَلُ الإحْسَاسِ الشَّقِيقِي. خلل الإحساس في أحد جانبي الجسم.

hemidystrophy خَلَلُ شَقِيقِي. عدم تساوي تنامي جهتي الجسم.

hemiepilepsy صَرْعٌ شَقِيقِي. صرع يصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

hemigeusia تَذَوُّقٌ نِصْفِيٍّ. وجود حس الذوق في جهة واحدة من اللسان.

hemihypalgesia نَقْصُ حِسِّ الأَلَمِ الشَّقِيقِي. نقص الحساسية للألم في إحدى جهتي الجسم فقط.

hemihyperesthesia فَزْطُ الحِسِّ الشَّقِيقِي. فرط التحسس الشاذ في إحدى جهتي الجسم فقط.

hemihyperidrosis فَزْطُ التَغَرُّقِ الشَّقِيقِي. فرط التعرق الشاذ في إحدى جهتي الجسم فقط.

hemihypermetria فَزْطُ القِيَاسِ الشَّقِيقِي. فرط القياس في جهة واحدة من الجسم.

hemihypertonia فَزْطُ التَوَثُّرِ الشَّقِيقِي. فرط التوتر في جهة واحدة من الجسم.

hemihypesthesia نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِيقِي. نقص الحس الشاذ في إحدى جهتي الجسم.

hemihypoesthesia (= hemihypoesthesia) نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِيقِي.

hemihypometria نَقْصُ القِيَاسِ الشَّقِيقِي. نقص القياس في جهة واحدة من الجسم.

hemihypotonia نَقْصُ التَوَثُّرِ الشَّقِيقِي. نقص التوتر في إحدى جهتي الجسم.

hemilaminectomy إِسْتِنْصَالُ نِصْفِ الصَّفِيحَةِ الفَقْرِيَّةِ. استئصال نصف الصفيحة الفقرية من إحدى جهتي الفقرة.

hemilateral نِصْفِيٍّ جَانِبِيٍّ. يصيب أحد النصفين الجانبيين.

hemilesion آفَةٌ شَقِيقَةٌ. آفة في إحدى جهتي النخاع الشوكي فقط.

hemineurasthenia وَهْنٌ عَصْبِيٌّ شَقِيقِي. وهن عصبي يصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

hemipalgia أَلَمٌ عَيْنِيٌّ شَقِيقِي. ألم يصيب إحدى العينين ونصف الرأس الذي على جهتها.

hemipopia (= hemianopia) عَمَى شَقِيقِي.

hemiparalysis (= hemiplegia) شَلَلٌ شَقِيقِي. فَالْج.

hemiparanesthesia خَدَرٌ شَقِيقِيٌّ سَفْلِيٌّ. خدر النصف السفلي لإحدى جهتي الجسم.

hemiparaplegia شَلَلٌ شَقِيقِيٌّ سَفْلِيٌّ. شلل النصف السفلي لإحدى جهتي الجسم.

hemiparesis خَزَلٌ شَقِيقِيٌّ. وهن عضلي أو شلل جزئي يصيب إحدى جهتي الجسم.

hemiparesthesia مَذَلٌ شَقِيقِيٌّ. شذوذ حسي في إحدى جهتي الجسم.

hemiparetic خَزَلِيٌّ شَقِيقِيٌّ. منسوب إلى الخزل الشقي أو مصاب به.

hemiparkinsonism بَارْكَنْسونِيَّةٌ شَقِيقَةٌ. باركنسونية تصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

- hemiplegia** فالج: شلل شقي. شلل إحدى جهتي الجسم.
- **h. alternans hypoglossica** فالج تحت اللساني المقابل. فالج مع آفة العصب تحت اللساني في الجهة المقابلة.
- **alternate h.** فالج متناوب. شلل يصيب أحد أقسام الجسم في إحدى جهتيه وقسماً آخر منه في الجهة المقابلة.
- **alternating oculomotor h. (= Weber's syndrome)** الشلل النصفي المتصالب لمحرك العين.
- **ascending h.** فالج متسلق. شلل متسلق في أحد نصفي الجسم.
- **capsular h.** فالج محفطي. فالج ينتج عن آفة المحفظة الداخلية.
- **cerebral h.** فالج دماغي. فالج يتسبب عن آفة دماغية.
- **contralateral h.** فالج مقابل. فالج في جهة الجسم المقابلة لجهة الآفة الدماغية التي تسببه.
- **crossed h. (= alternate h.)** فالج متصالب.
- **h. cruciata (= alternate h.)** فالج متصالب.
- **facial h.** شلل وجهي شقي. شلل في أحد نصفي الوجه مع عدم إصابة الجسم بأي شلل.



hemiplegia

حالة فالج (شلل نصفي). يشاهد المريض يسير مع عدم حركة الذراع المصاب الذي يبقى قريباً من الجسم وهو منتن جزئياً عند المرفق.

- **faciobrachial h.** شلل وجهي عضدي شقي. شلل يصيب أحد نصفي الوجه والذراع العلوي بنفس الجهة من الجسم.
- **faciolingual** شلل وجهي لساني شقي. شلل نصف الوجه واللسان.
- **flaccid h.** فالج رخو. فالج مع فقدان توتر العضلات المشلولة وفقدان المنعكس الوتري فيها.
- **infantile h.** فالج طفلي. فالج يصيب الولدان ويتسبب عن نزيف أو خثار دماغي يحدث أثناء الولادة أو قبلها.
- **puerperal h.** فالج نفاسي. فالج يصيب النساء بعد الولادة مباشرة.
- **spastic h.** فالج تشنجي. فالج مع فرط توتر العضلات المشلولة وزيادة المنعكسات الوتريّة فيها.
- **spinal h.** فالج نخاعي. فالج يتولد نتيجة آفة في النخاع الشوكي.
- **Wernicke-Mann h.** فالج فزنيكة - مان. شلل شقي جزئي في أطراف إحدى جهتي الجسم.
1. فالجني 2. مفلوج. متعلق
- hemiplegic** بالفالج أو مصاب به.
- hemirachischisis** انشقاق السيساء
- النصفي.** انشقاق السيساء من دون تدلي النخاع الشوكي منه.

hemiscotosis (= hemianopia) عمى شقي.

hemiseptum نصف الحاجز. نصف أي حاجز خصوصاً الحاجز الشفاف للدماغ.

- **h. cerebri** نصف حاجز الدماغ. النصف الوحشي للحاجز الشفاف للدماغ.

hemispasm تشنج شقي. تشنج في إحدى جهتي الجسم فقط.

hemisphere نصف الكرة. نصف أية كرة وخصوصاً نصف الكرة المخية أو نصف الكرة المخية.

- **cerebellar h.** نصف الكرة المخيخية. قسم المخيخ على جانب دودته.

- **cerebral h.** نصف الكرة المخية. أي من نصفي كرة المخ المفصولين عن بعضهما في الوسط بالشق

المخي الطولاني ويحوي تجويف البطن الجانبي وتغطيه طبقة من المادة السنجابية وهي قشرته ويكون نصفاً كرة المخ أكبر قسم من دماغ الإنسان.

dominant h. - نصفُ الكُرّة السائد. نصف كرة المخ المتخصص أكثر من النصف الثاني في تنسيق الحواس والسيطرة على الكثير من وظائف الجسم مثل اللغة والكلام وتفضيل العمل بأحد الأعضاء المزدوجة كاليدين في الحركات الإرادية. ومثال ذلك نصف كرة المخ الأيسر في الأشخاص اليمينيين الذين يفضلون استعمال يدهم اليمنى كما يهيمن النصف الأيسر على وظيفة الكلام عند هؤلاء الأشخاص.

hemispherectomy - استئصالُ نصفِ الكُرّة. قطع نصف كرة المخ.

hemithermoanesthesia - فقدانُ حسِّ الحَرارة الشَّقِيّ. فقدان حس الحرارة في إحدى جهتي الجسم.

hemitonia (= hemihypertonia) - قَرْطُ التَوَثُّر الشَّقِيّ.

hemitremor - رُعاشُ شَقِيّ. رعاش في إحدى جهتي الجسم فقط.

hemivagotomy - غَلْبَةُ أَحَدِ المُبْهَمِينَ. فرط استثنائية العصب المبهم في إحدى جهتي الجسم.

hemorrhage - نَزْفٌ. تسرب الدم من أحد الأوعية.

brain h. - نَزْفٌ دِمَاعِيّ. نزف إلى داخل بنية الدماغ.

cerebral h. - نَزْفٌ مُخِيّ. نزف إلى داخل المخ.

epidural h. (= extradural h.) - نَزْفٌ خَارِجَ الجَافِيَةِ. نزف خارج الجافية.

extradural h. - نَزْفٌ خَارِجَ الجَافِيَةِ. نزف داخل القحف في الحيز خارج الجافية.

intracerebral h. - نَزْفٌ دَاخِلَ المُخ. نزف في داخل المخ.

Intramedullary h. (= hematomyelia) - نَزْفٌ نُخَاعِيّ.

subarachnoid h. - نَزْفٌ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّة. نزف داخل القحف في الحيز تحت العنكبوتية.

subdural h. - نَزْفٌ تَحْتَ الجَافِيَةِ. نزف مخي في الحيز تحت الجافية.

hepatalgia - أَلَمٌ كَبِدِيّ. ألم الكبد.

hepatolenticular - كَبِدِيّ عَدَسِيّ. نسبة إلى الكبد والنواة العدسية.

hereditary - وِرَاثِيّ. ما ينقل جينياً من الوالدين للأبناء.

heredity - وِرَاثَةٌ. انتقال الصفات والخلاط من الوالدين للأبناء.

autosomic h. - وِرَاثَةٌ جَسَدِيَّة. وراثه الصفات والخلاط بالجينات الموجودة في الصبغيات الجسدية.

sex linked h. - وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالْجِنْس. انتقال الصفات والخلاط بواسطة الجينات الموجودة في الصبغي الجنسي.

x-linked h. - وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِأَكْس. وراثه مرتبطة بالجنس تنتقل بواسطة الجينات الموجودة في الصبغي أكس.

heredoataxia - رَنَحٌ وِرَاثِيّ. رنح ينتقل بالوراثة.

heredodegeneration - تَنَكُّسٌ وِرَاثِيّ. تنكس ينتقل وراثياً بسبب مرض وراثي.

heredopathia atactica polyneuritiformis (= Refsum's disease) - اعتِلَالٌ وِرَاثِيّ رَنَحِي عَصَبِي مُتَعَدِّد.

hermaphrodite - خُنْثَى. (ج: خُنَائِي) شخص يتصف بالخنوثة.

hermaphroditism - خُنُوْتَةٌ. حالة تتصف بوجود أعضاء تناسلية ذكرية وانثوية لدى الشخص ومن الممكن أن تكون خنوثة حقيقية أو أن تكون خنوثة كاذبة حيث تظهر أعضاء أحد الجنسين أكثر وضوحاً من أعضاء الجنس الآخر.

hernia - فَتَقٌ. (ج: فَتَقَاتٌ). بروز عروية أو جزء من عضو أو نسيج خلال فتحة شاذة في الجسم.

brain h. - فَتَقٌ دِمَاعِيّ. تبارز جزء من الدماغ خلال فتحة شاذة أو عيب في القحف (كما يحدث بعد عملية استئصال ورم الدماغ) أو خلال منجل المخ أو خيمة المخ أو خلال تلمة الخيمة أو الثقبية العظمى.

cerebral h. (= brain h.) - فَتَقٌ دِمَاعِيّ.

herniation - إِنْفِثَاقٌ. توليد الفتق.

caudal transtentorial h. - إِنْفِثَاقٌ ذَنْبِيّ خِلَالِ

- الخَيْمَة. انفتاق الدماغ بالاتجاه الذنبي خلال فرجة الخيمة.
- **cingulate h.** **إِنْفَتَاقُ الْجَزَامِي.** انفتاق التليف الحزامي خلال منجل المخ.
- **disk h.** **إِنْفَتَاقُ الْقُرْص.** انفتاق النواة اللبية للقرص بين الفقر خلال الحلقة اللبية للقرص.
- **foraminal h.** **إِنْفَتَاقُ ثُقْبِي.** انفتاق خلال فتحة تشريحية مثل انفتاق اللوزة المخيخية خلال الثقبية العظمى أو انزياح السويقة المخية بالاتجاه الراسي خلال تلمة الخيمة.
- **h. of intervertebral disk (= disk h.)** **إِنْفَتَاقُ الْقُرْص.**
- **rostral transtentorial h.** **إِنْفَتَاقٌ مُنْقَارِي** خَلَالِ الخَيْمَة. بروز جزئي للفص الصدغي خلال تلمة الخيمة بسبب زيادة الضغط فوق الخيمة أثناء الولادة.
- **subfalcial h.** **إِنْفَتَاقٌ تَحْتَ الْمَنْجَل.** انفتاق الجهة الإنسية لنصف كرة المخ تحت الحافة السفلية لمنجل المخ.
- **tonsillar h.** **إِنْفَتَاقُ اللُّوْزَة.** بروز لوزة المخيخ خلال الثقبية العظمى وزيادة الضغط على النخاع المستطيل (البصلة).
- **transtentorial h.** **إِنْفَتَاقٌ خِلَالِ الخَيْمَة.** انزياح بعض البنيات الدماغية الإنسية للأسفل خلال تلمة الخيمة بسبب ضغط الكتلة فوق الخيمة على البنيات الواقعة أسفل منها وحتى على جذع الدماغ.
- **uncal h. (= transtentorial h.)** **إِنْفَتَاقُ الشَّص.**
- herpes** **هربس؛** خلا. مرض جلدي التهابي يولده فيروس الهربس (الحلا) يتصف بتكوين مجموعات من الحويصلات الصغيرة.
- **h. zoster** **هربس نطاقي؛** خلا نطاقي. خلا عدواني حاد يتحدد ذاتياً يسببه فيروس خاص ويصيب العقد الحسية ومناطق تعصيبها ويتصف بالم عصبى شديد على طول منطقة توزيع العصب المصاب مع مجموعات من الحويصلات الصغيرة المكدة فوق منطقة القطاع الجلدي الذي يناسب العصب المصاب وعادة ما يصيب قطاعاً جلدياً واحداً أو بضعة قطاعات وفي جهة واحدة من الجسم ومن الممكن أن يبقى الالم العصبى إلى ما بعد زوال المرض.
- **h. zoster ophthalmicus** **هربس نطاقي**

عَيْنِي. خلا منطقي يصيب فرع العصب العيني من العصب ثلاثي التوائم ويتصف بطفح جلدي حويصلي على قاعدة حمامية على طول مسار العصب المصاب ويسببه ذلك الم راح مع التهاب الملتحمة وأحياناً التهاب القرنية والصلبة أو القرنية والهدابى وشلل عضلات خارج العين والأطراف وتوسع الحدقة.

herpesencephalitis (= herpes encephalitis) **الْتِهَابُ الدُّمَاجِ الهَرَبَسِي (الْخَلْطِي).**

herpetophobia **رُهابُ الرُّوْاجِف.** الخوف من الزواحف والبرمائيات.

hersage **تَمْشِيطُ الْعَصَب.** تفريق الألياف العصبية للعصب المحيطي بشطر أغمارها وفصل الألياف عن بعضها في المنطقة المصابة من العصب.

heteresthesia **تَبَايُنُ الْحِس.** تباين درجة الحس في المناطق المتجاورة من الجلد على سطح الجسم.

heteroganglionic **رَابِطُ الْعُقْد.** ما يربط مختلف العقد الودية.

heterolalia (= heterophasia) **كَلَامٌ مُغَايِر.** كَلَامٌ مُغَايِر. النطق بكلمات غير التي يقصدها المتكلم.

heterophasis (= heterophasia) **كَلَامٌ مُغَايِر.**

heterophemia (= heterophasia) **كَلَامٌ مُغَايِر.**

heterosexuality **إِسْتِهَاءُ الْمُغَايِر.** انجذاب جنسي نحو الجنس المغاير.

heterosmia **شَمٌّ مُغَايِر.** حالة شم الروائح بخلاف رائحتها.

heterotopia **تَوَضُّعٌ مُغَايِر.** توضع شاذ لأجزاء أو أعضاء أو أنسجة في مواضع غير مواضعها الطبيعية في الجسم.

heterotrophia **إِضْطِرَابُ التَغْذِيَة.** اضطراب في تغذية الجسم.

hexobarbital **هِكْسُوْبَارِبِيْتَال.** دواء مسكّن يستعمل عن طريق الفم.

hiatus فُجْجَة. هوة أو فتحة أو فلق.

- neural h. الفُجْجَة العَصَبِيَّة. فتحة في الانبوب العصبي أثناء مرحلة انغلاقه في الجنين.

hiccup (= hiccup) فُواق.

hiccup فُواق. تقلص تشنجي لإرادي للحجاب الحاجز يولد بداية تنفسية سرعان ما تثبط بصورة فجائية بانسداد المزمار مولداً الصوت الخاص بالفواق.

hillock بُرُوز. ارتفاع صغير من بنية أو عضو.

- axon h. سُرَّةُ المِخْوَار. التوسيع المخروطي للمحوار عند نقطة اتصاله بجسم العصبون.

hilum نَقِير. انخساف أو وهدة في أحد الأعضاء يدخل أو يخرج من خلالها عصبه وأوعيته.

- h. of caudal olivary nucleus نَقِيرُ النَوَاةِ الزَيْتُونِيَّةِ الذَّنْبِيَّة. اللب الأبيض للنواة الزيتونية الذنبية للنخاع المستطيل (البصلة) والذي يبرز بصورة خاصة على جهتها الإنسية.

- h. of dentate nucleus نَقِيرُ النَوَاةِ المُسَنَّنَةِ. اللب الأبيض للنواة المسننة للمخيخ.

hindbrain (= rhombencephalon) الدِّمَاغُ المُوَخَّر.

hippocampus الحُصَيْن. ارتفاع مقوس من مادة سنجابية تمتد على طول قاع القرن الصدغي للبطين الجانبي. وهو يحوي سبع طبقات وهي ابتداء من ناحية البطين: البطانة العصبية، الشكوة، الطبقة الموجهة، الطبقة الهرمية، الطبقة الشعاعية، الطبقة الجوبية ثم الطبقة الجزيئية.

- h. minor (= calcar avis) الحُصَيْن الصغير؛ مِهْمَازُ الطَّيْرِ.

hippus (= pupillary athetosis) كَنَعُ الحَذَقَة. التوسع والتقلص النظاميان المبالغان والشاذان لبؤبؤ العين وغير المتعلقين بتغيرات شدة الضوء أو تثبيت العينين.

hirsutism شَعْرَانِيَّة؛ زَيْب. كثرة الشعر الشاذ عند النساء خصوصاً ذلك الذي يشبه نمط التوزيع الذكوري عند البالغين.

histamine هِسْتَامِين. مادة تتولد من نزع

كربوكسيل الهستيدين وتوجد في كل أنسجة الجسم وخاصة في الخلايا البدنية وخلايا الدم القعدة وتوجد بأعلى تركيز في الرثتين ولها تأثيرات عديدة في الجسم ومنها توسيع الشعيرات وتقليص معظم العضلات الملساء وتحفيز الإفرازات المعدية وتسريع القلب.

hodoneuromere قُسْنِمٌ عَصَبِيٌّ جَنِينِي. أحد قسيمات الجذع الجنيني مع عصبه النخاعيين وفروعهما.

holoprosencephaly عَدَمُ انْشِطَارِ الدِّمَاغِ المُقَدَّم. عيب خلقي يترافق مع عيب تنامي منتصف الوجه.

holorachischisis انْشِقَاقُ النُّخَاعِ الكَامِل. انشقاق السيساء التام مع شق في كل النخاع الشوكي.

holotonia (= holotetanus) تَوْتَرِيَّة شاملة. تشنُّج كل عضلات الجسم.

homalocephalus مُسَطَّحُ الرَّأْس. شخص ذو رأس مسطح.

homatropine هُومَاتروپِين. مادة كيميائية مضادة للفعل الكولينِّي تشبه الاتروبين في عملها ولكنها أضعف منه.

homeostasis الإِسْتِقْبَاب. حالة الثبات والاستقرار في حالات ووظائف الجسم السوية ويسيطر عليها الجهاز المركزي بمساعدة عملية التغذية الراجعة للوظائف المختلفة مثل ثبات درجة حرارة الجسم.

homeothermy ثَبَاتُ الحَرَارَةِ. ثبات درجة حرارة الجسم رغم التغيرات المختلفة في درجة حرارة البيئة المحيطة به.

homoeroticism اشتهاه المماثل؛ جُنُوسِيَّة؛ لِسَاط. جنسانية نحو شخص آخر من نفس الجنس.

homogenous مُتَجَانِس. مكون من عناصر أو عوامل متشابهة ومتماثلة في كل أقسامه.

homosexual لِسَاطِي؛ سِحَاقِيَّة؛ جُنُوسِي. توجه الجنسية نحو شخص آخر من نفس الجنس.

homosexuality انجذاب للمائل: لواط:

سحاق؛ جُثُوسِيَّة. انجذاب جنسي نحو شخص آخر من نفس الجنس.

- female h. (= lesbianism) سحاق.

homotype نَمَطٌ مِزَاجِي. تناظر عكسي

مع عضو مثل مثل تناظر اليدين أو القدمين.

hormone هُرمُون. مادة يولدها عضو

في الجسم أو بعض خلاياه ولها وظيفة تحكّمية معينة على وظائف عضو أو أعضاء أخرى في الجسم وتولده عادة إحدى الغدد الصماء ولكن قد تولد بعض أنواعه خلايا لاغذية خاصة.

horn قَرْن. بروز مدبب كقرون رؤوس

الحيوانات أو بنيات مشابهة لها.

- h. of Ammon (= hippocampus) قَرْنُ آمُون: الحَصِين.

- anterior h. of lateral ventricle (= cornu frontale ventriculi lateralis) القَرْنُ الجَبْهِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- anterior h. of spinal cord (= cornu ventrale medullae spinalis) القَرْنُ البَاطِنِي لِلنُّخَاع.

- dorsal h. of spinal cord (= cornu dorsale medullae spinalis) القَرْنُ الظَّهْرِي لِلنُّخَاع.

- frontal h. of lateral ventricle (= cornu frontale ventriculi lateralis) القَرْنُ الجَبْهِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- gray h's. of spinal cord (= gray columns) الأَعْمَدَةُ السِّنْجَابِيَّة.

- inferior h. of lateral ventricle (= cornu temporale ventriculi lateralis) القَرْنُ الصَّدْغِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- lateral h. of spinal cord (= cornu lateralis medullae spinalis) القَرْنُ الوَحْشِي لِلنُّخَاع.

- occipital h. of lateral ventricule (= cornu occipitale ventriculi lateralis) القَرْنُ القَذَالِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- posterior h. of lateral ventricle (= cornu occipitale ventriculi lateralis) القَرْنُ القَذَالِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- posterior h. of spinal cord (= cornu dorsalis medullae spinalis) القَرْنُ الظَّهْرِي لِلنُّخَاع.

- temporal h. of lateral ventricle (= cornu temporalis ventriculi lateralis) القَرْنُ الصَّدْغِي لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِي.

- ventral h. of spinal cord (= cornu ventralis medullae spinalis) القَرْنُ البَاطِنِي لِلنُّخَاع.

hydatid غُدَارِي. 1. كيسة عدارية
2. أية بنية كيسية.

- h. cyst كَيْسَةُ غُدَارِيَّة. انظر cyst.

hydranencephaly مَوَّةُ الرُّأْسِ اللَّامُخِّي: مَوَّةُ انعدام المخ. عدم وجود نصفى كرة المخ مع امتلاء حيز الرأس الذي يشغلانه عادة بالسائل الدماغي النخاعي.

hydrargyromania هَوَسٌ زُهْبَقِي الْمَنْشَأ. اختلال عقلي يسببه التسمم بالزئبق.

hydrencephalocele (= encephalocystocele) قَبْلَةُ الدِّمَاغِ المَوْهِيَّة: قَبْلَةُ دِمَاغِيَّة كَيْسِيَّة.

hydrencephalomeningocoele قَبْلَةُ دِمَاغِيَّة سَحَائِيَّة مَائِيَّة. بروز انفصالي خلال عيب قحفي للسحايا الممتلئة بالسائل الدماغي النخاعي وبعض المادة الدماغيّة.

hydrencephalus (= hydrocephalus) مَوَّةُ الرُّأْسِ.

hydrencephaly (= hydrocephalus) مَوَّةُ الرُّأْسِ.

hydrocephalocele (= encephalocystocele) قَبْلَةُ دِمَاغِيَّة كَيْسِيَّة.

hydrocephalus مَوَّةُ الرُّأْسِ. حالة توسع بطينات الدماغ وعادة ما يكون ذلك بسبب انسداد مجاري السائل الدماغي النخاعي والذي يترافق



hydrocephalus

مؤه الدماغ الطفلي يظهر تضخم راس الطفل وانحراف العينين للأسفل مع تفارق بروز الجمجمة.



hydrocephalus

مؤه الدماغ: مقطع محوري بالمونان (resonator) يظهر توسع البطينين الجانبيين.

مع تجمع السائل في داخل القحف الذي يكون عادة بضغط عالٍ ولكنه قد يكون بضغط سوي. وهو

عادة ما يتصف بضخامة الرأس وبروز الجبهة وضمور الدماغ والتخلف العقلي والاختلاجات. وقد يكون المرض خلقياً أو مكتسباً مع بداية مفاجئة أو بطيئة متروية.

مؤه الرأس المستطرق: communicating h. **مؤه الرأس المتصل.** مؤه الرأس الذي لا يترافق مع انسداد مجرى السائل الدماغى النخاعي الذي يمر خارجاً من الدماغ إلى القناة النخاعية بحرية ولكنه لا يمتص فيتجمع.

مؤه الرأس الفراغى. مؤه الرأس h. ex vacuo الذي يتولد ليملا الفراغ الذي ينتج عن ضمور الدماغ.

مؤه الرأس الإنسدادي. noncommunicating h. (= obstructive h.)

مؤه الرأس الخفي. normal-pressure occult h. إسوي الضغط: مؤه الرأس إسوي الضغط الخفي. مؤه الرأس الذي يتصف بالخرف والرنج ولس البول مع وجود دليل بالتصوير الدماغى الهوائى على مؤه الرأس وهو يتصف بضخامة البطينات المترافق مع عدم كفاءة الاحياز تحت المنكبوتية ولكن مع إسوية ضغط السائل النخاعي الشوكي. ويظهر عادة عند منتصف العمر وفي الشيخوخة.

مؤه الرأس الإنسدادي. مؤه الرأس obstructive h. الذي يتولد عن انسداد مجرى السائل الدماغى النخاعي.

مؤه الرأس الأذني. مؤه الرأس otitic h. الذي يتولد عن انتشار التهاب الأذن الوسطى إلى داخل تجويف القحف.

مؤه الرأس الثانوي. مؤه الرأس secondary h. الرأس الذي ينتج عن التهاب السحايا.

مؤه الرأس. hydrocephaly (= hydrocephalus)

عَطَشٌ لِلْمَاءِ. العطش للماء. hydrodipsia

هَوَسٌ شرب الماء. hydrodipsomania نوبة صرعية تتصف بالعطش الذي لا يروى.

قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ كَيْسِيَّةٌ. hydroencephalocele (= encephalocystocele)

hydromeningitis التَّهَابُ السَّحَايَا المَوْهِي. التهاب السحايا مع انصباب مصلي.

hydromeningocele قَيْلَةٌ سَحَائِيَّةٌ مَوْهِيَّةٌ. بروز السحايا خلال عيب في القحف أو العمود الفقري مكوناً كيساً تحوي السائل الدماغي النخاعي.

hydromicrocephaly صِغَرُ الرَّأْسِ المَوْهِي. صغر الرأس مع كثرة السائل النخاعي الدماغي الشاذة.

hydrophobia 1. رُهَابُ المَاءِ 2. دَاءُ الكَلْبِ. 1. الخوف والفصص والكام عند محاولة شرب الماء في الطور العصبي الحاد من داء الكلب والذي يتسبب عن ألم تشنج البلعوم والحنجرة 2. داء الكلب.

hyoscyamine هَيُوسِيَامِين. قلواني مضاد للفعل الكولينيني وذو فعل واستعمالات مشابهة للأتروبين ولكنه ذو تأثير مركزي ومحيطي أشد منه.

hypacusia, hypacusis ضَعْفُ السَّمْعِ. (= hypoacusis)

hypalgesia نَقْصُ حِسِّ الأَلَمِ. قلة الإحساس بالألم.

hypalgia (= hypalgesia) نَقْصُ حِسِّ الأَلَمِ.

hypanakinesia (= hypokinesia) نَقْصُ الحَرَكَةِ.

hypanakinesis (= hypokinesia) نَقْصُ الحَرَكَةِ.

hyperactivity فَرْطُ النُّشَاطِ. فرط فعالية الجسم كعرض لاختلال دماغي.

purposeless h. فَرْطُ النُّشَاطِ اللأَمْسَهْدَفِ. تتولد في بعض أمراض الدماغ العضوية فعالية نشطة من غير هدف الاستجابة لأبسط المنبهات.

hyperacusis جِدَّةُ السَّمْعِ؛ فَرْطُ السَّمْعِ. حالة تسمع فيها الأصوات عالية أي أعلى من شدتها الحقيقية.

hyperaffectivity فَرْطُ العَاطِفِيَّةِ. فرط الحس العاطفي لأبسط المنبهات.

hyperalgesia فَرْطُ التَّأَلُّمِ؛ شِدَّةُ التَّأَلُّمِ. فرط حساسية الألم.

- auditory h. فَرْطُ التَّأَلُّمِ السَّمْعِيِّ. حالة التآلم الشديد عند سماع الأصوات.

- muscular h. فَرْطُ التَّأَلُّمِ العَضَلِيِّ. حالة التآلم العضلي الشديد عند القيام بأبسط الحركات.

hyperalgia (= hyperalgesia) فَرْطُ التَّأَلُّمِ.

hyperanacinesia (= hyperkinesia) فَرْطُ الحَرَكَةِ؛ تَحَرَّك.

hyperanakinesia (= hyperkinesia) فَرْطُ الحَرَكَةِ؛ تَحَرَّك.

hyperaphia (= tactile hyperesthesia) فَرْطُ حِسِّ اللَّمْسِ.

hyperarousal شِدَّةُ اليَقَظَةِ. حالة فرط التوتر النفسي والفيزيولوجي والذي يتصف بنقص التحمل للألم والارق والتعب والتوتر العصبي.

hypercenesthesia فرط الابتهاج؛ فَرْطُ الانْتِشَرَاخِ. حالة الشعور بالانتشراح والبهجة المفرطة.

hypercinesia (= hyperkinesia) فَرْطُ الحَرَكَةِ؛ تَحَرَّك.

hypercryalgia فَرْطُ الحَسَّاسِيَّةِ لِلْبَرْدِ. فرط حس البرد.

hypercryesthesia (= hypercryalg-esia) فَرْطُ الحَسَّاسِيَّةِ لِلْبَرْدِ.

hyperdynamia فَرْطُ النُّشَاطِ العَضَلِيِّ. فرط الديناميكية.

hyperenergia فَرْطُ الطَّاقَةِ. فرط النشاط الجسمي العام أو الطاقة.

hypererethism فَرْطُ الهَيُوجِيَّةِ. الهيجية المفرطة.

hyperergasia (= hyperergia) فَرْطُ النُّشَاطِ. فرط الفعاليات الوظيفية الجسمية الشاذة.

hyperesthesia فَرْطُ الحِسِّ. فرط الحس للمنبهات.

- acoustic h. (= hyperacusis) جِدَّةُ السَّمْعِ؛ فَرْطُ حِسِّ السَّمْعِ.

- auditory h. (= hyperacusis) جِدَّةُ السَّمْعِ: فرطُ حسِّ السَّمْعِ.
- cerebral h. فرطُ الجِسْمِ المُخِّي المنشأ. فرط الحسِّ بسبب آفة مخية.
- gustatory h. (= hyperguesia) جِدَّةُ الذَّوْقِ: فرطُ الذَّوْقِ.
- muscular h. فرطُ الجِسْمِ العَضَلِيِّ. فرط حس العضلات للآلام والتعب.
- olfactory h. (= hyperosmia) فرطُ الشَّمِّ.
- oneiric h. فرطُ الجِسْمِ النَّوْمِيِّ. فرط الحس أو فرط التألم أثناء النوم أو عند الاحتلام.
- optic h. فرطُ الجِسْمِ البَصَرِيِّ. فرط حس العين للضوء.
- tactile h. فرطُ الجِسْمِ اللمسي. فرط حس اللمس.
- hyperesthetic مفرطُ الحسِّ. منسوب لفرط الحس أو مصاب به.
- hypergenitalism (= hypergonadism) فرط وظيفية الغدة التناسلية: فرط القنديّة.
- hypergeusesthesia (= hyperguesia) جِدَّةُ الذَّوْقِ: فرطُ حسِّ الذَّوْقِ.
- hypergeusia جِدَّةُ الذَّوْقِ: فرطُ حسِّ الذَّوْقِ. زيادة الحساسية للذوق.
- hypergia (= hypoergia) نقصُ النَشَاطِ. قلة فعالية الجسم الشاذة.
- hypergnosis فرطُ الإدراك. مبالغة الإدراك بحيث يوسع الشخص الفكرة إلى قصة فكرية فلسفية كما يحدث في الذهان الكبريائي (الزور).
- hypergonadism فرط وظيفية الغدة التناسلية: فرطُ القنديّة. حالة تنتج عن أو تتصف بفرط فعالية الغدد التناسلية الشاذة مع فرط نمو الأعضاء التناسلية وتناميها المبكر.
- hyperhedonia فرطُ التَلَذُّذِ. فرط السرور المرضي بالفعاليات المناسبة.
- hyperirritability فرطُ الهَيُوجِيَّةِ. فرط الاستثارية المرضي والاستجابة حتى للمنبهات الضعيفة جداً.

- hyperkinesia فرطُ الحَرَكَاتِ. فرط الفعاليات الحركية أو النشاط العام.
- hypermania هُوسٌ مُفرط. حالة هوس مفرط مع توتر حاد وتوهان وكثرة الكلام وفرط الحركة.
- hypermetria فرطُ القِيَاسِ. حالة تتصف بالحركة العضلية المفرطة التي تتعدى حدود الهدف المقصود منها.
- hypermimia فرطُ الإيماء. كثرة الإيماء والتعابير أثناء الكلام.
- hypermnnesia جِدَّةُ الذَّاكِرَةِ. حدة الذاكرة وتزاحم الذكريات.
- hypermnestic حَادُ الذَّاكِرَةِ. 1. شخص حاد الذاكرة أو ما يتعلق بحدة الذاكرة 2. مفرط الفعاليات الدماغية والفكرية.
- hypermotility فرطُ التَحَرُّكِ. فرط الحركة المرضي أو كثرتها كما يحدث في الجهاز الهضمي.
- hypermyotonia فرطُ التَوَثُّرِ العَضَلِيِّ. فرط توتر العضلات.
- hypermyotrophy فرطُ التَّنَامِي العَضَلِيِّ. فرط نمو العضلات.
- hyperorexia فرطُ الشَّهْيَةِ. زيادة الشهية الشاذة.
- hyperosmia فرطُ حسِّ الشَّمِّ. فرط حس الشم.
- hyperosphresia (= hyperosmia) فرطُ حسِّ الشَّمِّ.
- hyperostosis فرطُ التَّعْظُمِ. ضخامة العظام.
- h. corticalis generalisata فرطُ التَّعْظُمِ القشري الشَّامِلِ: فرط تعظم الجمجمة الشامل. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية يتصف بتصلب عظام الجمجمة والفك والترقوة والاضلاع والعظام الطويلة مع ارتفاع فسفتاز الدم ويبدأ عادة عند سن البلوغ ويؤدي أحياناً إلى ضمور العصب البصري والصمم الإدراكي بسبب انضغاط العصبين البصري والسمني بعظام قاعدة القحف المتخنة.
- h. cranii فرطُ تَعْظُمِ القَحْفِ. فرط التعظم الذي يشمل عظام القحف.

فَرْطُ تَعَظُّمٍ بِاطْنِ الْجَبْهِيِّ. **h. frontalis Interna** -
فَرْطُ تَعَظُّمٍ وَسَمَكِ اللُّوْحِ الدَّاخِلِيِّ لِلْعَظْمِ الْجَبِيّ وَالَّذِي
يَكُونُ عَادَةً مُتَرَاكِبًا مَعَ فَرْطِ الْإِشْعَارِ وَالْبَدَانَةِ وَغَالِبًا مَا
يَصِيبُ النِّسَاءَ عِنْدَ سِنِ الْيَاسِ.

فَرْطُ النَّالَمِ. فَرْطُ الْاسْتِجَابَةِ **hyperpathia**
لِلْمُنْبَهَاتِ الْمُؤَلِّمَةِ.

فَرْطُ النَّشَاطِ الْعَقْلِيِّ. **hyperphrenia**
1. هِيَاجٌ فِكْرِي شَدِيدٌ 2. نَشَاطٌ فِكْرِي شَدِيدٌ.

فَرْطُ الْإِسْتَقْطَابِ. زِيَادَةُ **hyperpolarization**
الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّحْنَتَيْنِ الْكَهْرِبَايَتَيْنِ عَلَى جِهَتِي غِشَاءِ
الْخَلِيَّةِ أَوْ الْعَصَبِ مِمَّا يَزِيدُ شِدَّةَ الْجَهْدِ الْكَهْرِبَايِيِّ
عَبْرَهُ.

مُفَرْطُ النَّشَاطِ الْعَقْلِيِّ. يَتَصَفُّ **hyperpragic**
بِفَرْطِ انْشِغَالِ الْفِكْرِ.

فَرْطُ الْفَعَالِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. فَعَالِيَّةٌ **hyperpraxia**
عَقْلِيَّةٌ مَفْرُطَةٌ شَاذَةٌ.

فَرْطُ الْإِسْتِغْرَاقِ. فَرْطُ التَّرَكِيزِ **hyperprosexia**
عَلَى نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ اسْتِثْنَاءِ كُلِّ الْفِكَارِ الْآخَرِ.

فَرْطُ الْإِنْعِكَاسِيَّةِ. مِبَالِغَةٌ **hyperreflexia**
الْمُنْعَكَسَاتِ.

فَرْطُ الْإِنْعِكَاسِيَّةِ الْمُسْتَقَلَّةِ. **h. autonomic** -
نُوبَاتٌ انْتِيَابِيَّةٌ مِنْ ارْتِفَاعِ ضَغْطِ الدَّمِ وَبُطْءِ الْقَلْبِ
وَتَعَرُّقِ الْجَبْهَةِ وَالصَّدَاعِ الشَّدِيدِ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الْمَثَانَةِ
وَالْمُسْتَقِيمِ وَتَحَدُّثِ عِنْدَ إِصَابَةِ الْأَعْصَابِ الْحَشْوِيَّةِ فَوْقَ
مُسْتَوًى تَقَرُّعِهَا.

فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ. فَرْطُ **hypersensibility**
التَّحَسُّسِ لِمَادَةٍ أَوْ مِنْهُ مَعِينٌ.

مُفَرْطُ الْإِحْسَاسِ. 1. مُصَابٌ **hypersensitive**
بِفَرْطِ الْإِحْسَاسِ الشَّاذِ 2. مَنْ يَتَصَفُّ بِقَابِلِيَّةِ
الْاسْتِجَابَةِ الْخَاصَةِ أَوْ الْعَامَةِ بِأَعْرَاضٍ وَعَلَامَاتٍ
نُوعِيَّةٍ خَاصَّةٍ عِنْدَ مَلَامَسَةِ بَعْضِ الْمَوَادِّ الَّتِي لَا
تُؤْدِي إِلَى آيَةٍ اسْتِجَابَةٍ عِنْدَ الْأَشْخَاصِ الْأَسْوِيَاءِ أَوْ
عِنْدَ تَطْبِيقِهَا عَلَى جِزءٍ مِنْ أَجْسَامِهِمْ.

فَرْطُ التَّحَسُّسِ. حَالَةٌ **hypersensitivity**
الْاسْتِجَابَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ 'بَعْضِ الْمَوَادِّ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تُولَدُ
اسْتِجَابَةً مُنَاعِيَةً مَفْرُطَةً لَهَا.

فَرْطُ الْجِنْسَانِيَّةِ. فَرْطُ الرِّغْبَةِ **hypersexuality**
أَوْ الْفَعَالِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ الشَّاذَةِ.

فَرْطُ النَّوْمِ. كَثْرَةُ النَّوْمِ. **hypersomnia**

hypersomnolence (= hypersomnia)
فَرْطُ الْوَسْنِ. اضْطِرَابُ النَّوْمِ الَّذِي يَشْمَلُ كَثْرَةَ
النَّوْمِ وَفَرْطَ الْوَسْنِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ.

فَرْطُ التَّوَثُّرِيَّةِ. فَرْطُ التَّوَتَرِ **hypersthenia**
أَوْ الْقُوَّةِ.

فَرْطُ تَوَثُّرِ الْوُدِيِّ. **hypersympathicotonus**
حَالَةٌ فَرْطِ تَوَتَرِ الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ الْوُدِيِّ.

فَرْطُ هَيُوجِيَّةِ الْجِهَازِ **hypertarachia**
الْعَصَبِيِّ. فَرْطُ هِيَاجِ الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ.

فَرْطُ التَّحَسُّسِ الْخَرَّارِيِّ. **hyperthermalgesia**
فَرْطُ التَّحَسُّسِ لِلْحَرَارَةِ.

فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ **hyperthermesthesia**
الْخَرَّارِيَّةِ. فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ لِلْحَرَارَةِ.

فَرْطُ التَّوَثُّرِ. حَالَةٌ فَرْطِ التَّوَتَرِ **hypertonia**
الْعَضَلِيِّ وَزِيَادَةُ مَقَاوِمَةِ الْعَضَلَاتِ لِلتَّمْدِيدِ الْمُنْفَعِلِ.

نَقْصُ **hypesthesia (= hyposthesia)**
الْحِسِّ.

مُنُومٌ. 1. عَامِلٌ يُولَدُ النَّوْمَ **hypnagogic**
2. يَحْدُثُ قَبْلَ النَّوْمِ كَالْهَلَسِ الَّذِي يَحْدُثُ قَبْلَ النَّوْمِ
أَوْ فِي بَدْنِهِ.

مُنُومٌ. (ج: مُنُومَاتٌ). عَامِلٌ **hypnagogue**
يُولَدُ النَّوْمَ أَوْ النَّعَاسَ.

الْمُ نَوْمِي. أَلَمْ يَحْدُثْ أَثْنَاءَ النَّوْمِ. **hypnalgia**

نَوْمِي. مُتَعَلِّقٌ بِالنَّوْمِ أَوْ مُحَرِّضٌ لَهُ. **hypnic**

تَحْلِيلُ تَنْوِيمِي. تَحْلِيلُ **hypnoanalysis**
نَفْسِي بَعْدَ تَنْوِيمِ الْمَرِيضِ.

تَخْدِيرُ تَنْوِيمِي. **hypnoanesthesia**
التَّخْدِيرُ بِوَسْطَةِ التَّنْوِيمِ.

مُنُومٌ. عَامِلٌ يَحْرُضُ عَلَى **hypnogenic**
النَّوْمِ أَوْ حَالَةِ تَنْوِيمِيَّةٍ.

مُنُومٌ. **hypnogenous (= hypnogenic)**

شَبِيهُةُ التَّنْوِيمِ. حَالَةٌ شَبِيهِةٌ بِالتَّنْوِيمِ **hypnoid**
أَوْ بِحَالَةِ التَّنْوِيمِ.

سَبَخٌ؛ نَوْمٌ إِنْتِيَابِيٌّ؛ تَغْفِيقٌ. **hypnolepsy**
انْظُرْ **narcolepsy**.

hypnopedi تَعَلُّمٌ نَوْمِي. التعلّم أثناء النوم
كسماع التسجيلات الموسيقية وتعلّمها.

hypnophobia رُهابُ النَّوْم. الخوف غير
الطبيعي من النوم.

hypnosia نُعَاسٌ مُسْتَحْكِم. نعاس شديد
ومستمر ولا يمكن التحكم فيه.

hypnosis تَنْوِيم. حالة تتصف بتغيير وعي
الشخص والتي يولدها لديه شخص أو أشخاص
آخرون وتتصف بتركيز الانتباه والزيادة المفرطة
في الاستجابة للإيحاءات والأوامر والإرشادات
وتثبيط أي نكران لديه للمعتقدات وإيقاف قدرته
على التحكم المنطقي الدقيق أو السيطرة على
مداركه العامة والخاصة، وعلى قدرته في التحكم
في حركاته وجعله يستجيب لما يوحى له من أفكار
أو بما يؤمر بالقيام به من حركات بصورة لاإرادية.

hypnotherapy الْمُعَالَجَةُ بِالتَّنْوِيم. معالجة
الأمراض بالتنويم.

hypnotic 1. مُنَوِّم 2. تَنْوِيمِي. دواء وعامل
منوّم أو ما يتعلق بالتنويم.

hypnotism (= hypnosis) تَنْوِيم إِيحَائِي.
تنويم بالإيحاء.

hypnotization تَنْوِيم. عملية توليد التنويم
لدى الشخص.

hypnotize نَوِّم. يقوم بعملية التنويم.

hypoactive قَاصِرُ النَّشَاط؛ خامل. شخص أو
عضو قاصر النشاط.

hypoactivity قُصُورُ النَّشَاط. قصور نشاط
وفعالية العضو أو إحدى الوظائف.

hypoacusis ضَعْفُ السَّمْع. قلة السمع
وضعفه أو وقره.

hypoadrenalism قُصُورُ الكُظُر. قصور
فعالية الغدة الكظرية.

hypoadrenocorticism قُصُور قَشْرَةِ الكُظُر.
قلة إفراز قشرة الغدة الكظرية الشاذ أو المرضي
كما في داء أديسون.

hypoaffective بَلِيدُ العَاطِفَة. ضعيف
الشعور العاطفي.

hypoalgesia (= hypalgesia) نَقْصُ حِسِّ
الألم.

hypoboulia ضَعْفُ الإرَادَة. ضعف المحفّزات
والدوافع والإرادة.

hypobulia (= hypoboulia) ضَعْفُ
الإرَادَة.

hypochondria (= hypochondriasis)
المُرَاق.

hypochondriac مَمرُوق. مريض مصاب
بالمراق.

hypochondriacal (= hypochondriac)
مَمرُوق.

hypochondriasis المُرَاق. اضطراب عقلي
يتصف بانشغال البال بالوظائف الجسمية والشك
بإحساساته الطبيعية السوية كحس ضربات قلبه أو
التعرق أو حركات أمعائه أو بآية اختلالات بسيطة
في جسمه كالآلام البسيطة أو تورّم غدة ليفية
والشك بأنها علامات أمراض خطيرة لديه وتحتاج
إلى رعاية طبية خاصة ولن تنفع معه نصائح
الأطباء وتطمينه على سلامته وإنما يزيده ذلك من
الشك والإلحاح في طلب عناية طبية أكثر.

hypocinesia (= hypokinesia) نَقْصُ
الحَرَكَ.

hypodynamia نَقْصُ القُوَّة. نقص قوة
الجسم ودينميته.

hypoequilibrium نَقْصُ الحِسِّ للدَوَار
وللتوازن. نقص الحس للمنبهات التي تولد الدوار
عادة أو نقص أو فقدان الاستجابة لتغيرات أوضاع
الجسم وللنوازن والذي يتولد عن الحس بفقدان
التوازن.

hypoergasia نَقْصُ التَفَاعُلِيَّة؛ نَقْصُ النَّشَاط.
القلة الشاذة للفعاليات الوظيفية.

hypoergic نَاقِصُ التَفَاعُلِيَّة. شخص مصاب
بقلة نشاطاته وضعف استجاباته للمنبهات.

hypoergy نَقْصُ التَفَاعُلِيَّة. الضعف الشاذ
في النشاط والاستجابة.

hypoesthesia نَقْصُ الحِسِّ. قلة الشعور
بالمنبهات.

- acoustic h. (= hypoacusis) ضَعْفُ السَّمْعِ.
- auditory h. (= hypoacusis) ضَعْفُ السَّمْعِ.
- gustatory h. (= hypogeusia) ضَعْفُ الذَّوْقِ.
- tactile h. (= hypopselaphesia) ضَعْفُ جِسْمِ اللَّفْسِ.

hypoesthetic نَاقِصُ الحِسِّ. منسوب إلى ضعف الحس أو مصاب به.

hypofunction قُصُور وظيفي. قلة الوظيفة وضعفها.

hypogeusia, hypogeusesthesia ضَعْفُ الذَّوْقِ. ضعف حس الذوق.

hypohypnotic خَفِيفُ النُّوْمِ. حالة النوم غير العميق.

hypokinesia نَقْصُ الحَرَكَ. حالة قلة الحركة أو ضعف الفعاليات الحركية.

hypokinesis (= hypokinesia) نَقْصُ الحَرَكَ.

hypokinetic نَاقِصُ الحَرَكَ. مصاب بقلّة الحركة أو بقصورها.

hypomania هَوَسٌ خَفِيفٌ. حالة شذوذ مزاجي شبيه بالهوس ولكنه أخف منه حدّة.

hypomelancholia سَوْدَاوِيَّةٌ خَفِيفَةٌ. حالة تشبه السوداوية ولكنها أخف منها.

hypometria قُصُورُ القِيَاسِ. حالة تنصف بقلّة الحركة العضلية التي لا تمكن العضو المحرك من الوصول إلى هدفه.

hypomnesia ضَعْفُ الذَّاكِرَةِ. ضعف الذاكرة الشاذ.

hypomotility نَقْصُ الحَرَكَ. قلة حركة أي عضو وضعفها.

hypomyotonia قلة التَوَثُّرِ العَضَلِيّ. قلة ونقص توتر العضلات.

hyponoia بِلَادَةٌ عَقْلِيَّةٌ. تلبد الفعاليات الفكرية والعقلية.

hypopallessthesia نَقْصُ حِسِّ الإِهْتِرَازِ. الضعف الشاذ بحس الإمتزاز.

hypophonia ضَعْفُ التَّصَوُّيْتِ. ضعف قدرة المريض على التصويت ويكاد أن يكون كلامه همساً.

hypophrenia تَخَلُّفٌ عَقْلِيٌّ. يشمل كل أنواعه، العته والبله والأفن.

hypophyseal (= hypophysial) نُخَامِيّ.

hypophysectomy اسْتِنْصَالُ النُّخَامِيَّةِ. استئصال الغدة النخامية.

hypophysial نُخَامِيّ. منسوب للجهاز البابي النخامي.

hypophysiportal بَابِيٌّ نُخَامِيّ. منسوب للجهاز البابي النخامي.

hypophysioprivic نَاقِصُ الإِفْرَازِ النُّخَامِيّ. منسوب إلى نقص إفراز النخامى أو مصاب به.

hypophysiotropic نُخَامِيّ التَّوَجُّه. عامل يؤثر على فعالية الغدة النخامية.

hypophysis النُّخَامِيَّةُ. الغدة النخامية بقسميها العصبي والغدي.

- h. cerebri النُّخَامِيَّةُ. الغدة النخامية.

hypophysitis إلتِهَابُ النُّخَامِيَّةِ. التهاب الغدة النخامية.

hypopituitarism قُصُورُ النُّخَامِيَّةِ. قلة أو توقف وظائف النخامية بسبب مرضي أو لإزالتها جراحياً أو بتسفيتهما.

hypopotentia نَقْصُ القُوَى. ضعف جهد الشخص أو ضعف الجهد والفعالية الكهربائية للدماغ.

hypopraxia نَقْصُ الأدَائِيَّةِ. نقص الفعالية الشاذ.

hypoprosody رَتَابَةُ الكَلَامِ. الكلام الخالي من التباين في شدته أو نظمه أو نغمته والذي يجري بوتيرة واحدة.

hypopselaphesia (= tactile hypoe-sthesia) ضَعْفُ جِسْمِ اللَّفْسِ. نقص أو فتور حس اللمس.

hyporeactive ناقص التفاعلية. متصف بالضعف الشاذ في استجاباته للمنبهات.

hyporeflexia ضعف الإنعكاسية. ضعف المنعكسات.

hyposensitive ناقص التحسس. يتصف بالضعف الشاذ في إحساساته.

hyposensitivity نقص التحسس. الضعف الشاذ للتحسس بالمنبهات.

hyposensitization (= desensitization) إنقاص التحسس. إنقاص التحسس أو إزالته.

hyposexuality ضعف الرغبة الجنسية.

hyposmia ضعف الشم. ضعف حس الشم الشاذ.

hyposomnia أرق. أنظر insomnia.

hyposphresia (= hyposomia) ضعف التنشؤ الجسمي.

hyposthenia (= weakness) ضعف؛ وهن.

hypostheniant (= debilitant) مُضعف.

hyposthenic ضعيف. شخص مصاب بالضعف.

hyposympathicotonus قصور التوتر الودي؛ تخاذل الودي. نقص توتر الجهاز العصبي الودي المستقل.

hyposynergia نقص التآزرية. ضعف التناسق العضلي.

hypothalamic وُطائي. متعلق بالوطاء أو منسوب إليه.

hypothalamotomy بضع الوطاء. بضع الأقسام الخلفية الوحشية للوطاء في معالجة بعض الأمراض النفسية.

hypothalamus الوطاء. القسم البطني من الدماغ البيني الذي يكون قاع البطين الثالث وجزءاً من جداره الجانبي ويشمل تشريحياً الباحة أمام البصرية والسبيل البصري والتصالبة البصرية والأقسام الحلمية والحديبة الرمادية والقمع والنخامية العصبية. وتعتبر النخامية العصبية من

الناحية الفيزيولوجية مستقلة عنه وتقوم النوى الوطائية بالوظائف القشرية الدماغية البينية التي تنشط وتتحكم وتنسق الفعاليات المستقلة المحيطة وأنشطة الغدد الصماء والعديد من الوظائف الجسدية كتنظيم توازن الماء في الجسم ودرجة حرارته والنوم وتناول الغذاء وتطوير الخواص الجنسية الثانوية، كما يفرز الوطاء هرموني الأوسيتوسين والفازوبرسين والعديد من العوامل المحررة التي تتحكم في وظائف النخامية الغدية.

hypothyria بلاذة الإنفعالات. قلة الإحساس والتوتر العاطفي.

hypothyrmism قصور التوتة. ضعف نشاط التوتة.

hypothyroidism قصور الدرقية. ضعف نشاط الغدة الدرقية.

hypotonia نقص التوتر. حالة نقص توتر العضلات الهيكلية ونقص مقاومتها للتمديد المنفعل.

benign congenital h. نقص التوتر الخلقي الحميد. حالة في الولدان تتصف بالضعف والترهل منذ ولادتهم وتنتج عن الضعف العضلي غير المترقي.

h. oculi نقص توتر المقلة. نقص الضغط داخل المقلة.


hypotonic ناقص التوتر. محلول ذو توتر أقل من توتر المحلول المعياري.

hypsarrhythmia لانظمية مفرطة؛ اضطراب النظم المفرط. لانظمية مخطط كهربائية الدماغ الشاذة التي تشاهد أحياناً في الأطفال وتتصف بموجات عشوائية عالية الفولطية وبطيئة مع سفاة والتي تبدأ من عدة بؤر وتنتشر إلى كل باحات القشرة وتترافق مع نوبات تشنجية ورمع عضلي وغالباً ما تترافق مع التخلف العقلي.

hepsicephaly (= oxycephaly) تسنم الرأس.

hypsokinesis ترنح خلقي قياسي. ترنح المريض أو انحناؤه للخلف وسقوطه عند وقوفه الذي يشاهد في حالات الشلل الرعاشي ومتلازمة الرعاش العضلي.

hysteralgia (= metralgia) ألم الرجم.



hypothalamus

الاتصالات الواردة والصادرة إلى الوطاء: (1) للبصلة الشمعية (2) السبيل البصري النخامي العلوي (3) السبيل الأحنوبي النخامي (4) اللاودي القحفي (5) الودي (6) عصب وربي (7) عقدة بين الفقرات (8) فرع أبيض (9) فرع سنجابي (10) سلسلة العقد الودية (11) اللاودي العجزي (12) النخاع العجزي (الشدف 4-2) (13) النخاع الصدري (الشدف 1-12) (14) النواة الظهرية للعصب المبهم (15) نواة العصب الوجهي (16) الحزمة الطولانية الظهرية (17) السبيل الحلمي المهادي (18) من الحصين (19) القيد.

hysteria هِسْتِيرِيَا؛ هُرَاع. 1. مرض يصيب النساء غالباً ويتصف بشكاوى جسدية متعددة من دون أن تكون لها أسباب مرضية جسدية وتترافق عادة بأعراض محاكية للأعراض العصبية كالعرة والشرد والشلل وعدم الحركة وانعدام الصوت أو النساوة 2. عصاب هستيري.

- anxiety h. هِسْتِيرِيَا القَلَق. اضطراب رهابي يتصف برهاب معين من دون سبب ظاهر ويؤدي إلى تجنب كل الحالات التي قد يوجد فيها أي أثر للعامل الرهابي ويسيطر هذا الخوف على كل حياة المصاب وفعالياته.

- conversion h. هِسْتِيرِيَا تحويلية. اضطراب يتصف بأعراض من دون وجود أي مرض عضوي مسبب لها ومن الممكن أن يشمل أعراضاً حسية أو حركية أو حشوية كالشلل أو العرة أو المذل أو التقيؤ أو النساوة أو الشرد أو تضاعف الشخصية أو فقدانها.

- convulsive h. هِسْتِيرِيَا إختلاجية. هستيريا تحويلية تكون فيها نوبات شبه صرعية كابرز عرض من أعراضها.

- dissociative h. هِسْتِيرِيَا تفارقية. هستيريا تتصف بالنساوة وفقدان الشخصية وعدم معرفتها.

- fixation h. هِسْتِيرِيَا التَثَبُّث. هستيريا تركز فيها الأعراض على مرض عضوي معين كاستمرار السعال العصبي بعد الإصابة بالشاموق

- grand h. (= major h.) الهِسْتِيرِيَا الكَبِيرَة.

- major h. الهِسْتِيرِيَا الكَبِيرَة. هستيريا تتصف بنوبات شبيهة بالصرع مع عرض عاطفي مثير.

- minor h. الهِسْتِيرِيَا الصَّغِيرَة. نوع من الهستيريا التحويلية التي يحتفظ فيها المريض بوعيه أثناء نوبات الاختلاج.

- monosymptomatic h. هِسْتِيرِيَا أَحَادِيَّةُ العَرَض. هستيريا تتصف بعرض واحد كالصرع مثلاً من دون أية أعراض عقلية.

- traumatic h. هِسْتِيرِيَا رَضِيَّة. هستيريا تحويلية تظهر بعد إحدى الإصابات الجسمية.

hysteric هِسْتِيرِي؛ هُسْتِر. متعلق بالهستيريا أو مصاب بها.

hysterics هُسْتَرَة؛ هِسْتِيرِيَّة. مصطلح يطلق على نوبات الانفجار العاطفي الشديد.

hysterodynia (= metrodynia) وَجَعُ الرَّجَم.

hysteroepilepsy هِسْتِيرِيَا صَرْعِيَّة. نوبات هستيرية تشابه نوبات الصرع.

I

1. **عِلَاجِيّ 2. تَطْبِيبِيّ.** iatric -

1. منسوب للدواء 2. منسوب للطبيب.

عِلَاجِيّ الْمَنْشَأُ: تَطْبِيبِيّ الْمَنْشَأُ. iatrogenic

ما يتولد عن العلاج الطبي للمريض.

نَشْبِيّ: نَوْبِيّ. ictal منسوب إلى النوبة أو يتصف

بها أو ناتج عنها أو نوبة الصرع.

فِكْرَة. idea صورة عقلية دماغية.

فِكْرَة أَصِيلَة: فِكْرَة ذَاتِيَّة. - autochthonous i.

الْمَنْشَأُ. فكرة مثابرة تنبع من لاوعي الشخص تظهر

له كأنها غرست فيه من مصدر خارجي.

فِكْرَة إِجْبَارِيَّة. - compulsive i. فكرة تقتحم

فكر الشخص وتعاوده وتثبت فيه بالرغم من إرادته

وبالرغم من معرفته بأسبابها وقد تجبره أحياناً على

القيام بأعمال غير مرغوبة.

فِكْرَة سَائِدَة. - dominant i. فكرة مرضية شاذة

تتحكم في كل أفعال المصاب وأفكاره.

فِكْرَة ثَابِتَة. - fixed i. فكرة ملازمة للشخص تلون

كل أفعاله وتتحكم فيها، ولا يمكنه تغييرها حتى عند

معرفته بأسبابها.

فِكْرَة - imperative i. (= compulsive i.)

مُسْتَحْوَذَة: فكرة قهرية؛ وسواس.

فِكْرَة مُسْتَحْوَذَة: فِكْرَة مُقْحَمَة. - obtrusive i. فكرة

وسواسية تعاود إقحام نفسها باستمرار في تفكير

الشخص بالرغم من معرفته بعدم صلاحيتها وعدم

انسجامها مع نفسه.

فِكْرَة مَرْجِعِيَّة. - i. of reference, referential i.

افتراض الشخص بأن أقوال وأفعال الآخرين تتعرض

له. أو أن جميع الأحداث الخارجية في محيطه تعود

عليه بالشر والضرر كالمطر أو الرعد مما يؤدي به بالشعور بأنها كلها موجهة ضده.

مِثَالِيّ. ideal معيار الكمال الذي يتمناه الشخص ويسعى لتحقيقه.

مِثَالِيَّةُ الذَّات. - ego i. الصورة التي يتمنى الشخص

تحقيقها لذاته والتي يسعى للوصول إليها غالباً ما

يضع نصب عينيه شخصية - وغالباً ما تكون أحد

والديه - يعتقد ما مثالية ويحاول تقليدها.

إِفْتِكَار. ideation تكوين الأفكار والمفاهيم.

إِفْتِكَارِيّ. ideational منسوب للافتكار أو

مولد عنه.

1. **إِسْتِعْرَاف 2. تَغْيِينُ** identification

الهَوِيَّة. عملية دفاعية لا واعية ينمط الشخص فيها

نفسه بنمط شخص آخر.

هُوِيَّة. identity مجموعة الصفات التي تعرف

الشخص بنفسه والتي يتعرف الآخرون عليه

بواسطتها.

هُوِيَّةُ الذَّات. - ego i. الشعور بوحدة الذات وتكامل

شخصيتها.

هُوِيَّةُ الْجِنْس. - gender i. إدراك الشخص ومعرفته

بجنسه فيما إذا كان ذكراً أم أنثى وذلك بمعرفة

خواصه الجنسية ومعاملة الآخرين له.

فِكْرِيّ الْمَنْشَأُ. ideogenetic متعلق بالفعاليات

العقلية والفكرية ومولد بتأثيرها.

حَرَكَِيّ فِكْرِيّ (= ideomotor) ideokinetic

التَحْفِيز.

حَرَكَة فِكْرِيَّةُ التَّحْفِيز. ideomotion حركة

عضلية لاإرادية ولا انعكاسية ولكنها محرّضة بفكرة

سائدة.

ideomotor حَرَكَيْ فِكْرِي التَّخْفِيز. متعلق بحركة لإرادية تحفزها فكرة سائدة.

ideomuscular عَضَلِيْ فِكْرِي التَّخْفِيز. توليد حركة عضلية لإرادية بتأثير فكرة أو هلاس.

ideophobia رُهَابُ التَّفْكِير. الخوف المرضي من الأفكار أو من التفكير.

ideophrenia (= delirium) هَذْيَان.

idiocy عَقَّة. تخلف عقلي شديد يقل فيه حاصل الذكاء عن 25.

- absolute i. (= profound i.) عَقَّة مُطْلَق. عته شديد.

- amaurotic i. عَقَّة كُمْفِي. اسم لانواع من امراض اختزان الشحوم ويكون النوع الخلقي منه مميتاً بعد حوالي الشهر الواحد من الولادة أما النوع الذي يصيب الاطفال فهو مرض تاي ساكس والنوع الذي يصيب الاحداث يظهر حوالي سن العاشرة ويؤدي إلى الموت هند البلوغ. وهي كلها اضطرابات تنكسية عصبية.

- athetotic i. (= athetosis) كَنْع.

- Aztec i. (= microcephalic i.) عَقَّة صَغِيرُ الرَّأْس.

- cretinoid i. عَقَّة فُذْمَانِي. فدامة مع تخلف عقلي شديد.

- Kalmuk i. (= mongolian i.) عَقَّة مُقُولِي.

- microcephalic i. عَقَّة صَغِيرُ الرَّأْس. تخلف عقلي وخيم مع صغر الرأس.

- mongolian i. عَقَّة مُقُولِي. تخلف عقلي شديد يرافق متلازمة داون.

- moral i. عَقَّة تَصَرُفِي؛ عَقَّة أَخْلَاقِي. سوء الاخلاق والتصرف الشديدين من دون تخلف عقلي.

- profound i. عَقَّة وَخِيم. تخلف عقلي شديد.

- spastic amaurotic axonal i. (= infantile neuroaxonal dystrophy) عَقَّة كُمْفِي

مُخَوَارِي تَشْنُجِي؛ حَثَلُ مَحَوَارِي عَصْبِي طُفُولِي.

idioglossia تَلْفُظٌ مُعَيَّب؛ غَضْفَضَةٌ. تلفظ ناقص غير مفهوم.

idihypnotism تَنْوِيمٌ ذَاتِي. تنويم محرّض ذاتياً.

idio-imbecile مَعْتَوَةٌ أَيْلَهُ. مصاب بتخلف عقلي بين البله والعتة.

idiolalia لُغَةٌ ذَاتِيَّة. النطق بكلمات خاصة يضعها الشخص نفسه ولا يفهمها غيره.

Idiologism تُطَقُّ ذَاتِي الْمَعْنَانِي. التلفظ بكلمات غير مفهومة إلا للمتكلم نفسه.

idiomuscular عَضَلِيْ تَلْقَانِي. حالة عضلية ذاتية من دون أي تأثير عصبي عليها وتحصل عادة في العضلات المتنكسة فقط.

idioreflex مُنْعَكِسٌ ذَاتِي الْإِخْدَاش. منعكس في أحد الأعضاء يتولد عن سبب من داخل العضو نفسه.

idiospasm تَشْنُجٌ مُوَضَّع. تشنج في منطقة محدودة.

idiot مَعْتَوَةٌ. مصاب بالعتة.

- i.-savant مَعْتَوَةٌ عَالِم. شخص شديد التخلف العقلي في الكثير من النواحي وبالرغم من ذلك يمتلك ملكات عقلية معينة ممتازة جداً في بعض النواحي كالذاكرة الحادة أو القدرة على حل المسائل الرياضية أو المهارة الموسيقية.

idiotrophic ذاتي التغذية. من يتمكن من اختيار غذائه بنفسه.

idiotropic (= egocentric) أَنَانِي؛ ذَاتِي التَّرْكِيز.

illness, emotional مَرَضٌ عَاطِفِي. يطلق على المرض النفسي غير العضوي.

illness, mental (= mental disorder) مَرَضٌ نَفْسِي.

illness, psychosomatic (= psychosomatic disorder) مَرَضٌ نَفْسِي جَسَدِي.

illusion انْخِدَاع. انطباع حسي خاطيء أو سوء تفسير للمنبهات الحسية الحقيقية.


illusional انْخِدَاعِي. متعلق بالانخداع أو متصف به.

image صُورَةٌ. رسم أو إدراك شبيه بالاحساس بجسم أو بمادة حقيقية.

- body i. صُورَةُ الْجِسْم. الصورة المجسمة التي

- يدركها الشخص لجسمه والتي تسجل في قشرة مخه
بإدراك الأوضاع المختلفة والمتغيرة دوماً لجسمه.
- eidetic i.** **صُورَةٌ تَذَكُّرِيَّةٌ.** إبصار صوري دقيق
لأجسام أو أحداث سبق رؤيتها في الماضي.
- memory i.** **جِسْمٌ تَذَكُّرِيٌّ.** صورة حسية
يتذكرها الشخص لإحساسات سابقة.
- mental i.** **صُورَةٌ فِكْرِيَّةٌ.** إدراك فكري
لأجسام أو لمادة كما تصورها الحواس.
- motor i.** **صُورَةٌ حَرَكِيَّةٌ.** النموذج الدماغي
المنسق لحركات الجسم المحتملة.
- sensory i.** **صُورَةٌ حِسِّيَّةٌ.** صورة منسقة تتكون
في الدماغ بواسطة إحدى الحواس أو عدة حواس
مشتركة.
- imbalance** **عدم التوازن.** 1. عدم المقدرة
على المحافظة على التوازن عند الوقوف 2. عدم
التوازن بين العضلات.
- autonomic i.** **عدم التوازن المُسْتَقْلِي.**
1. رنج مستقلي 2. أي اضطراب للجهاز العصبي
المستقل.
- sympathetic i. (=vagotonia)** **عدم التوازن**
الوَدِّي؛ غَلَبَةُ المُبْهِم.
- vasomotor i.** **عدم التوازن الوِعَائِي الحَرَكِي.**
اضطراب الجهاز العصبي المستقل المحرك للأوعية.
- imbecile** **أَبْلَه.** شخص مصاب بالبله.
- imbecility** **الْبَلَه.** تخلف عقلي متوسط أو
شديد يكون حاصل الذكاء فيه بين 25-49
- moral i. (=moral insanity)** **بَلَهٌ أَخْلَاقِيٌّ.**
- impiramine** **إِيمِپِرَامِين.** دواء مضاد للاكتئاب
ويستعمل أيضاً في بول الفراش عند الأطفال.
- implantation, nerve** **غَرْسُ العَصَب.** عملية
غرس جزء من عصب في محفظة عصب آخر
متنكس.
- impression** **انطباع.** تأثير تولده المنبهات
أو العوامل الخارجية على الفكر والجسم والحواس.
- impression, basilar** **انطباعٌ قَاعِدِيٌّ؛**
تسطُّح القَاعِدَةِ. أنظر platybasia
- impulse** **دُفْعَةٌ.** (ج: دفعات). 1. دفعة شديدة

- مفاجئة 2. الدفعة أو النبضة العصبية.
- nerve i. (=neural i.)** **العملية**
الكهركيمائية التي تنتقل على طول الألياف العصبية.
- impulsion** **إِنْدِفَاع.** الطاعة العمياء للدوافع
الداخلية من دون أي اعتبار لقبولها من قبل الآخرين
من دون أي اعتبار لقبولها من قبل الآخرين أو
الذات النفسية وتشاهد عند الأطفال أو عند البالغين
ضعيفي الحالات النفسية.
- inactivate** **بَطَّلَ؛ عَطَّلَ.** يعطل فعالية
العضو أو فعالية عامل آخر كالدواء مثلاً.
- inadequacy** **قُصُور؛ عَدَمُ الكِفَايَةِ.** حالة
أو صفة الشخص القاصر أو غير الكفوء.
- inadequate** **عَرِيْمُ الكِفَايَةِ؛ غَيْرُ كَافٍ.**
1. ناقص النضوج النفسي أو الاجتماعي ولا يتمكن
من التلاؤم مع مجتمعه 2. عامل قاصر عن تنفيذ
وظيفة أو عملية معينة.
- inappetence** **1. انْعِدَامُ الشَّهْيَةِ 2. انْعِدَامُ**
المُبَادَرَةِ. 1. انعدام الشهية للطعام 2. انعدام
الرغبة في العمل أو في القيام بأية وظيفة فكرية أو
جسدية.
- incallosal** **عَرِيْمُ الثَّنْفِي.** عديم الجسم الثفني
والذي يتصف عادة بالتخلف العقلي.
- incest** **غَشَبَانُ المَحَارِم.** الاتصال الجنسي
مع من تحرّم الشرائع أو التقاليد الاجتماعية الزواج
منهم من ذوي القربى.
- incisura** **ثُلْمَةٌ.** (ج: ثلَم). قطع أو ثلم أو
انخساف على حافة العظم أو أية بنية عصبية أو
غيرها.
- i. verebelli anterior** **الثُلْمَةُ المُخِيخِيَّةُ**
الْأَمَامِيَّةُ. ثلثة واسعة على السطح الأمامي للمخيخ
تحتلها الأكمة السفلية والسويقة المخيخية العلوية.
- i. cerebelli posterior** **الثُلْمَةُ المُخِيخِيَّةُ**
الخَلْفِيَّةُ. ثلثة بين نصفي كرة المخيخ على وجهه
الخلفي تحوي منجل المخيخ.
- i. fastigii** **الثُلْمَةُ الأَوْجِيَّةُ.** أخدود مستعرض
على السطح البطني للصفحة المخيخية للمخيخ
الجنيني المتنامي.



Impulse, nerve

الدفعات العصبية التي تتولد في الياف العصبية عند تنبيهه بمنبهات ذات شدة مختلفة (من 1.0 إلى 0.0001). ويمثل انقطاع الخط الأبيض الفترة التي وضع فيها التنبيه. كما يلاحظ أن فترة الكمون تزداد طولاً عند تناقص شدة التنبيه. ويلاحظ أيضاً أن المنبه إذا الشدة (0.001) هو أضعف منه يولد الاستجابة ولذلك يسمى المنبه الأصغري. وتمثل الخطوط البيضاء المتقطعة في اسفل كل تسجيل فترة (0.2) الثانية.

- **الثَّلَمَةُ الجَبْهِيَّةُ.** ثلثة في الحافة فوق **i. frontalis** - الحجاجية للعظم الجبهي تتحور أحياناً إلى شكل ثقبية يمر من خلالها العصب والأوعية فوق الجبهيّة.

- **الثَّلَمَةُ أَمَامَ القَذَالِيَّةِ.** ثلثة **i. preoccipitalis** بالقرب من النهاية الخلفية للحافة السفلية الوحشية لنصف كرة المخ وهناك خط يوصلها بالشق الجداري القذالي يحدد الفصين الصدغي والجداري عن الفص القذالي.

- **الثَّلَمَةُ الصَّدْغِيَّةُ.** شق صغير بين **i. temporalis** معقف التفيف جنب الحصين وقمة الفص الصدغي.

- **ثُلَمَةُ الحَيَمَةِ المُخَيخِيَّةِ.** **i. tentorli cerebelli** فتحة في القسم الأمامي من المخيخ مكونة من الحافة الأمامية الحرة للخيمة والسرّج الظهري للوتدي ويحتلها بصورة رئيسية الدماغ المتوسط والقسم الأمامي

للسطح العلوي لدودة المخيخ.

سَلْسُ. عدم المقدرة على **incontinence** التحكم في الإفراغ، كإفراغ البول أو البراز.

- **fecal i.** سَلْسُ البراز. عدم السيطرة على عضلات المصرّة الشرجية مما يولد إفراغ البراز والفازات بصورة لاإرادية.

- **intermittent i.** سَلْسُ مُتَقَطِّع. فقدان التحكم في إفراغ البول عند الحركة المفاجئة أو عند الضغط على المثانة بسبب قطع السبيل الإرادي للبول فوق المركز القطني.

- **overflow i.** سَلْسُ المُفْرِض. سلس البول بسبب ضغط البول المتبقي في المثانة بعد انقباضها الأقصى.

- **paradoxical i. (=overflow i.)** سَلْسُ مُتَنَاقِض. سلس البول بسبب

- **paralytic i.** سَلَسٌ شَلَلِيّ. سلس البراز والبول
بسبب شلل المصبرات الشرجية والمثانية والناجم عن
آفة المراكز القطنية.

- **passive i.** سَلَسٌ لَا فَاعِل. سلس البول عندما
تكون المثانة ممتلئة ولا يمكنها إفراغ بولها بالطريقة
الطبيعية ولكن البول يتقاطر بمجرد الضغط على
المثانة.

- **rectal i. (=fecal i.)** سَلَسٌ الْبِرَاز. المصاب بسلس البول

- **urinary i.** سَلَسٌ الْبُول. فشل التحكم السوي
بالمصبرات المثانية والإحليلية مما يؤدي إلى تقاطر
البول اللاإرادي المستمر.

incontinent مَسْلُوس. المصاب بسلس البول
أو البراز.

incontinentia (=incontinence) سَلَسٌ.

incoordination لَا تَنَاسُق. عدم أو قلة
إحكام الحركات العضلية أو فشل الأعضاء من العمل
المنسق.

incus السَّغْدَان. العظيمة الوسطى بين عظيما
الأذن الوسطى الثلاث.

index 1. مَقْسَب. (ج: مَنَاسِب) 2. السَّبَابَة.
1. كمية غير محددة عادة هي النسبة بين كميتين
مقيستين ومضروبة بمئة (100). 2. إصبع الكف
الثاني المجاور للإبهام.

- **cephalic i.** الْمَقْسَبُ الرَّأْسِيّ. مئة مرة لأعظم
عرض للراس مقسومة على أعظم طول له.

- **cephalo- orbital i.** الْمَقْسَبُ الرَّأْسِيّ الْحَاجَجِيّ. مئة مرة لأعظم
سعة للقحف مقسومة على سعة
الحجاجين.

- **cephalospinal i.** الْمَقْسَبُ الرَّأْسِيّ الْخُخَاعِيّ. نسبة مساحة الثقبة العظمى بالامتار المربعة إلى سعة
الجوف القحفي بالسنتيمترات المكعبة.

- **cerebral i.** الْمَقْسَبُ الدِّمَاغِيّ. نسبة أعظم عرض
لتجويف القحف إلى أعظم قطر أمامي خلفي له.

- **cerebrospinal i.** الْمَقْسَبُ الدِّمَاغِيّ الْخُخَاعِيّ. الرقم الذي نحصل عليه عند ضرب الضغط الدماغى
الخخاعي الأخير بكمية السائل المسحوب في عملية بزل
النخاع وقسمته بعد ذلك على ضغطه الأولي.

- **cranial i.** الْمَقْسَبُ الْقُحْفِيّ. أكبر عرض للقحف
مضروباً بمئة ومقسوماً على طوله.

indifference, belle سَدَرٌ جَمِيل. عدم مبالاة
المريض وعدم اهتمامه بأعراضه أو بإعاقته
ويشاهد ذلك في بعض أنواع الهستيريا.

indolent 1. قليل الإيلام 2. بطيء النُمو.
1. يولد قليلاً من الألم أو لا يولد ألماً بالمرّة.
2. بطيء النمو كالورم البطيء.

induction of anesthesia تحريض التخدير.
في التبخير الاستنشاقى، هي الفترة من بدء التخدير
حتى مرحلة التخدير الجراحى الكامل.

infantilism الطَّفَالَة. حالة تتصف بدوام
صفات وخواص الطفولة لدى البالغين وتتصف
بالتخلف العقلي وقصور تنامي الأعضاء التناسلية
وغالباً، ولكن ليس دائماً، بالقزامة.

- **Brissaud's i. (=Infantile myxedema)** طِفَالَة
بريساود: الوُدْمَة الطِفْلِيَّة الْمُخَاطِيَّة.

- **cachetic i.** طِفَالَة دَنَفِيَّة. طِفَالَة تتولد من
العدوى أو التسمم المزمن.

- **dysthyroidal i.** طِفَالَة إِغْتِلَالِ الدَّرَقِيَّة. طِفَالَة تتولد عن عيب في وظائف الغدة الدرقية.

- **hypophysial i.** طِفَالَة نُخَامِيَّة. طِفَالَة تتولد
عن قلة إفراز هرمونات النمو وموجهة الغدد التناسلية
التي تفرزها النخامية الغدية.

- **sexual i.** طِفَالَة جُنْسِيَّة. تخلف التطور الجنسي
كالذي يحدث في الحثل الشحمي التناسلي.

- **universal i.** طِفَالَة عَامَّة. طِفَالَة مع قزامة عامة
وغياب الصفات الجنسية الثانوية.

infarction إِخْتِشَاء. توليد الاحتشاء أو
الاحتشاء نفسه والذي يعني منطقة نخر تخثري في
النسيج بسبب إقفاره الذي يتولد عن انسداد دورته
الدموية وغالباً ما يكون بسبب خثرة أو صمّة في
الأوعية.

- **cerebral i.** إِخْتِشَاء دِمَاجِيّ. حالة إقفار دماغي
تولد عيباً عصبياً مزمناً في مواضع توزيع أحد شرايين
الدماغ.

infection عَدَوِيّ. مهاجمة الجراثيم للجسم
وتكاثرها في أنسجته ومن الممكن أن تبقى العدوى
متوضعة أو تنتشر إلى باقى أنحاء الجسم.

infecundity عَقْم. عدم الإلقاح.

inferiority, psychopathic (=antisocial personality) شخصية معتلة اجتماعياً؛ شخصية لا اجتماعية.

infiltration, paraneural (=paraneural anesthesia) إِرْتِشَاح حَوْل الْعَصَب.

inflammation إِلْتِهَاب. استجابة موضعية وقائية تولدها إصابات الأنسجة أو تخريبها وتستهدف القضاء على العامل المخرب أو تحديده أو عزله مع الأنسجة المخربة. ويتصف عادة بالآلم والإحمرار والحرارة والتورم وفقدان أو تقليل وظيفة العضو أو النسيج المصاب.

infrapsychic تحت مستوى الشعور؛ لاشعوري. تلقائي دون الوعي النفسي.

infundibuloma وَرَم الْقَمْع. ورم قمع الوطاء.

infundibulum قَمْع. بنية بشكل ممر قمعي الشكل. ويستعمل الاصطلاح بمعفرده للدلالة على قمع الوطاء المكون من البارزة الناصفة وساق القمع.

I. hypothalami قَمْعُ الْوُطَاء. كتلة قمعية الشكل أمام الحدة الرمامية تمتد إلى النخامى العصبية وتسمى أيضاً سوقة النخامى.

inheritance وَرَاثَة. اكتساب الصفات والخواص بانتقالها من الآباء للأبناء.

Inhibition تَنْبِيْط. 1. إيقاف أو تأخير. 2. في التحليل النفسي هو أبة عملية أو وظيفة. 3. في التحليل النفسي هو الامتناع الواعي أو اللاشعوري للدرجات أو للدوافع.

- antitdromic I. (=recurrent I.) تنبيط معاكس للمسيرة؛ تنبيط راجع.

- associative I. تنبيط ترابطي. 1. حصر أو إضعاف ترابط نفسي أو وظيفي ثابت بتوليد ترابط جديد يترايط مع الترابط القديم. 2. مقاومة توليد أي ترابط جديد يحل محل ترابط قديم راسخ.

- autogenous I. تنبيط ذاتي المنشأ. تنبيط انعكاسي يحدث عند نقطة التنبيه.

- central I. تنبيط مركزي. تنبيط تنبيه العصبونات الذي يتم في داخل الجهاز العصبي المركزي.

- end-product I. تنبيط بالمحصول النهائي. تنبيط الفعلية بالمحصول النهائي الذي تولده وهو تنبيط بالتغذية الراجعة (الارتجاع).

- feedback I. تنبيط بالارتجاع؛ تنبيط بالتغذية الراجعة. تنبيط العمليات الأولية للفعلية بالمحصول النهائي الذي تولده.

- proactive I. تنبيط بالتأثير الرجعي. تنبيط تثبيت التعلم الحديث بتأثير التعلم القديم.

- reciprocal I. تنبيط متبادل. تنبيط مجموعة من العضلات بتنبيه العضلات الضادة لها وهذه خاصية تتولد عن التعصيب المتبادل للعضلات.

- retroactive I. تنبيط الإكزي الرجعية. تنبيط التعليم الحديث لذكرى التعلم القديم.

- Wedensky I. تنبيط ودنسكي. حصر جزئي للتوصيل في العصب يمكنه توصيل النبضات بطيئة التردد من دون تمكنه توصيل النبضات سريعة التردد.

iniencephaly إِنْقِدَالُ الدِّمَاغ. عيب خلقي يتصف بضخامة الثقبية العظمى وغياب التواءات الصفيحية والشوكية للفقرات العنقية والصدرية وأحياناً القطنية أيضاً مع نقص عدد الفقرات واندغامها الشاذ وبذلك يحتل الدماغ والقسم الأكبر من النخاع الشوكي تجويفاً واحداً كبيراً مشتركاً بينهما.


1. حَقْن. 2. إِحْتِقَان. 1. إدخال سائل بالضغط إلى الأنسجة أو الأوعية. 2. امتلاء أو تجمع مفرط للدم في أحد الأنسجة أو الأعضاء.

injury إَصَابَة. ضرر أو تخريب لأحد الأنسجة أو الأعضاء وغالباً ما يطلق على الضرر المولد من تأثير خارجي.

Innate (= 1. hereditary 2. inborn) 1. مُتَأَصِّل؛ مَوْزُوث. 2. وِلَادِي؛ خَلْقِي.


innervation تَعَصِيب. 1. توزيع ونشر الأعصاب في أحد أعضاء الجسم أو في أحد أقسامه

تَفْصِيْلٌ مُزْدَوِجٌ. تَمْصِيْبُ أَحَدِ أَقْسَامِ - double I. تَجْهِيْزُ أَحَدِ أَقْسَامِ الْجِسْمِ بِالطَّاقَةِ الْعَصْبِيَّةِ أَوْ الْجِسْمِ بِنَوْعَيْنِ مِنَ الْأَعْصَابِ مِثْلِ الْأَعْصَابِ الْوُدِيَّةِ وَاللَّادِيَّةِ أَوْ الْمُسْتَقْلَةِ وَالْجَسَدِيَّةِ.



Innervation

التَمْصِيْبُ الْحَسِّي لِجِلْدِ الْأَطْرَافِ الْعُلْوِيَّةِ: (1) فَوْقَ التَّرْقَوِيِّ (2) الْإِبْطِيِّ (3) الْعَصَبُ الْعَضْدِيُّ الْجِلْدِيُّ الْخَلْفِيُّ (فَرْعٌ مِنَ الْعَصَبِ الْكَبِيرِيِّ) (4) الْعَصَبُ الْعَضْدِيُّ الْجِلْدِيُّ السُّفْلِيُّ الْوَحْشِيُّ (فَرْعٌ مِنَ الْعَصَبِ الْكَبِيرِيِّ) (5) الْعَصَبُ الْوَرَبِيُّ الْعَضْدِيُّ وَالْعَصَبُ الْعَضْدِيُّ الْجِلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ (6) الْعَصَبُ السَّاعِدِيُّ الْجِلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ (7) الْعَصَبُ السَّاعِدِيُّ الْجِلْدِيُّ (فَرْعٌ مِنَ الْكَبِيرِيِّ) (8) الْعَصَبُ السَّاعِدِيُّ الْجِلْدِيُّ الْوَحْشِيُّ (نَهَائِيَّةُ الْعَصَبِ الْعَضْلِيِّ الْجِلْدِيِّ) (9) الْعَصَبُ الْكَبِيرِيُّ (الْفَرْعُ السُّطْحِيُّ) (10) الْعَصَبُ الزَّنْدِيُّ (11) الْعَصَبُ الْفَاصِفُ.



Innervation

التغذية العصبية «المسقط» على عظام اليد للأعصاب الحسية: (1) منظر خلفي (ب) منظر أمامي (1) العصب الزندي (باللون الأزرق) (2) العصب الناصف (باللون الأحمر) (3) العصب الكعبري (باللون الأخضر)

- **multiple i.** تَفْصِيْبٌ مُتَعَدِّدٌ. وجود أكثر من صفيحة انتهائية حركية واحدة على أحد الألياف العضلية.
- **pleurisegmental i.** تَفْصِيْبٌ مُتَعَدِّدُ الشُّدَفَاتِ. تعصيب إحدى البنيات الجسمية أو الأعضاء بالألياف عصبية مستمدة من عدة شذفات من النخاع الشوكي.
- **polyneuronal i.** تَفْصِيْبٌ مُتَعَدِّدُ الْعَصْبُونَاتِ. تعصب الألياف العضلية بأكثر من عصبون واحد كما هو الحال في الكثير منها وفي ألياف داخل المفزل.

- **reciprocal i.** تَفْصِيْبٌ مُتَبَادِلٌ. تعصيب العضلات الموجودة حول أحد المفاصل بالألياف حركية بترتيب زوجي بحيث يؤدي تنبيه أحدهما إلى تثبيط العصب الثاني.
- **Innocipitia** إِنْعِدَامُ الْفَصِّ الْقَذَائِيِّ. عدم تَكُونِ الْفَصِّ الْقَذَائِيِّ لِلدِّمَاغِ أو نقص في تكوينه.
- **inoglia (= fibrogia)** دَبْقٌ لِيَفِي.
- **inomyositis (= fibromyositis)** إِنْهَابٌ

- عَصْلِي لَيْفِي.**
insane مَجْنُون. مختل عقلياً.
insanity جُنُون. اختلال عقلي وعادة ما يستعمل للدلالة على عدم مسؤولية المصاب عن تصرفاته حتى عندما تكون جنائية.
- acute confusional i. جُنُون تَخْلِيطِي حَادٍ. هذيان يتصف ببداية حادة و يترافق مع النسابة القصيرة المدى والتوهان.
- impulsive i. جُنُون إِنْدَفَاعِي. رغبة جامحة للتصرف والعمل الاعتدائي.
- moral i. جُنُون أَخْلَاقِي. جنون يتصف بفقدان القيم والتصرفات الأخلاقية.
- i. of negation جُنُون الْإِنْكَار. جنون يتصف بتوهم انعدامي كتوهم المصاب بعدم وجود جسم له.
- senile i. (= senile dementia) خَرَفٌ شَيْخُوخِي.
insenescence تعمير: إِنْشِيَاخ. عملية التقدم في العمر.
insensible لَامَحْسُوس؛ غَيْر حَسَّاس. 1. ما لا يحس أو يدرك بالحواس 2. فاقد الوعي أو الحواس.
insertion مَقْرُوز؛ غَرْز. موقع ارتكاز واتصال العضلة في العظم أو في جزء الجسم الذي يحركه.
insheathed مُتَقَفَّد. بنية محاطة بغمد كالليف العصبي، مثلاً.
insight الْبَصِيرَةُ. في الطب النفسي، هي معرفة المريض بأن شكواه وأعراض مرضه ناتجة عن اضطراب أو شذوذ مرضي مع معرفته بأسباب ذلك وعواقبه.
Insomnia أَرْق. 1. عدم المقدرة على النوم 2. سهاد شاذ.
insomniac مُؤَرَّق. شخص مصاب بالارق.
insomnic أَرْقِي؛ مُؤَرَّق. يتصف بالارق أو مصاب به.
instinct غَرِيْزَة؛ فِطْرَة. مجموعة من الاستجابات الأصلية غير المتعلمة أو المكتسبة من المحيط تتصف بها بعض الأجناس وتكون خاصة
- aggressive i. (= death i.)** غَرِيْزَة الْمَوْت.
- death i. غَرِيْزَة الْمَوْت. الغريزة اللاشعورية التي تدفع الكائن إلى الانحلال والموت وهي عكس غريزة الحياة كما تصورها فرويد.
- ego i. غَرِيْزَة الْإِنَّا. أية غريزة غير الغريزة الجنسية التي تدفع للحفاظ على الذات.
- herd i. غريزة القطيع؛ غَرِيْزَة التَّجْمَع.
 الغريزة التي تدفع الكائن ليكون عضواً في جماعة ولينسجم معهم في مقاييسهم ومثلهم وتصرفاتهم وأفكارهم.
- life i. غَرِيْزَة الْحَيَاة. الغريزة التي تدفع الكائن للقيام بالأعمال البناءة التي تحافظ على حياته وعلى تكاثر نوعه.
- mother i. غَرِيْزَة الْأُمُومَة. السلوك المعقد للام الذي يضمن لها الحفاظ على أبنائها ورعايتها لهم.
- sexual i. (= life i.) الغريزة الجنسيّة. هي غريزة (= life i.) الحياة التي تستهدف الحفاظ على النوع.
instinctive غَرِيْزِيّ؛ فِطْرِيّ. تصرف طبيعي يقوم به الكائن حتى من دون تسيبيه.
insula الْجَزِيرَة؛ الْفَص الْجَزِيرِيّ. أنظر lobus insularis
insulae of Peyer (= lobus insularis) جُزُر باير؛ الْفَص الْجَزِيرِيّ.
integration تَكَامُل. تجميع أقسام متعددة وتنظيمها بشكل منسّق متكامل.
integrative مُتَكَامِل. فعالية أو نظام متكامل ومنسّق.
intellect الْفِكْر؛ الْعَقْل؛ الذَّهْن. التفكير والفهم والعقل وخصوصاً تلك الفعاليات التي تتعرف على العلاقات بين مختلف الأفكار وإدراكها وتقييمها وتسببها.
intellectualization تَفْكِير؛ اسْتِذْهَان. وظيفة أو آلية لاشعورية يحلّ فيها المرء الأمور ويسببها ويقدر نتائجها وبذلك يتجنب مجابهة الحوادث الضارة ويتوقى القلق والضرر.
Intelligence ذكاء. القدرة على الفهم والإدراك والمقدرة على التعلّم السريع وتطوير الاستجابات

لتناسب الحالات الطارئة. كما أنه يدل على المقدرة على فهم الإشارات وحل المسائل ومجابهة المشاكل.

حاصل الذكاء. انظر quotient. - i. quotient

intercalatum (= substantia nigra)

المادة المقحمة؛ المادة السوداء.

intercourse إتصال. اتصال متبادل.

جماع. اتصال جنسي. - sexual i. (= coitus)

Interictal بين النوبات. يحدث بين النوبات.

intermittent متقطع. يحدث في فترات متقطعة تفصلها فترات خالية من الفعالية

interneuron عصبون بيني؛ عصبون متوسط. أي عصبون في سلسلة من العصبونات يقع بين العصبون الأولي والعصبون الأخير.

internode بين العقدتين؛ راجية. قطعة تقع بين عقدتين.

- i. of Ranvier بين عقدتي رانفييه. شدة من الليف العصبي تتوسط بين عقدتي رانفييه متجاورتين.

internuncial عصبون متوسط. عصبون متوسط ينقل الدفعات بين العصبونات أو بين المراكز العصبية.

interoceptive داخلي الاستقبال. صفة المستقبلات التي تستقبل المنبهات من الأقسام والسطوح الداخلية للجسم.

interoceptor مستقبل داخلي. المستقبل الذي يستقبل المنبهات من أقسام الجسم الداخلية ومن سطوحه الداخلية.

Interofection الاستجابة للمنبهات الداخلية. استجابة الجسم للتغيرات التي تحدث في داخل الجسم والتي يولدها الجهاز العصبي الودي.

interofective داخلي التنبيه. ما ينبه داخل الجسم. ويستعمل المصطلح لوصف تنبيه الجهاز العصبي المستقل الذي ينبه داخل الجسم.

Interpial بين طبقتي الحنّون. بين طبقتي الأم الحنّون.

intersex خُنثي. فرد يتصف باختلاط في صفاته الجنسية الذكرية والأنثوية بدرجات متفاوتة ويشمل ذلك أعضاءه الجنسية وسلوكه الجنسي.

intradural داخل الجافية. داخل الأم الجافية أو تحتها.

introspection تأمل باطن. ملاحظة وتحليل الأفكار والمشاعر الذاتية والتحليل الذاتي للفرد.

introvert 1. إنطوائي 2. أناني. 1. شخص مركّز كل اهتمامه على ذاته 2. شخص مركّز كل اهتمامه على منفعة ذاته.

invert (= homosexual) مُنحَرِف؛ يَقلِب.

involuntary لا إرادي. ما يحدث من دون إرادة المرء.

involution أوب. 1. تغيير رجوعي لكل الجسم أو لأحد أعضائه كالذي يحدث في الأعضاء الجنسية للام بعد ولادة جنينها لتعود إلى حجمها السوي 2. التناقص المترقي الذي يحدث مع تقدم العمر الذي يتصف بذيول الأنسجة والأعضاء.

- senile i. أوب شيخوخي. التناقص المترقي الذي يحدث عند الشيخوخة مع ذبول الأعضاء والأنسجة.

ipsilateral بنفس الجانب. ما يقع أو يؤثر في أو يتعلق بنفس الجهة.

IPSP (= inhibitory postsynaptic potential) الجهد المثبط بعد المشبكي.

iQ (= intelligence quotient) حاصل الذكاء. انظر quotient.

iridalgia ألم القرنية.

iridoparalysis (= iridoplegia) شلل القرنية. شلل مصرة القرنية.

iridoplegia شلل القرنية. شلل مصرة القرنية وفقدانها لوظائفها الحركية.

- accommodation i. شلل القرنية التكيفي. عدم تضيق الحدقة عند تكيف العين للبصر القريب.

- complete i. شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ التَّامَ. عدم تضيق الحدة لأي من المنبهات.
- reflex i. شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ الْمُعْكَسِي. عدم تضيق الحدة عند تنبيه العين بالضوء أو عند تنبيه الجلد.
- sympathetic i. شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ الْوُدِّي. عدم توسع الحدة عند تنبيه الجلد بالمنبهات المؤلمة.
- irreversibility اللاعكوسية. خاصية عدم الانعكاس.
- i. of conduction اللاعكوسية التوصيلية. المبدأ الذي ينص على أن مسلك أي منعكس يسمح بمرور الدفعات العصبية باتجاه واحد فقط.
- irreversible لا عكوس. لا يمكن أن ينعكس.
- irritability هيوجية؛ تهيجية. 1. خاصية البنية أو العضو الهيج أو استجابته للمنبهات. 2. الاستجابة الشاذة للمنبهات الضعيفة.
- muscular i. الهوجية العضلية. استجابة العضلات السوية للمنبهات.
- myotatic i. هيوجية التمدد العضلي. قدرة العضلة على التقلص استجابة لتعديدها.
- nervous i. الهوجية العصبية. 1. قدرة العصب على توصيل النبضات العصبية. 2. الاستثارية المرضية للجهاز العصبي.
- irritable هيوج. 1. قادر على الاستجابة للمنبهات. 2. حساس بصورة شاذة للمنبهات.
- irritant مهيج. 1. يولد التهيج. 2. عامل يولد التهيج.
- irritation 1. تهيج. 2. تهيج. 1. التنبيه. 2. حالة فرط الاستثارية والحساسية.
- cerebral i. تهيج مخي. المرحلة الثانية من ارتجاج الدماغ الذي يتصف بفرط استثارية الدماغ.
- direct i. تهيج مباشر. تهيج يتولد عن التنبيه المباشر للجزء أو للعضو.
- functional i. تهيج وظيفي. تهيج يتولد عن اختلال وظيفي من دون أية إصابة عضوية أو فرط استثارية العضو بسبب فعاليته الوظيفية المفرطة.
- meningeal i. تهيج سحائي. تهيج السحايا بسبب التهابها أو نزفها مما يؤدي إلى الصداع وتيبس الرقبة.

- spinal i. تهيج سنيثائي. صَمَلُ السيساء والمه بسبب آفة أو مرض العمود الفقري.
- sympathetic i. تهيج تعاطفي. التهاب أحد الأعضاء نتيجة لالتهاب عضو آخر مناسب له كالتهاب إحدى العينين عند التهاب العين الثانية.
- ischemia إقفار. نقص الدم في أحد الأقسام أو الأعضاء بسبب تضيق أوعيته الوظيفي أو بسبب انسدادها المرضي.
- ischialgia ألم الورك؛ ألم الإسك. وجع عظم الورك.
- ischiodynia (= ischialgia) ألم الورك؛ ألم الإسك.
- island of Reil (= insula) الجزيرة.
- isocarboxazid ايزوكربوكسازيد. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب.
- isocortex (= neopallium) القشرة الحديثة.
- isoelectric كهرساوي؛ متساوي التكهرب. لا يظهر أي فرق في الجهد الكهربائي.
- isometric إسوئي الطول. المحافظة على طول ثابت.
- i. contraction تقلص إسوئي الطول. تقلص العضلة من دون تغيير طولها مع زيادة توترها.
- isopotential إسوئي الجهد؛ تساوي الجهد. تساوي الجهد الكهربائي على طرفي غشاء الليف العصبي مثلاً.
- isothermognosis حس حراري إسوئي. شذوذ مرضي يحس المريض فيه حساً حرارياً للمنبهات الحارة والباردة والمؤلمة على حد سواء وبدرجة واحدة تقريباً.
- isotonic contraction تقلص إسوئي التوتر. تقلص العضلة من دون تغيير توترها ولكنها تقصر طولياً.
- isotransplant (= isograft) غرسة إسوئية. طعم بين فردين متشابهين جينياً كالطعم بين التوأمين المتشابهين.

isthmus بَزَزَخ. توصيلة ضيقة بين بنيتين كبيرتين.

- **i. gyri cinguli** بَزَزَخُ التَلْفِيفِ الحَزَامِيِّ. الجزء الضيق من التلفيف الحزامي الذي يرتبط مع التلفيف حول الحصين في منطقة ذنب الجسم الثفني.

Itching (= pruritus) حَكَّة. مِفْعَر. مسلك أو ممر أنبوبي.

- **i. ad infundibulum** مِفْعَرُ القَمْع. الممر بين البطين الثالث للدماغ والقمع.

- **i. e tertio ad quartum ventriculum** المَسَالُ المُخِّي. (= **aqueductus cerebri**)

- **i. of Sylvius (= aqueductus mesencephali)** مَسَالُ الدُّمَاغِ المُتَوَسِّط.

J

jacksonian epilepsy صَرْعٌ جَاكْسُونِيّ. انظر epilepsy.

jargonaphasia حُبْسَةٌ رَاطِنَةٌ. حبسة تتصف بدمج عدة كلمات ببعضها.

jaw فَكٌّ. أي من البنييتين العظميتين، الفك العلوي أو الفك السفلي، في الجمجمة واللّتين تحمّلان الأسنان.

- drop j. فَكٌّ سَاقِطٌ. المرحلة الشللية في داء الكلب. حيث يتدلى الفك السفلي.

Jerk نَفْضَةٌ. حركة منعكسية فجائية ولا إرادية.

- Achilles j. (= triceps surae reflex) نَفْضَةٌ الكَاكِل.

- ankle j. (= triceps surae reflex) نَفْضَةٌ الكَاكِل.

- biceps j. (= biceps reflex) مُنْعَكْسُ ذَاتِ الرَّأْسَيْنِ.

- elbow j. مُنْعَكْسُ المِرْفَقِ. الانثناء الإرادي للمرفق عند طرق وتر العضلة ذات الرأسين أو العضلة ثلاثية الرؤوس.

- jaw j. (= jaw reflex) مُنْعَكْسُ الْفَكِّ.

- knee j. (= patellar reflex) نَفْضَةُ الرُّكْبَةِ.

- myoclonic j. (= myoclonus) رَمَعٌ عَضَلِيّ.

- nystagmoid j's. نَفْضَاتٌ رَأْسِيَّةٌ. حركات قفزية آنية جانبية للعين لا تدوم طويلاً ومن الممكن حدوثها عند النظر للجانب.

- pendular knee j. نَفْضَةُ الرُّكْبَةِ النُّوَاسِيَّةِ.

نفضة الركبة التي تشاهد في داء الرقص والتي تحدث عند طرق وتر الرضفة حيث تتحرك الساق أماماً وخلفاً لعدة مرات.

- quadriceps j. (= knee j.) نَفْضَةُ رُبَاعِيَّةِ الرُّؤُوسِ. تقلص العضلة رباعية الرؤوس النفضي عند طرق وتر الرضفة.

- tendon j. (= tendon reflex) مُنْعَكْسُ الوَتَرِ.

- triceps surae j. (= ankle j.) نَفْضَةُ ثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوسِ الرُّبْلِيَّةِ. تقلص نفضي للعضلة ثلاثية الرؤوس الربلية عند طرقها أو طرق وتر الكاحل.


junction مُوَصِّلٌ. (ج: مَوَاصِلُ). محل التقاء أو اتصال عضوين أو نسيجين أو بنييتين متباينتين.

- myoneural j. (= neuromuscular j.) مُوَصِّلٌ عَصَبِيّ عَضَلِيّ.

- neuromuscular j. مُوَصِّلٌ عَصَبِيّ عَضَلِيّ. محل اتصال ليف عصبي حركي مع الليف العضلي الهيكلي الذي يغذيه وتكون نهاية هذا العصب الحركي الصفيحة الحركية الانتهائية كما تكون منطقة الليف العضلي المقابلة لها الصفيحة تحت العصبية ويفصلها عن بعضهما الفلح التشابكي حيث يفرز الأسيتيل كولين من نهاية العصب الحركي الذي ينتشر عبر الموصل إلى الليف العضلي وينبهه.

juvenile 1. يَفَعِيّ؛ حَدَثٌ 2. يافع. 1. متعلق بالأحداث أو الشباب أو الأحداث غير الناضجين 2. حدث صغير السن أو طفل 3. خلية بين مرحلتي النضوج والفجاجة.

juxtaspinal مُجَاوِرُ السِّنْسَاءِ. بجوار العمود الفقري.



jerk, knee

وضع الانبساط

شكل يبين منعكس الوتر (نغضة الركبة أو منعكس الوتر الرضفي). ويلاحظ انبساط الساق عند طرق وتر الرضفة الباسطة الذي يرتكز على الظنبوب تحت الركبة. (1) العصب الوارد من العضلة الباسطة (2) العصب الحركي للعضلة الباسطة (3) العصب الحركي إلى العضلة المثنية (4) العضلة الباسطة (5) الوتر الرضفي (6) العضلة المثنية.

K

kakergasia (= merergasia) اضطرابٌ وظيفي. أي اضطراب يؤدي إلى فقدان القدرة الجزئي أو الكلي على القيام بأي عمل أو وظيفة كما يحدث في حالات العصاب.

kakesthesia (= cacesthesia) إحساسٌ شاذٌ. أي نوع من الإحساسات الشاذة أو المضطربة.

kakosmia (= cacosmia) رائحةٌ كريهة؛ استكراه الرائحة. شَمَ رائحة كريهة دون منبه حقيقي.

kathisophobia (= akathisia) قُماص؛ رُهابُ الجلوس. الخوف الشديد من الجلوس.

kentrokinesis (= centrokinesia) حَرَكَة مَرَكِزِيَّة التَّنْبِيهِ.

kernicterus يَرَقَانٌ نَوَوِي. حالة تتصف بأعراض عصبية وخيمة مع ارتفاع مستوى بليروبين الدم الذي يؤدي إلى انصبغ النوى القاعدية والجسم الشاحب والنواة المذنبة وقشرة النواة العدسية والنوى المخيخية والبصلية والمادة السنجابية للمخ بالصبغ الأصفر، كما أنها تترافق مع تخريب واسع في الجهاز العصبي وهي تتولد عن اليرقان الوليدي الوخيم.

kinesalgia ألمُ الحَرَكَة. الألم الذي يرافق الجهد العضلي عند الحركة.

kinesia (= kinetosis) اضطرابٌ حَرَكِيٌّ المَنَشَأ. أي اضطراب جسمي يتولد عن الحركات غير الاعتيادية مثل داء الحركة.

kinesialgia (= kinesalgia) ألمُ الحَرَكَة.

kinesiatrics (= kinesiotherapy)

مُعَالَجَة بِالْحَرَكَة.

kinesi- esthesiometer مِقْيَاسُ الحِسِّ الحَرَكِي. آلة لقياس أو تقدير حس الحركة.

kinesimeter 1. مِقْيَاسُ الحَرَكَة
2. مِقْيَاسُ الحِسِّ السَطْحِي. 1. آلة القياس الكمي للحركة. 2. آلة لفحص إحساسات سطح الجسم.

kinesiology عِلْمُ الحَرَكَة. مجموع الدراسات عن حركات جسم الإنسان.

kinesiometer (= kinesimeter)

1. مِقْيَاسُ الحَرَكَة. 2. مِقْيَاسُ الحِسِّ السَطْحِي.

kinesioneurosis غَضَابٌ حَرَكِيٌّ. اضطراب عصبي وظيفي يتصف باضطرابات حركية مثل التشنج والعزات.

kinesiotherapy (= kinesitherapy)

مُعَالَجَة بِالْحَرَكَة. معالجة الأمراض بالحركة.

kinesodic نَاقِلُ الدَّفْعَاتِ الحَرَكِيَّة. ناقل للنبضات العصبية الحركية.

kinesthesia الحِسُّ الحَرَكِي. الحس الذي يدرك حركة ووزن ووضع مختلف أقسام الجسم وخصوصاً تغيير زوايا المفاصل عند حركتها.

kinesthesiometer مِقْيَاسُ الحِسِّ الحَرَكِي.

kinesthesia (= kinesthesia) الحِسُّ الحَرَكِي.

kinetosis اضطرابٌ حَرَكِيٌّ المَنَشَأ. انظر kinesia.

kinetotherapy (= kinesiotherapy)

مُعَالَجَة بِالْحَرَكَة.

kleptomania هَوَسُ السَّرْقَةِ. هوس لا يقاوم يدفع المريض للسرقة وعادة ما تكون لمواد لها قيمة رمزية فقط وهي عادة ما تكون لا شعورية للمريض .

kleptomaniac مُهَوَّسُ السَّرْقَةِ. مصاب بهوس السرقة.

knee رُكْبَةٌ. المفصل بين الفخذ والساق.

knismogenic مُدْغِغٌ. ما يولد الدغدة.

knob زَرٌّ. كتلة مكورة أو نتوء مكور.

- synaptic k's. أَقْدَامٌ أَنْتَهَائِيَّةٌ. انظر end feet.

koniocortex الْقَشْرَةُ الْمُخَبِّبَةُ. القشرة الحبيبية للمناطق الحسية للمخ.

krauomania عَرَّةٌ نَظْمِيَّةٌ. عرة تتصف بحركات نظمية مثل دوران الرأس أو حركات توازن الجسم.


kuru كُورُو. مرض عصبي عائلي متروك ومميت يتصف بفترة حضانة طويلة ويسببه فيروس خاص يؤدي إلى اعتلال الدماغ وتخريبه.

kwashiorkor كُوَأَشِيرُكُور. متلازمة تتولد عن نقص البروتين الشديد وتتصف بتخلف النمو وبتغير لون الجلد والشعر والوذمة واضطرابات مرضية في الكبد مع تليفه ونخره ومع اضطرابات عقلية وذهول.

kyphoscoliosis جَنْفٌ حُدَابِيٌّ. انحناء السيساء الخلفي والجانبية.

kyphosis حُدَابٌ. زيادة تحذب السيساء الشاذة في المنحنى الصدري كما يشاهد عند النظر إليه من الجانب.

kyphotic 1. أَخْذَبٌ؛ حُدْبَاءٌ 2. حُدَابِيٌّ. مصاب بالحذاب أو منسوب إليه.



kyphosis

حجاب الرقبة وتضييق القناة الشوكية حيث تؤدي الإصابات الانضغاطية أو كسور الفقرات الرقبية إلى تضيق القناة الشوكية وانضغاط النخاع فيها فتؤدي حركات الرقبة إلى نبضان مستمر في منطقة الإصابة مع سحبها. كما يؤدي الثني الأمامي للرقبة (ب) إلى سحب منطقة الإصابة وتشوهها وتمدد الرقبة وإجهادها.

L

lability تَقَلُّلٌ؛ عَدَمُ الْإِسْتِقْرَارِ؛ عَطُوبِيَّةٌ. عدم الاستقرار العاطفي مع تغير الحالة العاطفية السريع.

labyrinth اللَّيْه. جهاز مكون من تجاويف وأقنية متصلة ببعضها. ويطلق المصطلح على جهاز الأذن الداخلية الذي يقوم بوظيفة حس التوازن والوضع.

bony l. اللَّيْهُ الْعَظْمِيّ. الهيكل العظمي للأذن الداخلية الذي يحيط بالتيه الغشائي.

cochlear l. اللَّيْهُ الْقَوَقَعِيّ. جزء التيه الغشائي الذي يشمل حيز اللمفا المحيطة والقناة القوقعية وهي آلة السمع الداخلية.

endolymphatic l. (= membranous l.) اللَّيْهُ الْغِشَائِيّ.

membranous l. اللَّيْهُ الْغِشَائِيّ. جهاز من أكياس وأنايب ظهارية متصلة ببعضها يتكون من قناة اللمف الباطنة والكيس والقريبة والقوقعة والأقنية الهلالية ويوجد في داخل التيه العظمي ويفصله عنه حيز اللمفا الظاهرة وينقسم إلى قسمين التيه القوقعي والتيه الدهليزي.

osseous l. (= bony l.) اللَّيْهُ الْعَظْمِيّ.

vestibular l. اللَّيْهُ الْدِهْلِيْزِيّ. جزء التيه الغشائي الذي يشمل الكيس والقريبة والأقنية الهلالية.

laceration تَهْتِكٌ؛ تَمَرُّقٌ؛ انْهْثَاكٌ. عملية التمزق أو جرح متمزق.

lacuna جَوْبَةٌ. حفرة صغيرة أو كهف مجوف.

cerebral lacunae جَوْبَاتٌ دِمَاعِيَّةٌ. باحات صغيرة من احتشاءات إقفارية دماغية تتولد من انسداد

الشريان الدماغي المتوسط أو الدماغي الخلفي أو الشرايين القاعدية تشاهد في حالات ارتفاع الضغط أو التصلب الشرياني.

lag تَلَكُّؤٌ. الفترة الزمنية بين وضع التنبيه وبدء الاستجابة.

lagnesis (= satyriasis) شَبَقٌ. فرط الرغبة الجنسية الشاذة في الذكور التي لا تشبع.

lagnosis (= lagnesis) شَبَقٌ.

lagophthalmos (= lagophthalmus) عَيْنٌ أَرْثِيَّةٌ. عدم القدرة على غلق العينين بصورة كاملة.

lallation نَمْنَمَةٌ؛ لَجَلَجَلَةُ الْأَطْفَالِ. نوع كلام الأطفال والصبيان.

lalognosis إِدْرَاكُ الْكَلَامِ. فهم الكلام المسموع ومعرفة مدلوله.

lalopathy خَلَلُ النَّطْقِ. أي اضطراب في الكلام.

lalophobia رُهَابُ الْكَلَامِ. التخوف من الكلام.

laloplegia شَلْلُ النَّطْقِ. شلل أعضاء النطق.

lalorrhea (= logorrhea) فُرُؤْرَةٌ.

lamella صُفَّاحَةٌ. صفيحة رقيقة كصفيحة العظم.

lamina صُفِّحَةٌ. طبقة رقيقة مسطحة ويستعمل المصطلح بمفرده للدلالة على صفيحة قوس الفقرة.

l. affixa الصُّفِّحَةُ اللَّاصِقَةُ. شريط من البطانة العصبية يحيط بالوريد المهادي المخطط والسطر الانتهائي في القسم المركزي من البطين الجانبي.

alar l., l. alaris الصُّفِّحَةُ الْجَنَاحِيَّةُ. أي من المنطقتين الطوليتين للأنبوب العصبي الجنيني بالجهة الظهرية للتملح المحدد والذي يتطور منه العمود

- السنجابي الظهري للنخاع الشوكي والمراكز الحسية للدماغ.
- laminae albae cerebelli الصَّفَائِحُ الْمُخَيَّخَةُ البَيَضَاءُ. لب المادة البيضاء الذي يسند ورقات القشرة المخيخية.
- l. arcus vertebralis صَفِيحَةُ قَوْسِ الْفَقْرَةِ. إحدى اللوحتين العريضتين اللتين تبرزان من سويقتي قوسي الفقرة اللتين تلتصقان في الخط الوسطي للفقرة لتكتمل القسم الظهري للقوس وتكونا قاعدة الناتئ الشوكي.
- basal l., l. basalis الصَّفِيحَةُ الْقَاعِيَّةُ. إحدى المنطقتين الطوليتين للأنبوب العصبي الجنيني بالجهة البطنية للتمل المحدد يتطور منها العمود السنجابي البطني للنخاع الشوكي والمراكز الحركية للدماغ.
- l. chorioidea epithelialis ventriculi الصَّفِيحَةُ الْمُشِيمَائِيَّةُ الظَّهَارِيَّةُ لِلْبَطْنِ lateralis الجانبي. البطانة العصبية التي تبطن البطين الجانبي للمخ.
- l. chorioidea epithelialis ventriculi quarti الصَّفِيحَةُ الْمُشِيمَائِيَّةُ الظَّهَارِيَّةُ لِلْبَطْنِ الرابع. البطانة العصبية التي تبطن البطين الرابع للدماغ.
- l. cinerea terminalis (= l. terminalis hypothalami) الصَّفِيحَةُ الْوِطَائِيَّةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ.
- epithelial l. (= l. epithelialis) الصَّفِيحَةُ الظَّهَارِيَّةُ. البطانة العصبية التي تغطي الصغيرة المشيمية.
- l. granularis, externa corticis cerebri الصَّفِيحَةُ الْحَبِيبِيَّةُ الظَّاهِرَةُ لِقَشْرَةِ الْمُخ. الطبقة الثانية من قشرة المخ والمكونة من العديد من الخلايا الهرمية الصغيرة ومن الخلايا الحبيبية ذات المحاور القصيرة.
- l. granularis interna corticis cerebri الصَّفِيحَةُ الْحَبِيبِيَّةُ الْبَاطِنَةُ لِقَشْرَةِ الْمُخ. الطبقة الرابعة من قشرة المخ والتي تزدهم بالعديد من الخلايا الحبيبية ذات المحاور القصيرة وبعض الخلايا الهرمية الصغيرة والتي يعبر من بينها العديد من الألياف العصبية باتجاه مستعرض.
- laminae medullares cerebelli الصَّفَائِحُ الْمُخَيَّخَةُ الْبَيَضَاءُ. (= laminae albae cerebelli)
- l. medullaris lateralis corporis striati الصَّفِيحَةُ النُّخَاعِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ لِلْجِسْمِ الْمُخَطَّط. طبقة من مادة بيضاء تفصل الكرة الشاحبة الوحشية عن قشرة النواة العدسية.
- l. medullaris medialis corporis striati الصَّفِيحَةُ النُّخَاعِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْجِسْمِ الْمُخَطَّط. طبقة من مادة بيضاء تقسم الجزء الإنسي من النواة العدسية (الكرة الشاحبة) إلى قسمين وحشي كبير وإنسي صغير.
- laminae medullares thalami interna and externa الصَّفَائِحُ النُّخَاعِيَّةُ الْمَهَادِيَّةُ الْبَاطِنَةُ وَالظَّاهِرَةُ. طبقتان من الألياف العصبية المعقدة في المهاد الظهري.
- l. medullaris transversa corporis quadrigemini (= stratum album profundum corporis quadrigemini) الطَّبَقَةُ الْعَمِيقَةُ الْبَيَضَاءُ لِلْأَجْسَامِ الرَّبَاعِيَّةِ.
- l. molecularis corticis cerebri الصَّفِيحَةُ الْجَزَائِيَّةُ لِقَشْرَةِ الْمُخ. الطبقة السطحية الأولى لقشرة المخ وهي أعلى طبقاته الست وتتكون بصورة رئيسية من ألياف عصبية مغمدة مرتبة باتجاه تماسي وهي تحوي نهايات تفصنية من خلايا الطبقات العميقة وبعض الألياف القشرية الواردة وبعض خلايا كاهال الممتدة أفقياً وبعض أنواع الخلايا العصبية الأخرى.
- l. multiformis corticis cerebri الصَّفِيحَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَشْكَالِ لِقَشْرَةِ الْمُخ. الطبقة السادسة من طبقات قشرة المخ المكونة من أنواع مختلفة من الخلايا العصبية وبصورة رئيسية خلايا مغزلية الشكل وغير منتظمة تمر محاورها إلى المادة البيضاء لقشرة نصف كرة المخ.
- l. plexiformis corticis cerebri (= l. molecularis corticis cerebri) الصَّفِيحَةُ الْهَرَمِيَّةُ الظَّاهِرَةُ لِقَشْرَةِ الْمُخ. الطبقة الثالثة من طبقات قشرة المخ الست المكونة من المنطقة الداخلية من الخلايا الهرمية المتوسطة الحجم وطبقة الخلايا الهرمية الخارجية وخلايا أخرى تمتد تفصناتها ومحاورها إلى الطبقات الأخرى.

- I. pyramidalis ganglionaris corticis cerebri (= I. pyramidalis interna corticis cerebri) الصَّفِيحَةُ الهَرَمِيَّةُ العُقدِيَّةُ لقشرة المخ.

- I. pyramidalis interna corticis cerebri الصَّفِيحَةُ الهَرَمِيَّةُ البَاطِنَةُ لِقِشْرَةِ المَخ. الطبقة الخامسة من طبقات قشرة المخ المكونة من أكبر الخلايا الهرمية (خلايا مارتينوتي وخلايا بتز) والتي تتعابر معها سطور من اليااف عصبية مرتبة بصورة أفقية وتترك محاور هذه الخلايا الهرمية هذه الطبقة إما كاليااف إسقاطية أو ترابطية أو صوارية.

- I. quadrigemina (= I. tecti mesencephali) صَفِيحَةُ سَقْفِ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط.

- I. reticularis الصَّفِيحَةُ الشَّبَكِيَّةُ. الغشاء الزجاجي المثقب الذي يغطي عضو كورتني.

- Rexed's laminae صَفَائِحُ رِيكْسِد. مخطط معماري لتصنيف بنيات النخاع الشوكي مبني على الصفات الخلوية لعصبونات المناطق المختلفة للمادة السنجابية. وهو يحوي تسع صفائح (1-9) تمتد خلال النخاع موازية للعمودي المادة السنجابية الظهرية والبطني، وطبقة عاشرة (10) تحيط بالقناة المركزية وتتكون من الصوارين الظهرية والبطني والمادة الهلامية المركزية.

- rostral I. (= I. rostralis) الصَّفِيحَةُ الرَّاسِيَّةُ. الجزء الانتهائي الرقيق لمغزاج الجسم القفني الذي ينزل أمام الصوار الأمامي وأمام المادة المثقبة الأمامية والتلفيف جنيب الانتهائي.

- I. septi pellucidi صَفِيحَةُ الحَاجِزِ الشَّفَاف. إحدى الصفيحتين العموديتين المفصولتين عن بعضهما بحيز قلحي الشكل مكوناً الحاجز الشفاف بينهما.

- I. tecti mesencephali صَفِيحَةُ سَقْفِ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. طبقة متداخلة من المادتين السنجابية والبيضاء في سقف الدماغ المتوسط من حيث تبدأ الاكيماتان السفلية والعلوية.

- terminal I. of hypothalamus الصَّفِيحَةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ لِلْوَطَاء. صفيحة رقيقة مستعدة من الدماغ الانتهائي تمتد إلى الأعلى من التصالبة البصرية والردب أمام البصري مكونة الجدار الأمامي للبطين الثالث للدماغ.

- white laminae of cerebellum الصَّفَائِحُ المُخَيَّخَةُ البَيضاء. (= laminae albae cerebelli)

laminectomy إِسْتِثْصَالُ الصَّفِيحَةِ. استئصال القوس الخلفي للفقرة.

laminotomy قَطْعُ الصَّفِيحَةِ. قطع صفيحة الفقرة.

lancinating رَامِح. ينقض كالسهم أو يقطع بحدة.

- I. pain أَلَمٌ رَامِح. انظر pain.

laryngalgia أَلَمُ الحَنَجرَةِ. ألم في الحنجرة.

laryngismus تَشَنُّجُ الحَنَجرَةِ. تشنج في الحنجرة.

- I. stridulus تَشَنُّجُ الحَنَجرَةِ الصَّرِيرِي. حالة تنفس بتشنج الحنجرة الفجائي مع تنفس صريري وزراق وقد تحدث في التهابات الحنجرة أو كمرض مستقل يرافق بعض الأمراض كالرُخْد مثلاً.

laryngoplegia شَلْلُ الحَنَجرَةِ. شلل في الحنجرة.

laryngospasm تَشَنُّجُ الحَنَجرَةِ. تشنج الحنجرة وانسداده.

lassitude إِنْهَاق. ضعف وتعب شديد.

latent كَامِن. غير ظاهر أو خامل.

- I. period فَتْرَةُ الكَوْن. انظر period.

laterality الجَانِبِيَّةُ. النسبة إلى إحدى جهتي الجسم وتفضيل استعمال أعضاء من نفس الجهة (كاليد أو الذراع أو القدم أو العين) عند القيام بالحركات والفعاليات الوظيفية الإرادية.

- crossed I. الجَانِبِيَّةُ التَّصَالِبِيَّةُ. تفضيل استعمال أعضاء الجهة المعاكسة في القيام بالحركات والفعاليات الإرادية كاستعمال إحدى العينين واليد المعاكسة لها.

- dominant I. الجَانِبِيَّةُ السَّائِدَةُ. تفضيل استعمال أعضاء إحدى جهتي الجسم في القيام بالحركات والوظائف الإرادية.

laterodeviation إِنْحِرَافٌ جَانِبِيٌّ. انحراف لأحد الجانبين.

lateroflexion إِنْثْنَاءٌ جَانِبِيٌّ. انثناء لأحد الجانبين.

lateroposition تَوَضُّعٌ جَانِبِيٌّ. انزياح الجسم وتوضُّعه في أحد الجانبين.

lateropulsion انْطِياقٌ جَانِبِيٌّ. الانسياق اللاإرادي لأحد الجانبين عند السير.

lathyrism التَّسَمُّمُ بِالْجُلْبَانِ. التسمم ببذور نبات الجلبان الذي يتصف بالشلل السفلي التشنجي والالام وفرط الحس والمذل.

laughter ضَحْكٌ. سلسلة حركات زفيرية تشنجية لاإرادية (جزئياً) مع إصدار أصوات غير مترابطة تدل غالباً على الفرح أو كمنعكس الدغدغة أو كعرض هستيري.

- compulsive l. ضَحْكٌ قَسْرِيٌّ. ضحك عميق بدون سبب.

- forced l. (= obsessive l. = compulsive l.) ضَحْكٌ قَسْرِيٌّ.

law قَانُونٌ. حقيقة أو مبدأ ثابت ومنظم.

- all or none l. قَانُونُ الْكُلِّ أَوْ الْعَدَمِ. انظر all or none.

- Babinski's l. قَانُونُ بَابِنْسْكِ. قانون يقارن بين استجابة شخص سليم للتيه مع آخر مصاب بالتيه فعند تنبيه الشخص السليم بمنبه كهربائي فإنه يميل إلى جهة القطب الموجب أما المصاب بمرض التيه فإنه يقع للجهة التي يميل نحوها اختياريًا. أما في حالة تخريب التيه الكامل فلا يتأثر الشخص بالتنبيه أبداً.

- l. of contrary innervation (= Meltzer's l.) قَانُونُ التَّعْصِيبِ الْمُتَعَاكِسِ. القانون الذي ينص (l.) على أن هناك قوتين متعاكستين تسيطران على كل الفعاليات الحيوية وهي التحفيز والزيادة من ناحية والتثبيط والنقصان من الناحية الأخرى.

- Cushing's l. قَانُونُ كُوشِنْغ. قانون ينص على أن ارتفاع ضغط داخل القحف يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدرجة أعلى قليلاً من ضغط السائل الدماغي النخاعي المؤثر على البصلة (النخاع المستطيل).

- l. of denervation قَانُونُ إِزَالَةِ التَّعْصِيبِ. إزالة تعصيب أية بنية أو عضو تزيد من حساسيتها للمنبهات الكيميائية.

- Dubois-Reymond l. قَانُونُ دِيْبُوَا - رِيْمُونْد. قانون ينص على أن العامل المؤثر في تنبيه العضل أو

العصب الحركي هو سرعة تغيير شدة التيار المنبه في أية لحظة وليست شدته المطلقة.

- Edinger's l. قَانُونُ أَدِينْغَر. تؤدي الزيادة التدريجية في وظيفة العصبون إلى زيادة نموه ولكن زيادتها غير المنتظمة أو المفرطة تؤدي إلى ضموره وتنكسه.

- Elliot's l. قَانُونُ إِيْلِيُوت. تتولد فعالية الأدرينالين عند تنبيه نهاية العصب الودي.

- Ewald's l. قَانُونُ إِيْوَالْد. أن الرؤية المولدة عن تيار اللعفا الباطنة في إحدى الأقنية الهلالية تكون باتجاه مواز لمستوى تلك القناة.

- l. of excitation (= Dubois-Reymond l.) قَانُونُ الإثَارَةِ. تعتمد استجابة العصب الحركي التي تظهر عند تقلص العضلة التي يغذيها على تغيير شدة التيار الكهربائي المنبه له وليست على شدته المطلقة.

- l. of facilitation قَانُونُ التَّيْسِيرِ. عند مرور نبضات عصبية خلال سلسلة معينة من العصبونات مرة واحدة ومن غير مرورها في غيرها ثم تعود لتمر في نفس السلسلة في مرات أخرى تقل عند ذلك مقارمة السلسلة لها بل وتيسر مرورها.

- l. of fatigue قَانُونُ التَّعَبِ. عند استمرار عمل إحدى العضلات أو مجموعة من العضلات حتى تتعب يكون حاصل ضرب مجموع العمل الذي قامت به في سرعته ثابتة دائماً.

- Fechner's l. قَانُونُ فِشْنَر. إن شدة الإحساس الذي يتولد من المنبهات المتغيرة يتناسب طردياً مع لوغاريتم شدة المنبه.

- Flatau's l. قَانُونُ فَلَائَاو. كلما زاد طول ليف النخاع الشوكي كلما كان موقعه أقرب إلى محيطه وتدفعه الألياف القصيرة إلى الجانب.

- Flechsig's l. (= myelogenetic l.) قَانُونُ فْلِيكْسِيْغ لِإِنْتَاكِ الْعِبَالِينِ.

- Flourens' l. قَانُونُ فْلُورِينْز. يؤدي تنبيه القناة الهلالية إلى رآرة باتجاه مستوى القناة.

- Gudden's l. قَانُونُ غُدْدِن. يتجه تنكس النهاية الدانية للعصب المقطوع نحو جسم الخلية.

- Hilton's l. قَانُونُ هِيلْتُون. إن العصب الذي يغذي أحد المفاصل يغذي أيضاً العضلات التي تحركه والجلد الذي يحيط به.

- قانون التّوصيل I. of isolated conduction** - المنعزل. لا تنتقل موجة النبضة العصبية المارة في أحد الأعصاب إلى عصب آخر إلا عند نهاياته.
- قانون جاكسون I. - Jackson's I.** - العصبية تخليقاً في أول الوظائف اضمحلالاً.
- قانون كالر. تمر الفروع الصاعدة I. - Kahler's I.** - للجذور الخلفية للأعصاب الشوكية في داخل النخاع الشوكي بالتتابع من منطقة الجذر حتى المستوى الناصف.
- قانون لاندوزي - Landouzy-Grasset I.** - غراسيت. في حالة إصابة نصف كرة المخ يميل الرأس إلى جهة الإصابة عند وجود شلل أو إلى جهة العضلات المصابة عند وجود تشنج فيها.
- قانون لابيك. تتناسب الرّزمة I. - Lapieque's I.** - عكسياً مع قطر الليف العصبي.
- قانون التّعصيب المتعاكس I. (= I. of contrary Innervation) - Meltzer's I.** - قانُونُ تَكُونُ المِيعَالِين. يتم تتخع الألياف العصبية للدماغ المتنامي بتتال معين بحيث تنضج وتتخع الألياف الخاصة بالترتيب الذي تطورت به الأجهزة فتتخع الياف الجذور الامامية أولاً وتتلاها الياف السبيل الهرمي.
- قانون نرنست. تتناسب شدة التيار I. - Nernst's I.** - المنبه لفعالية العضلة طردياً مع الجذر التربيعي لذبيذته.
- قانون فلوغر. يتنبه السبيل العصبي I. - Pflüger's I.** - عند المهبط عند بدء التنبيه الكهربائي وعند المصعد عند قطع التنبيه.
- قانون بريفوست. في حالة إصابة I. - Prévost's I.** - الدماغ الجانبية يدور الرأس إلى الجهة المصابة.
- القانون النفسى الجسدى. (= Weber-Fechner psychophysical I. - I.)** - قانُونُ الأَلَمِ المُحَوَّل. يتردد الألم المحول عند تهيج الأعصاب الحساسة لحسّ الألم عند وضع المنبه على سطح الجسم.
- قانون الإنعاش. تعتمد سرعة I. - refreshment I.** - انعاش العضلة المتعبة على سرعة تجهيزها بالدم الشرياني.
- قانون ريتز - فالي. ينتشر فرط I. - Ritter-Valli I.**

الهيوجية الأولى وفقدانها الثانوي في العصب المقطوع باتجاه محيطي بعيداً عن مركزه العصبي.

- قانون شرويدر I. - Schroeder Van der Kolk's I.** - فان دركولك. تنتشر الأعصاب الحسية للعصب المختلط إلى العضلات التي تنبها الألياف العصبية الحركية للعصب نفسه.
- قانون شيرنغتون. 1. يغذي I. - Sherrington's I.** - كل جذر شوكي خلفي منطقة معينة من الجلد بالرغم من احتمال تغذية المنطقة نفسها بألياف من الشدقات النخاعية المجاورة. 2. عند استلام عضلة لمنبه حركي يقلصها تستلم العضلة الضادة لها منبهاً عصبياً يرخيها في ذات الوقت.
- قانون الهيوجية I. of specific irritability** - النوعية. يستجيب كل عصب حسي لنوع واحد من المنبهات ويولد نوعاً واحداً من الإحساس في الحالات السوية. وفي الحالات الشاذة يمكن أن ينبه بنوع مغاير من المنبهات ولكنه يولد نفس النوع من الإحساس.
- قانون ستوكس. تصاب بالشلل عادة I. - Stokes' I.** - العضلة الكائنة فوق الغشاء الملتهب.
- قانون توينبي. في حالات مرض I. - Toynbee's I.** - الدماغ الناجم عن التهاب الأذن يصاب المخيخ وجيوب الخشاء الجانبية كما يصاب المخ من سقف الطبل.
- قانون فان دركولك (= Schroeder van der Kolk's I.)** - قانُونُ فَاَن دِرْكُولِك.
- قانون والر. عند I. (= Wallerian I.) - Waller's I.** - قطع الألياف العصبية الحسية لجذر النخاع الشوكي على الجهة المركزية لعقدته لا تتنكس الألياف الكائنة على جهتها المحيطية بل تتنكس تلك الألياف التي تبقى مرتبطة بالنخاع.
- قانون ويبر. يحافظ التغيير في شدة I. - Weber's I.** - المنبه الذي يولد أصغر تغيير في الحس المدرك على نسبة ثابتة تقريباً بالنسبة لكل الأجهزة الحسية.
- قانون ويبر - فشنر. I. - Weber-Fechner I.** - يزداد الإحساس بشدد متساوية بمتتالية حسابية عندما تزداد شدة المنبه بمتتالية هندسية.
- طبقة. كتلة نسيجية صفيحية الشكل layer** - ومنظمة السماكة تقريباً ومن الممكن أن تتراكم عدة طبقات منها فوق بعضها كما هو الحال في طبقات الجلد مثلاً.

- fusiform l. of cerebral cortex (= lamina multiformis corticis cerebri) **الطبقة المِقْزَلِيَّة الشَّكْل لِقَشْرَةِ المَخ.**
- ganglionic l. of cerebellum (= stratum gangliosum cerebelli) **الطبقة العُقْدِيَّة لِلْمَخِيخ.**
- ganglionic l. of cerebral cortex (= lamina pyramidalis interna corticis cerebri) **الطبقة العُقْدِيَّة لِقَشْرَةِ المَخ: الطبقة المتعددة الأشكال لقشرة المخ.**
- ganglionic l. of optic nerve **الطبقة العُقْدِيَّة لِلْعَصَبِ البَصْرِيِّ.** طبقة الجزء العصبي للشبكة التي تحوي عصبونات متعددة الأقطاب تكون محاورها العصب البصري.
- ganglionic l. of retina **الطبقة العُقْدِيَّة لِلشَّبَكِيَّة.** طبقة القسم العصبي للشبكة التي تحوي العصبونات ثنائية الأقطاب.
- granular l. of cerebellum (= stratum granulosum cerebelli) **الطبقة الحَبَبِيَّة لِقَشْرَةِ المَخِيخ.**
- granular l. of cerebral cortex, external (= lamina granularis externa corticis cerebri) **الطبقة الحَبَبِيَّة الظَّاهِرَة لِقَشْرَةِ المَخ.**
- gray l's. of cranial colliculus (= strata grisea et alba colliculi) **الطبقات السَّنْجَابِيَّة لِلأَكْمِيَّات الدِّمَاغِيَّة.**
- medullary l's. of thalamus (= laminae medullares thalami) **طبقات المِهَاد التَّخَاعِيَّة.**
- molecular l. of cerebellum (= stratum moleculare cerebelli) **الطبقة الجُزْيِيَّة لِلْمَخِيخ.**
- molecular l. of cerebral cortex (= lamina molecularis corticis cerebri) **الطبقة الجُزْيِيَّة لِقَشْرَةِ المَخ.**
- multiform l. of cerebral cortex (= lamina multiformis corticis cerebri) **الطبقة المُتَعَدِّدَة الأشْكَال لِقَشْرَةِ المَخ.**
- nerve fiber l. **طبقة الألياف العَصْبِيَّة.** طبقة في الشبكة تقع بين طبقة الخلايا العقدية والغشاء المحدد الباطن وتتكون من محاور الخلايا العقدية وتمر خلال الصفيحة المصفوية لتكون العصب البصري.
- neuroepidermal l. (= ectoderm) **الأديم الظاهر.**
- neuroepithelial l. of retina (= layer of rods & cones) **طبقة العصي والمخاريط للشبكية.**
- nuclear l. of cerebellum (= stratum granulosum cerebelli) **الطبقة النووية لِلْمَخِيخ.**
- plexiform l. of cerebellum (= stratum molecularis cerebelli) **الطبقة الضَّفِيرِيَّة الشَّكْل لِلْمَخِيخ.**
- plexiform l. of cerebral cortex (lamina molecularis corticis cerebri) **الطبقة الضَّفِيرِيَّة الشَّكْل لِقَشْرَةِ المَخ.**
- Purkinje l. (= Purkinje cell l.) **طبقة خَلَايا بَرْكِنجِي.** طبقة من الخلايا من قشرة المخ بين الطبقتين الجزيئية السطحية والحبيبية ويعتبرها البعض أعمق أقسام الطبقة الجزيئية.
- pyramidal l. of cerebral cortex, external (= lamina pyramidalis externa corticis cerebri) **الطبقة الهرمِيَّة الخَارِجِيَّة لِقَشْرَةِ المَخ.**
- subcallosal l. **الطبقة تَحْتَ التَّفْنِي.** طبقة الألياف العصبية على القسم السفلي من الجسم الثفني.
- white l's. of cerebellum (= laminae albae cerebelli) **طبقات المَخِيخ البِيضَاء.**
- zonal l. of cerebral cortex (= l. molecularis corticis cerebri) **الطبقة الجُزْيِيَّة لِقَشْرَةِ المَخ.**
- zonal l. of quadrigeminal body (= stratum zonale corporis quadrigemini) **الطبقة المِنْطَقِيَّة لِلْجِسْمِ الرُّبَاعِيِّ.**
- zonal l. of thalamus (stratum zonale thalami) **الطبقة المِنْطَقِيَّة لِلْمِهَاد.**

1. رصاص 2. اتجاه؛ قياد. 1. معدن
الرصاص 2. اتجاه في التخطيط الكهربائي للدماغ أو للقلب.

تَعَلَّمَ، عملية تلاؤمية سلوكية طويلة **learning**
تحدث تغييراً في سلوك الشخص وتولد نتيجة
الخبرة وتكسب الكائن استجابات جديدة.

تَعَلَّمَ تَرَابُطِي، تعلم ترابط وظيفي بيل **associative** -
حدثين يثبت حدوث أحدهما الحدث الآخر.

تَعَلَّمَ اجْتِنَابِي، نوع من التدريب **avoidance I.** -
يتعلم فيه الحيوان التجريبي اجتناب منبه مؤلم بالقيام
باستجابة حركية اجتنابية.

تَعَلَّمَ **conditioning I. (= conditioning)**
إشراطي؛ إشرط؛ تَكْنِيف.

تَعَلَّمَ تَمْيِيزِي، تعلم الاستجابة **discriminative I.** -
لبعض المنبهات الخاصة وعدم الاستجابة لغيرها.

تَعَلَّمَ تَقْلِيدِي، تعلم يعتمد على التقليد **imitative I.** -
الواعي لتصرفات وسلوك شخص أو أشخاص آخرين.

تَعَلَّمَ تَبْصُرِي، أعلى أنواع التعلم الذي **insight I.** -
يتصف بمقدرة الشخص على تقييم الخبرات السابقة
لحل مشكلة آتية أو لتحقيق أهداف مرغوبة.

تَعَلَّمَ فَعَال، **instrumental I. (= operant I.)** -
تَعَلَّمَ كَامِن، تعلم يحدث من دون تعزيز **latent I.** -
ولكنه يظهر عند إضافة أي تعزيز أو منح أي ثواب.

تَعَلَّمَ فَعَال، نوع من التعلم يعتمد على **operant I.** -
الإشراف الفعال حيث يزداد احتمال توليد أية استجابة
عند تعزيز المنبه وبهذه الطريقة من الممكن تعليم
الحيوان التجريبي استجابات معقدة غير اعتيادية.

تَعَلَّمَ إدْرَاكِي، تعلم يتصف بتطوير **perceptual I.** -
وتحوير فهم الأمور وإدراكها.

تَعَلَّمَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْحَالَةِ، **state-dependent I.** -
تعلم يتم عندما يكون الشخص بحالة نفسية معينة ومن
الممكن تذكره عندما يكون المرء بنفس هذه الحالة مرة
ثانية.

التَعَلَّمَ بِالتَّجَرِبَةِ وَالْخَطَا، **trial-and-error I.** -
تعلم يتم بالتجربة بتكرار المنبهات والتعرف على
المفيد منها والضرار والصحيح والغلط.

leioasthenia وَهْنُ الْعَضَلَاتِ الْمَلْسَاءِ.

leiodystonia حَثَلُ الْعَضَلَاتِ الْمَلْسَاءِ.

leiomyoma ورم العضلات الملساء.

وهو ورم حميد.

leiomyosarcoma ساركومة عَضَلِيَّة ملساء.

ساركومة تحوي خلايا مغزلية كبيرة من العضلات
الملساء تتكون في الرحم أو خلف الصفاق.

فَتِيل، (ج: أَفْتِلَة)، شريط أو حزمة **lemniscus**
من الألياف العصبية في داخل الجهاز العصبي
المركزي.

الْفَتِيلُ الْوَحْشِي، **lateral I. (= I. lateralis)** -
سبيل طولاني من الألياف العصبية التي تمتد إلى
الأعلى خلال المادة السقفية للجسر والمكونة بصورة
خاصة من الياف تبدأ من النوى القوقعية المعاكسة
والجسم المنحرفي وتصلد لتنتهي في الأكمة السفلية
والجسم الركيبي الإنسي.

الْفَتِيلُ الْإِنْسِي، **medial I. (= I. medialis)** -
سبيل يبدأ من الألياف المقوسة الداخلية للنواتين
الإسفينية والناحلة والذي يعبر إلى الجهة المعاكسة في
القسم السفلي من البصلة ليتسلق أولاً بين الزيتونتين
ثم خلال الجزء الظهري للجسر على ظهر النوى
الجسرية ثم يستمر خلال سقيفة الدماغ المتوسط
لينتهي في القسم البطني الخلفي للمهاد ويحمل هذه
السبيل دفعات حسية من الجهة المقابلة للجسم.

السَّبِيلُ الْبَصْرِي، **optic I. (= tractus opticus)** -

I. sensitivus (= sensory I. = medial I.)
الْفَتِيلُ الْجَسْمِي.

الْفَتِيلُ النُّخَاعِي، قسم **spinal I. (= I. spinalis)** -
السبيل النخاعي المهادي الذي يوجد في الجسر
والدماغ المتوسط والذي يكون حزمة منتشرة بين
الفتيلين الوحشي والإنسي وهو يحمل دفعات حواس
الألم والحرارة واللمس من الجهة المعاكسة من الجسم
وينتهي في القسم البطني الخلفي للمهاد.

فَتِيلُ ثَلَاثِي **trigeminal I. (= I. trigeminalis)** -
التَوَائِم. ألياف تنقل دفعات حسية من نوى العصب
ثلاثي التوائم إلى القسم البطني الخلفي للمهاد على
الجهة المعاكسة وهي تتسلق مختلطة مع الفتيل
النخاعي وبجوار الفتيل الإنسي.

شَلْلُ الْعَرِيء، **lemoparalysis**

تَضْيِيقُ الْعَرِيء، **lemostenosis**

إِسْتِجَابَةُ التَّطْوِيل، **lengthening reaction**

تطويل للعضلات الباسطة يسمح بثني الطرف.

lenticular عَدَسِي. 1. متعلق بالعدسة

2. متعلق بالنواة العدسية.
- lenticulo-optic** عَدَسِيٌّ مِهَادِي. متعلق بالنواة العدسية والمهاد البصري.
- lenticulostriate** عَدَسِيٌّ مُخَطَّطِي. متعلق بالنواة العدسية والجسم المخطط.
- lenticulothalamic** عَدَسِيٌّ مِهَادِي. متعلق بالنواة العدسية والمهاد.
- leprosy** الجُدَام. مرض عدوائي متري مزمن تولده المتفطرة الجذامية ويتصف بأفات ورمية حُبَبِيَّة أو تغذوية عصبية في الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب والعظام والأحشاء.
- leptocephalic** أَمَقُّ الرَّأْس. مصاب بمق الرأس.
- leptocephaly** مَقَقُّ الرَّأْس. طول الرأس الشاذ مع ضيقه.
- leptomeninges** السَّحَايَا الرِّقِيَّة. الأم الحنون والعنكبوتية يسميان معاً بالرقبقتين.
- leptomeningioma** وَرَمٌ سَحَائِي رَقِيق؛ وَرَمٌ السَّحَايَا الرِّقِيَّة.
- leptomeningitis** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا الرِّقِيَّة. التهاب الأم الحنون والعنكبوتية الدماغية أو النخاعية.
- I. interma** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا الدَّاخِلِيَّة. التهاب الأم الحنون.
- sarcomatous I.** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا السَّارَكُومِي. احتشاء ساركومي منتشر في الأم الحنون.
- leptomeningopathy** اِغْتِلَالُ السَّحَايَا الرِّقِيَّة. أي مرض يصيب السحايا الرقيقة.
- leptomeninx** سَحَاءَةٌ رَقِيَّة. مفرد السحايا الرقيقة.
- lesbian** سَحَايِيَّة. أنثى تشتهي ممارسة الجنس مع مثيلاتها من النساء.
- lesbianism** سَحَاق. جنوسية أنثوية.
- lesion** آفة. (ج: آفات). تقطع الأنسجة المرضي أو الرضحي أو فقدان وظيفة أحد أقسام الجسم.
- central I.** آفة مَرْكَزِيَّة. آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- local I.** آفة مَوْضِعِيَّة. آفة في الجهاز العصبي تولد أعراضاً موضعية في الجسم.
- lower motor neuron I.** آفة العَصَبُون الحَرَكِي السُّفْلِي. آفة في الأعصاب الحركية خارج الجهاز العصبي المركزي.
- organic I.** آفة عُضْوِيَّة. آفة تولد تغييراً عضوياً في بنية العضو المصاب.
- structural I. (= organic I.)** آفة عَضْوِيَّة.
- systemic I.** آفة جَهَازِيَّة. آفة تصيب أحد أجهزة الجسم أو أعضائه المترابطة وظيفياً.
- trophic I.** آفة تَغْذَوِيَّة. آفة تولد اضطراباً في تغذية أحد الأعضاء.
- upper motor neuron I.** آفة العَصَبُون الحَرَكِي العُلَوِي. المتلازمة الهرمية وهي آفة تصيب الألياف العصبية الحركية المركزية.
- lethal** مُمِيت. عامل يسبب الموت.
- lethargy** وَسَنٌ؛ نَوَام. حالة نعاس شديد شاذ أو ذهول مع تعب أو تخلف أو نقص النشاط الجسمي أو الفكري ويمكن أن تنتج عن آفة عضوية أو اختلال وظائف الجهاز العصبي أو مرض عقلي.
- hypnotic I.** وَسَنٌ تَنْوِيْمِي. وسن ينتج عن التنويم.
- hysteric I. (= hypnotic I.)** وَسَنٌ هِسْتِيرِي. وسن تنويمي.
- induced I. (= hypnotic I.)** وَسَنٌ مُحْدَث. وسن تنويمي.
- lucid I.** وَسَنٌ وَاعٍ. فقدان الإرادة على العمل والحركة رغم كون المصاب واعٍ وقادر على الكلام.
- lethetal (= amnesic)** نَسَاوِيٌّ؛ مُفْقَدُ الذَّاكِرَةِ.
- lethologica (= aphasia nominal)** حُبْسَةٌ إِسْمِيَّة.
- leucotomy (= leukotomy)** بَضْعُ الفَصِّ الجَبْهِي.
- leukencephalitis** إِلْتِهَابٌ بَيْضَاءُ الدِّمَاغ. التهاب المادة البيضاء للدماغ.

leukodystrophy حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ. اضطراب مادة الدماغ البيضاء.

- globoid l., globoid cell l. حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ. انظر Krabbe's disease.

- hereditary cerebral l. (= Pelizaeus-Merzbacher disease) حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الدَّمَاعِيَّةِ الْوَرِاثِيَّ

- Krabbe's l. (= Krabbe's disease) دَاءُ كِرَابَّةٍ حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ

- metachromatic l. حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُتَبَدِّلِ اللَّوْنِ. نوع وراثي جسدي متنح من حثل المادة البيضاء يتسبب عن ترسب الشحميات السفنغولية في الأنسجة العصبية وغير العصبية مع فقدان النخاعين المنتشر في الجهاز العصبي المركزي ويبدأ عادة في الأطفال في سن الثالثة مع العمى واختلالات الحركة والصمم والتخلف العقلي والاختلاج.

- spongiform l. (= Canavan's disease) حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الإسْفَنْجِي الشَّكْل.

- sudanophilic l. حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ أَلْيَفِ الْعُلُونِ السُّودَانِيَّ. مجموعة من الأمراض متباعدة المنشأ تشمل حثل المادة البيضاء الكظري ويتصف بتخريب النخاعين وتتصبغ فيه المواد المخربة بلون أحمر قاني بالملونات الشحمية.

leukoencephalitis الْتِهَابُ بَيْضَاءِ الدَّمَاعِ. التهاب المادة البيضاء الدماغية.

leukoencephalopathy اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ الدَّمَاعِ. أية مجموعة من الأمراض التي تصيب مادة الدماغ البيضاء وخصوصاً مادة نصفي الكرة المخيتين وعادة ما تصيب الولدان والأطفال.

- metachromatic l. اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُتَبَدِّلِ اللَّوْنِ. - progressive multifocal l. اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُتَعَدِّدِ الْبُؤَرِ. داء مميت يتسبب غالباً عن إصابة فيروسية، يتصف بزوال نخاعين المادة البيضاء وقد يحدث في ساق الدماغ والمخيخ أيضاً.

- subacute sclerosing l. (= subacute sclerosing parencephalitis) اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُصَلَّبِ دُونَ الْحَادِ.

leukoencephaly (= leukoencephalopathy) اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ الدَّمَاعِ.

leukomyelitis اِلْتِهَابُ بَيْضَاءِ النُّخَاعِ. التهاب المادة البيضاء للنخاع الشوكي.

leukomyelopathy اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ النُّخَاعِ. أي مرض يصيب ببيضاء النخاع الشوكي.

leukotome مِبْضَعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. قُتْنِي تمرر خلاله عروة سلكية لإجراء عملية بضع الفص الجبهي.

leukotomy (= lobotomy prefrontal) بَضْعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. عملية بضع المادة البيضاء للفص الجبهي.

- transorbital l. بَضْعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ عِبْرَ الْحَجَاجِ. بضع المادة البيضاء للفص الجبهي عبر الصفيحة الحاجية.

level مُسْتَوًى. (ج: مُسْتَوَيَات). 1. الموقع النسبي أو الدرجة أو التركيز النسبي 2. مركز دماغي نخاعي لربط وتنسيق الدفعات العصبية فالمستوى الأول هو النخاعي والثاني هو ساق الدماغ والثالث قشرته.

- l's. of consciousness مُسْتَوَيَاتُ الْوَعْيِ. درجات الإحساس واليقظة وهي السهاد اليقظ alert wakefulness والوسن lethargy أو تغيم الوعي obtundation والذهول stupor والسبات أو الغيبوبة coma.

- isoelectric l. مُسْتَوًى تَسَاوِي الكهربائية. مستوى جهد الراحة للخلية وهو مستوى الخط القاعدي للمخطط الكهربائي للقلب.

levodopa لِيْفُودُوبَا. مادة بيضاء تستعمل كدواء لمعالجة داء باركنسون.

libido شَبَقٌ؛ كَرَجٌ؛ الرغبة الجنسية. 1. الشهوة الجنسية 2. قوة الحياة الجنسية النشطة.

limb طَرْفٌ. 1. إحدى الزوائد المزودة للجسم وهما الطرفان العلويان والسفليان 2. بنية تشبه الذراع أو الساق.

l. of internal capsule, anterior الدَّرَاعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْمَحْفَظَةِ الدَّاخِلِيَّةِ. قسم المحفظة الداخلية للدماغ الذي يفصل النواتين المذنبة والعنسية عن بعضهما وهو يحوي التشععات المهادية الامامية والسبيل الجبهي الحنكي.

- phantom l. طَرَفٌ شَبَحِيٌّ. حس بوجود الطرف بعد بتره وكأنه لا زال في موضعه، كما قد يشعر المريض بآلام متقطعة أو متواصلة وكأنها صادرة من الطرف المقطوع.

limbic حَوْفِيٌّ. متعلق بالحواف أو الحافة.

- l. system النظام الحَوْفِيٌّ. انظر system.

limen عَتَبَةٌ. مصطلح عام للدلالة على نقطة البدء أو الحافة أو عتبة البنية أو المنبه.

- l. insulae عَتَبَةُ الْجَزِيرَةِ. النقطة التي تتصل عندها قشرة الجزيرة على السطح السفلي لنصف كرة المخ مع قشرة الفص الجبهي.

liminal حَدِّيٌّ؛ أَصْغَرِيٌّ. أصغر حد من المنبه تدركه الحواس.

liminometer مِقْيَاسُ الْعَتَبَةِ. آلة تقيس شدة المنبه الذي يطبق على الوتر لغرض قياس عتبة المنعكس المولد.

lingula لُسْنِيْن. (ج. لُسْنِيْنَات). بنية شبيهة باللسان الصغير.

- l. cerebelli. لُسْنِيْنُ الْمُخِيخِ. القسم البطني للفص الخلفي للمخيخ حيث يلتصق الشراع البصلي القحفي.

liquor cerebrospinalis (=fluid cerebrospinal) السَّائِلُ الدَّمَاعِي النَّخَاعِي. انظر fluid.

lissencephalia انعدام التلافيف.

lissencephalic عديم التلافيف. ذو مخ فيه القليل من التلافيف الضحلة أو معدوم التلافيف ويشاهد ذلك في العديد من الحيوانات.

lissencephaly انعدام التلافيف.

lissive مُرَّخٌ إِسْوَانِيٌّ. يرخي تشنج العضلات من دون التأثير على وظائفها.

lobe فَصٌّ. (ج. فُصُوصٌ). جزء محدد ومعين من أحد الأعضاء خصوصاً من الدماغ أو الرئة أو الكبد.

- anterior l. of hypophysis (=adenohypophysis) النَخَامِيَّةُ الغُدِّيَّة.

- anterior l. of pituitary gland (=adenohypophysis) النَخَامِيَّةُ الغُدِّيَّة.

- caudate l. of cerebrum (=insula) الْجَزِيرَةُ: الفص الذنبِي للمخ.

- l. of cerebellum, anterior (=lobus rostralis cerebelli) الفُصُّ الْمُنْقَارِيُّ لِلْمُخِيخِ.

- l. of cerebellum, cranial (=lobus rostralis cerebelli) الفُصُّ الْمُنْقَارِيُّ لِلْمُخِيخِ.

- l. of cerebellum, middle (=lobus caudalis cerebelli) الفُصُّ الذَنبِيُّ لِلْمُخِيخِ.

- cuneate l. (=cuneus) الْإِسْفِين.

- frontal l. الفُصُّ الْجَبْهِيُّ. القسم الأمامي من نصف كرة المخ.

- gracile l/ of cerebellum (=lobulus paramedianus cerebelli) الْفُصُّصُ الْمُخِيخِي الْمَجَاوِر لِلنَّاصِفِ

- limbic l. (=gyrus fornicatus) التَلْفِيفُ الْمُقْوَس.

- neural l. فَصٌّ عَصَبِيٌّ.

- l. of neurohypophysis (=lobus nervosus neurohypophyseos) النَخَامِيَّةُ العَصَبِيَّة. الفص العصبي للنخامية العصبية.

- occipital l. الفُصُّ الْقَذَالِيٌّ. القسم الخلفي من نصف كرة المخ.

- olfactory l. (=lobus olfactorius) الفُصُّ الشَّمِّيُّ.

- parietal l. الفُصُّ الْجِدَارِيٌّ. القسم العلوي المركزي من نصف كرة المخ.

- piriform l. (=piriform area) الفُصُّ الْكُفْرِيُّ الشَّكْل. الباحة الكثرية الشكل.

- posterior l. of hypophysis (=neurohypophysis) النَخَامِيَّةُ الْعَصَبِيَّة.

- prefrontal l. الفُصُّ أَمَامُ الْجَبْهِيِّ. قسم الفص الجبهي من الدماغ الذي يقع أمام التلفيف الصاعد.

- quadrangular l. of cerebellum (=lobulus quadrangularis cerebelli) الْفُصُّصُ الْمُرَبَّعُ لِلْمُخِيخِ.

- quadrate l. of cerebral hemisphere الطَّلَل: الفُصُّ الْمُرَبَّعِي لِنِصْفِ كُرَةِ الْمَخ. الفص أمام الإسفين.

- semilunar l., inferior (=lobulus semilunaris inferior) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي السُّفْلِي**.

- semilunar l., superior (=lobulus semilunaris superior) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي العُلَوِي**.

- temporal l. **الفَصُّ الصَّدْغِي**. الفَصُّ السفلي الوحشي لنصف كرة المخ

lobectomy **إِسْتِنْصَالُ الفَصِّ**. استئصال أحد الفصوص سواء من المخ أو الكبد أو الرئة أو الغدة الدرقية.

lobotomy **بَضْعُ الفَصِّ**. قطع الفص. وفي الدماغ هو قطع كل ألياف أحد الفصوص.

- frontal l. (=prefrontal l.) **بَضْعُ الفَصِّ الجَبْهِي**. عملية تقطع أثناءها كل ألياف الفص الجبهي بمبضعه الخاص الذي يمرر خلال ثقب ثقب في القحف.

- transorbital l. **بَضْعُ الفَصِّ عبر الحَجَاج**. بضع الفص الجبهي بإدخال المبضع خلال الصفيحة الحاجبية.

lobule **فُصَيْص**. فص صغير.

- anterior l. of pituitary gland (=lobus anterior hypophyseos) **الفَصُّ الأَمَامِي لِلنَّخَامِيَّة**.

- central l. of cerebellum (=lobulus centralis cerebelli) **الفُصَيْصُ المَرْكَزِي للمُخَيِّخ**.

- falciform l. (=cuneus) **الإِسْفِين**.

- paracentral l. (=lobulus paracentralis) **الفُصَيْصُ المجاور للمَرْكَزِي**.

- paramedian l. (=lobulus gracilis cerebelli) **الفُصَيْصُ المجاور للنَّاصِف؛ الفُصَيْصُ المُخَيِّخِي النَّاحِل**.

lobulus **فُصَيْص**. فص صغير.

- l. centralis cerebelli **الفُصَيْصُ المَرْكَزِي للمُخَيِّخ**. جزء الفص القحفي للمخ الذي يقع بين اللسين والقنة والذي يستقر على اللسين وعلى الشراع البصلي الأمامي.

- l. gracilis cerebelli **الفُصَيْصُ النَّاحِل**

للمُخَيِّخ. جزء من الفص الذنبى لنصف كرة المخ يقع بين الفصيصات الذنبى والهلالى وثنائى البطينين.

- paracentral l. **الفُصَيْصُ المجاور للمَرْكَزِي**.

فصيص على السطح الإنسى لنصف كرة المخ متصل مع التلفيفين أمام ووراء مركزى الفصين الجبهى والجدارى ويحده من الأسفل التلم الحزامى ويتكون بصورة رئيسية من مراكز حسية وحركية للطرف السفلى من الجسم.

- l. paramedianus cerebelli (=l. gracilis cerebelli) **الفُصَيْصُ المجاور للنَّاصِف؛ الفُصَيْصُ المُخَيِّخِي النَّاحِل**.

- l. parietalis inferior **الفُصَيْصُ الجِدَارِي السُّفْلِي**. الفصيص الذي يكون القسم الخلفى من الجزء الوحشى من الفص الجدارى للمخ يقع تحت التلم داخل الجدارى وفوق الفرع الخلفى للشق المخى الوحشى وخلف التلم وخلف المركزى وهو يحوى التلفيفين فوق الهامشى والزواوى ويتحكم فى نصف الكرة السائد بوظائف الكلام.

- l. parietalis superior **الفُصَيْصُ الجِدَارِي العُلَوِي**. القسم الخلفى من الجزء العلوى من الفص الجدارى للمخ ويقع خلف التلم خلف المركزى وأمام الشق الجدارى القذالى وفوق التلم داخل الجدارى وهو يجوى باحات ارتباطية خاصة بالوظائف الحسية العامة.

- l. quadrangularis cerebelli **الفُصَيْصُ المُرَبَّع المُخَيِّخِي**. جزء الفص القحفى لنصف كرة المخ الذى يقع بين الشقين وراء المركزى والاولى والمتصل مع القنة.

- l. semilunaris caudalis **الفُصَيْصُ الهَلَالِي الذَّنْبِي**. جزء الفص الذنبى لنصف كرة المخ المتصل مع حدة الدودة.

- l. semilunaris cranialis (=l. semilunaris rostralis) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي القَحْفِي؛ الفص الهلالى المنقارى**.

- l. semilunaris inferior (=l. semilunaris caudalis) **الفص الهلالى السفلى؛ الفُصَيْصُ الهَلَالِي الذَّنْبِي**.

- l. semilunaris rostralis **الفُصَيْصُ الهَلَالِي المنقارى**. جزء نصف كرة المخ المتصل مع ورقة الدودة.

- **l. semilunaris superior (=l. semilunaris rostralis)** الفص الهلالي العلوي: الفصين الهلالي المنقاري.

- **l. simplex cerebelli** الفصين البسيط للمخيخ. جزء الفص الذنبى لنصف كرة المخ المتصل مع الحدة.

lobus (=lobe) فص. (ج: فصوص).

- **l. anterior cerebelli (=cranialis cerebelli)** الفص القحفى للمخيخ.

- **l. anterior hypophyseos (=adenohypophysis)** النخامية الأمامية.

- **l. caudalis cerebelli** الفص الذنبى للمخيخ. جزء المخيخ الذي يفصله الشق الأولي عن الفص القحفى ويفصله الشق الظهرى الوحشى عن الفص الندفي العقيدى ويحوي الحدة وورقة الدودة وحدبتها والهرم واللاهة والفصيص البسيط والفصيصين الهلاليين القحفى والذنبى.

- **lobi cerebri** فصوص المخ. المناطق المحددة من قشرة المخ التي تحددها الشقوق والاتلام والخطوط المصطلحية والتي تشمل الفصوص الجبهى والجدارى والصدى والقذالى.

- **l. flocculonodularis** الفص الندفي العقيدى. جزء رئيسى من المخيخ يحوي الندتين الجانبيتين وسوقياتهما والعقيدات.

- **l. frontalis** الفص الجبهى. القسم الامامى من نصف كرة المخ الذي يمتد من القطب الامامى حتى التلم المركزى.

- **l. insularis** الفص الجزيرى. جزء قشرة المخ الذي يقع في عمق التلم الوحشى والذي يحيطه التلم الدائري تقريبا ويغلى ويخبا بالوصاد المجاور.

- **l. nervous hypophyseos (=neurohypophysis)** النخامية الخلفية.

- **l. occipitalis** الفص القذالى. القسم الخلفى من نصف كرة المخ والذي يمتد من القطب الخلفى حتى الشق الجدارى القذالى على السطح الإنسى ويتصل بالفص الجدارى على الوجه الوحشى للمخ.

- **l. olfactorius** الفص الشمى. مصطلح يطلق على الجهاز الشمى في السطح السفلى للفص الجبهى

للدماغ ويتكون من البصلة الشمية والسبيل والمثلث الشميين.

- **l. parietalis** الفص الجدارى. الفص العلوى المركزى لنصف كرة المخ الذي يفصله من الأسفل التلم الوحشى عن الفص الصدغى ولكنه يتصل به عند نهايته الخلفية ويفصله التلم المركزى عن الفص الجبهى ويتصل بالفص القذالى عند نهايته الخلفية على السطح الوحشى ولكنه مفصول عنه على جهته الإنسية بالتلم الجدارى القذالى.

- **l. posterior cerebelli (=l. caudalis cerebelli)** الفص الذنبى للمخيخ.

- **l. posterior hypophyseos (=neurohypophysis)** الفص الخلفى للنخامية: النخامية الخلفية.

- **l. rostralis cerebelli** الفص المنقاري للمخيخ. جزء المخيخ الذي يقع أمام الشق الأولى ويحوي اللسين والفصيص المربع.

1. توضع. 2. توضيح. 1. تعيين localization موقع أو موضع أية أفة أو عملية. 2. تحديد الوضع في منطقة محددة.

توضع دماغى. تحديد موضع مختلف محتويات الدماغ أو توضع مختلف وظائف الدماغ في مناطق معينة منه.

lockjaw (=trismus) صرر.

locomotion تحرك. الحركة أو القابلية على الحركة والانتقال من موضع لآخر.

locomotor تحركى. متعلق بالتحرك أو ما يؤثر في الجهاز الحركى للجسم.

locus موضع. (ج: مواضع). موقع في أحد أقسام الجسم.

l. caeruleus (=l. coeruleus) الموضع الأزرق.



l. ceruleus (=l. coeruleus) الموضع الأزرق.

l. coeruleus الموضع الأزرق. بارزة منصبة في الزاوية العلوية في قاع الدماغ.

l. ferrugineus (=l. coeruleus) الموضع الأزرق.



نقب الفرس



localization, sensory

التوزيع المقطعي للقطاعات الجلدية على الوجهين الخلفي للجسم (1) وعلى وجهه الامامي (2). وتشير الحروف C إلى القطاعات الرقبية و T إلى القطاعات الصدرية و L إلى القطاعات البطنية و S إلى القطاعات المعجزية. كما تشير الأرقام إلى أرقام القطاعات. كما ظهرت المناطق الرقبية باللون الأصفر والمنطقة الصدرية العلوية والأطراف العلوية باللون الأحمر والمنطقة الصدرية السفلية والبطنية باللون البنفسجي ومنطقة الجسم السفلي والأطراف السفلية باللون الأزرق.

- المَاةُ
- l. niger (=substantia nigra) السُّودَاءُ.
- النَّوَاةُ الحَمْرَاءُ.
- l. ruber (=red nucleus)
- حُبْسَةُ كَلَامِيَّة. اختلال وظائف الكلام المركزية كالحبسة أو انعدام النطق.
logagnosia
- حُبْسَةُ كِتَابِيَّة. عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة.
logagraphia
- حُبْسَةُ إِدْرَاكِيَّة.
logamnesia (=receptive aphasia)
- حُبْسَةُ تَفْصِيْرِيَّة.
logaphasia (=expressive aphasia)
- حُبْسَةُ الفَهْم. اضطراب دماغي يتصف بعدم مقدرة المريض على فهم الكلام.
logasthenia
- رَمْعُ الكَلَام. ترديد مقاطع آخر الكلمات.
logoclonia
- رَمْعُ الكَلَام.
logoklony (=logoclonia)
- حُبْسُة سَمْعِيَّة. صمم الكلمات وعدم فهم الكلمات المسموعة.
logokoposis (=word deafness)
- ثَرْثَرَة: هَذَر. كثرة الكلام.
logomania
- إِغْتِلَالُ كَلَامِي. أي اضطراب في وظائف الكلام.
logopathy
- شَلْلُ كَلَامِي. شلل أعضاء الكلام أو النطق.
logoplegia
- هَذَر: ثَرْثَرَة. كثرة الكلام وسرعته.
logorrhea
- تَشَنُّجُ الكَلَام. نطق الكلمات التشنجي.
logospasm
- عُرْوَة. (ج: عُرَى). تقوس حاد في بنية خيطية الشكل أو آلة ذات قوس طرفي.
loop
- دَائِرَة مُغْلَقَة. جهاز يؤثر فيه النتائج على الدخل.
- closed l.
- عُرْوَة غَامَا. قوس منعكسي يتكون من خلايا القرن الامامي التي تنبه اليافها الغامية الحزم
- gamma l.
- العضلية داخل المغزل فتتقلص وتولد نبضات واردة تمر خلال الجذر الخلفي إلى خلايا القرن الامامي فتولد منعكس التمدد.
- عُرْوَة غَامَا.
- Granit l. (=gamma l.)
- العُرْوَة الرَقَبِيَّة.
- l. of hypoglossal nerve (=ansa cervicallis)
- العُرْوَة العَدْسِيَّة.
- lenticular l. (=ansa lenticularis)
- دَائِرَة مُفْتُوحَة: عروة مفتوحة. جهاز يؤثر فيه الدخل على النتائج وعلى الدخل.
- العُرْوَة السُّوَيْفِيَّة.
- peduncular l. (=ansa peduncularis)
- عُرَى الأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّة.
- l's. of spinal nerves (=ansae nervorum spinalium)
- العُرْوَة تَحْتَ الرِّقَابِيَّة.
- subclavian l. (=ansa subclavia)
- قَعَس. التقعر الامامي في تقوس العمود الفقري القطني والرقبي كما يشاهد من الجانب.
- أَلَمُ القَطْن: قُطَان. أَلَمُ في المنطقة القطنية.
- أَلَمُ القَطْن الإِقْفَارِي. ألم منطقة أسفل الظهر والأليتين بسبب القصور الوعائي كما يحدث في انسداد نهاية الأبر.
- جُنُون.
lunacy (=insanity)
- مَجُنُون.
lunatic (=insane)
- ثُنَائِي (lysergic acid diethylamide (LSD) إيثلاميد حَمْضُ اللَّيْسَرْجِيك. مادة محرّضة للهلوسة تولد من قلوانيات الارغوت ولها فعل محاكي الودي ومحصر لفعل السيروتونين فتغير مزاج المريض ووظائفه الحسية والهلوسة والتوهم والحس المشترك وفقدان الشخصية الذاتية.
- رُهَابُ الكَلْب. الخوف من داء الكلب.
lyssophobia

M

macrencephalia (= macrencephaly) ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

macrencephaly ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ. فرط نمو الدماغ.

macrocephalia (= macrocephaly) ضَخَامَةُ الرَّأْسِ.

macrocephalic (= macrocephalous) ضَخْمُ الرَّأْسِ.

macrocephalous ضَخْمُ الرَّأْسِ. ذو رأس ضخم جداً.

macrocephaly ضَخَامَةُ الرَّأْسِ. ضخامة الرأس الشاذ.

macroencephaly (= macrencephaly) ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

macroesthesia حَسٌّ تَضَخُّيْمِي. حس المواد وإدراكها بأنها أكبر من حجمها الحقيقي.

macrogenitosomia ضَخَامَةُ تَنَاسُلِيَّة جَسَدِيَّة. ضخامة الأعضاء التناسلية المفرطة.

- m. precox (= epiphyseal syndrome) ضَخَامَةُ تَنَاسُلِيَّة جَسَدِيَّة مُبَكِّرَة.

macroglia دَبَقٌ عَصَبِيٌّ كَبِيرِي. دبق عصبي من أصل أديمي ظاهري يشمل الخلايا النجمية والخلايا الدبقية القليلة التغصن.

macrogyria ضَخَامَةُ التَّلَافُيفِ. نقص في عدد أتلالم المخ مع زيادة مادة المخ مما يولد ضخامة في حجم التلافيف.

macula بُقْعَة. بقعة أو تتخُن أو تَغَيَّر في لون منطقة صغيرة بالنسبة للمناطق المحيطة بها.

- cerebral m. (= tache cerebrale) لَطَخَةٌ مُخَيَّة.

- m. retinae بُقْعَةُ الشَّبَكِيَّة. بقعة صغيرة منخفضة صفراء اللون بعرض حوالي 3 درجات وبالجبهة الوحشية وقليلًا إلى الأسفل من القرص البصري وهي النقطة الحساسة لرؤية الألوان وللتمييز البصري.

maculocerebral بُقْعِي دِمَاعِي. متعلق ببقعة الشبكية والدماغ.

madness (= insanity) جُنُون.

maladjustment سُوءُ التَّلَاؤُم. فشل الشخص في ملاءمة حاجاته النفسية مع محيطه.

malady (= disease) مَرَضٌ؛ دَاء.

malaise وَغَكَة؛ فُتُور. شعور غامض بعدم الراحة أو الاستقرار الجسدي.

malaria, cerebral مَلَارِيَا دِمَاعِيَّة. اختلاط وبيل ومميت أحياناً للملاريا المنجلية التي تصيب الدماغ وتتصف بالصداع والتخليط والظواهر النفسية التي تتطور إلى الهذيان والغيوبة أو ارتفاع درجة الحرارة المفاجيء التي تبقى عالية مولدة الاختلاج والغيوبة.

maldevelopment سُوءُ التَّنَامِي. النمو والتنامي الشاذان.

malformation (= deformity) تَشَوُّه؛ شَوَّه. العيب الشكلي الذي يتولد عن سوء التنامي الشاذ.

malfunction (= dysfunction) خَلَلٌ وَظِيفِي.

malignancy خَبَائَثَة. 1. الاستعداد للتطور النوعي، وصفة الآفات الخبيثة. 2. السرطان وخاصة ذلك الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت.

malignant خَبِيث. الاستعداد للتطور التدريجي

إلى الأسوأ الذي يؤدي إلى الموت وله خواص الكشم والغزو والانتقال كما يحصل في الأورام الخبيثة.

malingerer مُتَمَارِض. شخص يحاول التمارض.

malingering تَمَارِض. شخص يحاول إرادياً أن يتحايل ويبالغ في أعراض مرضه أو إصابته أو يتصنعها لتحقيق رغبة مستهدفة.

malleation نَفْضَانُ اليَد. نفضان عضلات اليد الحاد وارتعاشها.

mammalgia (= mastalgia) ألم الثدي.

mania هُوس. 1. اضطراب المزاج الذي يتصف بالنه والتمالي والهباج وفرط الاستثارية والفعالية مع سرعة التفكير والنطق وتوارد الخواطر 2. كما يعني المصطلح عند ربطه باسم آخر الوسواس القسري بأحد الأمور مثل هوس العشق أو هوس السرقة.

aknetic m. هُوسٌ لَأَحْرَكِي. متلازمة هوسية تتصف باللاحركية بدل فرط الحركة.

m. à potu (= delirium tremens) هَذْيَانٌ إِرْتَعَاشِي.

Bell's m. (= delirious m.) هُوسٌ هَذْيَانِي.

brooding m. (= obsessive rumination) إِجْتِرَارٌ وَسْوَاسِي.

dancing m. (= choreomania) هُوسٌ رَقْصِي.

delirious m. هُوسٌ هَذْيَانِي. أشد أنواع الهوس ويشاهد خاصة في الذهان الهوسي الاكتئابي مع هياج نفسي حركي ووهط قد يؤدي إلى الموت ومن خواصه الرئيسية التوهان الجزئي أو الكلي.

depressive m. هُوسٌ إِكْتِنَابِي. حالة تشاهد في الذهان الهوسي الاكتئابي تظهر فيها أعراض اكتئابية ضمن الأعراض الهوسية.

doubting m. (folle du doute) هُوسٌ تَشَكُّكِي. حالة مرضية تتصف بعدم تمكن المصاب من اتخاذ أي قرار مهما كان تافهاً وهي حالة قسرية.

periodical m. هُوسٌ دَوْرِي. هوس يعاود بنوبات دورية.

persecution m. هُوسٌ إِضْطِهَاد. هوس المصاب بشعوره الخاطئ باضطهاد الآخرين له.

puerperal m. هُوسٌ نَفَاسِي. هوس يتلو الولادة وهو عرض للذهان النفاسي.

reactive m. هُوسٌ إِسْتِجَابِي. هوس يتولد استجابة لحوادث خارجية طارئة كال فشل أو الخسارة أو فقدان عزيز أو قريب.

religious m. هُوسٌ دِينِي. هوس يتولد عن اعتقادات دينية خاطئة أو شاذة.

unproductive m. هُوسٌ غَيْرُ مُفْعِر. حالة تتصف بسلوك شبيه بالهوس مع كبت المريض لأفكاره وسكوته.

maniac مَهْوُوس. شخص مصاب بالهوس.

maniacal مَهْوُوس. مصاب بالهوس.

manic-depressive هُوسِي - إِكْتِنَابِي. تناوب بين نوبات الهوس والاكتئاب.

mannerism التَّصْنُوع. أي حركات نمطية أو عادات يتعلمها الشخص ويكررها دائماً وتكون خاصة به.

mannitol مَانِيْتُول. دواء يستعمل لتقليل ضغط داخل العين أو ضغط السائل الدماغي النخاعي.

mantle رِبْطَةٌ. غطاء أو ستر أو طبقة.

brain m. (= pallium) قَشْرَةُ المَخ. الطبقة الخارجية التي تغطي المخ.

MAO (= monamine oxidase) أُكْسِيدَازُ أَحَادِي الأَمِين.

1. سَغْلِي **marasmatic (= marasmic)** 2. سَغْل. منسوب للسفل أو مصاب به.

marasmus سَغْل. حالة سوء تغذية بروتينية - سَعْرِيَة في الأطفال خصوصاً في السنة الأولى من أعمارهم. تتصف بتخلف النمو والضمور المترقي للعضلات وشحم تحت الجلد ولكن مع الاحتفاظ بالشهية واليقظة الفكرية وقد تنتج عن العدوى والالتهابات.

marche a petits pas مَشْيَةُ الخَطَوَاتِ القَصِيرَة. مشية يخطو فيها المريض خطوات قصيرة تشاهد في الصمل التصلبي الشرياني الدماغي.

margim هَامِش؛ حَافَة. حافة أو هامش أحد الأعضاء أو البنات التشريحية.

margo (= margin) هامش؛ حافة.
 - m. inferior cerebri الحافة السفلية للمخ.
 الحافة السفلية الوحشية لنصف كرة المخ.
 - m. inferolateralis cerebri (= m. inferior cerebri) الحافة السفلية الوحشية للمخ.
 - m. inferomedialis cerebri (= m. inferior cerebri) الحافة السفلية الإنسية للمخ.
 - m. medialis cerebri الحافة الإنسية للمخ.
 الحافة السفلية الإنسية لنصف كرة المخ.
 - m. superior cerebri الحافة العلوية للمخ.
 الحافة العلوية الإنسية لنصف كرة المخ.
 - m. superomedialis cerebri (= m. superior cerebri) الحافة العلوية الإنسية للمخ.
mariahuana, mariajuana
 (= marihuana) الحشيش.
mariguana, marihuana الحشيش.
 مستحضر من أوراق وزهور نبتة الحشيش الذي يصنع بشكل سكاثر ويدخن بسبب خواصه الشمية.
marijuana (= marihuana) الحشيش.
marrowbrain (= myelencephalon) الدماغ البصلي.
masculation إذكاء. ثنائي الصفات الذكورية.
masculine مُذكر. منسوب للجنس المذكر أو يتمتع بصفات ذكورية.
masculinity ذكورة. امتلاك الصفات الذكورية.
masculinization إذكاء. التطور السوي للصفات الجنسية الذكورية في الذكور أو تنامي أو تنمية الصفات الذكورية الثانوية في الإناث.
masculinize يُذكر. توليد صفات ذكورية في الأنثى أو حتّى نمو الصفات الذكورية في الذكر البالغ.
masochism مَارُوخِيَّة. شذوذ جنسي تشبع فيه الرغبة الجنسية بضرب الشخص أو إهانته أو تعذيبه من قبل شخص آخر.
masochist مَارُوخِي. مصاب بالماروخية.
mastodynia وجع الثدي. ألم في الثدي.
mastoid 1. خُشاء 2. ثديي. 1. النائي 2. الخشائي للعظم الصدغي 2. ثديي الشكل.

mastoidalgia ألم الخشاء. ألم في الخشاء أو في منطقة النائي الخشائي.
masturbation الإستمناء. التنبيه الذاتي للأعضاء التناسلية لغرض التلذذ الجنسي.
mating تزاوج. تزاوج أفراد من جنسين مختلفين وخاصة لغرض التوالد.
matter مادة. 1. كل ما يحتل حيزاً 2. قيع.
 - gelatinous m. (= substantia gelatinosa) المادة الهلامية.
 - gray m. of nervous system (= substantia grisea) مادة الجهاز العصبي
 - white m. of nervous system (= substantia alba) مادة الجهاز العصبي البيضاء.
maturation 1. نُضج 2. تَقْنِج. 1. مرحلة أو عملية النضج الكامل وبلوغ النضج العقلي والعاطفي الكامل للمرء 2. تَقْنِج.
mature 1. نَضَج 2. ناضج، راشد. شخص ناضج أو يمر بمرحلة النضج أو بعملية النضج.
maturity الرشد؛ النضج. مرحلة بلوغ أعلى درجات النضج والتطور.
matutinal صباحي. متعلق بالصباح أو يحدث أثناءه.
mazodynia (= mastodynia) وجع الثدي.
meatus صِمَاخ. ممر أو فتحة في الجسم.
 - external acoustic m. الصمّاخ السَمْعِي الظاهر. العمر من الأذن الخارجية حتى غشاء الطبل.
 - internal acoustic m. الصمّاخ السَمْعِي الباطن. العمر الذي تمر منه الأعصاب الوجهي والوسطي والسمعي الدهليزي والشريري التيهي.
mechanoreceptor مُسْتَقْبِلَة آليَّة. مستقبلات تتنبه بالضغط الآلي أو بالانفعال مثل مستقبلات اللمس والصوت والتقلص العضلي.
mecocephalic (= dolichocephalic) طَوِيلُ الرَّأْس.
mecystasis ثَبَاتُ التَوَثُّر. حالة عدم

تغير توتر العضلة التقلصي أو الارتخائي بالرغم من تغيير طولها.

medazepam hydrochloride

هيدروكلوريد الميدازيبام. دواء مهدئ.

1. نُخَاع 2. لُب. مصطلح عام
يعني القسم الداخلي للعضو أو البنية.

- adrenal m. (= m. glandulae supra-renalis) لُب الكُظُر.

- m. glandulae suprarenalis لُب الكُظُر.
القسم الأحمر القهوائي الداخلي واللين من غدة الكظر والذي يولد ويخزن الكاتيكولامين.

- m. oblongata البَصَلَةُ: النُخَاعُ المُسْتَطِيل.
مخروط النسيج العصبي المتصل بالجسر من الأعلى وبالتخاع الشوكي من الأسفل والذي يقع أمام المخيخ. ويكون القسم العلوي من سطحه الخلفي قاع الجزء السفلي من البطين الرابع وهو يحوي سبلاً عصبية صاعدة وهابطة وتجمعات من الخلايا العصبية التي تسيطر على الكثير من الوظائف الحيوية كالتنفس والدوران والحواس الخاصة.

- spinal m. (= m. spinalis) النُخَاعُ الشُّوكِيّ:
القسم الجهاز العصبي المركزي الذي يوجد في القناة الفقرية والذي يمتد من الثقبة العظمى حيث يتصل بالنخاع المستطيل حتى القسم العلوي من المنطقة القطنية حيث ينتهي بين الفقرات الصدرية الثانية عشر والقطنية الثالثة وغالباً بجانب القرص الفقري بين الفقرتين الأولى والثانية وهو يتكون من اللب السنجابي الداخلي الذي تكثر فيه الخلايا العصبية والطبقة الخارجية المكونة من المادة البيضاء التي تكثر فيها الألياف العصبية الممددة. وتحيط بالنخاع الشوكي ثلاثة أغشية، هي الأم الحنون والعنكبوتية والأم الجافية، وينبع منه 31 عصباً شوكياً هي 8 أعصاب رقبية و 12 عصباً صدرياً و 5 أعصاب قطنية و 5 أعصاب شوكية وعصب عصبني واحد، وهو ينقل السبل العصبية من وإلى الدماغ.

1. نُخَاعِي 2. لُبِّي 3. نَقِيّ: نَقَوِيّ.
نسبة إلى لب أو نخاع الأعضاء أو نقي العظام.

medullary cancer

سَرَطَان لُبِّي. انظر cephaloma.

نُخَاعِيّ (= myelinated) ذو ميالين.

medullectomy إِسْتِنْصَالُ النُّخَاع. استئصال نخاع أو لب أحد الأعضاء.

medulloblast أُرُومَةُ نُخَاعِيَّة. خلية جنينية غير مميزة في الأنبوب العصبي الجنيني تتطور إلى أرومة عصبية أو أرومة إسفنجية.

medulloblastoma وَرَمُ الأُرُومَةِ النُّخَاعِيَّة.
ورم مخيخي يتكون من خلايا دبقية عصبية غير مميزة وهي حساسة جداً للإشعاع ويتولد في الأغلب في الأطفال من سقف البطين الرابع أو من جواره.

medulloepithelioma وَرَمُ ظَهَارِيّ نُخَاعِيّ.
ورم دماغي نادر يتكون من الخلايا الظهارية العصبية الابتدائية التي تبطن الأحياز الأنبوبية للدماغ.

megacephaly (= megaloccephaly) ضَخَامَةُ الرُّأْس.

megalencephalon دِمَاعٌ ضَخْم. دماغ ضخم بصورة شاذة.

megalencephaly (= macrencephaly) ضَخَامَةُ الدِّمَاغ.

megalgia أَلَمٌ مُفْرَط. ألم شديد مثل ألم الروماتزم العضلي.

megalocephalia (= megaloccephaly) ضَخَامَةُ الرُّأْس.

megaloccephalic ضَخْمُ الرُّأْس.


megaloccephaly ضَخَامَةُ الرُّأْس. ضخامة حجم الرأس بصورة شاذة.

megalomania هَوَسُ العَظْمَةِ. اقتناع الشخص واعتقاده غير المسبب بعظمته أو بقوته أو بذكائه المفرط أو بطيبته وتسمى هذه الاعراض أوهام العظمة.

megalomaniac مَهْوُوسٌ بِالْعَظْمَةِ. مصاب بهوس العظمة.

megrin (= migraine) الشَّقِيْقَةُ.

melagra أَلَمٌ عَضَلَاتٍ الاَطْرَاف.



medulla spinalis

مقطع في الحبل الشوكي مع سحايه واعصابه في لقناة الفقرية في منطقة الرقبة: (1) العنكبوتية (2) الأم الحنون (3) الجذر الخلفي للعصب الشوكي (4) الأم الجافية (5) العقدة الشوكية (6) الرباط المسنن (7) الجذر الأمامي للعصب الشوكي (8) الفرع الموصل للعصب الشوكي (9) الفرع الأولي الأمامي للعصب الشوكي (10) الفعد العصبي (11) الفرع الأولي الخلفي للعصب الشوكي (12) العقدة الشوكية (13) الحيز تحت العنكبوتية (14) الأم الجافية (15) الحيز تحت الجافية (16) الحيز فوق الجافية (17) الطبقة السحائية للأم الجافية.

melalgia

أَلَمُ الْأَطْرَافِ.

melancholia

السُّودَاوِيَّةُ؛ مَالِيخُولِيَا؛

مَالَتَخُولِيَا. مصطلح كان يستعمل للدلالة على ما يشار إليه اليوم بالاكتئاب وكان يعتقد بأنه ينتج عن الصفراء السوداء ولكن المصطلح يستعمل اليوم للدلالة على حالة الاكتئاب الشديد.

- m. agitata (= agitated m. = agitated depression) سُوْدَاوِيَّةٌ هَيَّاجِيَّةٌ.

- m. attonita سُوْدَاوِيَّةٌ جَامُودِيَّةٌ. فصام مع ذهول جامودي.

- climacteric m. السوداوية الإيائية. اكتئاب الإياس عند انقطاع الحيض.

- m. hypochondriaca سُوْدَاوِيَّةٌ مُرَاقِيَّةٌ. اكتئاب مترافق مع المراق.

- involutional m. سُوْدَاوِيَّةٌ أُوَيْيَّةٌ. اكتئاب يحدث في أواخر منتصف العمر في شخص لم يصب سابقاً بأي مرض عقلي بالرغم من احتمال كونه شخص متسلب وعنود.

- m. simplex سُوْدَاوِيَّةٌ بَسِيْطَةٌ. اكتئاب من دون أية أروام.

- m. stuporosa (= m. attonita) سُوْدَاوِيَّةٌ جَامُودِيَّةٌ.

melancholic سُوْدَاوِي. مصاب بالسوداوية.

melancholy (= melancholia) السُّودَاوِيَّة.

melanoameloblastoma وَرَمٌ مِلَانِيّ مِلَانِيّ.

ورم عصبي ملاني أديمي ظاهر.

melanoblast أُرُومَةُ الْمِلَانِيَّة. خلية تنشا

من العرف العصبي والتي تتحول إلى خلية ملانية.

melanoblastoma (= malignant

melanoma) وَرَمٌ مِلَانِيّ خَبِيثٌ. ورم أرومة
المملانية.

melanoma وَرَمٌ مِلَانِيّ. ورم يتولد من
الخلايا المملانية للجلد والأنسجة الأخرى ويمكن أن
يتولد في الأم الحنون أو ملتحمه العين أو العين.

melosalgia أَلَمُ الْأَطْرَافِ السُّفْلِيَّة.

membrane غِشَاء. طبقة نسيجية رقيقة تغطي
أحد السطوح أو تبطن أحد التجاويف أو تقسم
أحيانا بعض الأعضاء.

- synaptic m. غِشَاءُ التَّشَابُك. الغشاء الذي يفصل
نهاية المحوار عن جسم العصبون الذي يتشابك معه.

- tectorial m. الْغِشَاءُ السَّقْفِيّ. غشاء ليفي متين
يرتبط بالقسم القاعدي من العظم القذالي ويمتد إلى
السطح الظهري لجسمي الفقرتين الرقبيتين الثانية
والثالثة.

memory ذَاكِرَةٌ. الملكة العقلية التي بواسطتها
يمكننا أن نتذكر إحساساتنا وانطباعاتنا وأفكارنا
السابقة.

- anterograde m. (= remote m.) ذَاكِرَةٌ السَّابِقِ.
ذاكرة الحوادث الماضية مع عدم إمكان إضافة ذكريات
جديدة إليها أو ذاكرة حوادث بعد الإصابة.

- eye m. (= visual m.) ذَاكِرَةٌ بَصَرِيَّة.

- iconic m. ذَاكِرَةٌ صُورِيَّة. المرحلة الأولى في
تكوين الذاكرة البصرية حيث يستمر تأثير صورة
المنبه البصري لفترة قصيرة بعد التنبه تتم خلالها
عملية تسجيل الذاكرة البصرية.

- immediate m. (= short-term m.) ذَاكِرَةٌ
أَتْنِيَّة؛ ذاكرة قَصِيرَةُ الْمَدَى.

- kinesthetic m. ذَاكِرَةٌ حَرَكِيَّة. ذاكرة حركات
الأطراف وأقسام الجسم الأخرى.

- long-term m. ذاكرة مديدة؛ ذَاكِرَةٌ طَوِيلَةُ الْمَدَى.
ذاكرة تحفظ لفترة زمنية طويلة.

- recent m. ذَاكِرَةٌ حَدِيثَةٌ. ذاكرة الحوادث التي
حدثت للمرء قبل فترة قصيرة تقاس بالساعات أو
الأيام أو الأسابيع.

- remote m. ذَاكِرَةٌ بَعِيدَةٌ. ذاكرة للحوادث البعيدة
التي حدثت للمرء منذ سنين طويلة.

- retrograde m. ذاكرة راجعة؛ ذَاكِرَةٌ السَّابِقِ.
ذاكرة للحوادث التي حدثت للشخص قبل الإصابة أو
قبل واقعة معينة.

- rote m. ذاكرة خائبة؛ ذَاكِرَةٌ الصَّم. ذاكرة الشخص
أو تعلمه لمادة أو لجملة أو مقاطع دون فهم معانيها بل
لمجرد حفظها لإعادة ترديدها بشكلها المحفوظ تماماً.

- screen m. ذاكرة حاجبة؛ ذَاكِرَةٌ تَرْبِئِيَّة. ذاكرة
واعية يحملها الشخص كدرية تقيه ذكرى ذاكرة أخرى
مؤلمة له أو تزعبه عاطفياً.

- short-term m. ذاكرة وجيزة؛ ذَاكِرَةٌ قَصِيرَةٌ
الْمَدَى. ذاكرة تدوم لفترة قصيرة (ثوانٍ أو دقائق)
قبل أن تختفي إلا إذا عززت بمنبه آخر.

- subconscious m. ذَاكِرَةٌ دُونِ الْوَعْي. ذاكرة
لأحداث لا يتذكرها الشخص بصورة اعتيادية أو
طبيعية ولكنها محفوظة لديه من دون وعيه وقد
يتذكرها في حالات خاصة أو تحت ظروف معينة.

- visual m. ذَاكِرَةٌ بَصَرِيَّة. ذاكرة لانطباعات
بصرية.

menalgia (= dysmenorrhea) عُسر الحيض
أَلَمُ الْحَيْضِ. الألم الذي يرافق الحيض.

meningeal سِحَائِيّ. متعلق بالسحايا.

meningematoma وَرَمٌ دُمَوِيّ سِحَائِيّ.
ورم دموي في الأم الجافية.

meningeocortical سِحَائِيّ قَشْرِيّ. متعلق
بالسحايا وقشرة الدماغ.

meningeoma (= meningioma) وَرَمٌ
سِحَائِيّ.

meningorrhaphy رَفُو السَّحَائِيَّ.

meninges السَّحَائِيَّ. (ف: سِحَاءة). الأغشية
الثلاثة التي تغلف الدماغ والنخاع الشوكي وهي
الأم الجافية والأم الحنون وبينهما المنكبوتية.

meninghematoma (= meninge-matoma) وَرَمٌ دُمَوِيٌّ سِحَائِيٌّ.

meningina (= pia-arachnoid) الْأَمُّ الْحَنُونُ وَالْعَنْكَبُوتِيَّةُ.

meningitis إِلْتِهَابُ الْحَنُونِ وَالْعَنْكَبُوتِيَّةِ.


meningioma وَرَمٌ سِحَائِيٌّ، وَرَمٌ صَلْبٌ بَطْنِيٌّ، النُّمُوُّ وَعَادَةً مَا يَكُونُ ذَا أَوْعِيَّةٍ وَيَحْدُثُ غَالِبًا عَلَى طُولِ الْأَوْعِيَّةِ السِّحَائِيَّةِ وَالْجَيْبِ الْعُلَوِيِّ الطَّوِلَانِيِّ وَيَفْزُو الْجَافِيَّةَ وَالْقَحْفَ مِمَّا يُوْدِي إِلَى تَأْكُلِهِ وَتَرْقُّقِهِ.

- angioblastic m. (= angioblastoma) سِحَاوُومُ الْأَرْوَمَةِ الْوِعَائِيَّةِ.

meningiomas تَكُونُ وَرَامٌ سِحَائِيٌّ، تَكُونُ عِدَّةُ أَوْرَامٍ سِحَائِيَّةٍ.


meningism تَهَيُّجٌ سِحَائِيٌّ؛ حَالَةٌ سِحَائِيَّةٌ. علاماتٌ وأعراضٌ تَهَيُّجٍ سِحَائِيٍّ يَتَرَفَّقُ مَعَ حِمَى حَادَّةٍ أَوْ تَجْفَافٍ مِنْ دُونِ أَيِّ عَدْوَى سِحَائِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ.

meningismus (= meningism) تَهَيُّجٌ سِحَائِيٌّ.



meninges

مَقْطَعٌ جِهِيٌّ عَنِ الْقَحْفِ يَظْهَرُ فُرُوعُ الرَّأْسِ وَعِظَامُ الْجُمُجْمَةِ وَالسَّحَايَا وَقَشْرَةُ الْمَخِّ: (1) الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْجِدَارِيُّ (2) تَحْبِيَّاتُ عَنْكَبُوتِيَّةٍ (3) الْعِظَمُ الْجِدَارِيُّ (4) الْأَمُّ الْجَافِيَّةُ (5) الْعَنْكَبُوتِيَّةُ (6) الْأَمُّ الْحَنُونُ (7) الْحِيزُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ (8) الْمَادَّةُ الْبَيْضَاءُ (9) الْمَادَّةُ السَّنْجَابِيَّةُ لِقَشْرَةِ الْمَخِّ (10) الْأَمُّ الْحَنُونُ (11) الْحِيزُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ (12) الْعَنْكَبُوتِيَّةُ (13) الْأَمُّ الْجَافِيَّةُ (14) اللَّوْحَةُ الدَّاخِلِيَّةُ (15) خِلَا لِلَّوْحَتَيْنِ (16) اللَّوْحَةُ الْخَارِجِيَّةُ (17) سَفَاقُ الْخَوْنَةِ (18) الْأَدَمَةُ (19) الْبَشْرَةُ (20) الْجِلْدُ (21) الْجَيْبُ السَّهْمِيُّ الْعُلَوِيُّ مَعَ تَحْبِيَّاتٍ عَنْكَبُوتِيَّةٍ (22) الدَّرَزُ السَّهْمِيُّ.



meninges

مقطع عرضي للنخاع الشوكي وأغشيته واليافه في القناة الشوكية: (1) الجافية (2) العنكبوتية (3 و 4 و 7 و 8) النسيج الضام والأربطة بين الحنون والعنكبوتية التي تثبت النخاع داخلها (5) النسيج فوق الحنون الذي يحيط بالنخاع (6) شعيرات النسيج فوق الحنون.

meningitic (متعلق) بالتهاب السحايا.
متعلق بالتهاب السحايا أو مصاب بها.

meningitides التهابات السحايا.

meningitis التهاب السحايا. التهاب السحايا فإذا ما أصاب الأم الجافية سمي التهاب الجافية أما إذا أصاب الأم الحنون والعنكبوتية فيسمى التهاب السحايا الرقيقة.

- aseptic m. التهاب السحايا العقيم. نوع خفيف من التهاب السحايا تولده في الغالب بعض الفيروسات.

- basilar m. التهاب السحايا القاعدية. التهاب سحايا قاعدة الدماغ.

- benign lymphocytic m. (= viral m.) التهاب السحايا السرطاني. تسمية خاطئة لغزو سرطاني منتشر في السحايا من دون أي التهاب فيها.

- cerebral m. التهاب السحايا الدماغية. التهاب سحايا الدماغ.

- cerebrospinal m. التهاب السحايا الدماغية والنخاعية. التهاب سحايا الدماغ والنخاع الشوكي.

- chemical m. التهاب السحايا الكيميائي. التهاب السحايا الطاهر الناتج عن تهيجها بمواد كيميائية غريبة في الحيز تحت العنكبوتية.

- cryptococcal m. التهاب السحايا بالمستخفيات. التهاب السحايا الذي تسببه المستخفيات وقد يكون حاداً وغالباً ما يكون مزمناً وقد تشاهد هذه الفطريات في السائل الدماغي النخاعي.

- eosinophilic m. التهاب السحايا الحمضي. التهاب السحايا اليوزيني. التهاب يتولد عن الإصابة ببعض الطفيليات وقد يتولد أحياناً عن السرطان الخبيث ويتصف بالصداع والصمل القفوي والتقير ونقص الحساسية وزيادة الخلايا الحمضة بالسائل الدماغي النخاعي.

- epidemic cerebrospinal m. التهاب السحايا الدماغية النخاعية الوبائي. التهاب حاد يتصف بعدوى مصلية قححية في السحايا الدماغية والنخاعية وتولده النيسرية السحائية وتشبه أعراضه أعراض التهاب الحاد مع ظهور بقع حمامية أو مريسية أو نزفية في الجلد.

- external m. (= pachymeningitis externa) التهاب ظاهري الجافية.

- gummatous m. التهاب السحايا الصمغي. التهاب السحايا أثناء الدور الثالث للزهري حيث يظهر العديد من البقع الصمغية في السحايا.

- internal m. (= pachymeningitis interna) التهاب السحايا الغائرة: التهاب باطن الجافية.

- lymphocytic m. (= viral m.) التهاب السحايا الفيروسي.

- meningococcal m. (= epidemic cerebrospinal m.) التهاب السحايا الدماغية والنخاعية الوبائي.

- Mollaret's m. نوبات حمى راجعة مع صداع ووعكة وأعراض سحائية واستجابات التهابية بمفصصات النوى في السائل الدماغي النخاعي.

- mumps m. التهاب السحايا النكافي. التهاب سحايا طاهر ثانوي للإصابة بداء النكاف.

- necrotoxic reactive m. التهاب السحايا السمي الناجح. حالة تتصف بتلين بؤري في بعض مناطق الدماغ مع أعراض وعلامات تهيج السحايا مما يدل على تغيرات التهابية في قشرة الدماغ.

- occlusive m. التهاب السحايا المسد. التهاب السحايا الرقيقة في الأطفال الذي يؤدي إلى انسداد الفتحات الإنسية والناصية للبطين الرابع.

- m. ossificans التهاب السحايا التعظمي. التهاب السحايا الدماغية الذي يولد تعظمها أو تكلسها.

- otitic m. التهاب السحايا الأذني المنشأ. التهاب السحايا الذي يولده التهاب الأذن الوسطى المزمن.

- plague m. التهاب السحايا الطاعوني. التهاب السحايا الثانوي لمرض الطاعون الدبلي الذي يتولد عن انتشار العدوى إلى السحايا خلال الدم.

- posterior m. التهاب السحايا الخلفية. التهاب سحايا منطقة المخيخ.

- purulent m. التهاب السحايا القيحي. التهاب السحايا الذي يولد القيح.

- Quincke's m. (= acute aseptic m.) التهاب السحايا العقيم الحاد.

- septicemic m. التهاب السحايا الإنتاني. التهاب السحايا المترافق مع تسمم الدم الإنتاني.

- m. serosa (= serous m.) التهاب السحايا المصلي.

- m. serosa circumscripta التهاب السحايا المُحدّد. التهاب السحايا الذي يولد تجمع مصلي كيسي مع التصاق السحايا والذي يولد أعراضاً تشبه أعراض الأورام.

- m. serosa circumscripta cystica التهاب السحايا المصلي الكيسي المُحدّد. التهاب السحايا المزمن الذي يولد أكياساً مليئة بسائل مصلي.

- serous m. التهاب السحايا المصلي. التهاب السحايا مع نضح مصلي إلى البطينات والأحياز تحت العنكبوتية وتغيرات بسيطة أو معتدلة في السائل الدماغي النخاعي.

- simple m. التهاب السحايا البسيط. التهاب السحايا الذي يترافق مع نضح مصلي وفبريني.

- spinal m. التهاب السحايا النخاعية. التهاب سحايا النخاع الشوكي.

- sterile m. التهاب السحايا العقيم. التهاب السحايا الذي لا ترافقه أية عدوى كذلك الذي يتولد عن حقن مادة تباينية في تصوير النخاع.

- m. sympathetica التهاب السحايا التعاطفي. التهاب السحايا السحايا الذي يتولد عن التهاب المناطق المجاورة لها والذي يتصف بزيادة حادة في ضغط السائل الدماغي الشوكي مع زيادة الألبومين والخلايا فيه بالرغم من بقائه عقيماً وقد تظهر علامات التهاب السحايا فيه.

- torula m. (= torular m. = cryptococcal m.) التهاب السحايا بالمُستخَفِّيات. التهاب السحايا بعدوى بالمستخففات.

- tuberculous m. التهاب السحايا السلّي. التهاب السحايا الشديد بالمتفطرات السلية التي تنتشر في الغالب من الرئة المصابة.

- viral m. التهاب السحايا الفيروسي. التهاب السحايا الذي يتولد عن الإصابة بأنواع الفيروسات والذي يتصف بالوعة والحمى والصداع والغثيان ووجود الخلايا في السائل الدماغي النخاعي مع ألم البطن وتيبس الرقبة والظهر. ولهذا المرض دورة قصيرة من دون أية اختلالات.

التهاب شرايين السحايا. meningoarthritis التهاب شرايين السحايا.

ورم ملائي سحائي. meningoblastoma ورم ملائي سحائي أولي خبيث.

قيلة سحائية. meningocele بروز انفتاق في السحايا خلال عيب في القحف (قيلة سحائية قحفية) أو في العمود الفقري (قيلة سحائية فقارية).

داء - spurious m. (= Billroth's disease) بيلروت.

meningocephalitis (= meningoencephalitis) التهاب الدماغ والسحايا.

meningocerebritis (= meningoencephalitis) التهاب الدماغ والسحايا.

meningococcemia عدوى الدم بالسحائيات. عدوى الدم بالمكورات السحائية.

meningococci المكورات السحائية.

meningococcosis داء المكورات السحائية. عدوى بالمكورات السحائية.

meningococcus المكورة السحائية. جرثوم النيسرية السحائية.

meningocortical سحائي قشري. متعلق بالسحايا وقشرة الدماغ.

meningocyte خلية سحائية. خلية منسجة سحائية.

meningoencephalitis التهاب الدماغ والسحايا.

- eosinophilic m. (= eosinophilic meningitis) التهاب الدماغ والسحايا الحمضي.

- mumps m. التهاب الدماغ والسحايا النكافي. التهاب حميد يصيب الأطفال وتسببه الفيروسات النكافية ويتصف بالحمى والتقيؤ والصلل القفوي والوسن والتهاب الغدة النكفية والصداع والاختلاج وآلم البطن والإسهال والتهديان.

- primary amebic m. التهاب الدماغ والسحايا الأميبي الأولي. التهاب نادر ومميت عادة يتصف بالحمى والتقيؤ وتولده أميبة النيفليريا أو الهارتمنيليا وتدخل غالباً إلى الدماغ خلال مناخر الأنف إلى البصلة

الشمية وأعصاب الدماغ ثم إلى السحايا والدماغ وقد تنتقل بعض أنواع الأميبة إلى الدماغ من مناطق أخرى في الجسم مصابة بالعدوى.

التهاب - syphilitic m. (= general paresis) التهاب الدماغ الزهري؛ الخزل العام.

meningoencephalocele قيلة دماغية سحائية. بروز انفتاق السحايا ومادة الدماغ خلال كسر أو عيب في القحف.

meningoencephalomyelitis التهاب الدماغ والسحايا والنخاع.

meningoencephalomyelopathy اعتلال الدماغ والسحايا والنخاع. أي مرض يصيب الدماغ والسحايا والنخاع الشوكي.

meningoencephalopathy اعتلال الدماغ والسحايا. داء لا التهابي يصيب الدماغ والسحايا.

meningofibroblastoma (= meningioma) ورم ارومي ليفي؛ ورم سحائي.

meningogenic سحائي المنشأ. ما ينشأ أو يتولد في السحايا.

meningoma (= meningioma) ورم سحائي.

meningomalacia تليّن السحايا. تليّن الأغشية السحائية.

meningomyelitis التهاب السحايا والنخاع. التهاب النخاع الشوكي وسحايه.

meningomyelocele قيلة سحائية نخاعية. انفتاق جزء من النخاع وسحايه خلال عيب في العمود الفقري.

meningomyeloencephalitis التهاب السحايا والنخاع والدماغ.

meningomyelradiculitis التهاب السحايا والنخاع والجذور.

meningo-osteophlebitis التهاب السحايا وأوردة العظم.

meningopathy اعتلال السحايا. أي مرض يصيب السحايا.

meningorachidian سحائي نخاعي. نسبة للنخاع الشوكي وسحايه.

meningoradicular سحائي جذري. نسبة إلى السحايا الشوكية وجذور النخاع الشوكي.

meningoradiculitis التهاب السحايا والجذور. التهاب جذور أعصاب النخاع الشوكي وسحايها.

meningorecurrence التهاب السحايا الناجس؛ رجعة سحائية. التهاب السحايا الزهري الراجع في المرضى المصابين بالزهري عند معالجتهم بالأدوية المضادة له.

meningorrhagia نزف سحائي. نزف من السحايا الدماغية أو النخاعية.

meningorrhea ثرو سحائي. انصباب دموي بين السحايا أو فوقها.

meningothelioma (= meningioma) ورم سحائي.

meningovascular وعائي سحائي. نسبة إلى الأوعية السحائية.

meninx سحاءة. أي غشاء خصوصاً أحد الأغشية الدماغية أو النخاعية.

menopausal إباسي. متعلق بالإياس أو يتصف به.

menopause إباس. توقف الحيض لدى الإناث الذي يحدث لديهن حوالي سن الخمسين.

artificial m. إباس اصطناعي. الإياس الذي يتم بطرق صناعية كالعمليات الجراحية أو التشعيع.

m. praecox الإياس المبكر. توقف الإباضة المبكر الذي قد يحدث بسبب نقص الخلايا المنتشة الأولية أو التمنيع الذاتي أو نقص الاستجابة للهرمون الموجه للغدد التناسلية المكتسب.

mental 1. عقلي؛ نفسي 2. ذقني. 1. متعلق بالعقل أو النفس 2. متعلق بالذقن.

mentality عقلية؛ نفسية. 1. القدرة والإمكانية العقلية 2. أسلوب التفكير.

mentation (= mental activity) تعقل. فعالية عقلية.

meperidine hydrochloride هيدروكلوريد

المِبيرِيدِين. دواء مسكن يستعمل قبل التخدير أو بعد العمليات أو الولادة وله مفعول قصير المدى.

mephenesin **مِفينيسين**. دواء مُرَخٍّ للعضلات يستعمل عن طريق الفم.

mephenoxalone **مِفينُوكسَالُون**. دواء مهدئ.

mephenytoin **مِفينيثُون**. دواء يستعمل للتحكم في نوبات الصرع الكبير ونوبات الصرع الجاكسونية والنفسية الحركية المقاومة للأدوية الأخرى.

mephobarbital **مِفُوبَارْبِيْتَال**. دواء باربيتوري مُقَوِّبَارْبِيْتَال. دواء يستعمل كمهدئ في حالات القلق والتوتر والتوجس ومضاد الاختلاج في الصرعين الكبير والصغير ويستعمل عن طريق الفم.

mepivacaine hydrochloride

هِيذِرُوكُلُورِيد المِيفِيكَاثِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي بحقنه حول العصب المحيطي أو حول الأم الجافية ليعمل كمخدر إحصاري.

meprobamate **مِبرُوبَامَات**. دواء مهدئ ومرخٍّ عضلي ومضاد للاختلاج ويستعمل كمهدئ للقلق والتوتر أو كمنوم أو في الاضطرابات العضلية الهيكلية وفي حالات الاختلاج الصرعي.

mepylcaine hydrochloride

هِيذِرُوكُلُورِيد المِپِيلِكَاثِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي بحقنه حول الأعصاب المحيطية.

meralgia **أَلَمُ الْفَخْذِ**. ألم في منطقة الفخذ.

m. paresthetica **أَلَمُ الْفَخْذِ الْمَذَلِّي**. داء يتصف بالمذل والألم والتئمل في السطح الخارجي للفخذ في المنطقة التي يغذيها العصب الفخذي الجلدي الوحشي وينتج عن انحصار العصب في المنطقة الأربية.

merergasia (= kakergasia) **إِضْطِرَابٌ وَظِيفِي**. أي اضطراب يؤدي إلى عدم المقدرة على القيام بالعمل أو بالوظائف كالذي يحصل في حالات العصاب.

merocoxalgia **أَلَمُ الْفَخْذِ وَالْوَرَك**. ألم في الفخذ ومنطقة الورك.

meroencephaly **نَقْصُ الدِّمَاغِ الْجُرْثِي**. النقص الخلقي لجزء من الدماغ كالخبيخ أو الجسم الثفني.

meroergasia (= neurosis) **عُصَابٌ**؛ **إِعْتِلَالٌ نَفْسِي**.

merorachischisis **إِنْشِقَاقُ النُّخَاعِ الْجُرْثِي**. انشقاق قسم من النخاع الشوكي.

merosmia **فُقْدَانُ الشَّمِّ الْجُرْثِي**. فقدان حس الشم لبعض المواد.

mesaxon **مَتَوَسِّطَةُ الْمَحَوَارِ؛ مُلْتَصِقٌ غِشَائِي** **المَخَوَارِ**. الغشاءان المتوازيان اللذان يعلمان تلامس حافتي الخلية الغمدية (خلية شوان) التي تغلف المحوار.

mescaline **مِسْكَالِين**. سم قلواني في أزهار بعض النباتات يولد توهم الألوان والموسيقى.

mescalism **التَسَكُّمُ بِالمِسْكَالِين**. تسكّم بزهر المسكاليين.

mesencephal (= mesencephalon) **الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّطُ**.

mesencephalitis **إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ** **دِمَاغِي** **mesencephalohypophyseal** **مُتَوَسِّطِي نَخَامِي**. متعلق بالدماغ المتوسط والغدة النخامية.

mesencephalon (= midbrain) **الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّطُ**. قسم الدماغ الذي يتطور من الحويصلة الوسطية للحويصلات الثلاث الابتدائية للأنبوب العصبي الجنيني والذي يحوي السقف وسويقتي المخ ويقع بين الدماغين المقدم والمؤخر.

mesencephalotomy **بَضْعُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ**. بضع الدماغ المتوسط جراحياً خصوصاً في منطقة السبل الناقلة لحس الألم لمعالجة الألم العسير.

mesmerism (= hypnotism) **المِسمَرِيَّة**؛ **تَنْوِيمٌ مِغْنَاطِيْسِي**؛ **تَنْوِيمٌ إِخَائِي**.

mesocephalon (= mesencephalon) **الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّطُ**.

mesoglia (= 1.microglia 2.oligodendroglia) **1. دَبْقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ** **2. دَبْقِيَّةٌ قَلِيلَةُ التَّغْصُنِ**.

mesoglioma (= 1. microglioma 2. oligodendrogloma) **1. وَرَمٌ دَبْقِي صَغِيرٌ** **2. وَرَمٌ دَبْقِي قَلِيلُ التَّغْصُنِ**.

mesorachischisis انشقاق السيساء الجُرْثِيّ. شق النخاع الشوكي والسيساء الجُرْثِيّ.

mesoridazine ميُزُورِيدازِين. دواء مضاد للذهان يستعمل في علاج الكحولية والفصام والأعراض العصبية النفسية والمشاكل السلوكية في التخلف العقلي وفي متلازمة الدماغ المزمنة ويستعمل عن طريق الفم أو الحقن داخل العضل.

metabolism استقلاب؛ أَيْضٌ. مجموع العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تولد المواد الحية للجسم والطاقة الضرورية لفعالياته.

metabutethamine hydrochloride هيدزوكليوريد المِتَابُوتِيْتَامِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي في طب الأسنان أو بحقنه حول العصب في التخدير الموضعي.

metabutoxycaine hydrochloride هيدزوكليوريد المِتَابُوتُوكْسِيكَايْن. دواء يستعمل كمخدر موضعي في طب الأسنان.

metallesthesia تحسس الفلزات. التعرف على المعادن بواسطة حس اللمس.

metaplexus ضفيرة تالية؛ ضفيرة البُطَيْن. الضفيرة المشيمية للبطين الرابع.

metapsyche (= metencephalon) الدماغ التَّالِي.

metapsychology علم النفس البَدِيل؛ علم ما بعد النفس. مصطلح يطلق على بعض النظريات البديلة حول الوظائف العقلية وبنياتها، وبالرغم من أنها تبدو منطقية ولكن ليس هناك من أدلة تسندنها تجريبياً.

metastasis 1. نَقِيلَة. 2. انْتِقَال. 1. انتقال المرض من موقع لآخر في الجسم كانتقال الخلايا السرطانية من العضو المصاب إلى أعضاء أو مناطق أخرى في الجسم. 2. نمو كائنات دقيقة أو خلايا مرضية في عضو آخر بعيد عن موقعه الأولي.

metathalamus المِهَادُ التَّالِي. قسم الدماغ البيني أسفل النهاية الذنبية لظهر المهاد يتكون من الجسمين التركيبين الوحشي والإنسي.

metencephal (= metencephalon) الدماغ التَّالِي.

metencephalon (= after brain) الدماغ التَّالِي. 1. القسم الأمامي من الدماغ المؤخر الذي يحوي المخيخ والجسر وقد يستعمل المصطلح للدلالة على الجسر وهو الحويصلة الأمامية من الحويصلتين الدماغيتين اللتين تتولدان في الدماغ المؤخر في الجنين 2. الحويصلة الأمامية من الحويصلتين اللتين تتكونان عند تمايز الدماغ المؤخر في الجنين.

metencephalospinal متعلق بالنخاع التالي والنخاع. نسبة إلى الدماغ التالي (المخيخ والجسر) والنخاع الشوكي.

metepencephalon (= myelencephalon) الدماغ البَصَلِيّ.

methadone hydrochloride هيدزوكليوريد المِيثَادُون. دواء له خواص شبيهة بخواص المورفين والهيريون وله قابلية توليد الإدمان مثلها وهو يستعمل كمسكن ومهدئ في متلازمة الامتناع عن المخدرات في معالجة إدمان الهيريون ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقن داخل العضل أو تحت الجلد.

methamphetamine ميثامفيتامين. دواء محاكي للودي من فصيلة الأمفيتامين يؤدي سوء استعماله إلى الإدمان.

m. hydrochloride هيدزوكليوريد الميثامفيتامين. دواء يستعمل بصورة رئيسية كمنبه مركزي في علاج الاكتئاب النفسي وحالات الاعتلال النفسي والشرود والنوم الانتيابي (السبخ) والسمنة الخارجية المنشأ وتهدة الأطفال مفرطي الحركة وبعد التبنيخ النخاعي.

metharbital ميثاربيتال. دواء مضاد للاختلاج يستعمل في علاج نوبات الصرع الكبير والصغير والرمع العضلي ونوبات الصرع المختلطة ويستعمل عن طريق الفم.

methixine hydrochloride هيدزوكليوريد المِيثِكْسِين. دواء مضاد لتشنج العضلات الملساء يستعمل في حالات المغص المعوي والمعدي.

methomania هوس الكحول. هوس المشروبات الكحولية.

methsuximide مِثْسُكْسِيمِيد. دواء يستعمل في علاج الصرعين الصغير والنفسي الحركي.

metiapine مِتْيَابِين. دواء يستعمل في علاج الفصام.

metonymy تَبْدِيلُ الْكَلِمَات. اختلال الكلام في مرضى الفصام تستعمل فيه كلمات بديلة ومقلوبة ولكنها ليست بعيدة عن الاسماء الصحيحة.

metopodynia صُدَاعُ جَبْهِي. صداع القسم الجبهي من الرأس.

metopon 1. مُقَدِّمُ الْجَبْهِي الْمَقْطَب 2. مِيتُوبُون. 1. القسم الامامي من المستوى الوسطي بين الحاجبين أو مقدمة الفص الجبهي للدماغ. 2. مادة تستخلص من المورفين تستعمل لتسكين الألم.

metralgia أَلَمُ الرَّجَم.

metrodynia وَجَعُ الرَّجَم.

metrostasis ثَبَاتُ الطَّوْل. حالة بقاء طول الليف العضلي ثابتاً في حالتي تقلصه وانبساطه.

micrencephalia (= micrencephaly) صِغَرُ الدِّمَاغ. صغر الدماغ الشاذ.

microcephalia (= microcephaly) صِغَرُ الرَّاس. صغر الدماغ والذي غالباً ما يترافق مع التخلف العقلي.

microcephalous صِغِيرُ الرَّاس. شخص صغير الرأس جداً وبصورة شاذة.

microcephaly صِغَرُ الرَّاس. صغر الرأس لدرجة شاذة مع تخلف عقلي.

microcrania صِغَرُ الْقَاف. صغر القحف الشاذ حيث تكون كل أقطاره أقصر من الحد السوي وتظهر منطقة الوجه كبيرة نسبة لحجم الجمجمة.

microencephaly (= micrencephaly) صِغَرُ الدِّمَاغ. صغر الدماغ الشاذ.

microglia دُبُقُ صِغْرِي؛ دُبَيْغِيَّات. الخلايا الخلالية الصغرية اللاعصبية ذات المنشأ الاديمي

المتوسط والتي تكون قسماً من البنية الساندة للجهاز العصبي المركزي وهي ذات اشكال مختلفة وقد تكون لها استطالات دقيقة وطويلة وهي خلايا مهاجرة وتعمل كخلايا بلعمية للفضلات التي تطرحها الانسجة العصبية.

microgliacyte (= microgliocyte) خلية دُبُقِيَّة؛ خَلِيَّةٌ دُبُقِيَّةٌ صِغْرِيَّة.

microgliocyte (= microglia cell) خَلِيَّةٌ دُبُقِيَّةٌ صِغْرِيَّة. الخلية الاولى التي تتطور لتولد الدبق الصغري.

microgliomatosis دُبَاقٌ صِغْرِي؛ تكثر الدبق الصغري. حالة تكون أورام تحوي دبقاً صغرياً.

microgyria (= polymicrogyria) التَّلَافِيفُ الصِّغْرِيَّة.

microgyrus تَلْفِيفٌ صِغْرِي. تلفيف دماغي صغري شاذ.

microinfarct اِحْتِشَاءٌ صِغْرِي. احتشاء صغير جداً بسبب انسداد الدوران في إحدى الشعيرات أو الشريينات.

micromania هَوْسُ الصِّغَارَةِ. هوس الاستصغار والاستئصال.

micromyelia صِغَرُ النُّخَاع. صغر النخاع الشوكي الشاذ.

microneurosurgery جِرَاحَةُ الْأَعْصَابِ المِجْهَرِيَّة. جراحة تجري باستعمال المجهر والادوات الصغيرة على أوعية الجهاز العصبي وبنياته الدقيقة.

micropolygyria (= polymicrogyria) تَعَدُّدُ التَّلَافِيفِ الصِّغْرِيَّة.

microsthenic وَاهِنُ الْعَضَلَات. شخص ذو عضلات واهنة.

microthrombosis خُثَارٌ صِغْرِي. وجود عدة خثرات صغرية في بعض الشعيرات أو الشريينات.

microthrombus خَثَرَةٌ صِغْرِيَّة. خثرة صغرية في شعيرة أو في وعاء دموي صغير.

midbrain (= mesencephalon) الدِّمَاغُ
المُتَوَسِّطُ.

midfrontal وَسَطُ الْجَبْهَةِ. وسط جبهة الرأس.

migraine الشَّقِيْقَةُ. نوبات دورية لصداع وعائي وعادة في المنطقة الصدغية وفي جهة واحدة من الرأس ويترافق عادة مع الهيجوية والغثيان أو التقيؤ والإمساك أو الإسهال ورهاب الضوء، ويسبق النوبات عادة تضيق الشرايين القحفية مع أعراض بادرية خصوصاً في العين ويتلو ذلك توسع الأوعية.

- abdominal m. الشَّقِيْقَةُ البَطْنِيَّةُ. الشقيقة التي تظهر فيها الأعراض البطنية كالغثيان والتقيؤ والإسهال.

- acute confusional m. الشَّقِيْقَةُ التَّخْلِيْطِيَّةُ. الحَاذَةُ. نوع نادر من الشقيقة يحدث في الأطفال ويتصف بنوبات تخلطوية وتوهان وهياج وقلق وتوجس وقد لا يظهر الصداع عند البدء ولكنه يظهر دائماً في الأخير.

- cervical m. الشَّقِيْقَةُ الرَّقِيْبِيَّةُ. نوبة ألم شديد في العنق وعادة ما يكون في قفا الرقبة أو في المنطقة القذالية في جهة واحدة أو في الجهتين.

- epileptic m. الشَّقِيْقَةُ الصَّرْعِيَّةُ. 1. حدوث الشقيقة والصرع في نفس الوقت لدى الشخص. 2. صداع يشبه الشقيقة يسبق أو يتلو نوبة الصرع. 3. ظاهرة هراعية حسية أو بصرية تشبه آورة الشقيقة ولكنها تحدث في الصرع البؤري أو الجزئي.

- facioptegic m. الشَّقِيْقَةُ الْمُشْلِلَةُ لِلوَجْهِ. شلل وجهي نصفي عابر يحدث في نوبة الشقيقة.

- fulgurating m. الشَّقِيْقَةُ الصَّاعِقَةُ. نوبة شقيقة شديدة تبدأ بصورة مفاجئة.

- hemiplegic m. الشَّقِيْقَةُ الْفَالِجِيَّةُ. نوبة شقيقة تترافق مع شلل نصفي أو خزل نصفي عابر.

- ophthalmic m. الشَّقِيْقَةُ الْعَيْنِيَّةُ. نوبة شقيقة تترافق مع غمش العين أو آية اختلالات بصرية أخرى.

- ophthalmoplegic m. الشَّقِيْقَةُ الشَّلْلِيَّةُ الْعَيْنِيَّةُ؛ الشقيقة الشالَّة للعَيْن. الشقيقة الدورية التي تترافق مع شلل العين.

milnenperone مِلْنَبِرُون. دواء يستعمل كمهدئ.

milieu الوَسْطُ. المحيط.

- m. exterieur الوَسْطُ الْخَارِجِي. الوسط المحيط بالجسم.

- m. interieur الوَسْطُ الدَّاخِلِي. وسط داخل الجسم وهو وسط الدم واللف المحيط بالخلايا.

mimesis مُحَاكَاة. مشابهة أحد الأمراض لمرض آخر في الجسم.

mimetic مُحَاكِ. مشابه لوظيفة أو مرض جسمي آخر.

mimic (= mimetic) مُحَاكِ.

mimination مَأْمَاة. إدخال حرف الـ «م» في وسط الكلمات عند نطقها.

mimosis (= mimosis) مُحَاكَاة.

mind الْعَقْل. وظيفة أو ملكة الدماغ التي يعي المرء بواسطتها محيطه وما يدور فيه وانتشار ذلك في المكان والزمان ويدرك المرء بواسطته مشاعره وعواطفه ورغباته وذكرياته ويمكنه من أن يسبب الأمور ويعقلها ويتخذ الإجراء المناسب بشأنها.

minuthesis وَهْنٌ حَسِّي. نقص الإحساس النفساني الجسدي لأحد أعضاء الحس عند تنبيهه المستمر لفترة طويلة.

miopragia وَهْنٌ وَظِيفِي. نقص الفعالية الوظيفية.

miosis تَقْبِضُ الْحَدَقَةِ. تقبض الحدقة وصغرها. **- Irritative m. (= spastic m.)** تَقْبِضُ الْحَدَقَةِ التَّشْنِجِي. التشنجي.

- paralytic m. تَقْبِضُ الْحَدَقَةِ الشَّلْلِي. تقبض الحدقة بسبب شلل العضلة موسعة الحدقة.

- spastic m. تَقْبِضُ الْحَدَقَةِ التَّشْنِجِي. تقبض الحدقة بسبب تشنج العضلة مضيقة الحدقة.

- spinal m. تَقْبِضُ الْحَدَقَةِ النُّخَاعِي. تقبض الحدقة بسبب مرض النخاع الشوكي.

misanthropia كُرْهُ الْبَشَر.

misogamy كُرْهُ الزَّوْاج. كره الزواج ورفضه.

misogyny كُرْهُ النِّسَاء.

mittelschmerz (= intermenstrual pain) أَلَمُ الْقَرْء؛ أَلَمُ بَيْنَ الْحَيْضَيْن. الألم

في الفترة بين حيزين متتالين، ويطرافق ذلك في الغالب مع الإباضة.

النهاية المُنبّهة. أي (**mittor** = **neuromittor**) من نهايات العصبون التي تولد دفعة عصبية أو تنبه مستقبلات العصبون المجاور.

mnemonic (= **mnemonic**) **ذَكْرِيّ.**

mnemonic 1. **ذَكْرِيّ 2.** مُقْوِي الذاكرة. متعلق بالذاكرة أو يتصف بها أو يحفزها.

mnemonics **تقوية الذاكرة:** تَطْوِيرُ الذاكرة. عملية تطوير الذاكرة وتحفيزها بمختلف الطرق والأساليب.

mobility **تحرك:** حَرَاك. 1. القدرة على الحركة أو التحرك أو التحريك.

mobilization **تَحْرِيك.** عملية تحريك جسم ثابت أو تحفيز مواد مخزونة على الحركة أو تمكين أحد الأعضاء المثبتة من الحركة كفك التصاقات العظم الركابي وتمكينه من الحركة.

mogiathria **رُتَّةُ عَضَلِيَّةِ المُنْشَأ.** عسر الكلام نتيجة خلل عضلات النطق.

mogilalia (= **stuttering**) **تَلَاة.**

mogiphonia **عُسْرُ التَّصْوِيت.** صعوبة توليد الأصوات.

monamine (= **monoamine**) **أَحَادِيّ الأَمِين.**

monaminergic (= **monoaminergic**) **أَحَادِيّ أَمِينِيّ الفِعْل.**

monaxon **أَحَادِيّ المِخْوَار.** عصبون له محور واحد.

monesthetic **مُتَعَلِّقٌ بِأَحَدِيّ الحَوَاس.** متعلق بأحدى الحواس أو يصيب إحدى الحواس فقط.

mongolism **المَغُولِيَّة.** مصطلح قديم يصف متلازمة داون للشبه الشديد بين شكل وجه المصاب بها ووجه سكان منغوليا.

monoamine **أَحَادِيّ الأَمِين.** جزيء أميني يحوي مجموعة أمينية واحدة مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين (النورابينفرين).

monoamine oxidase (MAO)

أكْسِيدَازُ أَحَادِيّ الأَمِين. (= **amine oxidase**) إنزيم يؤثر على أحاديّات وثنائيّات الأمين.

monoaminergic **أَحَادِيّ أَمِينِيّ الفِعْل.** عصبونات تفرز مواد أحادية الأمين كناقلات عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين.

monoanesthesia **تَخْدِيرٌ أَحَادِيّ.** تنبج عضو واحد أو أحد أقسام الجسم فقط.

monochorea **رَقَصٌ أَحَادِيّ.** رقص يصيب أحد الأذرع فقط.

monomania **هَوَسٌ أَحَادِيّ.** هوس يتصف بالتركيز على موضوع أو فكرة واحدة.

monomyoplegia **شَلَلٌ عَضَلِيّ أَحَادِيّ.** شلل يصيب عضلة واحدة فقط.

monomyositis **الْتِهَابُ العَضَلَةُ الأحَادِيّ.** التهاب يصيب العضلة ذات الرأسين فقط وبصورة دورية.

1. **أَحَادِيّ العَصَب 2.** أحادي العصبون. 1. متعلق بعصب واحد أو مغذى بفروع عصب واحد فقط. 1. ذو عصبون واحد فقط.

mononeuric **أَحَادِيّ العَصْبُون.** ذو عصبون واحد فقط.

mononeuritis **الْتِهَابُ العَصَبِ الأحَادِيّ.** التهاب عصب واحد فقط.

m. multiplex **الْتِهَابُ الأعْصَابِ الْمُتَعَدِّدَة.** التهاب عدة أعصاب متفرقة في ذات الوقت.

mononeuropathy **إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ أَحَادِيّ.** داء يصيب عصباً واحداً فقط.

- cranial m. **إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ قَحْفِيّ.** مرض أحد الأعصاب القحفية كمرض العصب القحفي السابع في داء بيل.

monoparesis **خَزَلٌ أَحَادِيّ.** خزل يصيب أحد أطراف الجسم.

monoparesthesia **مَذَلٌ أَحَادِيّ.** مذل يصيب أحد أطراف الجسم.

monophasia **نُطْقٌ أَحَادِيّ.** حبسة يتمكن المصاب بها من نطق كلمة أو مقطع واحد فقط.

monoplegia **شَلَلٌ أَحَادِيّ.** شلل أحد أطراف الجسم.

monoplegic أَحَادِي الشَّلَل. مصاب بالشلل الأحادي أو منسوب إليه.

monosexual أَحَادِي الْجِنْس. الذي يظهر صفات أحد الجنسين فقط.

monosynaptic أَحَادِي التَّشَابُك. سبيل أو منعكس ذو تشابك واحد فقط.

monticulus cerebelli النَّاتِيءُ الْمُخِخِي. ناتئ أو القسم المركزي من الدودة العليا.

mood مُزَاج. حالة عاطفية ثابتة ويمكنها عندما تكون متطرفة أن تغير أسلوب حياة صاحبها وآراءه وقد يكون المزاج كثيباً أو مرحاً.

mood-congruent مُنْسَجِم مَعَ الْمَزَاج. الهلوسة المنسجم مع مزاج الشخص والذي يحدث خلال نوبة هوسية أو اكتئابية.

mood-incongruent غَيْرُ مُنْسَجِم مَعَ الْمَزَاج. هلوسة وتوهم غير منسجم مع المزاج يحدث في حالات الفصام والاضطرابات النفسانية الأخرى.

moron مَافُون. إحدى درجات التخلف العقلي يكون حاصل الذكاء فيها (50-69)، وهو تخلف معتدل نسبياً.

moronity أَفَن. تخلف عقلي معتدل.

morphine مُورَفِين. عقار قلواني يستخلص من الأفيون وهو مسكن شديد الفعالية ويؤدي استعماله الطويل إلى الإدمان.

morphinism 1. المُرَفِينِيَّة 2. إِذْمَانُ المُرَفِين. حالة مرضية تتولد عن سوء استعمال المورفين لمدة طويلة أو إدمانه.

morphinist مُدَمِّنُ المُرَفِين. شخص مصاب بالإدمان على المورفين.

morphinium (= morphine) مُورَفِين.

motility تَحَرُّك. القدرة على الحركة الذاتية.

motivation دَافِع. في علم النفس هو أي من القوى التي تنشط السلوك وتدفع المرء إلى تحقيق أي من رغباته أو الحصول على أي من احتياجاته.

motive حَافِز؛ دَافِع. في علم النفس هي الحالة التي تدفع بالشخص على القيام بسلوك معين يستهدف تحقيق أي من رغباته.

achievement m. حَافِزُ إِنْجَازِي. الرغبة في الانجاز لغرض الانجاز نفسه.

aroused m. حَافِزُ مُسْتَنَار. حافز يؤثر على السلوك بصورة فعالة والذي يستدل عليه من طبيعة السلوك نفسه.

motoceptor مُسْتَقْبِلُ حَرَكي. إحدى المستقبلات الحسية في العضلة كعضو غولجي في الوتر أو في المغزل العضلي.

motofacient مُحَرِّك. ما يولد الحركة ويطلق على طور النشاط العضلي الذي يساعد العضلة على حركتها الفعلية.

motoneuron عَصْبُونٌ حَرَكي. عصبون ذو وظيفة حركية وهو عصبون صادر ينقل الدفعات الحركية إلى الأعضاء المنفذة.

alpha m's. عَصْبُونَاتُ الْفَا الحَرَكيَّة. عصبونات القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي تعطي ألياف الفا العصبية التي تغذي ألياف العضلات الهيكلية.

gamma m's. عَصْبُونَاتُ غَامَا الحَرَكيَّة. عصبونات القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي تعطي ألياف غاما العصبية التي تغذي الألياف داخل المغازل العضلية.

heteronymous m's. العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة المَعَارِبة. العصبونات الحركية التي تغذي عضلات غير تلك التي تصدر منها الدفعات الواردة.

homonymous m's. العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة المَعَاثِلَة. العصبونات الحركية التي تغذي العضلات التي تصدر منها التنبضات العصبية الواردة.

lower m's. العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة السُّفْلِيَّة. عصبونات حركية محيطية توجد في أجسام خلايا في القرن الأمامي للنخاع الشوكي وتوزع أليافها إلى العضلات.

peripheral m's. العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة المُحِيطِيَّة. عصبونات في قوس المنعكس العصبي المحيطي تستلم الدفعات العصبية من العصبونات الوسيطة لتنتقلها إلى العضلات الإرادية.

upper m's. العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة العُلْوِيَّة. عصبونات القشرة الدماغية التي تنقل الدفعات العصبية من القشرة الحركية إلى النوى الحركية للأعصاب القحفية أو إلى العمود السنجابي الأمامي للنخاع الشوكي.

motor حَرَكَِيّ. 1. عصب أي عضلة أو مركز عصبي متحكم في الوظيفة الحركية 2. ما يحفز الحركة أو منسوب إليها.

- **m. oculi (= oculomotor nerve)** العَصَبُ مُحَرِّكُ الْعَيْنِ.

movement حَرَكَةٌ. (ج: حَرَكَات). 1. عملية الحركة 2. عملية التَقَوُّط.

- **active m.** حَرَكَةٌ فَاعِلَةٌ. حركة إرادية تقوم بها عضلات الشخص نفسه.

- **adversive m.** حَرَكَةٌ تَوَجُّهِيَّةٌ. حركة متجهة نحو الجذع أو حركة متجهة نحو جهة البنية العصبية المركزية المنبهة.

- **ameboid m.** حَرَكَةٌ أَمِيبَانِيَّةٌ. حركة الاميبة التي تتم بجريان الهيولي إلى الأقدام الكاذبة التي تقدم جسم الاميبة وتحركه.

- **angular m.** حَرَكَةٌ زَاوِيَّةٌ. حركة تغير زاوية المفصل بين عظمين.

- **assistive m.** حَرَكَةٌ مُسَاعِدَةٌ. حركة تستعمل في العلاج الطبيعي حيث يساعد المعالج المريض على القيام ببعض حركات أطرافه المشلولة ومن الممكن أن تكون حركات فاعلة أو لا فاعلة.

- **associated m.** حَرَكَةٌ مُتَرَابِطَةٌ. حركات اقسام من الجسم تتم مترامنة مع بعضها البعض مثل حركات العينين والأجفان.

- **associated contralateral m.** حَرَكَةٌ مُتَرَابِطَةٌ بِالْجَانِبِ الْمُقَابِلِ. حركة لا إرادية في الجهة المشلولة من المريض المفلوج عند قيامه بحركة إرادية في الجهة السليمة.

- **athetoid m.** حَرَكَةٌ كُنْعَانِيَّةٌ. حركة تشبه الحركات التي تشاهد في الكنع.

- **automatic m.** حَرَكَةٌ تِلْقَائِيَّةٌ. حركة لاإرادية ينبهها الجهاز العصبي الذاتي.

- **bowel m.** التَقَوُّط. حركة الامعاء والتفوط.

- **choreic m's.** حَرَكَاتٌ رَقْصِيَّةٌ. الحركات النفضية غير المنتظمة التي تحدث في مجموعات من العضلات في داء الرقص.

- **cillary m's.** حَرَكَاتٌ هَذْبِيَّةٌ. الحركات المستمرة التي تقوم بها أهداب بعض الأعضاء أو الخلايا.

- **circus m.** حَرَكَةٌ دَائِرِيَّةٌ. مشية دورانية خاصة وهي حركة التفاضية متعثرة تحدث في آفات الدماغ ومراكز الأعصاب القاعدية.

- **contralateral associaed m. (= associated contralateral m.)** حَرَكَةٌ مُتَرَابِطَةٌ بِالْجَانِبِ الْمُقَابِلِ.

- **dystonic m.** حَرَكَةٌ مُخْتَلَّةُ التَوَثُّرِ. حركة كنعنانية كبيرة مضخمة.

- **forced m.** حَرَكَةٌ قُسْرِيَّةٌ. حركة تتولد عن إصابة أحد المراكز الحركية أو السبل العصبية الحركية.

- **Frenkel's m's.** حَرَكَاتٌ فَرَنْكِل. سلسلة من حركات دقيقة يقوم بها المريض المصاب بالرنح بغرض استعادة توازنه وتناسق حركته.

- **passive m.** حَرَكَةٌ لَا فَاعِلَةٌ. حركة قسم أو طرف من أطراف الجسم تجري بفعل قوة خارجية ومن دون أن يبذل فيها الجسم أي جهد.

- **rapid eye m. (REM)** حَرَكَةُ الْعَيْنِ السَّرِيعَةِ. حركة العينين المتقارنة والسريعة التي تحدث أثناء النوم العميق (نوم حركات العين السريعة).

- **reflex m.** حَرَكَةٌ إِنْعَكَاسِيَّةٌ. حركة لا إرادية نمطية يحفزها منبه خارجي وتتم خلال مركز عصبي والتي تحدث خلال القوس المنعكسية.

- **saccadic m.** حركة رمشية؛ حَرَكَةٌ قَفْزِيَّةٌ. حركة العين السريعة عندما تقفز من موقع تثبيت واحد إلى موقع آخر.

- **spontaneous m. (= automatic m.)** حَرَكَةٌ تِلْقَائِيَّةٌ؛ حَرَكَةٌ عَفْوِيَّةٌ.

- **synkinetic m.** حَرَكَةٌ مُرَافِقَةٌ. حركات ثانوية صغيرة لاواعية ترافق الحركات الإرادية الكبيرة مثل حركات الوجه التي ترافق حركات الإجهاد الشديد.

- **voluntary m.** حَرَكَةٌ إِرَادِيَّةٌ. حركة فاعلة يقوم بها الشخص عن وعي تام.

mover مُحَرِّكٌ. الذي يولد الحركة.

- **prime m.** الْمُحَرِّكُ الرَّئِيسِيّ. العضلة التي تعمل بصورة مباشرة في تنفيذ إحدى الحركات المرغوبة.

multisynaptic (= polysynaptic) متعدّد المشابك؛ عَدِيدُ التَشَابُكَاتِ.

muscle عَضَلَةٌ. نسيج أساسي في الجسم

تمتلك خلاياه القدرة على التقلص مما يمكن الجسم أو أحد أقسامه على الحركة.

- agonistic m. عَضَلَةٌ مُضَادَّةٌ. عضلة تضادها في عملها عضلة ضادة (مناهضة).

- antagonistic m. عضلة مناهضة؛ عَضَلَةٌ ضَادَّةٌ. عضلة تضاد في عملها عمل عضلة أخرى تسمى العضلة الشادة.

- antigravity m's. عَضَلَاتٌ مُقَاوِمَةٌ لِلجاذِبِيَّةِ. عضلات تقاوم فعل الجاذبية التي تحاول جذب الجسم للأسفل وبذا تحافظ على وضعه.

- articular m. (= musculus articularis) عَضَلَةٌ مَفْصَلِيَّةٌ.

- m. atony وَنِي عَضَلِيٌّ. انظر atony.

- cardiac m. عَضَلٌ قَلْبِيٌّ. عضل القلب المكون من الألياف عضلية مخططة لا إرادية.

- m. clonus رَمَعٌ عَضَلِيٌّ. انظر clonus.

- m. contraction تَقَلُّصُ العَضَلَةِ. انظر contraction.

- m. contracture تَقَفُّعُ العَضَلَةِ. انظر contracture.

- m. cramp مَعْصُ العَضَلَةِ. انظر cramp.

- emergency m's. عَضَلَاتٌ الطَوَارِيءِ. عضلات لا يحتاجها الجسم في الحالات الاعتيادية للقيام بوظائفه الطبيعية لكنها تساعد عضلات الحركات الكبيرة عند قيامها بحركة شديدة أو طارئة.

- extensor m. عَضَلَةٌ بِاسِطَةٌ. عضلة تقوم ببسط أحد الأجزاء أو الأطراف.

- fast m. (= white m.) عَضَلَةٌ سَرِيعَةٌ. عضلة بيضاء.

- flexor m. عَضَلَةٌ مُنْخِئَةٌ. عضلة تقوم بثني أحد الأجزاء أو الأطراف.

- involuntary m. عَضَلَةٌ لَإِزَادِيَّةٍ. عضلة لا تقع تحت السيطرة الإرادية وهي غالباً غير مخططة عند العضلة القلبية.

- nonstriated m. عضلة غير مخططة؛ عَضَلَةٌ مُلْسَاءٌ. عضل لا إرادي وهو نوع من العضل لا يحوي خطوطاً عرضانية على أليافه.

- plain m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مُلْسَاءٌ.

- red m. عَضَلَةٌ حَمْرَاءٌ. عضلة حمراء قانية اللون

توجد في بعض الحيوانات اللبونة وتتكون من الألياف غامقة غنية بالمتقدرات والفلوبين العضلي والهيولى العضلية ولكنها تحوي خطوطاً عرضية باهتة اللون وتقوم بتقلصات بطيئة ومتناوبة لفترات طويلة. لذلك فإنها تسمى عضلات بطيئة ولا تتعب بسهولة.

- skeletal m's. العَضَلَاتُ الهَيْكَلِيَّةُ. عضلات مخططة. تتركز على العظام وعادة ما تعبر حول أحد المفاصل.

- slow m. (= red m.) عَضَلَةٌ بَطِيئَةٌ.

- smooth m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مُلْسَاءٌ. عضلة لا إرادية لا مخططة.

- somatic m's. (= skeletal m's.) عَضَلَاتٌ هَيْكَلِيَّةٌ.

- m. spindle مِفْزَلٌ عَضَلِيٌّ. انظر spindle.

- striated m. عَضَلَةٌ مَخْطُطَةٌ. عضلة توجد في أليافها خطوط عرضية وعادة هي عضلات إرادية إلا العضلة القلبية فهي مخططة ولكنها لا إرادية.

- striped m. (= striated m.) عَضَلَةٌ مَخْطُطَةٌ.

- synergic m's. (= synergistic m's.) عَضَلَاتٌ تَأَزَّرِيَّةٌ.

- m. tone (muscular tension) التَوَتُّرُ العَضَلِيُّ. انظر tension.

- tonic m. (= red m.) عَضَلَةٌ حَمْرَاءٌ؛ عَضَلَةٌ تَوَتَّرِيَّةٌ.

- m. tremor رُعَاشٌ عَضَلِيٌّ. انظر tremor.

- m. twitch نَفْضَانٌ عَضَلِيٌّ. انظر twitch.

- twitch m. (= white m.) عَضَلَةٌ بَيْضَاءٌ؛ عَضَلَةٌ نَفْضَانِيَّةٌ.

- unstriated m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مُلْسَاءٌ. عضلة غير مخططة.

- visceral m. عَضَلَةٌ حَشَوِيَّةٌ. الألياف عضلية توجد بصورة رئيسية في الأحشاء المجوفة وكلها عضلات حشوية ملساء ما عدا تلك الألياف الحشوية التي توجد في القلب فهي الألياف مخططة ولكنها لا إرادية.

- voluntary m. عَضَلَةٌ إِزَادِيَّةٌ. عضلة تحت سيطرة الإرادة وهي غالباً ما تكون عضلة مخططة.

- white m. عَضَلَةٌ بَيْضَاءٌ. الألياف عضلية فاقعة اللون تحوي القليل من الهيولى العضلية والأليافها أسمك عادة من الألياف العضلات الحمراء وأسرع منها عملاً ولذلك تسمى العضلات السريعة.

muscular عَضَلِيّ. متعلق بالعضل أو مكوّن منها.
musculature المَجْمُوع العَضَلِيّ؛ العَضَل.
 الجهاز العضلي للجسم أو لأحد أعضائه.

musculoskeletal عَضَلِيّ هَيْكَلِيّ. متعلق
 بالمجموعة العضلية والجهاز الهيكلي للجسم.

musculi عَضَلَات. جمع عضلة.

musculus عَضَلَة. عضو يتقلص ويرتخي
 فيحرك بذلك الجسم كله أو أحد أعضائه.

- **musculi abdominis** عَضَلَات البَطْن.

- **m. abductor digiti minimi manus**
 (= **abductor muscle of little finger**)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِخَنَصِرِ اليَد. عضلة في اليد يغذيها

العصب الزندي.

- **m. abductor digiti minimi pedis**
 (= **abductor muscle of little toe**)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِخَنَصِرِ القَدَم. عضلة يغذيها الفرع السطحي

للعصب الأخمصي الوحشي.

- **m. abductor digiti quinti manus** (= **m.**
abductor digiti minimi manus)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِخَنَصِرِ اليَد.

- **m. abductor digiti quinti pedis** (= **m.**
abductor digiti minimi pedis)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِخَنَصِرِ القَدَم.

- **m. abductor hallucis** (= **abductor**
muscle of great toe)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِإِبْهَامِ القَدَم. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الإنسي.

- **m. abductor pollicis brevis** (= **short**
abductor muscle of thumb)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة لِإِبْهَامِ. عضلة يغذيها العصب الناصف.

- **m. abductor pollicis longus** (= **long**
abductor muscle of thumb)
 العَضَلَة المُبَعِّدَة الطَوِيلَة لِإِبْهَامِ. عضلة يغذيها العصب بين

العظام الخلفي.

- **m. adductor brevis** (= **short adductor**
muscle)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة القَصِيرَة. عضلة

تقرب وتدور وتثني الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor hallucis** (= **adductor**
muscle of great toe)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة لِإِبْهَامِ القَدَم. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الوحشي.

- **m. adductor longus** (= **long adductor**
muscle)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة الطَوِيلَة. عضلة تقرب وتدور وتثني الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor magnus** (= **great adductor**
muscle)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة الكَبِيرَة. ولها قسمان سطحي يمدد الفخذ ويغذيها العصب الوركي وقسم عميق يقرب الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor minimus** (= **smallest**
adductor muscle)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة الصَغِيرَة. عضلة تقرب الفخذ ويغذيها العصبان الوركي والسدادي.

- **m. adductor pollicis** (= **adductor**
muscle of thumb)
 العَضَلَة المُقَرَّبَة لِإِبْهَامِ. عضلة تقرب الإبهام وتقابلها مع باقي الأصابع ويغذيها العصب الزندي.

- **m. anconeus** (= **anconeus muscle**)
 العَضَلَة المِرْفَقِيَّة. عضلة تمدد الساعد ويغذيها العصب الكعبري.

- **m. antitragicus** (= **antitragus muscle**)
 عَضَلَة المَرَزَة. عضلة تغير القليل جداً من شكل الأذن أو موقعها في الإنسان ويغذيها العصبان الصدغي والأذني الخلفي.

- **musculi arrectores pilorum** (= **arrector**
muscles of hair)
 العَضَلَات نَاصِبَة الشَّعْر. عضلات ترفع وتوقف شعر الجلد وتغذيها الأعصاب الودية.

- **m. articularis** (= **articular muscle**)
 عَضَلَة مَفْصِلِيَّة. عضلة تنغرز إحدى نهايتيها في الغشاء الزليلي للمفصل.

- **m. articularis cubiti** (= **articular**
muscle of elbow)
 عَضَلَة المِرْفَقِ المَفْصِلِيَّة. بعض ألياف السطح العميق للعضلة الثلاثية الرؤوس العضدية التي تنغرز في الرباط الخلفي والغشاء الزليلي لمفصل المرفق.

- **m. articularis genu** (= **m. articularis**
genus)
 عَضَلَة الرُّكْبَة المَفْصِلِيَّة.

- **m. articularis genus** (= **articular**
muscle of knee)
 عَضَلَة الرُّكْبَة المَفْصِلِيَّة. عضلة ترفع محفظة مفصل الركبة ويغذيها العصب الفخذي.

- m. aryepiglotticus (= aryepiglottic muscle) **الْعَضَلَةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ اللُّسَانِ الْعِزْمَارِيَّةُ.** اسم يطلق على حزمة غير ثابتة من العضلة الطرجهالية التي تتأصل من قمة الغضروف الطرجهالي وتنفرز في الحافة الوحشية للسان المزمار (الفلكة).
- m. arytenoideus obliquus (= oblique arytenoid muscle) **الْعَضَلَةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْمَائِلَةُ.** عضلة تغلق مدخل الحنجرة ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- m. arytenoideus transversus (= transverse arytenoid muscle) **الْعَضَلَةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ.** عضلة تقرب الغضاريف الطرجهالية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- m. auricularis anterior (= anterior auricular muscle) **الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ.** عضلة تسحب الأذن إلى الامام ويغذيها العصب الوجهي.
- m. auricularis posterior (= posterior auricular muscle) **الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ.** عضلة تسحب الأذن للخلف ويغذيها العصب الوجهي.
- m. auricularis superior (= superior auricular muscle) **الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ.** عضلة ترفع الأذن للأعلى ويغذيها العصب الوجهي.
- muscoli auricularii (= auricular muscles) **الْعَضَلَاتُ الْأُذُنِيَّةُ.** العضلات الأذنية الداخلية التي تمتد بين أقسام صيوان الأذن وتشمل العضلات الحتاريتين الكبيرة والصغيرة والزئمة والمرزة والأذنيتين المائلة والمستعرضة.
- m. biceps brachii (= biceps muscle of arm) **الْعَضَلَةُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ الْعَضْدِيَّةُ.** عضلة تثني الساعد وتبسط اليد ويغذيها العصب العضلي الجليدي.
- m. biceps femoris (= biceps muscle of thigh) **الْعَضَلَةُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ الْفَخْذِيَّةُ.** عضلة تثني الساق وتبسط الفخذ ويغذي رأسها الطويل العصب الظنبوبي ورأسها القصير العصب الشظوي.
- m. brachialis (= brachial muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَضْدِيَّةُ.** عضلة تثني الساعد ويغذيها العصبان الكبير والعضلي الجليدي.
- m. brachioradialis (= brachioradial muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَضْدِيَّةُ الْكُفْبَرِيَّةُ.** عضلة تثني الساعد ويغذيها العصب الكبير.
- m. broncho-oesophageus (= bronchoesophageal muscle) **الْعَضَلَةُ الْقَصْبِيَّةُ.** اسم يطلق على حزم من الياف عضلية تتأصل من جدار القصبة اليسرى تسند عضلات المريء.
- m. buccinator (= buccinator m.) **الْعَضَلَةُ الْمُبَوَّقَةُ.** عضلة تضغط على الوجنة وتسحب زاوية الفم ويغذيها الفرع الشدقي للعصب الوجهي.
- m. buccopharyngeus (= pars buccopharyngea muscili constrictoris pharyngis superioris) **الْعَضَلَةُ الشَّدْقِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ.** القسم الشدقي البلعومي للعضلة المضيق للبلعوم العلوية.
- muscoli bulbi (= extraocular muscles) **عَضَلَاتُ الْمُقْلَةِ.** العضلات الإرادية الست التي تحرك مقلة العين وهي المستقيمات العلوية والسفلية والوحشية والإنسية والمائلتان العلوية والسفلية.
- m. bulbo cavernosus (= m. bulbospongiosus) **الْعَضَلَةُ الْبَصَلِيَّةُ الْكَهْفِيَّةُ.**
- m. bulbospongiosus (= bulbocavernosus m.) **الْعَضَلَةُ الْبَصَلِيَّةُ الْكَهْفِيَّةُ.** عضلة تضيق بصلة الإحليل ويغذيها العصب الفرجي.
- m. caninus (= m. levator anguli oris) **الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لَزَاوِيَةِ الْفَمِّ.**
- muscoli capitis (= muscles of the head) **عَضَلَاتُ الرَّأْسِ.**
- m. ceratocricolideus (= ceratocricoid muscle) **الْعَضَلَةُ الْقَرْنِيَّةُ الْخَلْقِيَّةُ.** اسم لحزمة عضلية تتأصل من الغضروف الحلقي وتنفرز في السطح السفلي لقرن الغضروف الدرقي.
- m. ceratopharyngeus (= pars ceratopharyngea muscili constrictoris pharyngis medii) **الْعَضَلَةُ الْقَرْنِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ.** الجزء القرني البلعومي للعضلة مضيق البلعوم الإنسية.

- **m. ciliaris (= ciliary muscle)** **الْعَضَلَةُ**
الهدبية. عضلة عينية داخلية تعمل على تغيير شكل عدستها ويغذيها عصب لا ودي يسير مع العصب محرك العين.
- **musculi coccygei (= coccygeal muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْعُصْفُصِيَّةُ.** العضلات التي تعمل على العصعص وتشمل العضلة العصصية والعضلة العجزية العصصية.
- **m. coccygeus (= coccygeal muscle)** **الْعَضَلَةُ الْعُصْفُصِيَّةُ.** عضلة تسند وترفع العصعص ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.
- **musculi colli (= neck muscles)** **عَضَلَاتُ**
الرقبة. وتشمل العضلة القصية الترقوية الخشائية والعضلة الرقبية الطويلة والقوق اللامية والتحت اللامية والعضلات الاخمصية.
- **m. compressor naris (= pars-transversa muscoli nasalis)**
الجزء المُستعرض للعضلة الأنفية.
- **m. constrictor pharyngis inferior (= inferior constrictor muscle of pharynx)**
العضلة مُضَيِّقَةُ الْبَلْعُومِ السُّفْلِيَّةِ. عضلة تغذيها الأعصاب اللسانية البلعومية والحنجري الظامري والراجع والصفيرة البلعومية.
- **m. constrictor pharyngis medius (= middle constrictor muscle of pharynx)**
العضلة مُضَيِّقَةُ الْبَلْعُومِ الْوَسْطِيَّةِ. عضلة تغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم والعصب اللساني البلعومي.
- **m. constrictor pharyngis superior (= superior constrictor muscle of pharynx)**
العضلة مُضَيِّقَةُ الْبَلْعُومِ الْعُلْوِيَّةِ. عضلة تغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم.
- **m. coracobrachialis (= coracobrachial muscle)** **الْعَضَلَةُ الْفَرَاوِيَّةُ الْعُضْدِيَّةُ.** عضلة تثني الذراع وتقربه ويغذيها العصب العضلي الجذلي.
- **m. corrugator supercillii** **الْعَضَلَةُ الْمُفْصَّئَةُ**
فَوْقَ الْهَدْبِيَّةِ. النهاية الإنسية للقوس فوق الهدبي والتي تسحب الجفن للأسفل وللجهة الإنسية ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. cremaster (= cremaster muscle)**
الْعَضَلَةُ الْمُشْمِرَّةُ. عضلة ترفع الخصية للأعلى ويغذيها الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي.
- **m. crico-arytenoideus lateralis (= lateral cricoarytenoid muscle)** **الْعَضَلَةُ**
الْحَلَقِيَّةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْوُحْشِيَّةُ. عضلة تقرب الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. crico-arytenoideus posterior (= posterior cricoarytenoid muscle)**
العضلة الْحَلَقِيَّةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ. عضلة تباعد الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. cricopharyngeus (= pars cricopharyngea muscoli constrictoris pharyngis inferioris)** **العضلة**
الْحَلَقِيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. الجزء الحلقى البلعومي من العضلة المضيقية للبلعوم السفلية.
- **m. cricothyroideus (= cricothyroid muscle)** **الْعَضَلَةُ**
الْحَلَقِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تشد وتوتر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري العلوي.
- **m. cruciatus (= cruciate muscle)** **عَضَلَةُ**
مُتَصَالِبَةٍ. عضلة تكون أليافها مرتبة بشكل متصالب على شكل X.
- **m. cutaneus (= cutaneous muscle)** **عَضَلَةُ**
جُلْدِيَّةُ. عضلة مخططة تنغرز في الجلد.
- **m. dartos (= dartos muscle)** **الْعَضَلَةُ**
السِّلْحِيَّةُ. ألياف عضلية غير مخططة في الغلالة السلحية وتساعد طبقتها العميقة في تكوين حاجز الصفن وقد يستعمل المصطلح للدلالة على الغلالة السلحية كلها.
- **m. deltoideus (= deltoid muscle)** **العضلة**
الدَّائِيَّةُ. عضلة تبعد أليافها الأمامية الذراع وتثنيه بينما تبعد أليافها الخلفية الذراع وتبسطه ويغذيها العصب الإبطي.
- **m. depressor anguli oris (= depressor muscle of angle of mouth)** **الْعَضَلَةُ**
الْخَافِضَةُ لِرَأْوِيَةِ الْفَمِ. عضلة يغذيها العصب الوجهي.
- **m. depressor labii inferioris (= depressor muscle of lower lip)** **العضلة**
الْخَافِضَةُ لِلشَّفَةِ السُّفْلَى. عضلة يغذيها العصب الوجهي.

- m. depressor septi nasi (depressor muscle of nasal septum) **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ لِحَاجِزِ الْأَنْفِ**. عضلة يغذيها العصب الوجهي وهي تضيق المنخر وتخفف حاجز الأنف.

- m. depressor supercillii (= superciliary depressor muscle) **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ فَوْقَ الْهَدَبِيَّةِ**. اسم يطلق على بضعة الياف من الجزء الحاجبي من عضلة العين الدويرية التي تنفرز في الحاجب الذي تخفّضه.

- m. detrusor vesicae (= detrusor muscle of bladder) **الْعَضَلَةُ النَافِضَةُ الْغَائِثِيَّةُ**. حزم من الألياف العضلية الملساء تكون الغلاف العضلي للمثانة ومرتبطة بطبقتين طولانية ودائرية وعند تقلصها تدفع البول وتطرّحه للخارج.

- muscoli diaphragmatis pelvis (= the muscles of the pelvic diaphragm) **عَضَلَاتُ حِجَابِ الْحَوْضِ**.

- muscoli diaphragmatis urogenitalis (= the muscles of the urogenital diaphragm) **عَضَلَاتُ حِجَابِ الْبُولِيِّ التَّنَاسُلِيِّ**.

- m. digastricus (= digastric muscle) **الْعَضَلَةُ ذَاتُ الْبَطْنَيْنِ**. عضلة ترفع العظم اللامي والفك السفلي ويغذي العصب الفكي اللامي قسمها البطني الأمامي بينما يغذي العصب الوجهي قسمها البطني الخلفي.

- m. dilator naris (= pars alaris muscoli nasalis) **الْعَضَلَةُ مُوسِّعَةُ الْمَنْخَرِ**. القسم الجناحي للعضلة الأنفية.

- m. dilator pupillae (= dilator muscle of pupil) **الْعَضَلَةُ مُوسِّعَةُ الْحَدَقَةِ**. عضلة تغذيها الأعصاب الودية.

- musculi dorsi (= dorsal muscles) **عَضَلَاتُ الظُّهْرِ**.

- m. epicranii (= epicranial muscle) **عَضَلَةُ الشَّوَاةِ**. الغطاء العضلي للفرجة الذي يشمل العضلتين القذالية الجبهية والصدغية الجدارية والخوذة السفاقية.

- m. epitrochleoanconeus (epitrochleoanconeus muscle) **الْعَضَلَةُ**

الْبُكَيرِيَّةُ الْمُزَفَّقِيَّةُ. شريط من الألياف العضلية يوجد أحياناً ويتأصل من ظهر اللقمة الإنسية للعضد وينغرز على الجهة الإنسية من الناتئ الزججي ويغذي فرع من العصب الزندي.

- m. erector spinae (= erector muscle of spine) **الْعَضَلَةُ النَّاصِبَةُ لِلْفَقَارِ**. ألياف من العضلات السطحية والعميقة للظهر تتأصل من العجز وشركات الفقرات القطنية والصدريتين الحادية عشرة والثانية عشرة وعرف الحرقفة ثم تنقسم لتغرز باسم العضلات الحرقفية الضلعية والطولى والشوكية.

- m. extensor carpi radialis brevis (= short radial extensor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الرُّسْغِ الْكَعْبَرِيَّةِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة تبسط مفصل الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الكعبري.

- m. extensor carpi radialis longus (= long radial extensor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الرُّسْغِ الْكَعْبَرِيَّةِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة تبسط مفصل الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الكعبري.

- m. extensor carpi ulnaris (= ulnar extensor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الرُّسْغِ الزَّنْدِيَّةِ**. عضلة تبسط وتقرب مفصل الرسغ ويغذيها العصب الكعبري العميق.

- m. extensor digiti minimi (= extensor muscle of little finger) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الْخِنْصِرِ**. عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.

- m. extensor digiti quinti proprius (= m. extensor digiti minimi) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الْخِنْصِرِ**.

- m. extensor digitorum (= extensor muscle of fingers) **الْعَضَلَةُ الْبَاسِطَةُ لِأَصَابِعِ الْيَدِ**. عضلة تبسط مفصل الرسغ والسلاميات ويغذيها العصب الكعبري العميق.

- m. extensor digitorum brevis (short extensor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة تبسط أصابع القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.

- m. extensor digitorum communis (m. extensor digitorum) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ أَصَابِعِ الْيَدِ**.

- m. extensor digitorum longus (= long extensor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة تبسط أصابع القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.
- m. extensor hallucis brevis (= short extensor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ**. اسم يطلق على جزء العضلة باسطة القدم القصيرة الذي يصل إبهام القدم.
- m. extensor hallucis longus (= long extensor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة تثني مفصل الكاحل للخلف وتبسط إبهام القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.
- m. extensor indicis (= extensor muscle of index finger) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ السَّيَّابَةِ**. عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.
- m. extensor indicis proprius (= m. extensor indicis) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ السَّيَّابَةِ**.
- m. extensor pollicis brevis (= short extensor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الإِبْهَامِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.
- m. extensor pollicis longus (= long extensor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الإِبْهَامِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق وهي تبسط وتبعد الإبهام.
- musculi extremitatis inferioris (= musculi membri inferioris) **عَضَلَاتُ الطَّرَفَيْنِ السُّفْلَيْنِ**.
- musculi extremitatis superioris (= musculi membri superioris) **عَضَلَاتُ الطَّرَفَيْنِ الْعُلَوَيْنِ**.
- musculi faciales et masticatores (= facial and masticatory muscles) **عَضَلَاتُ الْوَجْهِ وَالْمَضْغِ**.
- m. fibularis brevis (= m. peroneus brevis) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الْقَصِيرَةُ**.
- m. fibularis longus (= m. peroneus longus) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الطَّوِيلَةُ**.
- m. fibularis tertius (= m. peroneus tertius) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الثَّالِثَةُ**.
- m. fixator baseos stapedis (= fixator muscle of base of stapes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ قَاعَةِ الرُّكَّابِيِّ**. عضلة تثبت قاعدة الركابي وتمنعها من الاندفاع بشدة نحو النافذة الدهليزية وبذا فهي تضاد فعل العضلة الموترة للطلبل.
- m. flexor accessorius (m. quadratus plantae) **الْعَضَلَةُ الْأَخْمَصِيَّةُ الْمُرَبَّعَةُ**.
- m. flexor carpi radialis (= radial flexor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ الْكَفَّيَّةُ الرُّمِّيَّةُ لِلرُّسْغِ**. عضلة تثني الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الناصف.
- m. flexor carpi ulnaris (= ulnar flexor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ الزَّنْدِيَّةُ الرُّمِّيَّةُ لِلرُّسْغِ**. عضلة تثني الرسغ وتقربه ويغذيها العصب الزندي.
- m. flexor digiti minimi brevis manus (= short flexor muscle of little finger) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ الْخِنْصَرِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة يغذيها العصب الزندي.
- m. flexor digiti minimi brevis pedis (= short flexor muscle of little toe) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ إِصْبَعِ الْقَدَمِ الصَّغِيرِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الوحشي.
- m. flexor digitorum brevis (short flexor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الإنسي.
- m. flexor digitorum longus (= long flexor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة تثني أصابع القدم وتبسط القدم ويغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
- m. flexor digitorum profundus (= deep flexor muscle of fingers) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْعَمِيقَةِ**. عضلة تثني السلاميات القاصية ويغذيها العصبان الزندي وبين العظمين الأمامي.
- m. flexor digitorum sublimis (= m. flexor digitorum superficialis) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ السُّطْحِيَّةِ**.

- مُثَنِّةُ أَصَابِعِ الْبِدِ السُّطْحِيَّةِ. عضلة تثني السلاميات الوسطية ويغذيها العصب الناصف.
- m. flexor hallucis brevis (= short flexor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ مُثَنِّةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة يغذيها العصبان الأخمصيان الإنسي والوحشي.
- m. flexor hallucis longus (= long flexor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ مُثَنِّةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة يغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
- m. flexor pollicis brevis (= short flexor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ مُثَنِّةُ إِبْهَامِ الْيَدِ الْقَصِيرَةِ**. عضلة تثني الإبهام وتقربه ويغذيها العصبان الزندي والناصف.
- m. flexor pollicis longus (= long flexor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ مُثَنِّةُ إِبْهَامِ الْيَدِ الطَّوِيلَةِ**. عضلة يغذيها العصب بين العظمين الأمامي.
- m. frontalis (= venter frontalis musculi occipitofrontalis) **الْعَضَلَةُ الْجَبْهِيَّةُ**. البطن الجبهية للعضلة القذالية الجبهية.
- m. fusiformis (= fusiform muscle) **الْعَضَلَةُ الْمَغْرَلِيَّةُ**. عضلة مغزلية الشكل اليافها متوازية مع محورها الطولي وتتقارب على وتر كل من النهايتين.
- m. gastrocnemius (= gastrocnemius muscle) **عَضَلَةُ السَّاقِ**. عضلة ذات رأسين تثني الكاحل نحو الأخمص وتثني مفصل الركبة ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. gemellus inferior (= inferior gemellus muscle) **الْعَضَلَةُ التَّوَامِيَّةُ السُّفْلَى**. عضلة تدور الفخذ للخارج وتغذيها الصغيرة العجزية.
- m. gemellus superior (= superior gemellus muscle) **الْعَضَلَةُ التَّوَامِيَّةُ الْعُلْوَى**. عضلة تدور الفخذ للخارج وتغذيها الصغيرة العجزية.
- m. genioglossus (= genioglossus muscle) **الْعَضَلَةُ الذَّقْنِيَّةُ اللِّسَانِيَّةُ**. عضلة تبرز اللسان وتخسفه ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. geniohyoideus (= geniohyoid muscle) **الْعَضَلَةُ الذَّقْنِيَّةُ اللِّسَانِيَّةُ**. عضلة ترفع العظم اللامي وتسحبه مع العصب تحت اللساني.
- m. glossopalatinus (= m. palatoglossus) **الْعَضَلَةُ الْحَنَكِيَّةُ اللِّسَانِيَّةُ**.
- m. glossopharyngeus (= glossopharyngea musculi constrictoris pharyngis superioris) **الْعَضَلَةُ اللِّسَانِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ**. الجزء اللساني البلعومي من العضلة مضيق البلعوم العلوي.
- m. gluteus maximus (= greatest gluteal muscle) **الْعَضَلَةُ الْأَلْوِيَّةُ الْعُظْمَى**. عضلة تبسط وتبعد وتدور الفخذ للخارج ويغذيها العصب الألوي السفلي.
- m. gluteus medius (= middle gluteal muscle) **الْعَضَلَةُ الْأَلْوِيَّةُ الْوَسْطَى**. عضلة تبعد الفخذ ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- m. gluteus minimus (= least gluteal muscle) **الْعَضَلَةُ الْأَلْوِيَّةُ الصُّغْرَى**. عضلة تبعد الفخذ وتدوره للداخل ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- m. gracilis (= gracilis muscle) **الْعَضَلَةُ النَّاجِلَةُ**. عضلة تقرب الفخذ وتثني مفصل الركبة ويغذيها العصب السدادي.
- m. heliis major **عَضَلَةُ الْحَتَارِ الْكَبِيرَةِ**. عضلة تشد جلد القناة السمعية ويغذيها العصبان الأذني الصدغي والأذني الخلفي.
- m. heliis minor **عَضَلَةُ الْحَتَارِ الصَّغِيرَةِ**. حزمة عضلية صغيرة أمام حافة الحتار ويغذيها العصبان الصدغي والأذني الخلفي.
- m. hyoglossus (= hyoglossal muscle) **الْعَضَلَةُ اللِّسَانِيَّةُ**. عضلة تخسف اللسان وتسحبه للأمام ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. iliacus (= iliac muscle) **الْعَضَلَةُ الْخَرْقَفِيَّةُ**. عضلة تثني الفخذ والجذع على الطرف السفلي ويغذيها العصب الفخذي.
- m. iliococcygeus (= iliococcygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْخَرْقَفِيَّةُ الْعُضْصِيَّةُ**. عضلة تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاع الضغط داخل البطن ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.
- m. iliocostalis (= iliocostal muscle) **الْعَضَلَةُ الْخَرْقَفِيَّةُ الضِّلْعِيَّةُ**. القسم الوحشي للعضلة الناصبة للفقر.

- m. iliocostalis cervicis (= iliocostal muscle of neck) **العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الرِّقَبِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري الرقبي وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- m. iliocostalis dorsi (= m. iliocostalis thoracis) **العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ**.
- m. iliocostalis lumborum **العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ القَطَنِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري القطني وتغذيها فروع من الأعصاب الصدرية والقطنية.
- m. iliocostalis thoracis (= iliocostal muscle of thorax) **العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري الصدري وتقومه وتغذيها فروع من الأعصاب الصدرية.
- m. iliopsoas (= iliopsoas muscle) **العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ القَطَنِيَّةُ**. عضلة مركبة من العضلتين الحرقفية والقطنية الكبيرة.
- muscoli incisivi labii inferioris (= Incisive muscles of inferior lip) **العَضَلَاتُ القَاطِعِيَّةُ الشَّقَوِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. حزم صغيرة من الألياف العضلية من عضلة الفم الدويرية التي تتأصل من الحفرة القاطعية للفك السفلي وتمتد إلى جهتها وتمتد جانبياً إلى زاويتي الفم.
- muscoli incisivi labii superioris (= incisive muscles of superior lip) **العَضَلَاتُ القَاطِعِيَّةُ الشَّقَوِيَّةُ العُلْوِيَّةُ**. حزم صغيرة من الألياف العضلية التي تتأصل من الحفرة القاطعية للفك العلوي وتمتد إلى جهتها وتمتد جانبياً إلى زاويتي الفم.
- m. incisurae helicis **عَضَلَةُ الثَّلَمَةِ الحِجَارِيَّةُ**. حزمة عضلية غير ثابتة تمتد إلى الامام من العضلة الزمنية للأذن لتعبر ثلمة الصماخ الغضروفي.
- muscoli infrahyoides (= infrahyoid muscles) **العَضَلَاتُ تَحْتَ اللِّامِيَّةِ**. العضلات التي تثبت العظم اللامي بعظام القص والرقوة والكتف وتشمل العضلات القصية اللامية والكتفية والقصية الدرقية والدرقية اللامية.
- m. infrapinnatus (= infrapinnatus muscle) **العَضَلَةُ تَحْتَ الشُّوْكَةِ**. عضلة تدور العضد وحشياً ويغذيها العصب فوق الكتف.

- muscoli intercostalis externi (= external intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوُزْبِيَّةُ الظَّاهِرَةُ**. عضلات تقرب الأضلاع نحو بعضها أثناء عملية التنفس وحركات الزفير وتغذيها الأعصاب الوربية.
- muscoli intercostalis interni (= internal intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوُزْبِيَّةُ البَاطِنَةُ**. عضلات تقرب الأضلاع نحو بعضها أثناء عملية التنفس وحركات الزفير وتغذيها الأعصاب الوربية.
- muscoli intercostalis intimi (= innermost intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوُزْبِيَّةُ الأَعْمَقُ**. طبقة الألياف العضلية المفصولة عن العضلات الوربية الباطنية بالأعصاب الوربية.
- muscoli interossei dorsales manus (dorsal interosseous muscles of hand) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ لليد**. أربع عضلات تبعد وتثني السلاميات القصوية ويغذيها العصب الزندي.
- muscoli interossei dorsales pedis (= dorsal interosseous muscles of foot) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْقَدَمِ**. أربع عضلات تثني وتبعد أصابع القدم ويغذيها العصب الإخمصي الوحشي.
- muscoli interossei palmaris (= palmar interosseous muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ لِلرَّاحَةِ**. ثلاث عضلات تقرب وتثني السلاميات القاصية لليد ويغذيها العصب الزندي.
- muscoli interossei plantaris (= plantar interosseous muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ لِلْأَخْفَصِ**. ثلاث عضلات تقرب وتثني أصابع القدم ويغذيها العصب الإخمصي الوحشي.
- muscoli interossei volaris (= muscoli interossei palmaris) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ لِلرَّاحَةِ**.
- muscoli interspinales (= interspinal muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ السِّنَّاسِ**. شرائط قصيرة من الألياف العضلية تمتد بين النواتئ الشوكية لل فقرات المتجاورة.

- **musculi interspinales cervicis**
(= interspinal muscles of neck)
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الرَّقَبِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية تمدد الفقرات الرقبية وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi interspinalis lumborum**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الْقَطَنِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية التي تمدد الفقرات القطنية وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi interspinalis thoracis**
(= interspinal muscles of thorax)
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الصَّدْرِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية التي تمدد الفقرات الصدرية وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- **musculi intertransversarii (= intertransverse muscles)**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ. عضلات تمتد بين النواتئ المستعرضة للفقرات المتجاورة.
- **musculi intertransversarii anteriores**
(= musculi intertransversarii thoracis)
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْأَمَامِيَّةِ.
- **musculi intertransversarii anteriores cervicis (= anterior intertransverse muscles of neck)**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْأَمَامِيَّةِ الرَّقَبِيَّةِ. عضلات صغيرة بين المستعرضات الشوكية الأمامية الرقبية المتجاورة تعمل على ثني العمود الفقري للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi intertransversarii lateralis**
(= musculi intertransversarii lateralis lumborum)
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْقَطَنِيَّةِ الْوُخْشِيَّةِ. عضلات صغيرة تعمل على ثني العمود الفقري في المنطقة القطنية للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi intertransversarii medialis lumborum**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْقَطَنِيَّةِ الْإِنْسِيَّةِ. عضلات صغيرة تعمل على ثني العمود الفقري للجانب في المنطقة القطنية وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi intertransversarii posteriores cervicis (=posterior intertransverse muscles of neck)**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْخَلْفِيَّةِ. عضلات صغيرة بين المستعرضات الرقبية وتثني العمود الفقري الرقبى للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi intertransversarii thoracis**
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الصَّدْرِيَّةِ. عضلات صغيرة تثني العمود الفقري الصدري للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- **m. ischiocavernosus**
(= ischiocavernous muscle)
الْعَضَلَةُ الْوُرْكِيَّةُ الْكَهْفِيَّةُ. عضلة تحافظ على انتصاب القضيب ويغذيها العصب العجاني.
- **musculi laryngis**
الْعَضَلَاتُ الْحَنَجْرَةِ. عضلات الحنجرة الداخلية والخارجية.
- **m. latissimus dorsi**
الْعَضَلَةُ الْعَرِيضَةُ الظَّهْرِيَّةُ. عضلة واسعة تقرب العضد وتبسطة وتدوره للجهة الإنسية ويغذيها العصب الصدري الظهرى.
- **m. levator anguli oris (= levator muscle of angle of mouth)**
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِرَاوِيَةِ الْفَمِ. عضلة ترفع زاوية الفم ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. levator ani (= levator ani muscle)**
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّرَاجِ. اسم يطلق على المكونات العضلية المهمة لحجاب الحوض ويشمل العضلة العانية العصبية (العضلتين الرافعة للبروستاتة والعانية المهبلية) والعضلة العانية المستقيمة والحرقفية العصبية.
- **musculi levatores costarum (= levator muscles of ribs)**
الْعَضَلَاتُ الرَّافِعَةُ لِلأَضْلَاعِ. مجموعة عضلات (اثنتا عشرة عضلة على كل جانب) ترفع الأضلاع خلال عملية التنفس وتغذيها الأعصاب الوربية.
- **musculi levatores costarum breves**
(= short levator muscles of ribs)
الْعَضَلَاتُ الْقَصِيرَةُ الرَّافِعَةُ لِلأَضْلَاعِ. عضلات قصيرة ترفع الأضلاع تنغرز بالجهة الإنسية من زوايا الأضلاع بالقرب من الفقرات التي تتصل بها.

- **musculi levatores costarum longi**
(= long levator muscles of ribs)
العضلات الطويلة الرافعة للأضلاع. العضلات الطويلة السفلية التي يمتد كل منها إلى الضلع أسفل الفقرة التي تتصل منها العضلة.
- **m. levator glandulae thyroideae**
(= levator muscle of thyroid gland)
العضلة الرافعة للغدة الدرقية. عضلة لا توجد دائماً وعندما توجد غالباً ما تقع على الجهة اليسرى.
- **m. levator labii superioris** (= levator muscle of upper lip)
العضلة الرافعة للشفة العليا. عضلة يغذيها العصب الوجهي.
- **m. levator labii superioris alaeque nasi** (= levator muscle of upper lips and ala of nose)
العضلة الرافعة للشفة العليا وجناح الأنف. عضلة يغذيها الفرع تحت الحجابي من العصب الوجهي.
- **m. levator palpebrae superioris**
(= levator muscle of upper lid)
العضلة الرافعة للجفن العلوي. عضلة يغذيها العصب محرك العين.
- **m. levator prostatae** (= levator muscle of prostate)
العضلة الرافعة للبروستاتة. اسم يطلق على القسم الأمامي من العضلة العانية العصبية ويغذيها العصبان العجاني والفرجي وهي عضلة تتحكم في عملية التبول.
- **m. levator scapulae** (= levator muscle of scapula)
العضلة الرافعة للكف. عضلة ترفع الكتف ويغذيها العصبان الرقباني الثالث والرابع.
- **m. levator veli palatini**
العضلة الرافعة لشرع الحنك. عضلة الحنك الرخو وتغذيها الصغيرة البلعومية للمبهم.
- **musculi linguae** (= muscles of tongue)
عضلات اللسان. العضلات الداخلية والخارجية للسان.
- **m. longissimus** (= longissimus muscle)
العضلة الطويلة. أطول قسم من العضلة الناصبة للفقار وهي تحوي العضلات الطويلة الرأسية والطويلة العنقية والطويلة الصدرية.
- **m. longissimus capitis** (= longissimus muscle of head)
العضلة الطويلة الرأسية. عضلة تمتد من النواتئ المستعرضة لل فقرات العنقية السفلية حتى الناتئ الخشائي للعظم الصدغي وهي تسحب الرأس للخلف وتدوره وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- **m. longissimus cervicis**
العضلة الطويلة الرقبية. عضلة تمتد بين الفقرات الصدرية العلوية الأربع والفقرات الرقبية وتقوم ببسط العمود الفقري الرقبى وتغذيها الأعصاب الفقرية الرقبية والصدرية.
- **m. longissimus dorsi** (= m. longissimus thoracis)
العضلة الطويلة الصدرية.
- **m. longissimus thoracis** (= longissimus muscle of thorax)
العضلة الطويلة الصدرية. عضلة تمتد من النواتئ المستعرضة لل فقرات القطنية وتنفرز في النواتئ المستعرضة لل فقرات الصدرية والأضلاع العشرة أو التسعة السفلية وهي تبسط العمود الفقري الصدري وتغذيها الأعصاب النخاعية القطنية والصدرية.
- **m. longitudinalis inferior linguae**
(= inferior longitudinal muscle of tongue)
العضلة الطولانية السفلية للسان. عضلة تغير شكل اللسان أثناء المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
- **m. longitudinalis superior linguae**
(= superior longitudinal muscle of tongue)
العضلة الطولانية العلوية للسان. عضلة تغير شكل اللسان أثناء المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
- **m. longus capitis** (= long muscle of head)
العضلة الرأسية الطويلة. عضلة تتصل في الفقرات الرقبية (3-6) وتنفرز في القسم القاعدي من العظم القذالي وهي تثني الرأس وتغذيها فروع من الأعصاب النخاعية الرقبية الأول والثاني والثالث.
- **m. longus coli** (= long muscle of neck)
العضلة الرقبية الطويلة. عضلة تتكون من ثلاثة أقسام: القسم العلوي المائل والقسم السفلي المائل والقسم العمودي وهي تعمل على ثني الرأس وإسناد الفقرات الرقبية وتثبيتها وتغذيها الأعصاب العنقية الأمامية.

- muscoli lumbricales manus

(= lumbrical muscles of hand) عَصَلَاتُ
الْيَدِ الْخَرَّاطِيَّةُ. عضلات تثني المفاصل السنية
السلامية وتبسط السلاميين الوسطى والقصى
ويغذيها العصبان الناصف والزندي.

- muscoli lumbricales pedis

(= lumbrical muscles of foot) عَصَلَاتُ
الْقَدَمِ الْخَرَّاطِيَّةُ. عضلات تثني السلاميات الدانية
ويغذيها العصبان الاخمصيان الإنسي والوحشي.

- m. masseter (= masseter muscle)

الْعَصَلَةُ الْمَاضِيَّةُ. عضلة ترفع الفك السفلي وتغلق
الفك ويغذيها الفرع الفكي للعصب ثلاثي التوائم.

- musculi membri inferioris

عَصَلَاتُ الطَّرَفِ السُّفْلِيِّ. العضلات التي تعمل في الفخذ والساق
والقدم.

- musculi membri superioris

عَصَلَاتُ الطَّرَفِ الْعُلْوِيِّ. العضلات التي تعمل في الذراع
والساعد واليد.

- m. mentalis. العضلة الذَّقِينِيَّةُ. عضلة تعمل على
تجميع جلد الذقن ويغذيها العصب الوجهي.

- musculi multifidi. العَصَلَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْفُلُوحِ. عضلات تتأصل من العجز والرباط العجزي الحرقفي
والنواتئ القطنية والمستعرضة الصدرية والمفصالية
العنقية وتنفذ في الشوكات الفقرية وهي تبسط
العمود الفقري وتدوره وتغذيها الفروع الظهرية
للأعصاب النخاعية.

- m. multipennatus (= multipennate
muscle) العَصَلَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ التَّرْيُشِ. عضلة
تتقارب حزم أليافها على عدة أوتار.

- m. mylohyoideus (= mylohyoid
muscle) العَصَلَةُ الْفَكِّيَّةُ الْأَمِيَّةُ. عضلة ترفع
العظم اللامي وتسد قاع الفم ويغذيها الفرع الفكي
اللامى للعصب ثلاثي التوائم.

- m. mylopharyngeus. العَصَلَةُ الْفَكِّيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. الجزء
الفكي البلعومي للعضلة مضيق البلعوم العلوية.

- m. nasalis (= nasal muscle) العَصَلَةُ الْأَنْفِيَّةُ. عضلة تتكون من قسمين القسم الجناحي الذي يساعد
في توسيع المنخر والقسم المستعرض الذي يخسف
غضروف الأنف ويغذيها العصب الوجهي.

- m. obliquus auriculae (= oblique
muscle of auricle) العَصَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْمَائِلَةُ. عضلة تساعد في تغيير شكل وموضع الأذن ويغذيها
العصبان الأذني الخلفي والصدغي.

- m. obliquus capitis inferior (= inferior
oblique muscle of head) العَصَلَةُ الرَّأْسِيَّةُ
الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ. عضلة تدور الرأس والفهق وتغذيها
الفروع الظهرية للأعصاب الشوكية الرقبية.

- m. obliquus capitis superior (= superior
oblique muscle of head) العَصَلَةُ
الرَّأْسِيَّةُ الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ. عضلة تبسط الرأس
وتحركه للجهة الوحشية وتغذيها الفروع الظهرية
للأعصاب الشوكية الرقبية.

- m. obliquus externus abdominis
(= external oblique muscle of abdomen)
العَصَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ الْمَائِلَةُ الظَّاهِرَةُ. عضلة تثني العمود الفقري وتدوره وتضغط الأحشاء
البطنية ويغذيها العصب الوربي السفلي.

- m. obliquus inferior bulbi (= inferior
oblique muscle of eyeball) العَصَلَةُ
الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَيْنِ. عضلة تدور المقلة إلى الأعلى
والخارج ويغذيها العصب محرك العين.

- m. obliquus inferior oculi (= m. oblique
inferior bulbi) العَصَلَةُ الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَيْنِ.

- m. obliquus internus abdominis
(= internal oblique muscle of abdomen)
العَصَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ الْمَائِلَةُ الْبَاطِنَةُ. عضلة تثني العمود الفقري وتدوره وتضغط على
الأحشاء البطنية ويغذيها العصب الوربي السفلي.

- m. obliquus superior bulbi (= superior
oblique muscle of eyeball) العَصَلَةُ
الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَيْنِ. عضلة تدور العين للأسفل وللخارج
ويغذيها العصب البكري.

- m. obliquus superior oculi (= m.
oblique superior bulbi) العَصَلَةُ
الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَيْنِ.

- m. obturatorius externus (= external
obturator muscle) العَصَلَةُ الْمُسَدَّةُ الظَّاهِرَةُ. عضلة تدور الفخذ للجهة الخارجية ويغذيها العصب
المسد.

- m. obturatorius internus (= internal obturator muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسَدِّةُ الْبَاطِنَةُ.** عضلة تدور الفخذ للجهة الخارجية وتغذيها الأعصاب العجزية الأولى والثانية والثالثة.
- m. occipitalis (= venter occipitalis musculi occipitofrontalis) **الْعَضَلَةُ الْقَذَالِيَّةُ.** البطن القذالي للعضلة القذالية الجبهية.
- m. occipitofrontalis (= occipitofrontal muscle) **الْعَضَلَةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَبْهِيَّةُ.** عضلة لها بطنان، البطن الجبهي يرفع الحاجب ويفذيه الفرع الصدغي للعصب الوجهي والبطن القذالي يسحب فروة الرأس للخلف ويفذيه الفرع الأذني الخلفي للعصب الوجهي.
- musculi oculi (= musculi bulbi) **عَضَلَاتُ الْعُقْلَةِ.**
- m. omohyoideus (= omohyoid muscle) **الْعَضَلَةُ الْكَتِفِيَّةُ اللَّامِيَّةُ.** عضلة تتكون من بطنين (العلوي والسفلي) يربطهما وتر وسطي بينهما يرتبط بالترقوة بامتداد ليفي وهي عضلة تخسف العظم اللامي ويفذيها العصب الرقبي العلوي خلال العروة الرقبية.
- m. opponens digiti minimi (= opposing muscle of little finger) **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْخَنْصَرِ.** عضلة تدور وتبعد العظم السنعي الخامس ويفذيها العصب الرقبي الثامن خلال العصب الزندي.
- m. opponens digiti quinti manus (= m. opponens digiti minimi) **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْخَنْصَرِ.**
- m. opponens pollicis (= opposing muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِإِبْهَامِ الْيَدِ.** عضلة تثني وتقابل إبهام اليد ويفذيها العصبان الرقبانيان السادس والسابع خلال العصب الناصف.
- m. orbicularis (= orbicular muscle) **عَضَلَةُ دَوَائِرِيَّةُ.** عضلة تحيط بفتحة كالمفم أو العين.
- m. orbicularis oculi (= orbicular muscle of eye) **عَضَلَةُ الْعَيْنِ الدَوَائِرِيَّةُ.** عضلة لها ثلاثة أقسام الحجاجي والجفني والدمعني وهي عضلة تغلق الأجفان وتجعد الجبهة وتضغط الكيس الدمعي ويفذيها العصب الوجهي.
- m. orbicularis oris (= orbicular muscle of mouth) **عَضَلَةُ الْفَمِ الدَوَائِرِيَّةُ.** عضلة تغلق الشفتين وتبرزهما ويفذيها العصب الوجهي.
- m. orbitalis (= orbital muscle) **الْعَضَلَةُ الْحَاجِيَّةُ.** عضلة تبرز العين للامام وتغذيها ألياف عصبية ودية.
- musculi ossiculorum auditus (= muscles of auditory ossicles) **عَضَلَاتُ الْعُقْلِيمَاتِ السَّمْعِيَّةِ.** العضلتان الموترة للطمبل والركابية.
- musculi ossis hyoidae (= muscles of hyoid bone) **عَضَلَاتُ الْعَظْمِ اللَّامِي.** وهي العضلات فوق اللامي وتحت اللامي.
- musculi palati (= palatine muscles) **الْعَضَلَاتُ الْحَنَكِيَّةُ.** العضلات الداخلية والخارجية التي تحرك الحفاف (شراع الحنك).
- musculi palati et faucium (= muscle of palate and fauces) **عَضَلَاتُ الْحَنَكِ وَالْحَلَقِ.** العضلات الداخلية والخارجية التي تحرك الحفاف (شراع الحنك) وجدار البلعوم المجاور له.
- m. palatoglossus (= palatoglossus muscles) **الْعَضَلَةُ الْحَنَكِيَّةُ اللَّسَانِيَّةُ.** عضلة ترفع اللسان وتضيق الحلق وتغذيها الصغيرة البلعومية للعصب المبهم.
- m. palatopharyngeus (= palatopharyngeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْحَنَكِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ.** عضلة تساعد في عملية البلع وتغذيها الصغيرة البلعومية للعصب المبهم.
- m. palmaris brevis (= short palmar muscle) **الْعَضَلَةُ الزَّاجِيَّةُ الْقَصِيرَةُ.** عضلة توتر راحة اليد ويفذيها العصب الرثوي.
- m. palmaris longus (= long palmar muscle) **الْعَضَلَةُ الزَّاجِيَّةُ الطَوِيلَةُ.** عضلة تثني مفصل المعصم ويفذيها العصب الناصف.
- muscle papillares (= papillary muscles) **الْعَضَلَاتُ الْخُلَيْمِيَّةُ.** بروزات عضلية مخروطية الشكل تبرز من السطح الداخلي البطيني للقلب.
- musculi pectinati (= pectinate muscles) **الْعَضَلَاتُ الْمِشْطِيَّةُ.** حروف من ألياف عضلية تبرز من السطح الداخلي لأذيني القلب.

- **m. pectineus (= pectineal muscle)** العَصَلَةُ العَاقِنِيَّةُ. عضلة تثني وتقرب الفخذ ويغذيها العصبان المسد والفخذي.
- **m. pectoralis major (=greater pectoral muscle)** العَصَلَةُ الصَّدْرِيَّةُ الكَبِيرَةُ. العضلة الكبيرة التي تثني الذراع وتقربه وتدوره للجهة الإنسانية ويغذيها العصب الصدري الامامي.
- **m. pectoralis minor (= smaller pectoral muscle)** العَصَلَةُ الصَّدْرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ. عضلة تسحب المنكب إلى الامام والاسفل ويغذيها العصب الصدري الامامي.
- **musculi perineales (= musculi perinei)** العَصَلَاتُ العِجَانِيَّةُ.
- **musculi perinei** العَصَلَاتُ العِجَانِيَّةُ. العضلات التي تشارك في تكوين العجان
- **m. peroneus brevis (= short peroneal muscle)** العَصَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ القَصِيرَةُ. عضلة تقرب القدم وتثنيه نحو الاخمص ويغذيها العصب الشظوي السطحي.
- **m. peroneus longus, (= long peroneal muscle)** العَصَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الطَوِيلَةُ. عضلة تبعد وتقلب القدم وتثنيه نحو الاخمص ويغذيها العصب الشظوي السطحي.
- **m. peroneus tertius** العَصَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الثَّالِثَةُ. عضلة تقلب القدم وتثنيه نحو ظهره يغذيها العصب الشظوي العميق.
- **m. pharyngopalatinus (= m. palatopharyngeus)** العضلة الحنكية البلعومية.
- **m. piriformis (= piriform muscle)** العَصَلَةُ الكُفْرِيَّةُ. عضلة تدور الفخذ للخارج ويغذيها العصبان العجزيان الاول والثاني.
- **m. plantaris (= planter muscle)** العَصَلَةُ الْأَخْمَصِيَّةُ. عضلة تثني القدم نحو الاخمص ويغذيها العصب الظنبوبي
- **m. pleuroes ophageus (= pleuroesophageal muscle)** العَصَلَةُ الْجَنْبَوِيَّةُ المَرِيثِيَّةُ. حزمة من الالياف العضلية الملساء تربط المريء بالجنبه المنصفية اليسرى.
- **m. popliteus (= popliteal muscle)** العَصَلَةُ

- العَاقِنِيَّةُ. عضلة تثني الساق وتدوره نحو الحزمة الإنسانية ويغذيها الاعصاب القطنية الرابع والخامس والعجزي الاول.
- **m. procerus (= procerus muscle)** العَصَلَةُ النَّاشِلَةُ. عضلة تسحب الحاجب للأسفل ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. pronator quadratus** العَصَلَةُ الكَائِبَةُ المُرَبَّعَةُ. عضلة تكب اليد ويغذيها العصب بين العظمين الامامي.
- **m. pronator teres** العَصَلَةُ الكَائِبَةُ المَدَوَّرَةُ. عضلة لها رأسان وهي تكب اليد ويغذيها العصب الناصف.
- **m. prostaticus (= substantia muscularis prostatae)** العَصَلَةُ المَادَّةُ العَضَلِيَّةُ لِلْبُرُوسَتَاتَةِ. العضلة البروستاتية.
- **m. psoas major (= greater psoas muscle)** العَصَلَةُ القَطْنِيَّةُ الكبيرة. عضلة تثني الجذع وتثني الفخذ وتدوره للجهة الإنسانية ويغذيها العصبان القطنيان الثاني والثالث.
- **m. psoas minor (= smaller psoas muscle)** العَصَلَةُ القَطْنِيَّةُ الصَّغِيرَةُ. عضلة تثني الجذع على الحوض ويغذيها العصب القطني الاول.
- **m. pterygoideus externus (=m. pterygoideus lateralis)** العَصَلَةُ الْجَنَاجِيَّةُ الْوُخْشِيَّةُ
- **m. pterygoideus internus (= m. pterygoideus medialis)** العَصَلَةُ الْجَنَاجِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ.
- **m. pterygoideus lateralis** العَصَلَةُ الْجَنَاجِيَّةُ الْوُخْشِيَّةُ. عضلة لها رأسين علوي وسفلي وهي تبرز الفك السفلي وتفتح الفكين وتحرك الفك السفلي إلى الجهتين ويغذيها القسم الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. pterygoideus medialis (=medial pterygoid muscle)** العَصَلَةُ الْجَنَاجِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ. عضلة تغلق الفكين ويغذيها القسم الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. pterygopharyngeus (= paris pterygopharyngea** العَصَلَةُ الْجَنَاجِيَّةُ

الْبُلْعُومِيَّة. الجزء الجناحي البلعومي لعضلة البلعوم العلوية.

- m. pubococcygeus (= pubococcygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَائِنَةُ الْعُصْعُصِيَّة.** اسم يطلق على القسم الامامي من العضلة الرافعة للشرج وهي تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاعات الضغط داخل البطن وتغذيها الاعصاب العجزية الثالث والرابع.

- m. puboprostaticus (= puboprostatic muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَائِنَةُ الْبُرُوسَتَاتِيَّة.** الياف عضلية ملساء توجد ضمن الرباط العاني البروستاتي الإنسي وتمر من البروستاتة إلى الامام نحو العانة.

- m. puborectalis (= puborectal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَائِنَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّة.** اسم يطلق على جزء من العضلة رافعة الشرج وهي عضلة تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاع الضغط داخل البطن ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.

- m. pubovaginalis (= pubovaginal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَائِنَةُ الْمَهْلِيَّة.** اسم يطلق على القسم الامامي من العضلة العانية العصصية وهي عضلة تساهم في التحكم بعملية التبول ويغذيها العصبان العجزوي والفرجي.

- m. pubovesicalis (= pubovesical muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَائِنَةُ الْمَثَانِيَّة.** اسم يطلق على الياف عضلية ملساء تمتد من عنق المثانة حتى العانة.

- m. pyramidalis (= pyramidal muscle) **الْعَضَلَةُ الْهَرَمِيَّة.** عضلة توتر جدار البطن ويغذيها العصب الصدري الأخير.

- m. pyramidalis auriculae (= pyramidal muscle of auricle) **الْعَضَلَةُ الْهَرَمِيَّةُ الْأُذْنِيَّة.** استطالة الالياف من الغفيرة حتى شوكة الحثار.

- m. quadratus femoris (= quadrate muscle of thigh) **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ الْفَخْذِيَّة.** عضلة تقرب الفخذ وتدوره للجهة الوحشية ويغذيها العصبان القطني الاخير والعجزوي الاول.

- m. quadratus labii inferioris (= m. depressor labii inferioris) **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ لِلشَّفَةِ السُّفْلَى.**

- m. quadratus labii superioris (= m. levator labii superioris) **الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّفَةِ الْعُلْيَا.**

- m. quadratus lumborum **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ الْقَطْنِيَّة.** عضلة تثني العمود الفقري القطني جانبياً وتغذيها الاعصاب القطنية الاول والثاني والصدري الاخير.

- m. quadratus plantae (= quadratus muscle of sole) **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ لِلْأَخْمَص.** عضلة تساعد في ثني اصابع القدم ويغذيها العصب الاخصبي الوحشي.

- m. quadriceps femoris (= quadriceps muscle of thigh) **الْعَضَلَةُ الرَّبَاعِيَّةُ الرُّؤُوسُ الْفَخْذِيَّة.** اسم يطلق على مجموعة العضلات المستقيمة الفخذية والمتسعة المتوسطة والمتسعة الوحشية والمتسعة الإنسية وكلها تعمل على بسط الساق على الفخذ.

- m. rectococcygeus (= rectococcygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْعُصْعُصِيَّة.** الياف عضلية ملساء تتأصل من السطح الامامي للفقرتين العصصيتين الثانية والثالثة وتنغرز في السطح الخلفي للمستقيم وتعمل على سحبه ورقعه وتغذيها اعصاب مستقلة.

- m. rectourethralis (= rectourethral muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْإِخْلِيَّة.** شريط من الياف عضلية ملساء تمتد من الانثناء العجاني للمستقيم إلى الإحليل الغشائي في الذكور.

- m. rectouterinus (= rectouterine muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الرَّحْمِيَّة.** شريط من الياف عضلية ملساء تمتد بين عنق الرحم والمستقيم في الثنية المستقيمة الرحمية.

- m. rectovesicalis (= rectovesical muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْمَثَانِيَّة.** شريط من الياف عضلية ملساء تربط العضلات الطولانية للمستقيم مع الطبقة العضلية الظاهرة للمثانة.

- m. rectus abdominis **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْبَطْنِيَّة.** عضلة تسند جدار البطن وتثني العمود الفقري القطني وتغذيها فروع من الاعصاب الصدرية

- **m. rectus capitis anterior** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**
الْأَمَامِيَّةُ لِلرَّأْسِ. عضلة تثني الرأس وتسندة ويغذيها
العصبان الرقبيا الأول والثاني.
- **m. rectus capitis lateralis** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**
الْوَحْشِيَّةُ لِلرَّأْسِ. عضلة تثني الرأس وتسندة ويغذيها
العصبان الرقبيا الأول والثاني.
- **m. rectus capitis posterior major**
الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْخَلْفِيَّةُ الْكَبِيرَةُ لِلرَّأْسِ. عضلة
تمدد الرأس ويغذيها العصبان القذالي الكبير وتحت
القذالي.
- **m. rectus capitis posterior minor**
الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْخَلْفِيَّةُ الصَّغِيرَةُ لِلرَّأْسِ. عضلة
تمدد الرأس ويغذيها العصبان القذالي الكبير وتحت
القذالي.
- **m. rectus femoris** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْفَخْذِيَّةُ**.
عضلة تمدد الساق وتثني الفخذ ويغذيها العصب
الفخذي.
- **rectus inferior bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**
السُّفْلِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة العين المستقيمة السفلية التي
تدور مقلة العين للأسفل وللجهة الإنسية ويغذيها
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus inferior oculi (= m. rectus**
inferior bulbi) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ السُّفْلِيَّةُ**
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus lateralis bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**
الْوَحْشِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تبعد مقلة العين ويغذيها
العصب المبعد.
- **m. rectus lateralis oculi (= m. rectus**
lateralis oculi) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْوَحْشِيَّةُ**
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus medialis bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**
الْإِنْسِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تقرب مقلة العين ويغذيها
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus medialis oculi (= m. rectus**
medialis bulbi) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْإِنْسِيَّةُ**
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus superior bulbi** **الْعَضَلَةُ**
الْمُسْتَقِيمَةُ الْعُلْوِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تقرب مقلة العين
وتدورها إلى الأعلى وإلى الجهة الإنسية ويغذيها
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus superior oculi (= m. rectus**
superior bulbi) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْعُلْوِيَّةُ**
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rhomboideus major (= greater**
rhomboideus muscle) **الْعَضَلَةُ الْمَغْنِيَّةُ الْكَبِيرَةُ**.
عضلة تبعد عظم الكتف وترفعه ويغذيها العصب الكتفي
الظهري.
- **m. rhomboideus minor (= lesser**
rhomboideus muscle) **الْعَضَلَةُ الْمَغْنِيَّةُ الصَّغِيرُ**.
عضلة تقرب عظم الكتف وترفعه ويغذيها العصب
الكتفي الظهري.
- **m. risorius (= risorius muscle)** **الْعَضَلَةُ**
الضُّحِكِيَّةُ. عضلة تسحب زاوية الفم للجهة الوحشية
ويغذيها الفرع الشدقي للعصب الوجهي.
- **musculi rotatores breves (= short**
rotator muscles) **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ**
الصَّغِيرَةُ. اسم يطلق على العضلات المديرة التي
تنفرز في صفاحة الفقرة فوق الفقرة التي تتأصل
منها.
- **musculi rotatores cervicis (= rotator**
muscles of neck) **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ الرَقَبِيَّةُ**.
عضلات تمدد العمود الفقري الرقبوي وتديره للجهة
المعاكسة وتغذية الاعصاب النخاعية الرقبية
rotat or
- **musculi rotatores longi (= long**
muscles) **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ الطَوِيلَةُ**. العضلات
التي تعبر فقرتين أو ثلاث لتنفرس في شوكة الفقرة
الفوقية.
- **musculi rotatores lumborum** **الْعَضَلَاتُ**
الْمُدِيرَةُ الْقَطَنِيَّةُ. عضلات تمدد العمود الفقري القطني
وتديره للجهة المعاكسة وتغذيها الاعصاب النخاعية
القطنية.
- **musculi rotatores thoracis** **الْعَضَلَاتُ**
الْمُدِيرَةُ الصَّدْرِيَّةُ. عضلات تمدد العمود الفقري
الصدري وتديره للجهة المعاكسة وتغذيها الاعصاب
الشوكية الصدرية.
- **m. sacrococcygeus dorsalis (= dorsal**
sacrocooccygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعُجْزِيَّةُ**
الْعَصَصِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ. شريط عضلي يمتد من الناحية
الظهرية للعجز إلى العصعص.

- m. sacrococcygeus ventralis (= ventral sacrococcygeal muscle) **العضلة العجزية**
العضلة البطنيّة. شريط عضلي وتري يمتد من
الفرقة العجزية السفلية إلى العصص.
- m. sacrospinalis (= m. erector spinae) **العضلة العجزية الفقارية.**
- m. salpingopharyngeus (= salpingopharyngeal muscle) **العضلة النفرية**
البلعومية. عضلة ترفع البلعوم الأنفي (الخبشوم)
وتغذيها الضفيرة البلعومية للعصب المبهم.
- m. sartorius (= sartorius muscle) **العضلة**
الخياطية. عضلة تشي الفخذ والساق ويغذيها العصب
الفخذي.
- m. scalenus anterior (= anterior scalene muscle) **العضلة الأمامية**
العضلة الأمامية. عضلة ترفع الضلع الأول وتغذيها الأعصاب الرقبية (7-2).
- m. scalenus medius (= middle scalene muscle) **العضلة الأمامية الوسطى.**
عضلة ترفع الضلع الأول وتغذيها الأعصاب الرقبية (7-2).
- m. scalenus minimus (= smallest scalene muscle) **العضلة الأمامية الصغرى.**
شريط عضلي يوجد أحياناً بين العضلتين الأماميتين
الأمامية والوسطى.
- m. scalenus posterior (= posterior scalene muscle) **العضلة الخلفية.**
عضلة ترفع الضلع الأول والثاني وتغذيها الأعصاب
الرقبية (7-2).
- m. semimembranosus (= semimermb-
ranous muscle) **العضلة الغشائية النصف.**
عضلة تشي الساق وتمدد الفخذ ويغذيها العصب
الظنبوبي.
- m. semispinalis **العضلة الشوكية النصفية.**
عضلة تتكون من الياف تمتد بصورة مائلة من
النواة المستعرضة للفرقات لشوكاتها ما عدا
العضلة الشوكية النصف الراسية.
- m. semispinalis capitis **العضلة الشوكية**
النصفية الرأسية. عضلة تمدد الرأس ويغذيها
- العصبان القذالي الكبير وتحت القذالي وفروع من
الأعصاب الرقبية.
- x- m. semispinalis cervicis **العضلة الشوكية**
النصفية الرقبية. عضلة تمدد العمود الفقري الرقبى
وتدوره وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- m. semispinalis dorsi (= m. semispi-
nalis thoracis) **العضلة الشوكية النصفية**
الصدريّة. عضلة تمدد العمود الفقري الصدري
وتدوره وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- m. semitendinosus (= semitendinous
muscle) **العضلة الوترية النصف.** عضلة
تشبي الساق وتمدد الفخذ ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. serratus, anterior **العضلة المنتشارية**
الأمامية. عضلة تسحب عظم الكتف إلى الأمام
وتدوره عند رفع المكب في حالة إبعاد الذراع ويغذيها
العصب الصدري الطويل.
- m. serratus posterior inferior **العضلة**
المنتشارية الخلفية السفلية. عضلة تخفض الأضلاع
عند الزفير وتغذيها الأعصاب الصدرية (12-9).
- m. serratus posterior superior **العضلة**
المنتشارية الخلفية العلوية. عضلات ترفع الأضلاع
عند الشهيق وتغذيها الأعصاب الوربية العلوية الأربعة.
- musculi skeleti (= skeletal muscles) **العضلات الهيكلية.** انظر (muscle).
- m. soleus (= soleus muscle) **العضلة**
التغلية. العضلة التي تشي مفصل الكاحل نحو
الأخمص ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. sphincter (= sphincter, muscle) **عضلة**
مصرة. عضلة حلزونية الشكل تغلق إحدى الفتحات
الطبيعية.
- m. sphincter ani externus (=external
sphincter of anus) **العضلة مصرة الشرج**
الظاهرة. عضلة تغلق الشرج ويغذيها العصبان
الشرجي السفلي والعجزى الرابع.
- m. sphincter ani internus (=internal
sphincter of anus) **العضلة مصرة**
الشرج الباطنة.

- الْعَضَلَةُ m. sphincter ductus choledochi** مَصْرُةُ الْقَنَاةِ الصَّفْرَاوِيَّةِ. غلالة عضلية حلقية تحيط بالقناة الصفراوية ضمن جدار الإثناعشري.
- m. sphincter pupillae (= sphincter muscle of pupil)** الْعَضَلَةُ مَصْرُةُ الْحَدَقَةِ. عضلة تعمل على تضيق الحدقة ويغذيها العصب محرك العين بأعصاب لا ودية.
- m. sphincter pyloric (= pyloric sphincter muscle)** الْعَضَلَةُ مَصْرُةُ الْبَوَابِ. عضلة ذات الألياف عضلية حلقية حول ممرها إلى الإثناعشري وتغذيها أعصاب مستقلة.
- m. sphincter urethrae (= sphincter muscle of urethra)** الْعَضَلَةُ مَصْرُةُ الْإِخْلِيلِ. عضلة تضغط على الإحليل الفشائي ويغذيها العصب العجاني.
- m. sphincter vesicae urinae (= sphincter muscle of urinary bladder)** الْعَضَلَةُ مَصْرُةُ الْمَثَانَةِ. عضلة تعمل على غلق الفتحة الداخلية للإحليل وتغذيها الأعصاب المثانية.
- m. spinalis** الْعَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ. القسم الإنسي من العضلة الناصبة للفقار وتشمل العضلات الشوكية الرأسية والرقبية والصدرية.
- m. spinalis capitis** الْعَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الرَّأْسِيَّةُ. عضلة تنصب الرأس وتمده وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- m. spinalis cervicis** الْعَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الرَّقْبِيَّةُ. عضلة تمدد العمود الفقري والرقبة وتغذيها فروع من الأعصاب الشوكية الرقبية.
- m. spinalis thoracis** الْعَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ. عضلة تنصب العمود الفقري في المنطقة الصدرية وتغذيها فروع من الأعصاب الشوكية الصدرية.
- m. splenius capitis** الْعَضَلَةُ الطَّاحِلَةُ الرَّأْسِيَّةُ. عضلة تعدد الرأس وتدوره ويغذيها العصبان الرقبيان الأوسط والسفلي وتتأصل من القسم السفلي للرباط العنقي ونواتي الفقرات الرقبية السابعة والصدرية العلوية الثلاث وتغرز في الناتئ الخشائي والعظم القذالي.
- m. splenius cervicis** الْعَضَلَةُ الطَّاحِلَةُ الرَّقْبِيَّةُ. عضلة تدور الرأس والرقبة وتغذيها الفروع الخلفية للعصب الرقبى السفلي وتتأصل من نواتي الفقرات الصدرية الثالثة وحتى السادسة وتغرز في الناتئ الخشائي والعظم الكيبر.
- m. stapedius (= stapedius muscle)** الْعَضَلَةُ الرَّكَابِيَّةُ. عضلة تكبت حركة العظم الركابي ويغذيها الفرع الركابي من العصب الوجهي.
- m. sternalis (= sternal muscle)** الْعَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ. شريط عضلي يشاهد أحياناً موازياً لعظم القص على الأصل القصي الضلعي للعضلة الصدرية الكبيرة.
- m. sternocleidomastoideus (= sternocleidomastoid muscle)** الْعَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تنثني العمود الفقري الرقبى وتدور الرأس ويغذيها العصب الإضافي والصفيرة العنقية.
- m. sternohyoideus (= sternohyoid muscle)** الْعَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ الْأَمِيَّةُ. عضلة تهبط العظم اللامي والحنجرة ويغذيها العصب الرقبى العلوي.
- m. sternothyroideus (= sternothyroid muscle)** الْعَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تهبط الغضروف الدرقي ويغذيها العصب العنقي العلوي.
- m. styloglossus (= styloglossus muscle)** الْعَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ اللِّسَانِيَّةُ. عضلة ترفع اللسان وتسحبها ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. stylohyoideus (= stylohyoid muscle)** الْعَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ الْأَمِيَّةُ. عضلة تسحب العظم اللامي واللسان للأعلى ويغذيها العصب الوجهي.
- m. stylopharyngeus** الْعَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. عضلة ترفع البلعوم وتوسعه ويغذيها العصب اللساني البلعومي والصفيرة البلعومية.
- m. subclavius (= subclavius muscle)** الْعَضَلَةُ تَحْتَ التَّرْقُوءَةِ. عضلة تخسف النهاية الوحشية للترقوة ويغذيها العصبان الرقبيان الخامس والسادس.

- **musculi subcostales (= subcostal muscles)** العضلات تحت الضلعية. عضلات ترفع الأضلاع عند الشهيق وتغذيها الأعصاب الوربية
- **musculi suboccipitales (= suboccipital muscles)** العضلات تحت القذالية. مجموع العضلات التي تقع تحت العظم القذالي وتشمل العضلتين المستقيمتين الخلفيتين الكبيرة والصغيرة والعضلتين المائلتين الراسيتين العلوية والسفلية والعضلتين المستقيمتين الراسيتين الأمامية والوحشية والعضلة الطاحلة الراسية والعضلة الراسية الطويلة.
- **m. subscapularis (= subscapular muscle)** العضلة تحت الكتفية. عضلة تدير العضد للجهة الإنسية ويغذيها العصب تحت الكتفي.
- **m. supinator (= supinator muscle)** العضلة الباسطة. عضلة تبسط اليد ويغذيها العصب الكبير العميق.
- **musculi suprahyoidei (= suprahyoid muscles)** العضلات فوق اللامي. مجموع العضلات التي توصل العظم اللامي بالجمجمة وتشمل العضلات ذات البطنين والإبرية اللامية والفكية اللامية والذقنية اللامية.
- **m. supraspinatus (= supraspinous muscle)** العضلة فوق الشوكة. عضلة تبعد العضد ويغذيها العصب فوق الكتف.
- **m. suspensorius duodeni (= suspensory muscle of duodenum)** العضلة المعلقة للإثنا عشر. شريط مسطح من الألياف العضلية الملساء التي تتأصل في الحجاب الحاجز والمتواصلة مع الغلاف العضلي للإثنا عشر عند اتصاله بالصائم.
- **m. tarsalis inferior (= inferior tarsal muscle)** العضلة الجفنية السفلية. عضلة توسع الشق الجفني وتغذيها أعصاب ودية.
- **m. tarsalis superior (= superior tarsal muscle)** العضلة الجفنية العلوية. عضلة توسع الشق الجفني وتغذيها أعصاب ودية.
- **m. temporalis (= temporal muscle)** العضلة الصدغية. عضلة تعمل على غلق الفكين

- ويغذيها القسم الفكي السفلي للعصب ثلاثي التوائم.
- **m. temporoparietalis (= temporoparietal muscle)** العضلة الصدغية الجدارية. عضلة توتر فروة الرأس وتغذيها الفروع الصدغية للعصب الوجهي.
- **m. tensor fasciae latae (= tensor muscle of fasciae lata)** العضلة المؤثرة للثافة. عضلة تثني الفخذ وتديره للجهة الإنسية ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- **m. tensor veli palatini** العضلة المؤثرة لبشرع الحنك. عضلة توتر شرع الحنك (الحفاف) وتفتح الأنبوب السمعي ويغذيها الفرع الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. teres major (= teres major muscle)** العضلة المؤثرة الكبيرة. عضلة تقرب وتبسط وتدير الذراع نحو الجهة الإنسية ويغذيها العصب تحت الكتف.
- **m. teres minor (= teres minor muscle)** العضلة المؤثرة الصغيرة. عضلة تدير الذراع للجهة الوحشية ويغذيها العصب الإبطي.
- **musculi thoracis (= muscles of thorax)** عضلات الصدر.
- **m. thyreopharyngeus (= pars thyreopharyngea constrictor pharyngis inferioris)** العضلة الدرقية البلعومية. القسم الدرقي البلعومي للعضلة مضيق البلعوم السفلية.
- **m. thyroarytenoideus (= thyroarytenoid muscle)** العضلة الدرقية الطرجهالية. عضلة ترخي وتقصر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. thyroepiglotticus (= thyroepiglottic muscle)** العضلة الدرقية اللسان مزمارية. عضلة تفلق مدخل الحنجرة ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. thyrohyoideus (= thyrohyoid muscle)** العضلة الدرقية اللامية. عضلة ترفع الحنجرة وتغير شكلها ويغذيها العصب الرقي العلوي.
- **m. tibialis anterior (= anterior tibial muscle)** العضلة الظنبوبية الأمامية. عضلة تثني

- القدم نحو ظهرها وتقلبها ويغذيها العصب الشظري العميق.
- m. tibialis posterior (= posterior tibial muscle) **الْعَضَلَةُ الظَّنْبُوبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ**. عضلة تثني القدم نحو الأخمص وتقلبها ويغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
 - m. trachealis (= tracheal muscle) **الْعَضَلَةُ الرُّغَامِيَّةُ**. عضلة تضيق الرغامى وتقلل من قطرها وتغذيها أعصاب ذاتية.
 - m. tragus (= muscle of tragus) **عَضَلَةُ الزَّنَمَةِ**. شريط عضلي مسطح عمودي قصير على السطح الوحشي للزنمة يغذيها العصبان الأذني الصدغي والأذني الخلفي.
 - m. transversospinalis **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الشُّوْكِيَّةُ**. مصطلح عام يشمل العضلات الشوكية النصفية والمتعددة الريش والمديرات.
 - m. transversus abdominis (= transverse muscle of abdomen) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْبَطْنِيَّةُ**. عضلة تضغط الأحشاء البطنية وتغذيها الأعصاب الوربية السفلى والحرقي المعدي والحرقي الأربي.
 - m. transversus auriculae (= transverse muscle of auricle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْأُذُنِيَّةُ**. عضلة تسحب حنار الأذن ويغذيها العصبان الأذني الكبير والأذني الخلفي.
 - m. transversus linguae (= transverse muscle of tongue) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ اللِّسَانِيَّةُ**. عضلة تغير شكل اللسان عند المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
 - m. transversus menti (= transverse muscle of chin) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الدَّقْنِيَّةُ**. ألياف عضلية سطحية للعضلة الخافضة لزاوية الفم التي تدور من جهتها وتعتبر للجهة المعاكسة.
 - m. transversus nuchae (= transverse muscle of nape) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْقَفَوِيَّةُ**. عضلة صغيرة توجد غالباً وهي تعبر من الناسرة القذالية إلى العضلة الأذنية الخلفية ويمكن أن تكون سطحية أو تحت العضلة شبه المنحرفة.
 - m. transversus perinei profundus (= deep transverse muscle of perineum) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْعِجَانِيَّةُ الْعَمِيقَةُ**. عضلة تسحب النقطة المركزية للعجان نحو الخلف ويغذيها العصب الفرجي.
 - m. transversus thoracis (= transverse muscle of thorax) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الصَّدْرِيَّةُ**. عضلة تضيق الصدر ويغذيها العصب الوربي.
 - m. trapezius (= trapezius muscle) **الْعَضَلَةُ شِبْهُ الْمُنْحَرَفَةِ**. عضلة تدير الكتف ليرفع المئكب عند تباعد الذراع ويغذيها العصب الإضافي والصفيرة الرقبية.
 - m. triangularis (= triangular muscle) **عَضَلَةُ مُثَلَّثَةٍ**. عضلة مثلثة الشكل.
 - m. triceps brachii (= triceps muscle of arm) **الْعَضَلَةُ الثَّلَاثِيَّةُ الرَّؤُوسِ الْعَضْدِيَّةُ**. عضلة تبسط الساعد وتقرب الذراع وتمده ويغذيها العصب الكعبري.
 - m. triceps surae **الْعَضَلَةُ الثَّلَاثِيَّةُ الرَّؤُوسِ الرَّبْلِيَّةُ**. عضلة الساق والعضلة النعلية معاً.
 - m. unipennatus (= unipennate muscle) **الْعَضَلَةُ أَحَادِيَّةُ الرَّيْشَةِ**. عضلة تقرب حزم الأليافها نحو وتر المغرز من جهة واحدة فقط.
 - m. uvulae (= muscle of uvula) **عَضَلَةُ اللَّهَاءِ**. عضلة ترفع اللهاة وتغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم.
 - m. vastus intermedius **الْعَضَلَةُ الْمُتَسِّعَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ**. عضلة تبسط الساق ويغذيها العصب الفخذي.
 - m. vastus lateralis **الْعَضَلَةُ الْمُتَسِّعَةُ الْوُحْشِيَّةُ**. عضلة تبسط الساق ويغذيها العصب الفخذي.
 - m. ventricularis **الْعَضَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ**. اسم يطلق على الألياف من العضلة الدرقية الطرجهالية التي تسير نحو الثنيات الدهليزية.
 - m. verticalis linguae (= vertical muscle of tongue) **عَضَلَةُ اللِّسَانِ الْعَمُودِيَّةُ**. عضلة تغير شكل اللسان عند المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.

- m. viscerum عَضَلَةُ حَشَوِيَّة. اسم يطلق على عضلة أحد الأعضاء الحشوية.

- m. vocalis (= vocal muscle) العَضَلَةُ الصَّوْتِيَّة. عضلة تقصر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.

- m. zygomaticus major (= greater zygomatic muscle) العَضَلَةُ الْوُجْنِيَّة الْكَبِيرَة. عضلة تسحب زاوية الفم إلى الخلف والأعلى ويغذيها العصب الوجهي.

- m. zygomatic minor (= lesser zygomatic muscle) العَضَلَةُ الْوُجْنِيَّة الصَّغِيرَة. عضلة تسحب الشفة العليا للأعلى وللجهة الوحشية ويغذيها العصب الوجهي.

musicotherapy

مُعَالَجَة بِالْمَوْسِيقَى. معالجة الأمراض بالموسيقى.

mussitation تَمَتُّعَة. تحريك الشفاه من دون إحداث أصوات كلامية.

mute أَعْرَس. لا يتمكن من النطق.

- deaf m. أَبْكَم. شخص لا يتمكن من السمع أو الكلام.

mutism 1. صُمَات 2. خَرَس. 1. الامتناع عن الكلام أو رفضه 2. عدم المقدرة على الكلام.

- akinetic m. صُمَات لا حركي. صمات لا يتمكن فيه المريض من توليد أية حركات صوتية.

- deaf m. بِكَامَة؛ صُمَات صَمْعِي. صمات يتولد نتيجة الصمم وعدم سماع العصاب أية أصوات لكي يقلدها.

- elective m. صُمَات انتخابي. صمات يتولد بسبب اختلال عقلي لدى الطفل الذي يرفض التحدث في المجتمعات لكنه يستطيع التحدث إلى بعض الأشخاص الذين يختارهم بنفسه.

myalgia أَلَمُ الْعَضَل. ألم عضلي.

- m. abdominis أَلَمُ عَضَلِي بَطْنِي. ألم في جدار البطن.

- m. capitis أَلَمُ عَضَلِي رَأْسِي. ألم في عضلات فروة الرأس مما يولد الصداع.

- m. cervicalis (= torticollis) صَعَر. ألم العنق؛ قُطَان.

- lumbar m. (= lumbago) أَلَمُ الْقَطَن؛ قُطَان.

myasthenia وَهْنُ عَضَلِي. أي شذوذ بنيوي عضلي يولد الضعف العضلي.

- angiosclerotic m. (= intermittent claudication) وَهْنُ عَضَلِي بِتَصَلُّبِ الشَّرَائِي. عرج متقطع.

- m. gastrica (= atony of stomach) وَهْنُ عَضَلِي مَعْدِي. ونى معدي بسبب ضعف وفقدان توتر عضلات جدار المعدة.

- m. gravis (= m. gravis pseudoparalytica) وَهْنُ عَضَلِي وَبِيل.

- m. gravis pseudoparalytica وَهْنُ عَضَلِي شَلَلِي كَاذِب. اضطراب وظيفي عضلي عصبي بسبب وجود أضداد لمستقبلات الأسيتيل كولين. وهو يتصف بتعب وإجهاد الجهاز العضلي مع تذبذب شدتهما ومن دون أي اضطراب حسي. ويمكن أن يتوضع هذا الاضطراب في إحدى المجموعات العضلية أو يكون عاماً مع الضعف الشديد. وفي بعض الحالات، عند قلة التهوية. وقد يصيب أية عضلة في الجسم وخاصة عضلات العين والوجه والشفيتين واللسان والبلعوم والرغبة.

- m. laryngis وَهْنُ عَضَلِي حَنْجَرِي. وهن عضلات الحنجرة بسبب كثرة الاستعمال أو الشخوخة أو حالات الضعف العام.

- neonatal m. وَهْنُ عَضَلِي وَلِيدِي. وهن عضلي عابر (لمدة أسبوع أو شهر) وعادة ما يصيب أولاد الأم المصابة بالوهن العضلي ويتصف بصعوبة الرضاعة والبلع.

myatonia (= amyotonia) وَنَاءُ عَضَلِي. حالة ونى عضلات الجسم.

- m. congenita (= amyotonia congenita) وَنَاءُ عَضَلِي خَلْقِي.

myatony (= myatonia) وَنَاءُ عَضَلِي.

myatrophie ضَمُورُ عَضَلِي. ضمور إحدى العضلات أو أكثر.

myautonomy الْحَالَةُ الْعَضَلِيَّة الْذَاتِيَّة. حالة يتأخر فيها التقلص بعد تنبيه العضلة لفترة طويلة نسبياً كما يظهر وكأنه يتم بمعزل عن التنبيه.

mydriasis تَوَسُّعُ الْحَدَقَة. توسع الحدقة الوظيفي أو المرضي أو بفعل الأدوية.

- **alternating m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ. عدم تساوي الحدقتين أو أن إحدهما تتوسع لفترة ثم تعود لتتسع الحدقة المعاكسة.

- **bounding m. (= alternating m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ.

- **paralytic m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الشَّلَلِيّ. توسع الحدقة الذي يتولد عن شلل العصب محرك العين.

- **spasmodic m. (= spastic m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ التَّشَنُّجِيّ. توسع الحدقة بسبب تشنج العضلة موسعة الحدقة أو بسبب فرط فعالية الودي.

- **spinal m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ النُّخَاعِيّ. توسع الحدقة بسبب شلل المركز الهذابي النخاعي في النخاع الشوكي.

- **springing m. (= alternating m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ.

myectomy قَطْعُ الْعَضَلَةِ. قطع قسم من العضلة.

myectopia انْزِيَاخُ الْعَضَلَةِ: انتبأ عضلي. انحراف العضلة.

myectomy (= myectopia) انْزِيَاخُ الْعَضَلَةِ.

myelalgia أَلَمُ النُّخَاعِ. ألم في النخاع الشوكي.

myelapoplexy (= hematomyelia) سَكْتَةُ نَخَاعِيَّة: تَدَمِّي النُّخَاعِ.

myelasthenia وَهْنُ النُّخَاعِ. وهن عصبي بسبب علة تصيب النخاع الشوكي.

myelatelie خَلَلُ تَنَامِي النُّخَاعِ. التنامي المعيب للنخاع الشوكي.

myelatrophy ضَمُورُ النُّخَاعِ. ضمور النخاع الشوكي.

myelauze ضَخَامَةُ النُّخَاعِ. زيادة حجم النخاع الشوكي الشاذة.

myelemla (= myelocytosis) كَثْرَةُ النُّقُويَات.

myelencephalitis التَّهَابُ النُّخَاعِ والدِّمَاغِ. التهاب الدماغ والنخاع الشوكي.

myelencephalon الدِّمَاغُ البَصَلِيّ.

1. النخاع المستطيل (البصلة) 2. القسم الخلفي من الحويصليتين المتكونتين من تطور الدماغ المؤخر في الجنين.

myelencephalospinal دِمَاعِيّ بَصَلِيّ. نسبة للدماغ البصلي والنخاع الشوكي.

myeleterosis تَنَكُّسُ النُّخَاعِ. تغير النخاع المرضي.

myelin نُخَاعِيْن؛ مِيَالِيْن. 1. مادة غشاء خلية شوان التي تلتف لتكون الغمد النخاعي الذي يحوي نسبة عالية من الشحميات بالنسبة للبروتين، ولذلك فهو يعمل كعازل كهربائي 2. مادة أحادية الأمين أحادية الفسفوتيد توجد في الدماغ.

myelinated مِيَالِيْنِي؛ نُخَاعِيْنِي. ذو غمد نخاعي.

myelination (= myelinization) تَكْوُنُ النُّخَاعِيْن؛ تَكْوُنُ المِيَالِيْن.

myelinic نُخَاعِيْنِي؛ مِيَالِيْنِي. منسوب للنخاعين أو ذو طبيعة نخاعية.

myelinization تشكّل المياليين. عملية إضافة النخاعين أو اكتسابه.

myelinoclasia (= myelinolysis) تَحْلُلُ المِيَالِيْن. زوال النخاعين أو تخريبه.

- **acute perivascular m. (= acute disseminated encephalomyelitis)** التَّهَابُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ المنتشر الحاد.

- **central pontine m. (= central pontine myelinolysis)** انْجِلَالُ المِيَالِيْن الجَسْرِيّ المَرْكَزِيّ.

- **postinfection perivenous m. (= postinfection encephalomyelopathy)** اغْتِلَالُ دِمَاعِيّ نُخَاعِيّ تَالٍ لِلْعَدْوَى.

myelinogenesis (= myelinization) تَكْوُنُ المِيَالِيْن؛ تَنَخُّع.

myelinogenetic مَكْوُنُ المِيَالِيْن؛ مُنَخَّع. مولد النخاعين أو مولد التنخع أو التثخيع.

myellnogeny تَكْوُنُ المِيَالِيْن العَصَبِيّ. تنخع الالياف العصبية أو تنامي النخاعين.

myelinolysis تجلُّل الميالين: إنْجَلَالُ النُّخَاعِينَ. تخریب النُّخَاعِينَ أو زواله.

central pontine m. تجلُّل الميالين الجُسْرِي. نوع نادر من زوال نخاعين الجسر الكتلي يحصل لدى مدمني الكحول.

myelinopathy إغْتِلَالُ مِيَالِينِي. تنكس المادة البيضاء للدماغ أو أي مرض يصيب الميالين (النخاعين).

myelinosis نخرٌ مِيَالِينِي. نوع من النخر الشحمي يتكون فيه الميالين.

myelinotoxic سَامٌ للميالين. مادة سامة مزيلة للنخاعين.

myelinotoxicity سُمِّيَّة مِيَالِينِيَّة؛ سَامٌ للميالين. ما له صفة تسميم النخاعين.

myelitis إِتِهَابُ النُّخَاع. التهاب النخاع الشوكي وتختلف أعراضه حسب موقع الإصابة التي تشمل ألم الظهر وحس حزامي وفرط الحساسية والتنمل والخدر مع اضطرابات حركية والشلل وفرط الانعكاسية وشلل المصبرات والقرحة الناقبة وفي الأدوار المتقدمة التقلصات التشنجية للعضلات المشلولة.

acute m. إِتِهَابُ النُّخَاع الحَاد. التهاب النخاع الشوكي الحاد.

apoplectiform m. إِتِهَابُ النُّخَاع السَّكْطِي. الشكل. التهاب النخاع الذي يظهر فيه الشلل بصورة مفاجئة.

ascending m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُتَسَلِّق. التهاب النخاع الشوكي الذي يتسلق تدريجياً نحو الدماغ.

bulbar m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُسْتَطِيل. التهاب الذي يصيب النخاع المستطيل (البصلة).

cavitary m. (= syringomyelitis) إِتِهَابُ النُّخَاع التَّكْهُفِي.

central m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُرَكَّزِي. التهاب يصيب المادة السنجابية للنخاع الشوكي بصورة خاصة.

chronic m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُزْمِن. التهاب النخاع الشوكي الذي يتطور بصورة تدريجية.

compression m. إِتِهَابُ النُّخَاع الإِنْضْغَاطِي.

اعتلال النخاع الشوكي الناتج عن انضغاطه بسبب آفة مثل الورم.

concussion m. إِتِهَابُ النُّخَاع الإِرْتِجَاجِي. اعتلال النخاع الشوكي بسبب ارتجاجه.

cornual m. إِتِهَابُ النُّخَاع القُرْنِي. التهاب يصيب قرون المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

descending m. إِتِهَابُ النُّخَاع الهَاطِط. التهاب النخاع الشوكي الذي ينزل متجهاً نحو ذنبه.

diffuse m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُتَشَتِّر. التهاب يصيب مناطق واسعة ومتفرقة من النخاع الشوكي.

disseminated m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُتَشَتِّر. التهاب تظهر فيه بؤر التهابية محددة في النخاع الشوكي.

focal m. إِتِهَابُ النُّخَاع البُؤْرِي. اعتلال نخاعي يصيب منطقة صغيرة من النخاع الشوكي أو عدة مناطق صغيرة فيه.

foudroyant m. (= acute m.) إِتِهَابُ النُّخَاع الحَاد.

funicular m. إِتِهَابُ النُّخَاع الحَبَلِي. اعتلال نخاعي يصيب المادة البيضاء للنخاع الشوكي وخاصة الحبل الظهري ويحدث ذلك خصوصاً في فقر الدم الوبيل.

hemorrhagic m. إِتِهَابُ النُّخَاع النَّزْفِي. اعتلال نخاعي يترافق مع النزف فيه.

interstitial m. (= sclerosing myelopathy) إِغْتِلَالُ نُّخَاعِي مُصَلَّب.

neuro-optic m. (= neuromyelitis optica) إِتِهَابُ النُّخَاع والعَصَبِ البَصْرِي.

parenchymatous m. إِتِهَابُ النُّخَاع المَتْنِي. اعتلال نخاعي يصيب بصورة خاصة مادة الألياف العصبية للنخاع الشوكي.

periependymal m. إِتِهَابُ النُّخَاع حَوْلُ البَطَانَةِ العَصْبِيَّة. التهاب النخاع في المنطقة المحيطة بقناته المركزية.

sclerosing m. إِتِهَابُ النُّخَاع المُصَلَّب. اعتلال نخاعي يتصف بتصلب النخاع الشوكي وفرط نمو الدبق.

systemic m. إِتِهَابُ النُّخَاع الجِهَازِي. اعتلال نخاعي يصيب سبلاً معينة وأجهزة خاصة في النخاع الشوكي.

- traumatic m. التهاب النخاع الرضحي. اعتلال النخاع الشوكي الذي يتلو إصابته بالرضح.

- m. vaccinia التهاب النخاع التلغيفي. التهاب النخاع الذي يتلو التلقيح أحياناً.

myeloarchitecture معمارية السبل
الميالينية. 1. ترتيب الألياف العصبية في قشريتي المخ والمخيخ. 2. ترتيب وتنظيم السبل العصبية في النخاع الشوكي وساق الدماغ.

myeloblast أرومة النقيوية. خلايا غير ناضجة توجد في نقي العظام ولا توجد في الدم في الحالة السوية وهي الخلية البدائية وسليفة الخلايا المحبة التي تتطور بمراحل إلى كرية الدم البيضاء.

myeloblastemia وجود الأرومات النقيوية بالدم.

myeloblastoma ورم أرومة النقيوية. ورم بؤري خبيث يشاهد في ابيضاض الدم النقوي الحاد ويتكون من أرومات نقوية فيها القليل من اللون الأخضر.

myeloblastomatosis ورم أرومة النقيوية. وجود العديد من أورام الأرومة النقيوية.

myeloblastosis كثرة الأرومات النقيوية بالدم. كثرة وجود الأرومات النقيوية بالدم.

myelocoele قيلة نخاعية. انفتاق مادة النخاع الشوكي خلال عيب في القناة الفقرية العظمية.

myeloclast ناقضة الميالين. خلية تشرط الأغصان الميالينية.

myelocone شحم مياليني. مادة شحمية في الدماغ.

myelocyst كيسة ميالينية. كيسة حميدة تتولد من أقتية نخاعية بدائية.

myelocystomeningocele (= myelomeningocele) قيلة ميالينية سحائية.

myelocyte النقيوية. 2. خلية طليعية في سلسلة تطور الخلايا المحبة يبدأ فيها تمايز تكوين الحبيبات. 2. أية خلية من خلايا المادة السنجابية للجهاز العصبي.

myelocythemia كثرة النقيويات بالدم. وجود الخلايا النقيوية بالدم.

myelocytoma ورم النقيويات. 1. ابيضاض الدم النقوي المزمن. 2. ورم نقوي.

myelocytomatosis ورم النقيويات. مرض يصيب الطيور يتصف بوجود عدة أورام نقوية.

myelocytosis (= myelosis) كثرة النقيويات بالدم.

myelodysplasia خلل التنسج النخاعي. سوء تنسج قسم من النخاع الشوكي خاصة من قسمه السفلي.

myeloencephalitis التهاب الدماغ والنخاع الميوزيني؛ التهاب الدماغ والنخاع. التهاب يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

- eosinophilic m. التهاب الدماغ والنخاع الحمضي. معقد أعراض عصبية يتولد عن الإصابة بالديدان الممسودة الفمويات الفكية والذي يتصف بالم جذور الشد يد يتلوه شلل الأطراف وفقدان الحواس المفاجيء مع كثرة الحمضات بالدم واصفرار السائل النخاعي الشوكي.

- epidemic m. (= epidemic polioencephalitis) التهاب سنجابية الدماغ الوبائي.

myelofugal نابذ النخاع. مبتعد عن النخاع الشوكي.

myelogenesis 1. تنامي الجهاز العصبي. 2. تكون الميالين. 1. تنامي وتطور الجهاز العصبي وخاصة الدماغ والنخاع الشوكي. 2. ترسب الميالين حول المحاور.

myelogeny (= myelinogeny) تناضج الميالين. نضوج الأغصان النخاعية حول الألياف العصبية عند تنامي الجهاز العصبي المركزي وتطوره.

myelogram صورة النخاع. الصورة الشعاعية للنخاع الشوكي.

myelography تصوير النخاع. تصوير النخاع الشوكي بعد حقن مادة مبيئة في الحيز تحت العنكبوتية.

التصوير الأكسجيني للنخاع. تصوير - oxygen m. النخاع باستعمال الأكسجين كوسط مباين.

1. نُخَاعِي 2. نَقْيَانِي. 1. منسوب myeloid إلى النخاع الشوكي 2. منسوب إلى النقي أو مشتق منه أو شبيه به.

myelolysis انحلال النخاع.

myeloma ورم نقوي. ورم نقوي مكون من خلايا مستمدة من نقي العظام.

myelomalacia تليّن النخاع. تليّن النخاع الشوكي المميت.

myelomenia حيض نخاعي. نزف حيضي مع انتباز بطاني رحمي في القناة الشوكية.

myelomeningitis التهاب النخاع والسحايا. التهاب النخاع الشوكي وسحاياه.

myelomeningocele قيلة نخاعية سحائية. انفتاق النخاع الشوكي وسحاياه خلال عيب في القناة الفقرية العظمية.

myelomere قسم نخاعي. قسم من أقسام الدماغ أو النخاع الشوكي المتمايين.

myeloneuritis التهاب النخاع والأعصاب. التهاب النخاع الشوكي والأعصاب المحيطة.

myelo-optic neuropathy اعتلال النخاع والعصب البصري. اضطراب يصيب النخاع الشوكي والعصب البصري.

myelopathy اعتلال نخاعي. 1. مصطلح عام يدل على اضطرابات وظيفية مع تغيرات مرضية أو بدونها تصيب النخاع الشوكي ويستعمل للدلالة على آفات غير معينة 2. تغيرات مرضية في نقي العظام.

myelopathy اعتلال نخاعي سكتي الشكل. - apoplectic form m. اعتلال يتصف بالشلل الذي يظهر بصورة مفاجئة.

myelopathy اعتلال نخاعي متسلق. - ascending m. نخاعي يتقدم نحو جهة الدماغ.

myelopathy اعتلال نخاعي انضغاطي. - compression m. اعتلال نخاعي يتولد عن انضغاط النخاع الشوكي بوزم مثلاً.

myelopathy اعتلال نخاعي ارتجاجي. - concussion m. نخاعي يتولد عن ارتجاج النخاع الشوكي.

myelopathy اعتلال نخاعي نازل. - descending m. نخاعي يتقدم نحو ذنب النخاع الشوكي.

myelopathy اعتلال نخاعي بؤري. - focal m. يصيب منطقة صغيرة أو عدة مناطق صغيرة في النخاع الشوكي.

myelopathy اعتلال نخاعي حبلّي. - funicular m. يصيب المادة البيضاء للنخاع الشوكي وخصوصاً الحبل الظهري وهو صفة مميزة لفقر الدم الوبيل.

myelopathy اعتلال نخاعي نزفي. - hemorrhagic m. نخاعي يترافق مع النزف.

myelopathy اعتلال نخاعي خلالي. - interstitial (= sclerosing m.) اعتلال نخاعي خلالي. - interstitial (= sclerosing m.) اعتلال نخاعي خلالي.

myelopathy اعتلال نخاعي متني. - parenchymatous m. اعتلال نخاعي يصيب المادة العصبية الأساسية للنخاع الشوكي.

myelopathy اعتلال نخاعي مصلب. - sclerosing m. نخاعي يتصف بتصلب النخاع الشوكي وفراط نمو الدبق فيه.

myelopathy اعتلال نخاعي فقاري. - spondylotic cervical m. اعتلال نخاعي ثانوي يتولد عن إصابة القناة الشوكية الصغيرة خلقياً بالفقر الرقبي.

myelopathy اعتلال نخاعي جهازّي. - systemic m. يصيب سبلاً عصبية معينة في النخاع الشوكي أو أحد أجهزته.

myelopathy اعتلال نخاعي مستعرض. - transverse m. نخاعي يمتد عرضياً في النخاع الشوكي.

myelopathy اعتلال نخاعي رضحي. - traumatic m. نخاعي يتلو إصابة النخاع الشوكي بإصابة رضحية.

myelopathy متجه للنخاع؛ إنتحاء نخاعي. - myelopetal متجه أو متحرك نحو النخاع الشوكي.

myelopathy بلعم نخاعي؛ غائية ميالينية. - myelophage بلعم يهضم أو يحطم الميالين.

myelopathy سحاف النخاع. - myelophthisis ضمور النخاع الشوكي.

myelopathy شلل نخاعي. - myeloplegia شلل بسبب مرض النخاع الشوكي.

myelopathy مسم نخاعي. - myelopore قناة أو فتحة في النخاع الشوكي.

myeloradiculitis التهاب النخاع والجذور. التهاب النخاع الشوكي والجذور الشوكية الخلفية.

myeloradiculodysplasia خلل تنسج النخاع والجذور. عيب خلقي تنموي شاذ في النخاع الشوكي والجذور.

myeloradiculopathy إعتلال النخاع والجذور. مرض النخاع الشوكي وجذور الاعصاب الشوكية.

myelorrhagia (= hematomyelia) تدمي النخاع.

myeloschisis إنشقاق النخاع. عيب تنموي يتصف بفلح النخاع الشوكي بسبب فشل الصفيحة العصبية في تكوين أنبوب كامل أو بسبب انفجار هذا الأنبوب العصبي بعد تكوينه.

myeloscintigram مخطط ومضائي نخاعي. تخطيط الجزيئات التي يعدها العداد الومضاني بعد زرق محلول يحوي نظيراً مشعاً في الحيز تحت العنكبوتية.

myelosclerosis تصلب النخاع. تصلب النخاع الشوكي.

myelosis كثرة النقويات بالدم.

myelospasr. تشنج نخاعي. تشنج ينتج عن مرض النخاع الشوكي.

myelospongium الإسفنج النخاعي. الشبكة التي يتطور منها النسيج الدبقي والموجودة في الأنبوب العصبي والمكونة من الأرومات الاسفنجية ونبوءاتها المتفرعة.

myelosyphilis الزهري النخاعي؛ الإفرنجي النخاعي. داء الزهري النخاعي.

myelotomy بضع النخاع. عملية قطع بعض السبل العصبية للنخاع الشوكي.

- commissural m. بضع الصوار النخاعي. بضع النخاع طويلاً لقطع الألياف العصبية الحسية العابرة ولتوليد تسكين موضعي.

myesthesia الجس الغشلي. الحس الذي يتولد عن التنبيه العضلي.

myitis (= myositis) التهاب العضل. التهاب إحدى العضلات.

myoarchitectonic معماري عضلي. متعلق بالمعمارية العضلية.

myoasthenia (= amyosthenia) وهن عضلي.

myoatrophy (= myatrophy) ضمور عضلي.

myoblast أرومة العضلية. خلية جنينية تتطور لتكون الليف العضلي.

myoblastoma ورم أرومة العضلية. آفة حميدة محددة شبيهة بالورم تتولد في الأنسجة الرخوة للعضلة.

myoblastomyoma (= myeloblastoma) ورم أرومة العضلية.

myobradia بطء الاستجابة العضلية. استجابة العضلة للمنبهات ببطء شديد.

myocardiac (= myocardial) قلبي. متعلق بالنسيج العضلي للقلب.

myocardiogram مخطط عضلة القلب. مخطط لحركات عضلة القلب.

myocardiograph مخطط عضلة القلب. جهاز يستعمل لتخطيط حركات عضلة القلب.

myocardiolysis انحلال عضلة القلب. نخر موضعي للألياف العضلية للقلب ينتج عن انسداد أحد شرايينها فيؤدي ذلك إلى تعويضها بنسيج ندبي كما يؤدي أيضاً إلى احتشاء كبير خصوصاً عندما يضاعفه الخثار.

myocardiopathy إعتلال عضلي قلبي. أي مرض لا التهابي يصيب عضلة القلب.

- alcoholic إعتلال عضلي قلبي كحولي. اعتلال عضلة القلب بسبب تعاطي الكحول المزمن وبكميات كبيرة ويتصف بتضخم القلب وتغيرات تنكسية عضلية قلبية تشاهد عند فحصها خاصة بالمجهر الإلكتروني.

myocardiorrhaphy رفو عضلة القلب. رفو جروح عضلة القلب.

myocarditis التهاب عضلة القلب. التهاب الجدار العضلي للقلب.

myocele قيلة عضلية. انفتاق العضلة خلال غلاتها المنشفة.

myocelialgia ألم عَضَلِ الْبَطْنِ. ألم في عضلات البطن.

myocelitis التهاب عَضَلِ الْبَطْنِ. التهاب في عضلات البطن.

myocellulitis إْتِهَابُ الْعَضَلِ وَالْهَلَلِ. التهاب العضلات المترافق مع التهاب الهل.

myoeceptor (= end plate) مُسْتَقْبَلَةٌ عَضَلِيَّةٌ؛ لَوْحٌ إِنْتِهَائِيٌّ؛ صَفِيحَةٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ.

myocerosis تَنْكُسٌ عَضَلِيٌّ شَمْعِيٌّ. تنكس شمعي يصيب العضل.

myochorditis إْتِهَابُ عَضَلَاتِ الْحَبَالِ. التهاب عضلات الحبال الصوتية.

myoclonia رَمَعٌ عَضَلِيٌّ. اضطراب يتصف بتقلصات عضلية ارتجاجية في جزء من عضلة أو في عضلة كاملة أو في مجموعة عضلات في منطقة محددة من الجسم أو في مناطق متعددة منه تحدث متزامنة أو غير متزامنة.

- m. epileptica (= myoclonus epilepsy) صَرْعٌ رَمْعِيٌّ عَضَلِيٌّ.

- m. fibrillaris multiplex (= myokymia) تَمَوُّجٌ عَضَلِيٌّ.

- fibrillary m. رَجْفَانٌ عَضَلِيٌّ. نقصان اللييفات العضلية أو رجفانها.

- pseudoglottic m. (= hiccup) قَوْاق.

myoclonus (= myoclonia) رَمَعٌ عَضَلِيٌّ.

- m. multiplex (= paramyoclonus multiplex) رَمَعٌ عَضَلِيٌّ مُتَعَدِّدٌ.

- palatal m. رَمَعٌ عَضَلِيٌّ حَنَكِيٌّ. حالة تنصف بحركة نظمية ارتجاجية لإحدى جهتي الحنك أو جهتيه للأعلى والأسفل وعادة ما ترافقها حركات رمعية متزامنة في عضلات نفس الجهة من الوجه واللسان والبلعوم والحجاب الحاجز.

myocrismus صَوْتُ الْعَضَلَةِ. الصوت الذي يسمع عند التسمع للعضلة المتقلصة.

myocyte خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ. خلية النسيج العضلي.

myocytolysis إِحْلَالُ الْخَلَايَا الْعَضَلِيَّةِ. تلاشي الألياف العضلية.

myocytoma وَرَمُ الْخَلَايَا الْعَضَلِيَّةِ. ورم يتكون من الخلايا العضلية.

myodegeneration تَنْكُسٌ عَضَلِيٌّ. تنكس العضلة.

myodemia تَنْكُسٌ شَحْمِيٌّ عَضَلِيٌّ. تنكس شحمي في العضلة.

myodiastasis إِنْفِصَالُ الْعَضَلَةِ. انفصال إحدى العضلات.

myodynamics دِيْنَامِيكَا الْعَضَلَاتِ. فيزيولوجيا الفعاليات العضلية.

myodynamometer مَقْيَاسُ قُوَّةِ الْعَضَلَاتِ. آلة لقياس قوة العضلات وشدة تقلصها.

myodynia (= myalgia) وَجَعٌ عَضَلِيٌّ. وجع في إحدى العضلات أو في مجموعة منها.

myodystonia (= myodystony) خَلَلٌ التَوَثُّرِ الْعَضَلِيِّ. اضطراب توتر العضلة.

myodystrophia (= myotonia atrophica) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

- m. fetalis (= amyoplasia congenita) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ جَنِينِيٌّ.

myodystrophy (= myodystrophia) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

myoedema وَذَمَةٌ عَضَلِيَّةٌ. وذمة العضلة.

myofascitis إْتِهَابُ الْعَضَلَةِ وَاللِّفَافَةِ. التهاب العضلة ولفافتها.

myofibril لَيْفِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ. أحد الخيوط الرقيقة الموجودة في الليف العضلي والتي تسير بموازاة طول الليف وتتكون من العديد من الخيوط العضلية.

myofibroblast أُرُومَةُ اللَّيْفَةِ الْعَضَلِيَّةِ. ليفة عضلية لا نمطية لها صفات تشبه خلية العضلات الملساء فلها نواة غير منتظمة الشكل وكمية كبيرة من شبكة الهيولي الباطنة ومجموعة كثيفة من الخيوط العضلية.

myofibroma وَرَمٌ لِيْفِيٌّ عَضَلِيٌّ. ورم يحوي عناصر عضلية وليفية.

myofibrosis تَلَيِّفٌ عَضَلِيٌّ. تعويض النسيج العضلي بنسيج ليفي.

تَلْيَفُ عَضَلِيٍّ قَلْبِيٍّ. تليف عضلة القلب. - m. cordis

الْتِهَابُ myofibrositis (= perimyositis) غمد العضل.

حَيْطُ عَضَلِيٍّ. بنية دون المجهرية myofilament خيطية الشكل توجد بحزم في اللييفة العضلية في العضلات المخططة والنوع السميك منها مكون من الميوزين والرفيق مكون من الاكتين وهما مسؤولان عن الخواص التقلصية للعضلات.

تَقَسُّ عَضَلِيٍّ. منطقة صلبة myogelosis محدودة في إحدى العضلات خصوصاً في العضلة الاولى.

تَوَلَّدَ عَضَلِيٍّ. تولد العضل myogenesis وتكونه في المراحل الجنينية.

يَبْقَى عَضَلِيٍّ. مادة خيطية تولدها myoglia الخلايا العضلية توجد في المراحل الجنينية الاولى فقط.

مِيَوْغْلُوْبِيْن. المادة الصباغية myoglobin الناقلة للأكسجين في العضل وهي بروتين مرتبط شبيه بالوحدات الثانوية من الهيموغلوبين وتقوم بنقل الأكسجين من الدم إلى العضلات.

مِيَوْغْلُوْبُلِيْن. غلوبلين يوجد myoglobulin في مصل العضلات.

مُخَطَّطُ العَضَل. مخطط يحصل myogram عليه بالتخطيط العضلي.

مِخْطَاطُ العَضَل. جهاز يسجل myograph تأثيرات التقلصات العضلية.

تَخْطِيطُ العَضَل. 1. تسجيل myography التقلصات العضلية 2. وصف مفصل للعضلات 3. تصوير شعاعي للعضلات بعد حقن مادة معتمة فيها.

هِيَمَاتِيْن عَضَلِيٍّ. سيتوكروم myohematin يوجد في العضلات يساعد في عملية الأكسدة فيها.

myohemoglobin (= myoglobin) مِيَوْغْلُوْبِيْن.

ضَخَامَةُ عَضَلِيَّة. ضخامة myohypertrophia العضلات.

ضَخَامَةُ عضلية شللية - m. kymoparalytica

تموجية. حثل العضلة مع شللها.

عَضَلَانِيٍّ؛ شَبِيهُ العَضَل. مادة شبيهة myoid بالعضل.

وَدَمَةٌ عَضَلِيَّة. myoidema (= myoedema)

العَضَلِيَّة. تقلص عضلي ذاتي. myoidism

إِقْفَارٌ عَضَلِيٍّ. نقص تجهيز myoischemia الدم إلى منطقة محددة من العضلة.

تَنَكُّسٌ myokerosis (= myocerosis) شَمْعِيٌّ عَضَلِيٍّ. تنكس العضلة الشمعي.

مِقْيَاسُ التَقَلُّصِ العَضَلِيٍّ. myokinesimeter آلة تقيس شدة التقلص العضلي المولد عن تنبيهها كهربائياً.

تَحَرُّكٌ عَضَلِيٍّ. حركة العضلات myokinesis وخصوصاً حركة الألياف عند تقلصها.

تَعَوُّجٌ عَضَلِيٍّ. حالة حميدة تتصف myokymia بتقلصات ذاتية كزازية قصيرة في وحدات حركية منفصلة في مجموعة من الألياف العضلية وعادة ما تتقلص المجموعات المتجاورة بصورة تناوبية.

غَذُّ اللَّيْفِ myolemma (= sarcolemma) العَضَلِيٍّ.

مِيُولِيْن. مادة اللييفات العضلية. myolin

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم عضلي myolipoma يحوي عناصر شحمية.

مَبْحَثُ العَضَل. مبحث تسمية myologia العضلات والاجربة والأغمار الزلالية.

عِلْمُ العَضَل. العلم الذي يدرس myology العضلات ووظائفها وكل ما يتعلق بها.

إِنْجِلَالُ العَضَل. تلاشي النسيج myolysis العضلي أو تنكسه.

وَرَمٌ عَضَلِيٍّ. ورم يتكون من عناصر myoma عضلية.

ورم عضلي كُرْوِيٍّ. ورم عضلي كروي - ball m. الشكل.

ورم عضلي أَمْلَس. - m. levicellularis (= leiomyoma)

ورم عضلي أَمْلَس رَجْمِيٍّ. - m. prevlum (= leiomyoma uteri)

- m. sarcomatodes (= myosarcoma)
ورم ساركومي عَضَلِيّ أَمْلَس.

- m. striocellulare (= rhabdomyoma) ورم
عضلي مَخْطَط الخلايا.

- m. telangiectodes ورم عضلي متوسّع الأوعية:
ورم عضلي أَمْلَس وَغَائِيّ. ورم يتكون من لفات من
الأوعية الدموية تحيط بها شبكات من الألياف العضلية.

myomagenesis تكوّن الورم العضلي.
تكون الورم العضلي أو تسببه.

myomalacia تَلَيُّنُ العَضَل. تلين العضل
المرضي.

myomatosis وُزَامُ عَضَلِيّ. وجود عدة أورام
عضلية.

myomectomy 1. استئصال الورم العضلي
2. قَطْعُ العَضَل. 1. استئصال الورم العضلي
جراحياً 2. قطع جزء من العضلة.

myomelanosis كثرة الميلانين العَضَلِيّ.
ملان أو انصبغ أسود في جزء من النسيج
العضلي.

myomere قُسَيْمٌ عَضَلِيّ. لوحة عضلية
أو جسيم جنيني يتطور ليولد عضلة إرادية.

myometer مِقْيَاسٌ عَضَلِيّ. مقياس يقيس
التقلص العضلي.

myometritis إِتِهَابُ عَضَلِ الرَّحِم. التهاب
المادة العضلية للرحم.

myometrium عَضَلُ الرَّحِم. الجدار العضلي
الأمس للرحم الذي يكون معظم كتلته.

myomotomy بَضْعُ الورم العضلي.

myonecrosis نَحْرُ عَضَلِيّ. نخر أو موت
الياف العضلية.

- clostridial m. (= gas gangrene) ورم
عضلي بالمطثيات؛ مَوَاتٌ غَازِيّ.

myoneural عَضَلِيّ عَصَبِيّ. نسبة للعضل
والعصب ويطلق على النهاية العصبية في العضلة.

myoneuralgia (= muscular
neuralgia) أَلَمٌ عَصَبِيٌّ عَضَلِيّ.

myoneurasthenia وَهَنٌ عَضَلِيّ. الوهن
العضلي الذي يرافق الوهن العصبي.

myoneure عَصَبُونٌ عَضَلِيّ. عصبون يغذي إحدى
العضلات.

myonosis (= myopathy) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ.
تَسْمِيَةُ العَضَلَات. التسمية
التشريحية للعضلات.

myopachynsis ضَخَامَةُ عضلية. ضخامة
إحدى العضلات.

myopalmus (= muscle twitching)
نَفْضَانٌ عَضَلِيّ. تقلص عضلي مفرد أو متكرر
قصير الأمد.

myoparalysis شَلْلٌ عَضَلِيّ. شلل العضلة
أو العضلات.

myoparesis خَرَلٌ عَضَلِيّ. ضعف العضلات.

myopathia (= myopathy) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ.
- m. cordis (= myocardosis) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ
قَلْبِيّ. اعتلال عضلة القلب الالتهابي الذي قد ينتج
عن ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشريان التاجي أو
فرط الدرقية.

- m. infraspinata إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ تَحْتَ الشُّوكِيّ.
حالة تنصف بتولد ألم مفاجئ في المنكب مع إيلام في
العضلة تحت الشوكية.

myopathy إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ. أي مرض
يصيب العضل.

- alcoholic m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ كُحُولِيّ. اعتلال
عضلي يصيب المدمنين على الكحول يتصف ببيلة
الميوغلوبين وضعف الأطراف الداني.

- centronuclear m. (= myotubular m.)
إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ نَوَوِيٌّ مَرْكَزِيّ.

- distal m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ قَاصٍ. اعتلال عضلي
يبدأ في العضلات القاصية للأطراف خصوصاً في
العضلات الصغيرة لليدين والقدمين.

- granulomatous m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ وَرَمِيّ
حَبِيبِيّ. اعتلال عضلي التهابي دون الحاد يتصف
بتجمعات خلوية التهابية تشبه الأورام الحبيبية
المتعددة وفي الغالب مع خلايا عملاقة.

- **metabolic m.** اعتلال عضلي استقلابي. اعتلال عضلي ينتج عن خلل استقلابي في العضلات.
- **myotubular m.** اعتلال عضلي أنبوبوي. اعتلال عضلي يتصف بوجود ألياف عضلية تشبه الألياف الجنينية البدائية التي تحوي نوى مركزية التوضع محاطة بهالة تدور خالية وتكسيها منظر أنبوبوي.
- **nemaline m.** اعتلال عضلي خيطي. شذوذ لبيفي عضلي خلقي يتصف بوجود جسيمات خيطية أو عصوية الشكل منتشرة خلال الألياف العضلية ويؤدي إلى الوهن العضلي وضعف العضلات الدانية.
- **nutritional m.** اعتلال عضلي تغذوي. اعتلال عضلي لا التهابي في العضلات الهيكلية والقلبية بسبب نقص مادة السيلينيوم والفيتامين E في الطعام ويحدث غالباً في الحيوانات.
- **ocular m. (= progressive ocular ophthalmoplegia)** شلل عيني مترق. شلل اعتلال عضلي خيطي.
- **rod m. (= nemaline m.)** اعتلال عضلي خيطي.
- **scapuloperoneal m.** اعتلال عضلي كتفي شظوي. اعتلال عضلي مترق يبدأ في العضلات الشظوية والظنبوبية الأمامية في الأطراف السفلية ثم في العضلة المنشارية والعضلات الأخرى المحيطة بالكف.
- **senile m.** اعتلال عضلي شيخوخي. ضعف مترق في عضلات الساق يحدث في الشيخوخة وينتج عن عوامل متعددة.
- myophage** بلعم العضل: خلية غائية عضلية. بلعمية تخرب مادة العضلة التقلصية.
- myophagism** بلعمة عضلية: ضمور عضلي. ضمور النسيج العضلي.
- myophone** مسماع عضلي. آلة تستعمل لتسمع أصوات التقلص العضلي.
- myoplasm** الهيولي العضلية. الجزء القلوص من الخلية العضلية أو اللييف العضلي.
- myoplasty** رأب عضلي. جراحة رأبية للعضلة.
- myoplegia** شلل عضلي. شلل إحدى العضلات أو أكثر.
- **familial m. (= periodic paralysis)** شلل عضلي عائلي. شلل دوري.

- myoreceptor** مستقبل عضلية. مستقبل حسية عميقة توجد في العضلة الهيكلية.
- myorrhaphy** رفو العضل. درز العضلة المقطوعة.
- myorrhexis** تمزق العضلة. تمزق العضلة وتشققها.
- myosalgia (= myalgia)** ألم عضلي.
- myosarcoma** ساركومة عضلية. ورم خبيث يتولد من الخلايا العضلية.
- myschwannoma (= schwannoma)** ورم عضلي شفاني.
- mysclerosis** تصلب عضلي. تصلب النسيج العضلي.
- myscope** منظار عضلي. آلة لتنظير التقلص العضلي.
- myoseism** تقلص عضلي نقضي. تقلصات عضلية نقضية غير منتظمة.
- myosin** ميوزين. غلوبين، وهو أكثر البروتينات وجوداً في العضل ومسؤول بالاشتراك مع الأكتين عن تقلص العضلات وارتخائها.
- myosis (= miosis)** تقبض الحدقة.
- myositis** التهاب العضل. التهاب العضلات الإرادية.
- **acute disseminated m. (= primary multiple m.)** التهاب العضل الحاد المنتشر: التهاب العضل الابتدائي المتعدد.
- **acute progressive m.** التهاب العضل المتروقي. مرض نادر يصيب التهابه تدريجياً كل الجهاز العضلي وينتهي بالموت بالاختناق والتهاب الرئة.
- **m. fibrosa** التهاب العضل التليفي. التهاب عضلي يؤدي إلى تليف داخل العضل.
- **m. a frigore** التهاب العضل التبريدي. التهاب عضلي روماتزمي يتولد عن التعرض للبرد أو للانجماد.
- **infectious m. (= interstitial m.)** التهاب العضل العدواني.
- **interstitial m.** التهاب العضل الخلالي. التهاب النسيج الرابط والحاجزي في العضل.

- multiple m. (= polymyositis) التهاب العضلات المتعدد.
- m. ossificans التهاب العضل المغطم. التهاب عضلي يتصف بترسب عظمي أو بتعظيم العضل.
- m. ossificans circumscripta التهاب العضل المغطم المتحدّد. التهاب عضلي يتصف بتوليد ورم عظمي مثل عظم الفرسان الذي يتولد في العضلات مقربة الفخذ.
- m. ossificans progressiva التهاب العضل المغطم المتّرقّي. مرض متّرقّي يبدأ في أوائل العمر تتحول عنده العضلات تدريجياً إلى نسيج عظمي مع تقدم العمر.
- m. ossificans traumatica التهاب العضل المغطم الرضحي. التهاب عضلي تعظمي ينتج عن رضح العضلة.
- parenchymatous m. التهاب العضل المتّني. التهاب عضلي يصيب النسيج الاساسي للعضل.
- primary multiple m. التهاب العضل الابتدائي المتّعدّد. مرض حمي حاد يتصف بالتهاب الجلد والعضلات والتهابهما في مختلف أنحاء الجسم.
- progressive ossifying m. (= m. ossificans progressiva) التهاب العضل المغطم المتّرقّي.
- m. purulenta التهاب العضل القيحي. التهاب العضل بسبب تجرثم الدم وبترافق مع القيح والموات.
- rheumatoid m. (= fibrositis) التهاب العضل الروماتويدي. التهاب ليفي.
- m. serosa التهاب العضل المصلي.
- trichinous m. التهاب العضل بالشعريّات. التهاب العضل المولد عن وجود الشعريّات في العضلات.
- رمع myospasia (= paramyoclonus) عضليّ متّعدّد. رمع عضلي يصيب عدة عضلات.
- تشنج عضلي myospasm تشنج العضلة.
- شنج عضلي myospasmia مرض يتصف بتشنج عضلي لا يمكن التحكم فيه.
- مقياس قوّة العضل myosthenometer (= dynamometer) جهاز يقيس قوّة المجموعات العضلية.

- سدى العضل. النسيج الهيكلي myostroma للعضل.
- رفو العضل myosuture (= myorrhaphy) التصاق العضل.
- التصاق العضل. التصاق myosynizesis العضلات.
- حسيّ عضلي عميق. منسوب للحس myotactic العضلي العميق.
- تمدد العضل. تمدد أو تمديد العضل myotasis.
- ممدّد العضل. ما يمدد العضل myotatic أو ما يقوم بتمديده.
- myotendonoplasty (= tenomyoplasty) رأب عضليّ وتري.
- التهاب عضليّ وتري. myotenositis التهاب العضل الوتر.
- بضع وتر العضلة: قطع وتر myototomy العضلة. قطع وتر إحدى العضلات وبضعه.
- حراريّ عضليّ. منسوب إلى myothermic التغيير الحراري للعضلة أثناء فعاليتها.
- مقبض الحديقة. myotic (= miotic).
- myotility (= muscular contractility) قلوّصيّة العضل.
1. مبضع العضل 2. بضعة عضلية. myotome
1. آلة لقطع العضلات 2. الصفيحة العضلية الجنينية التي تتطور إلى عضلة إرادية 3. مجموعة من العضلات تغذيها أعصاب شوكية من قسيمة شوكية واحدة.
- قطع العضل. قطع العضل أو تشريحه. myotomy
- توتر عضليّ. myotone (= myotonus)
- تأثر العضل؛ تشنج العضل التوتري. myotonia
- فرط ميوجية العضل وقلوصيته مع نقصان قدرته على الارتخاء مما يؤدي إلى تشنج العضلة التوتري.
- تأثر العضل المكتسب. تأثر - m. acquisita
- العضل الذي يتولد عن الرضخ أو نتيجة إصابته بمرض ما.
- m. atrophica (= myotonic dystrophy) تأثر العضل الضموريّ.

- **m. congenita** تَأْتَرُ الْعَضَلُ الْخَلْقِي. تَأْتَرُ عضلي خلقي ويمكن أن يكون وراثياً أيضاً يتصف بتشنج العضل التوتري مع صمل بعض العضلات عند محاولة تحريكها بعد فترة من استراحتها أو عند تنبيهها ألياً ويزول الصمل عند استمرار تحريك العضلة.

- **m. dystrophica (= myotonic dystrophy)** تَأْتَرُ الْعَضَلُ الضُّمُورِي.

- **m. hereditaria (= m. congenita)** تَأْتَرُ الْعَضَلُ الْوَرِاثِي.

- **m. neonatorum (= tetanism)** تَأْتَرُ الْعَضَلُ الْوَلِيدِي: تَكَزَّر: خَالَةً تَكَزُّزِيَّة.

- **percussion m.** تَأْتَرُ غَضَلِي قَرْعِي. نوتر العضلات عند قرعها.

myotonic تَأْتَرِي غَضَلِي. منسوب للتأثر العضلي أو مصاب به.

myotonoid شَبِيهِ التَأْتَرِ الْغَضَلِي. استجابات عضلية تتصف ببطء التقلص والارتخاء.

myotonometer مَقْيَاسُ التَّوْتَرِ الْغَضَلِي. آلة لقياس التوتر العضلي.

myotonus تَشْنُجٌ غَضَلِيٌّ تَوْتَرِي. تشنج توترى لإحدى العضلات أو لمجموعة من العضلات.

myotrophic 1. مُنَمِّي الْعَضَل 2. تَغْذَوِي غَضَلِي. 1. ما ينمي العضل ويزيد من وزنه 2. نسبة إلى تغذية العضل.

myotrophy تَغْذِي الْعَضَل. تغذي العضل وتنميه.

myotropic مُوجِّهٌ غَضَلِي. ذو توجيه للعضلات. **myotubule** نَبِيْبٌ غَضَلِي. ليف عضلي متنام ذو نواة مركزية بدلاً من النواة المحيطة.

myovascular غَضَلِيٌّ وَعَاقِي. متعلق بالعضلة وأوعيتها الدموية.

myringa (= tympanic membrane) غِشَاءُ طَبْلَةِ الْأُذُن.

myringectomy اسْتِنْصَالُ غِشَاءِ الطَّبْلِ. استئصال غشاء الطبل جراحياً.

myringitis الْتِهَابُ غِشَاءِ الطَّبْلِ.

- **m. bullosa, bullous m.** الْتِهَابُ غِشَاءِ الطَّبْلِ الْفُقَاعِي. نوع من التهاب الاذن الوسطى الفيروسي يولد فقاعات مصلية أو دموية على غشاء الطبل وجدار الصماخ المجاور.

myringoplasty رَأْبُ غِشَاءِ الطَّبْلِ. رأب غشاء الطبل المثقوب بالطعم.

mysophilia وَلَعُ الْقَذَارَةِ. نوع من الشذوذ يتصف بالولع بالقذارة والغانط والمفرغات.

mysophobia رُهَابُ الْقَذَارَةِ. الخوف المفرط الشاذ من القذارة والمفرغات.

mythomania هَوَسُ الْكُذْبِ؛ هَوَسُ التَّهْوِيل. التهويل والكذب المفرط الشاذ.

mythophobia رُهَابُ الْكُذْبِ؛ رُهَابُ التَّهْوِيل. الخوف من التهويل والكذب أو من سماعهما.

myxedema وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّة. حالة تتولد عن قصور الغدة الدرقية تتصف باورام شمعية جافة مع تكدس المخاطين (موسين) الشاذ في الجلد والأنسجة الأخرى.

myxomyoma وَرَمٌ غَضَلِيٌّ مُخَاطِي. ورم عضلي مع تنكس مخاطي.

N

nalorphine نَالُورْفِين. دواء يستعمل كعلاج مضاد للمورفين والمخدرات الأخرى.

naloxone hydrochloride هَيْدُرُوكْلُورِيد الفلوكسون. دواء يستعمل كدرياق لعلاج فرط جرعات الأدوية المخدرة.

naltrexone نَالْتْرِكْسُون. دواء مضاد للمخدرات.

nanocephaly 1. صِغَرُ الرَّأْس. صغر الرأس الشاذ.

nanocormia 1. صِغَرُ الْجِسْم 2. صِغَرُ الْجَذَع. قَزَامَةُ الْجَذَع. صِغَرُ الْجِسْم أو الجذع الشاذ بالنسبة للرأس والأطراف.

nanomelia صِغَرُ الْأَطْرَاف؛ قَزَامَةُ الْأَطْرَاف. صغر الأطراف الشاذ.

nanosoma (= nanism = dwarfism) قَزَامَةٌ.

nanosomia قَزَامَةٌ.

naranol hydrochloride هَيْدُرُوكْلُورِيد النَارَانُول. دواء مهدئ.

narcism (= narcissism) النَرْجِسِيَّة. حب الذات، ففي النرجسية الأولية عند الأطفال لا يفرق الطفل بين ذاته وبين العالم الخارجي ويعتقد أن كل مصادر اللذة كائنة في ذاته، أما في النرجسية الثانوية عندما ينضج المرء فإنه يوجه كل رغباته وحبه نحو ذاته حتى أنه قد يستمني أمام المرأة.

narcissistic نَرْجِسِي. منسوب للنرجسية أو مصاب بها.

narcoanalysis تَحْلِيلُ تَخْدِيرِي. تحليل نفسي بحقن المخدر إلى المريض بغرض تشجيعه على الإفصاح عن رغباته وأفكاره المكبوتة.

narcohypnia تَنْهَلُ الاستيقاظ. تنمل يشعر به الشخص عند الاستيقاظ من النوم.

narcohypnosis تَنْوِيمٌ تَخْدِيرِي. إحياء تنويمي للشخص عندما يكون تحت تأثير أحد المخدرات.

narcolepsy سَبَحٌ؛ تَغْفِيقٌ؛ نَوْمٌ إِنْتِيَابِي. نوبات نومية قصيرة ومعاودة لا يمكن مقاومتها وعادة ما تترافق مع هلوسات منومة أو مع الجمدة أو الشلل النومي.

narcoleptic 1. نَوْمِي إِنْتِيَابِي؛ مُتَغَفِّقٌ 2. مُنَوِّمٌ إِنْتِيَابِي. 3. مَسْبُوح. 1. منسوب للنوم الانتيابي 2. عامل أو دواء يولد نوما انتيابيا 3. مصاب بالنوم الانتيابي.

narcoma سُبَات تَخْدِيرِي. حالة ذهول تولدها المخدرات.

narcose ذَاهِل. شخص في حالة ذهول.

narcosis تَخْدُرٌ؛ تَخْدِير. حالة خمود لا نوعي وعكوس لوظائف الجهاز العصبي المركزي تتصف بالذهول أو عدم الحساسية وتولدها العقاقير المخدرة.

- basal n. (= basis n.) تَخْدِيرٌ قَاعِدِي. تخدير يتصف بفقدان الوعي التام والنسابة والتسكين.

- insufflation n. (= insufflation anesthesia) تَبْنِيجٌ نَفْجِي.

- intravenous n. (= phlebonarcosis) تَخْدِيرٌ وِرِيدِي.

- medullary n. تَخْدِيرٌ نَخَاعِي. تخدير يولد بحقن المخدر الموضوعي إلى الحيز النخاعي تحت العنكبوتي.

- Nussbaum's n. تَخْدِيرٌ نُوسْبَاوَم. تخدير يولد

باستعمال الإيثر أو الكلوروفورم بعد حقن المورفين.
narcostimulant مُخَدِّرٌ مُتَّبِه. مادة لها تأثير تخديري وآخر تنبيهي.

1. مُخَدِّر. 2. تَخْدِيرِي. 1. مادة تولد التخدير. 2. مادة تولد انعدام الحس أو الذمول.

1. تَخَدَّر. 2. إِذْمَانُ الْمُخَدَّرَات. **narcotism** خَدْر. وضع الشخص تحت تأثير أحد المخدرات.
narcotize

مخثران. فتحتا الأنف **nares (= nostrils)** الخارجيتان.

مَنْخَر. إحدى فتحتي الأنف الخارجيتين. **naris** المَنْخَرُ الأمامي. **- anterior n. (= external n.)** أحد المنخرين الخارجيين.

المَنْخَرُ الغائر؛ **- internal n. (= cavum nasi)** جوف الأنف. فتحة تجويف الأنف نحو البلعوم.

المَنْخَرُ الخَلْفِي. **- posterior n. (= choana)** الفتحة بين تجويف الأنف والبلعوم الأنفي (الخيشوم).

أَنْفِي. متعلق بالأنف. **nasal**

قَرُط **natremia (= hypernatremia)** صُودِيُوم الدَّم. ارتفاع نسبة الصوديوم بالدم.

طَبِيعِي. ما هو ليس بالصنعي ولا **natural** بالمرضي.

غَثَيَان. إحساس مزعج غير مريح يحس **nausea** في الشرسوف أو البطن وغالباً ما يؤدي إلى التقيؤ.
 غَثَيَانُ الحَمَل. الغثيان الصباحي **- n. gravidarum** أثناء فترة الحمل.

غَثَيَانِي. عامل يولد الغثيان. **nauseant**

السُرَّة. **navel (= umbilicus)**

رُؤُوقِي. ما يشبه الزورق في شكله. **navicular**

رَقَبَة؛ عُنُق. جزء ضيق من الجسم أو **neck** العضو مثل الرقبة التي توصل الرأس بالجذع أو عنق الرحم وهو قسمه الضيق السفلي.

neurencephalus (= encephalomal-
acia) نَخَرُ الدِّمَاغ؛ تَلَكُّنُ الدِّمَاغ. تلين الدماغ المرضي.

هَوَسُ الأَمَوَات. الانشغال **necromania** المرضي بأجسام الأموات.

تَوَهُمُ المَوْت. توهم المصاب **necromimesis** بأنه ميت أو يتصنع الموت.

مُجَامَعَةُ المَيِّت. الانجذاب **necrophilia** الجنسي الشاذ أو الاتصال الجنسي بالميت.

مُجَامَعَةُ **necrophilism (= necrophilia)** المَيِّت.

مُجَامَعَةُ **necrophily (= necrophilia)** المَيِّت.

رُهَابُ المَيِّت؛ رُهَابُ المَوْت. **necrophobia** الخوف المرضي من الميت أو من الموت.

سَادِيَةُ المَوْتِي. جِدَع وتمزيق **necrosadism** جسم الميت إشباعاً للرغبة الجنسية.

نَخَر. التغيرات المورفولوجية التي **necrosis** تحدث للأجسام أو الأنسجة الميتة.

انعدام الأوعية. النخر الذي يتولد **- avascular n.** عن نقص في تجهيز الدم للعضو أو لبعض أنسجته.

النَخَرُ القَشْرِيّ المَخِّي. **- cerebrocortical n.** نخر قشرة المخ في الأبقار والأغنام بسبب عوز الأكسجين أو استهلاك الثيامين الشاذ ويتصف بالاختلاج والهياج والرنح وهو مرض مميت.

neencephalon (= neoencephalon) الدِّمَاغُ الحَدِيث.

المُعَانَذَة. مقاومة المريض ورفضه **negativism** لاية إرشادات أو اقتراحات أو أوامر تقدم له كما يحدث في الفصام الجامودي.

المُخَيِّخُ الحَدِيث. اسم **neocerebellum** أطلق أصلاً للدلالة على نصفي كرة المخيخ أما الآن فإنه يطلق على الأقسام التي تستلم اليافا بصورة رئيسية من السبيل القشري الجسري المخيخي وتشمل الفص الذنبي بدون الهرم واللهاة وهي الأقسام التي تسيطر على تنسيق الحركات الحذقة التي تبدأ إشاراتها من قشرة المخ.

القَشْرَةُ الحَدِيثَة. القسم الجديد **neocortex** ذو الطبقات المنظمة الست من قشرة المخ التي تمثل أحدث أقسامه في كل مراحل تطوره.

neencephalon (= neoencephalon) الدِّمَاغُ الحَدِيث. قشرة المخ وأقسامه الأخرى المرتبطة بها وهي أحدث أقسام الدماغ في مراحل تطوره.

neokinetic الحَرَكيَّةُ الحَدِيثَةُ. اسم يطلق على الآلية الحركية العصبية التي تسيطر على الحركات الإرادية في الجسم وهي مرتبطة بالباحات الحركية للمخ وتسمى بالحركية الحديثة لأنها تطورت عند تطور الباحات الحركية الحديثة.

neoplasm وَرَمٌ. نمو جديد شاذ وخاصة ورم الأنسجة المتورقي الذي لا يمكن السيطرة عليه، وتتميز الأورام الخبيثة عن الحميدة بكونها أسرع نمواً وأكثر انتشاراً وتظهر درجة أكبر من الكشم.

neostigmine نِيُوسْتِكْمِين. عامل مضاد للكولينستيراز يستعمل لعلاج أعراض الوهن العضلي الوبيل ولمعالجة الركود والوني العضلي في الجهازين الهضمي والبولي بعد العمليات والوقاية منهما.

neostriatum الجِسْمُ المَخْطُطُ الحَدِيثُ. القسم الأحدث تطوراً في الجسم المخطط الذي يشمل النواة المذنبة وقشرة النواة العديسية.

neothalamus المِهَادُ الحَدِيثُ. القسم

الأحدث تطوراً في المهاد وهو القسم المرتبط مع القشرة الجديدة للمخ.

nephralgia أَلَمُ الكَلَوَةِ. ألم في الكلية.

nerval (= neural) عَصَبِيّ.

nerve عَصَبٌ. (ج: أعصاب). بنية حبلية الشكل مكونة من مجموعة من الألياف العصبية تنقل الدفعات العصبية بين أقسام الجهاز العصبي المركزي والأقسام الأخرى من الجسم.


- accelerator n's. أعصاب مُسرَّعة. الأعصاب القلبية الودية التي تسرع القلب.

- afferent n. عَصَبٌ وَّارِد. عصب ينقل الدفعات العصبية من أطراف الجسم نحو الجهاز العصبي المركزي مثل الأعصاب الحسية.

- centrifugal n. (efferent n.) عَصَبٌ صَّائِر.

- centripetal n. (= afferent n.) عَصَبٌ وَّارِد.

- cerebral n's. (= cranial n's.) الأعصاب الدماغية؛ الأعصاب القَحْفِيَّة.



nerve

ملتح عرَضِي للعصب وهو يحوي أليافاً عصبية مفردة وغير مفردة.

- نقل النبضات العصبية من أعضاء الحس نحو النخاع الشوكي والدماغ.
- الأغصَابُ الجَسَدِيَّةُ. الأعصاب - **somatic n's.** الحسية والحركية التي تغذي العضلات الهيكلية والأنسجة الجسدية.
- الأغصَابُ النُّخَاعِيَّةُ. الأعصاب التي - **spinal n's.** تنبع من النخاع الشوكي وهي واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب.
- الأغصَابُ الحَشَوِيَّةُ. الأعصاب - **splanchnic n's.** التي تغذي الأوعية الدموية والأحشاء خصوصاً الأعصاب الصدرية والبطنية والحوضية للجهاز العصبي الوردي.
- الأغصَابُ العَرَقِيَّةُ. الأعصاب - **sudomotor n's.** التي تغذي الغدد العرقية.
- العَصَبُ الوُدِّي. 1. الجذع الوردي - **sympathetic n.** 2. أحد أعصاب الجهاز العصبي الوردي.
- عَصَبٌ لَا مِيَالِينِي. عصب غير - **unmyelinated n.** محاط بغمد مياليني.
- أَغصَابٌ وَعَائِيَّةُ. الأعصاب التي - **vascular n's.** تغذي الفللة البرانية للأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُضَيِّقُ الأَوْعِيَّةِ. - **vasoconstrictor n.** عصب يؤدي تنبيهه إلى تضيق الأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُوسِّعُ الأَوْعِيَّةِ. عصب - **vasodilator n.** يؤدي تنبيهه إلى توسيع الأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُحَرِّكُ الأَوْعِيَّةِ. أحد - **vasomotor n.** الأعصاب التي تنظم سعة الوعاء سواء أكان عصباً موسعاً أو مضيقاً له.
- عَصَبٌ حِسِّيٌّ وَعَائِيٌّ. عصب - **vasosensory n.** يغذي الأوعية بالياف حسية.
- أَغصَابُ. جمع عصب. **nervi**
- حَرَكَةُ عَصَبِيَّةِ التَّنْبِيهِ. حركة - **nervimotion** تتم بتأثير تنبيه عصبي.
- عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. نسبة إلى - **nervimuscular** العصب المغذي للعضلة.
- عَصَبِيٌّ. 1. نسبة إلى العصب - **nervous** 2. شديد الاستثارة أو مستثار.
- إِنْهَارٌ عَصَبِيٌّ. أي نوع - **nervous breakdown** من الاضطرابات النفسية التي تؤثر على الفعاليات
- الأغصَابُ الرَقَبِيَّةُ. الأزواج الشمانية - **cervical n's.** من الأعصاب الشوكية التي تنبع من القسيمات الرقبية للنخاع الشوكي الرقبي.
- الأغصَابُ القَحْفِيَّةُ. الأزواج العصبية - **cranial n's.** الإثنا عشر المرتبطة بالدماغ.
- عَصَبٌ جُلْدِيٌّ. عصب محيطي - **cutaneous n.** مختلط يغذي منطقة جلدية معينة.
- عَصَبٌ صَادِرٌ. عصب ينقل - **efferent n.** دفعات عصبية من الجهاز العصبي المركزي نحو الأقسام المحيطية من الجسم كالأعصاب الحركية للعضلات.
- عَصَبٌ مُسْتَثِيرٌ؛ عَصَبٌ (= excitator n.) - **exciter n.** مُثَبِّهٌ. عصب ينقل دفعات إلى أحد أقسام الجسم تحفز فعاليته.
- عَصَبٌ تَنْبِيهِيٌّ مُنْعَكَسِيٌّ. عصب - **exitoreflex n.** حشوي يولد فعلاً منعكساً.
- عَصَبٌ صَادِرٌ. (= efferent n.) - **exodic n.**
- عَصَبٌ مُقَبِّطٌ. عصب ينقل دفعات - **inhibitory n.** تثبط فعالية العضو الذي يتصل به.
- عَصَبٌ (= myelinated n.) - **medullated n.** مِيَالِينِي.
- عَصَبٌ مُخْتَلَطٌ. عصب يحوي اليافاً - **mixed n.** حركية (صادرة) واليافاً حسية (واردة).
- عَصَبٌ حَرَكِيٌّ. عصب محيطي صادر - **motor n.** ينقل دفعات حركية للعضلة.
- عَصَبٌ مِيَالِينِي. عصب (خاصة) - **myelinated n.** أحد الأعصاب المحيطية) يحوي اليافاً (محاور) مغطاة بغلاف نخاعيني يغلف بدوره بغمد الليف العصبي.
- (= unmyelinated n.) - **nonmedullated n.** عَصَبٌ لَا مِيَالِينِي.
- عَصَبٌ لَا وُدِّي. أحد - **parasympathetic n.** أعصاب الجهاز العصبي اللاودي.
- عَصَبٌ مُحِيطِيٌّ. أي من الأعصاب - **peripheral n.** خارج الجهاز العصبي المركزي.
- (= nervus ischiadicus) - **sciatic n.** العَصَبُ الْوَرَكِيُّ.
- عَصَبٌ حِسِّيٌّ. عصب محيطي وارد - **sensory n.**



nerve, sciatic

منظر جانبي وخلفي للعصب الوركي وبعض فروعه.

الطبيعية الاعتيادية للشخص والتي تظهر عادة بصورة مفاجئة.

nervousness عَصَبِيَّة. استثارة مفرطة مع عدم الاستقرار الفكري أو الجسدي.

nervus (= nerve) عَصَب. (ج. أعصاب).

- n. abducens (= abducens nerve)

العَصَبُ المُبْعِد. وهو العصب القحفي السادس ينبع من نواة في الجسر تحت قاع البطين الرابع ويخرج من الجهة الامامية لجذع الدماغ بين الجسر والبصلة ويغذي العضلة المستقيمة الوحشية للعين بالياف حركية.

- n. accessorius (= accessory nerve)

العَصَبُ الإِضَافِي. العصب القحفي الحادي عشر ينبع بجذور قحفية من جانب النخاع المستطيل (البصلة) وجذور نخاعية من جانب النخاع (من القسيمات العنقية العلوية الثلاث أو أكثر) ثم تتحد الجذور لتولد جذع العصب الذي ينقسم إلى قرعين داخلي وخارجي، ويتوزع فرعه الداخلي مع المبهم إلى الحنك والبلعوم والحنجرة والأحشاء الصدرية ويتوزع فرعه الخارجي إلى العضلتين القصية الترقوية الحشائية وشبه المنحرفة وبذا فهو عصب لا ودي وحركي.

- n. acusticus (= n. vestibulochlearis)

العَصَبُ السَّمْعِي. العصب الدهليزي القوقعي.

- n. alveolaris inferior (= inferior

alveolar nerve) العَصَبُ السِّنْحِي السُّفْلِي. فرع من العَصَبِ الفكي السفلي ويتفرع إلى الأعصاب الفكي اللامي والسني السفلي والذقني واللثوي السفلي وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. alveolares superiores

(= superior alveolar nerves) الأَعْصَابُ السِّنْحِيَّةُ العُلْوِيَّة. اسم عام للفروع السنية التي تتفرع من العصبين الفكي العلوي وتحت الحجاجي.

- n. ampullaris anterior (= anterior

ampullar nerve) العَصَبُ الأَمْبُولِي الأَمَامِي. فرع من العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الامامية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- n. ampullaris inferior (= n. ampullaris posterior) العَصَبُ الأَمْبُولِي السُّفْلِي.

- n. ampullaris lateralis (= lateral

ampullar nerve) العَصَبُ الأَمْبُولِي الوَحْشِي. فرع العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الوحشية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- n. ampullaris posterior (= posterior

ampullar nerve) العَصَبُ الأَمْبُولِي الخَلْفِي. فرع العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الخلفية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- n. ampullaris superior (= n.

ampullaris anterior) العَصَبُ الأَمْبُولِي العُلْوِي. الأغْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ السُّفْلِيَّة.

- n. anococcygei (= anococcygeal

nerves) الأغْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ العُضْصِيَّة. أعصاب تنبع من الضفيرة العصبية وتتوزع إلى المفصل العجزي العصصي والعصعص والجلد الذي يغطيه وهو عصب حسي.

- n. articularis (= articular nerve)

عَصَبُ مَفْصَلِي. عصب محيطي مختلط يغذي المفصل والبنات والأنسجة المتعلقة به.

- n. auriculares anteriores

(= anterior auricular nerves) الأغْصَابُ الأُذُنِيَّةُ الأَمَامِيَّة. أعصاب تنبع من العصب الأذني الصدغي وتتوزع إلى القسم الامامي العلوي للأذن وهي أعصاب حسية عامة.

- n. auricularis magnus (= great

auricular nerve) العَصَبُ الأُذُنِي الكَبِير. عصب ينبع من الضفيرة الرقبية (الرقبيتين 2 و 3) ويتفرع إلى الفرعين الامامي والخلفي ويتوزع إلى الجلد الذي يغطي الغدة التكمفية والناثرء الخشائي وسطح الأذن وهو عصب حسي.

- n. auricularis posterior (= posterior

auricular nerve) العَصَبُ الأُذُنِي الخَلْفِي. عصب يتفرع من العصب الوجهي ويتفرع إلى الفرع

القذالي الذي يغذي العضلتين الأذنية الخلفية والقذالية الجبهية والجلد الذي يغطي الصماخ السمعي الظاهر وهو عصب حركي حسي.

- n. auriculotemporalis

(= auriculotemporal nerve) **العَصَبُ الأذني**
الصدغي. عصب ينبع بجذرين من العصب الفكي السفلي يتفرع إلى العصب الأذني الأمامي وعصب الصماخ السمعي الظاهر والفروع النكفية وفرع غشاء الطبل والفروع المتواصلة مع العصب الوجهي، وتنتهي فروعه الانتهازية بالفروع الصدغية السطحية لفروة الرأس ويتوزع العصب حسب توزيع فروعه وهو عصب حسي.

- n. axillaris (= axillary nerve) **العَصَبُ الإبطي**.

ينبع من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية ويتفرع إلى العصب العضدي الجلدي العلوي الوحشي والفروع العضلية ويتوزع إلى العضلتين الدالية والمدورة الصغيرة والجلد فوق ظهر الذراع وهو عصب حسي عام.

- n. buccalis (= buccal nerve) **عصب المبوقة**:

العَصَبُ الشدقي. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي ويتوزع إلى جلد الخد وغشائه المخاطي وإلى اللثة ولربما إلى السنين الرحويين الأول والثاني والأسنان الضواك وهو عصب حسي عام.

- n. buccinatorius (= n. buccalis) **العَصَبُ الشدقي**.

- n. canalis pterygoidei (= nerve of pterygoid canal) **عَصَبُ القَنَاةِ الجَنَاحِيَّةِ**. عصب يتصل من اتحاد العصبين الصخريين العميق والكبير ويتوزع إلى العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب ودي ولا ودي.

- n. cardiacus cervicalis inferior (= inferior cervical cardiac nerve)

العَصَبُ الرَقَبِيُّ القَلْبِيُّ السُّفْلِي. عصب يتصل من العقدة الرقبية الصدرية ويتوزع خلال الضفيرة القلبية إلى القلب وهو عصب ودي مسرع للقلب وعصبي حسي حشوي وارد (لحس الالم بصورة خاصة).

- n. cardiacus cervicalis medius (= middle cervical cardiac nerve) **العَصَبُ الرَقَبِيُّ القَلْبِيُّ الوُسْطَى**. عصب يتصل من العقدة الرقبية الوسطى ويتوزع إلى القلب وهو عصب ودي

ومسرع للقلب وحسي حشوي وارد (خصوصاً لحس الالم).

- n. cardiacus cervicalis superior

(= superior cervical cardiac nerve)

العَصَبُ الرَقَبِيُّ القَلْبِيُّ العُلْوِي. عصب ينبع من العقدة الرقبية العلوية ويتوزع إلى القلب وهو عصب ودي مسرع للقلب.

- nervi cardiaci thoracici (= thoracic

الأغصَابُ القَلْبِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ. أعصاب تتصل من العقد 2-4 أو 3 الصدرية للجذع الودي وتتوزع إلى القلب وهي أعصاب ودية مسرعة للقلب وحسية حشوية (خصوصاً لحس الالم).

- nervi caroticotympanici

الأغصَابُ السَّبَاتِيَّةُ الطَّبَلِيَّةُ. أعصاب تتصل من الضفيرة السباتية الباطنة وتكون مع العصب الطبلي الضفيرة الطبلية وتتوزع إلى منطقتي الطبل والغدة النكفية وهي أعصاب ودية.

- nervi carotici externi (= external

الأغصَابُ السَّبَاتِيَّةُ الظَّاهِرَةُ. أعصاب تتصل من العقدة الرقبية العلوية وتتوزع إلى الأوعية الدموية والغدد القحفية خلال الضفيرة السباتية الظاهرة وهي أعصاب ودية.

- n. caroticus internus (= internal

العَصَبُ السَّبَاتِيُّ البَاطِنُ. عصب يتصل من العقدة الرقبية العلوية ويتوزع إلى الأوعية الدموية والغدد القحفية خلال الضفيرة السباتية الباطنة وهو عصب ودي.

- nervi cavernosi clitoridis

(= cavernous nerves of clitoris)

الأغصَابُ الكَهْفِيَّةُ البَطْرِيَّةُ. أعصاب تتصل من الضفيرة الرحمية المهبلية وتتوزع إلى الأنسجة الناعطة للبظر وهي أعصاب ودية ولا ودية وحشوية واردة.

- nervi cavernosi penis (= cavernous

الأغصَابُ الكَهْفِيَّةُ القَضِيَّةُ. أعصاب تتصل من الضفيرة البروستاتية وتتوزع إلى الأنسجة الناعطة للخصيب وهي أعصاب ودية ولا ودية وحشوية واردة.

- **nervi cerebrales (= nervi cranialis)**
الأعصاب الدماغية: الأعصاب القحفية.
- **nervi cervicales (= cervical nerves)**
الأعصاب الرقبية. الأزواج الثمانية التي تتبع من قسيمات النخاع الشوكي الرقبية وتترك العمود الفقري (ما عدا الزوج الأخير) فوق مستوى الفقرة المناسبة له وتتحد الفروع الأمامية للأعصاب الأربعة العلوية لتكون الضفيرة الرقبية كما تتحد الفروع الأمامية للأعصاب الأربعة السفلية مع الفرع البطني للصدرية الأولى لتكون معظم الضفيرة العنقية.
- **nervi ciliares breves (= short ciliary nerves)**
الأعصاب الهدبية القصيرة. أعصاب تتصل من العقدة الهدبية وتتوزع إلى العضلات الملساء للعين وإلى غلاتها وهي أعصاب ودية ولا ودية وحسية عامة.
- **nervi ciliares longi (= long ciliary nerves)**
الأعصاب الهدبية الطويلة. أعصاب تتصل من العصبين الأنفي الهدبي والعيني وتتوزع إلى العصب موسع الحدقة والقرنية والعينية وهو عصب ودي وحسي عام.
- **nervi clunium inferiores (= inferior clunial nerves)**
الأعصاب الألوية السفلية. أعصاب تتصل من العصب الجلدي الفخذي الخلفي وتتوزع إلى المنطقة السفلية للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi clunium medii (= middle clunial nerves)**
الأعصاب الألوية الوسطية. أعصاب تتصل من الضفيرة المكونة من الفروع الوحشية للفروع الظهرية للأعصاب العجزية الأربعة الأولى خلف العجز والعصعص وتتوزع إلى الأوتار العجزية والجلد فوق القسم الخلفي للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi clunium superiores (= superior clunial nerves)**
الأعصاب الألوية العلوية. أعصاب تتصل من الفروع الوحشية للفروع الظهرية للأعصاب القطنية العلوية وتتوزع إلى جلد المنطقة العلوية للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **n. coccygeus (= coccygeal nerve)**
العصب العُصْفَصِي. أحد العصبين اللذين ينبعان من القسم العصعصي للحبل الشوكي.
- **n. cochleae (= pars cochlearis nervi vestibulocochlearis)**
العصب القَوَقَعِي. الجزء القوقعي من العصب الدهليزي القوقعي.
- **n. cochlearis (= cochlear nerve)**
العصب القَوَقَعِي. قسم العصب الدهليزي القوقعي المختص بالسمع ويتكون من الياف تتبع من الخلايا ثنائية القطبين في العقدة الحلزونية والتي توجد مستقبلاتها في العضو الحلزوني.
- **nervi craniales (= cranial nerves)**
الأعصاب القحفية. الأعصاب الإثنا عشر المرتبطة بالدماغ مباشرة.
- **n. cutaneus antebrachii lateralis (= lateral cutaneous nerve of forearm)**
العصب الجلدي الوُخْشِيِّ لِلسَّاعِد. هو امتداد للعصب العضلي الجذلي ويتوزع للجلد على الجهة الكعبرية للساعد وأحياناً لمنطقة في جلد ظهر اليد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antebrachii medialis (= medial cutaneous nerve of forearm)**
العصب الجلدي الْإِنْسِيِّ لِلسَّاعِد. وهو الحبل الإنسي للضفيرة العنقية (الرقبي 8 والصدرية 1) ويتفرع إلى الفرعين الأمامي والزندني ويتوزع إلى النواحي الأمامية والإنسية والظهرية الإنسية للساعد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antebrachii posterior (= posterior cutaneous nerve of forearm)**
العصب الجلدي الْخَلْفِيِّ لِلسَّاعِد. عصب يتصل من العصب الكعبري ويتوزع إلى المناطق الجلدية الظهرية للساعد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antibrachii dorsalis (= n. cutaneus antebrachii posterior)**
العصب الْجِلْدِي الْخَلْفِي لِلسَّاعِد.
- **n. cutaneus brachii lateralis inferior (= inferior lateral cutaneous nerve of arm)**
العصب الْجِلْدِي السُّفْلِي الْوُخْشِيِّ لِلْعُضْد. عصب يتصل من العصب الكعبري ويتوزع إلى جلد المنطقة السفلية من العضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus brachii lateralis superior**
(= superior lateral cutaneous nerve of arm)
العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْغُلَوِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب يتأصل من العصب الإبطي ويتوزع إلى جلد ظهر

العضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus brachii medialis**
(= medial cutaneous nerve of arm)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب ينبع من الحبل الإنسي للضفيرة العضدية (العضدية 1) ويتوزع إلى جلد المنطقتين الوحشية والظهرية للعضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus brachii posterior**
(= posterior cutaneous nerve of arm)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب ينبع من العصب الكعبري في الإبط ويتوزع إلى جلد ظهر العضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus colli** (= n. transversus colli)
العَصَبُ الْمُسْتَعْرِض لِلرَّقَبَةِ.

- **n. cutaneus dorsalis intermedius**
(= intermediate dorsal cutaneous nerve)
العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْمُتَوَسِّطُ.

عصب ينبع من العصب الشظوي السطحي ويتفرع إلى الأعصاب الإصبعية الظهرية للقدم ويتوزع إلى جلد المنطقة الأمامية للثلث السفلي من الساق وظهر القدم ومفاصل المناطق المتجاورة بين أصابع القدم الثالث والرابع وبين الرابع والخامس وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. cutaneus dorsalis lateralis**
(= lateral dorsal cutaneous nerve)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْوَحْشِيُّ. وهو امتداد للعصب الربلي ويتوزع إلى جلد ومفاصل الجهة الوحشية من القدم وإصبع القدم الخامس وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus dorsalis medialis**
(= medial dorsal cutaneous nerve)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْإِنْسِيُّ. عصب يتأصل من العصب الشظوي السطحي ويتوزع إلى جلد ومفاصل الجهة الإنسية من القدم وإبهامه وللجوانب المتجاورة من الإصبعين الثاني والثالث وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus femoris lateralis** (= lateral cutaneous nerve of thigh)
العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْفَخْذِيُّ الْوَحْشِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية

(القطنيين 2 و 3) ويتوزع إلى جلد المنطقتين الوحشية والأمامية للفخذ وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus femoris posterior**
(= posterior cutaneous nerve of thigh)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْفَخْذِيُّ الْخَلْفِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (العجزى 1-3) ويتفرع إلى العصب الأولي السفلي والفروع العجائية ويتوزع إلى جلد الألية والأعضاء التناسلية الخارجية وظهر الفخذ والربلة وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus surae lateralis** (= lateral cutaneous nerve of calf)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلرَّبْلَةِ. عصب يتأصل من العصب الشظوي الأصيل ويتوزع إلى جلد المنطقة الوحشية لظهر الساق ونادراً ما يستمر مكوناً العصب الربلي وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus surae medialis** (= medial cutaneous nerve of calf)

العَصَبُ الْجِلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ لِلرَّبْلَةِ. عصب يتأصل من العصب الظنبوبي وعادة ما يتصل بالفرع الشظوي الموصل للعصب الشظوي الأصيل ليكونا العصب الربلي أو قد يستمر كالعصب الربلي وهو عصب حسي عام.

- **nervi digitales dorsales hallucis lateralis et digiti secundi medialis** (= dorsal digital nerves of lateral surface of great toe and medial surface of second toe)

الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِبْخَسِيَّةُ لِلسَّطْحِ الْوَحْشِيِّ لِإِبْهَامِ الْقَدَمِ وَالسَّطْحِ الْإِنْسِيِّ لِأَصْبَعِ الْقَدَمِ. أعصاب تتأصل من القسم الانتهائي الإنسي من العصب الشظوي العميق وتتوزع إلى جلد ومفاصل الجهات المتجاورة من الإبهامين الكبير والثاني وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi digitales dorsales nervi radialis**
(= dorsal digital nerves of radial nerve)

الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِبْخَسِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْكُعْبَرِيِّ. أعصاب تتأصل من الأعصاب السطحية للعصب الكعبري وتتوزع لمفاصل وجلد ظهر الإبهام والسبابة وجزء من الوسطى حتى السلامة القصوية وهي أعصاب حسية.

- **nervi digitales dorsales nervi ulnaris**
(= dorsal digital nerves of ulnar nerve)

الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْعَصَبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. أعصاب

تتأصل من الفرع الظهري للعصب الزندي وتتوزع إلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية للخنصر والمناطق الظهريّة للجهات المتجاورة للخنصر والبصير وهي أعصاب حسية.

- nervi digitales dorsales pedis

الأغصَابُ الظَّهْرِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ (= dorsal digital nerves of foot) أعصاب تتأصل من العصب الجلدي الظهري المتوسط وتتوزع إلى مفاصل وجلد المناطق المتجاورة بين أصابع القدم الثالث والرابع وبين الرابع والخامس وهي أعصاب حسية عامة.

- nervi digitales palmares communes

nervi mediani (= common palmar digital nerves of median nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. وهي أربعة أعصاب تتأصل من الفرعين الإنسي والوحشي للعصب الناصف وتتفرع إلى الأعصاب الراحية الاصبعية وتتوزع إلى الإبهام والسبابة والوسطى والبصير وللعضلتين الخراطينيتين الأوليتين وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

- nervi digitales palmares communes

nervi ulnaris (= common palmar digital nerves of ulnar nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. وهما عصبان يتأصلان من الفرع السطحي للعصب الزندي ويتفرعان إلى الأعصاب الراحية الاصبعية ويتوزعان إلى الخنصر والبصير وهما عصبان حسيان.

- nervi digitales palmares proprii nervi

mediani (= proper palmar digital nerves of median nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. أعصاب تتأصل من الأعصاب الراحية الاصبعية الأصلية وتتوزع إلى العضلتين الخراطينيتين الأوليتين ومفاصل وجلد الوجوه الراحية وجهتي الإبهام والسبابة والوسطى والجهة الكعبرية للبصير وظهر النواحي القاصية لهذه الأصابع وهي أعصاب حسية عامة وحركية.

- nervi digitales palmares proprii nervi

ulnaris (= proper palmar digital nerves of ulnar nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. أعصاب تتأصل من العصبين الوحشين من الأعصاب الراحية الاصبعية

الأصلية من الفرع السطحي للعصب الزندي وتتوزع إلى مفاصل وجلد الجهتين المتجاورتين للخنصر والبصير وهي أعصاب حسية عامة.

- nervi digitales plantares communes

nervi plantaris lateralis (= common plantar digital nerves of lateral plantar nerve) الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْوَحْشِيِّ. وهما عصبان يتأصلان من الفرع السطحي للعصب الأخمصي الوحشي ويتفرعان إلى عصبين أخمصيين لأصابع القدم خاصين وتتوزع العصب الوحشي منهما إلى العضلة القصيرة المثنية لأصابع القدم وإلى مفاصل وجلد الأخمص والأبخرس الصغير وتتوزع العصب الإنسي منهما إلى الجهتين المتجاورتين بين إصبعي القدم الرابع والخامس وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

- nervi digitales plantares communes

nervi plantaris medialis (= common plantar digital nerves of medial plantar nerve) الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْإِنْسِيِّ. وهي أربعة أعصاب تتأصل من العصب الأخمصي الإنسي وتتفرع إلى العصبين العضلي والعصب الأخمصي لأصابع القدم الخاص وتتوزع إلى العضلتين المثنية لإبهام القدم القصيرة والخراطينية الأولى وإلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية للقدم وإبهام القدم والمناطق المتجاورة بين أصابع القدم الأول والثاني وبين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع وهي أعصاب حركية وحسية.

- nervi digitales plantares proprii nervi

plantaris lateralis (= proper plantar digital nerves of lateral plantar nerve)

الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْوَحْشِيِّ. أعصاب تتأصل من الأعصاب الأخمصية لأصابع القدم الأصلية وتتوزع إلى العضلة المثنية لإصبع القدم الصغير القصيرة وإلى مفاصل وجلد الأخمص وإصبع القدم الصغير والجهتين المتجاورتين بين إصبعي القدم الرابع والخامس وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

- nervi digitales plantares proprii nervi

plantaris medialis (= proper plantar digital nerves of medial plantar nerve)

الأعصاب الأَخْمَصِيَّةُ المخصوصة لأصابع القدم
لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الإنْسِيِّ. أعصاب تتأصل من
الأعصاب الأخمصية لأصابع القدم الأصلية وتتوزع
إلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية لإصبع القدم الصغير
والجهات المتجاورة بين أصابع القدم الأول والثاني
وبين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع كما تمتد
الأعصاب إلى ظهر القدم لتغذي فراش الاظافر وذرى
أصابع القدم وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi digitales volares communes nervi mediani (= nervi digitales palmares communes nervi mediani)**
الأعصاب الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ
النَّاصِفِ.

- **nervi digitales volares communes nervi ulnaris (= nervi digitales palmares communes nervi ulnaris)**
الأعصاب الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّؤْدِيِّ.

- **nervi digitales volares proprii nervi mediani (= nervi digitales palmares proprii nervi mediani)**
الأعصاب الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الْخَاصَّةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ.

- **nervi digitales volares proprii nervi ulnaris (= nervi digitales palmares proprii nervi ulnaris)**
الأعصاب الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الْخَاصَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّؤْدِيِّ.

- **n. dorsalis clitoridis (= dorsal nerve of clitoris)**
عَصَبُ ظَهْرِ البَطْرِ. عصب يتأصل من
العصب الفرجي ويتوزع إلى العضلتين المستعرضة
العجانة العميقة ومصرة الإحليل وإلى الجسم الكهفي
البطري وإلى جلد وقلقة وحشفة البظر وهو عصب
حركي وحسي عام.

- **n. dorsalis penis (= dorsal nerve of penis)**
عَصَبُ ظَهْرِ القَضِيْبِ. عصب يتأصل
من العصب الفرجي ويتوزع إلى العضلتين
المستعرضة العجانة العميقة ومصرة الإحليل والجسم
الكهفي القضيبى وإلى جلد وقلقة وحشفة القضيب
وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. dorsalis scapulae (= dorsal nerve of scapula)**
عَصَبُ ظَهْرِ الكَتَفِ. عصب يتأصل
من الضفيرة العضدية (الفرع البطني للرقبي 5)

ويتوزع إلى العضلتين المعينيتين وأحياناً إلى العضلة
الرافعة للكتف وهو عصب حركي.

- **nervi encephalici (= nervi craniales)**
الأعصابُ القَحْطِيَّةُ.

- **nervi erigentes (= nervi splanchnici pelvini)**
الأعصابُ الْمُعْظَلَةُ: الأعصابُ الحَشَوِيَّةُ الخَوْضِيَّةُ.


- **n. ethmoidalis anterior (= anterior ethmoidal nerve)**
العَصَبُ الْغَرْبَالِيُّ الأَمَامِيُّ. وهو استمرارية العصب الأنفي الهديبي من العصب
العينى ويتفرع إلى الفروع الظاهر والباطن والإنسي
والوحشي ويتوزع إلى المخاطية الأمامية والعلوية
لحاجز الأنف والجدار الوحشي للتجويف الأنفي وجلد
الجسر السفلي وذروة الأنف وهو عصب حسي عام.

- **n. ethmoidalis posterior (= posterior ethmoidal nerve)**
العَصَبُ الْغَرْبَالِيُّ الخَلْفِيُّ. يتأصل من العصب الأنفي الهديبي من العصب العينى
ويتوزع إلى مخاطية الخلايا الغربالية الخلفية والجيب
الوئدي وهو عصب حسي عام.

- **n. facialis (= facial nerve)**
العَصَبُ الْوَجْهِيُّ. العصب القحفي السابع ويتكون من جذرين حركي
كبير يغذي عضلات الوجه التعبيرية وجذر أصغر هو
العصب المتوسطي. يتأصل العصب الوجهي من
الحافة السفلية للجسر بين الزيتونة والسويقة
المخيخية السفلية ويتفرع جذره الحركي إلى العصبين
الركابي والأذني الخلفي والصفيرة النكفية وعصب
ذات البطنين والصدغي والوجني والشدقي واللساني
والفكي السفلي الهامشي والفرع الرقبي كما أنه يجهز
فروعاً موصلة للصفيرة الطبلية وتتوزع هذه الفروع
لمختلف أقسام الرأس وهو عصب حركي وحسي عام
وخاص.

- **n. femoralis (=femoral nerve)**
العَصَبُ الْفَخْذِيُّ. يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنيات 2-4)
ويهبط خلف الرباط الأربى إلى المثلث الفخذي ويتفرع
إلى العصب الصافن والفروع العضلية والجلدية
الأمامية ويتوزع إلى جلد الفخذ والساق والعضلات
الأمامية للفخذ ومفصلي الورك والركبة وهو عصب
حركي وحسي عام.

- **n. fibularis communis (=common fibular nerve)**
العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الأَصْلِيُّ.



nerve, femoral

أعصاب وعضلات وأوعية الطرف السفلي: (1) الوريد الحرقفي (2) الشريان الحرقفي (3) العصب الفخذي (4) العضلة الحرقفية (5) الشريان الفخذي العميق (6) الشريان الفخذي المنعطف (7) الفرع الصاعد (8) الفرع النازل (9) الفروع العضلية للعصب الفخذي (10) العضلة المستقيمة الفخذية (11) الشريان الثاقب (12) العضلة المتسعة الوحشية (13) الفرع العضلي للعصب الفخذي (14) العضلة المستقيمة الفخذية (15) العضلة المتسعة الإنسية (16) العصب الصافن (17) فرع الشريان الركبي النازل (18) شبكة عروق مفصل الركبة (19) الشريان المابضي (20) الشريان الركبي السفلي (21) الشريان الركبي العلوي (22) العضلة الخياطية (23) فرجة المقربين (24) الشريان الفخذي (25) العضلة المقربة الكبيرة (26) العضلة الناحلة (27) الوريد الفخذي (28) العضلة المقربة الطويلة (29) الفرع الجلدي للعصب السداي (30) الشريان الثاقب (31) العضلة المقربة الطويلة (32) العضلة المقربة القصيرة (33) الوريد الفخذي العميق (34) الوريد الفخذي (35) الشريان السداي (36) العصب السداي (37) الشريان المنعطف الفخذي (38) الوريد الصافن الكبير (39) العصب السداي.



nerve, fibular

أعصاب وشرايين وعضلات الساق اليمنى: (1) الشريان الركبي العلوي الوحشي (2) الشريان الركبي السفلي (3) العصب الشظوي السفلي (4) العضلة الشظوية الطويلة (5) العضلة باسطة الأصابع الطويلة (6) الشريان الظنبوبي الراجع (7) العصب الشظوي العميق (8) العصب الشظوي السطحي (9) العضلة الشظوية الطويلة (10) العضلة باسطة الأصابع الطويلة (11) العصب الشظوي السطحي (12) العضلة الشظوية القصيرة (13) العضلة الباسطة للأصابع الطويلة (14) الفرع الناقب للشريان الشظوي (15) الشبكة الكعبية الوحشية (16) الشريان الكعبي الأمامي الوحشي (17) العضلة باسطة الأصابع القصيرة (18) وتر العضلة الشظوية (19) الشرايين المشطية الظاهرة (20) الأعصاب الإصبعية الظهرية (21) شريان ظهر القدم (22) العصب الشظوي العميق (23) قيد الباسطات السفلي (24) العضلة باسطة الإبهام الطويلة (25) العصب الشظوي العميق (26) العضلة الظنبوبية الأمامية (27) الشريان الظنبوبي الأمامي (28) الرباط الرضفي (29) الشبكة الشريانية الركبية (30) الشريان الركبي العلوي الإنسي.

يتأصل من العصب الوركي في القسم السفلي من الفخذ ويتفرع ويتوزع إلى الرأس القصير للعضلة ذات الرأسين الفخذية ويعطي العصب الربلي الجليدي الوحشي والفرع الشظوي الموصل عند هبوطه في الحفرة الأبخسية ويغذي المفصلين الركبي والظنبوبي الشظوي والعضلة الشظوية الامامية ثم ينقسم إلى العصبين الشظويين السطحي والعميق وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. fibularis profundus (= deep fibular nerve) العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ. هو فرع انتهائي للعصب الشظوي الأصلي ويتفرع ويتوزع بالتفاف حول عنق الشظية ويهبط بين الغشاءين العظميين إلى أمام الكاحل ويعطي فروعاً سفلية إلى العضلات الظنبوبية الامامية وباسطة إبهام القدم الطويلة وباسطة الأباخس الطويلة والعضلة الشظوية الثالثة وفرع إلى مفصل الكاحل ويغذي فرعه الانتهائي الوحشي العضلة الباسطة للأباخس القصيرة والمفاصل الرضفية كما يغذي فرعه الانتهائي الإنسي أو الفرع الأبخسي، الذي ينقسم إلى الأعصاب الظهرية الأبخسية، مفاصل وجلد الجهات المتجاورة للأبخسين الكبير والثاني وهو عصبي حركي وحسي عام.

- n. fibularis superficialis (= superficial fibular nerve) العَصَبُ الشَّظْوِيُّ السُّطْحِي. هو فرع انتهائي للعصب الشظوي الأصلي يتفرع ويغذي ويهبط أمام الشظية ليغذي العضلتين الشظويتين الطويلة والقصيرة وينقسم في الجزء السفلي من الساق إلى الفروع العضلية والعصبين الجلديين الإنسي والمتوسط الظهرية وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. frontalis (= frontal nerve) العَصَبُ الْجَبْهِي. يتأصل من العصب العيني وهو فرع من العصب ثلاثي التوائم ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي العلوي ويتفرع إلى العصبين فوق الحجاجي وفوق البكري ويتوزع بصورة رئيسية إلى الجبهة وفروة الرأس وهو عصب حسي عام.

- n. genitofemoralis (= genitofemoral nerve) العَصَبُ التَّنَاسُلِيُّ الْفَخْذِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنيين 1-2) ويتفرع إلى الفرعين التناسلي والفخذي وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. glossopharyngeus (= glossopharyngeal nerve) العَصَبُ اللِّسَانِيُّ الْبَلْعُومِي. العصب القحفي التاسع يتأصل بعدد من الجذيرات من الجانب الوحشي للقسم العلوي من النخاع المستطيل (البصلة) بين الزيتونة والسويق المخيخي السفلي ويتفرع إلى العصب الطبلي والفروع البلعومي والإبري البلعومي واللوزي واللساني وفرع للجيب السباتي وآخر موصل مع الفرع الأذني للعصب المبهم وتوجد فيه عقدتان العلوية والسفلية ويغذي اللسان والبلعوم والغدة النكفية وهو عصب حركي ولا ودي وحسي خاص وحسي حشوي.

- n. gluteus inferior (= inferior gluteal nerve) العَصَبُ الْأَلْوِي السُّفْلِي. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 5- العجزي 2) ويتوزع إلى العضلة الألوية الكبرى وهو عصب حركي.

- n. gluteus superior (= superior gluteal nerve) العَصَبُ الْأَلْوِي الْعُلْوِي. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 5- العجزي 1) ويتوزع إلى العضلتين الألويتين الصغرى والوسطى وموترة اللقافة العريضة ومفصل الورك وهو عصب حركي وحسي عام.

- nervi haemorrhoidales inferioris (= nervi rectales inferiores) العَصَبُ الْمُسْتَقِيمِي السُّفْلِي.

- nervi haemorrhoidales medii (= branches of middle rectal plexus) فُرُوعُ الضْفِيرَةِ الْمُسْتَقِيمِيَةِ الْوَسْطَى.

- nervi haemorrhoidales superiores (= branches of the superior rectal plexus) فُرُوعُ الضْفِيرَةِ الْمُسْتَقِيمِيَةِ الْعُلْوِيَةِ.

- n. hypogastricus (dexter/ sinister) العَصَبُ الْخَلْتِيُّ (الْأَيْمَنُ وَالْأَيْسَرُ). جذع عصبي يقع على الجهتين (اليسرى واليمنى) ويربط الضفيرتين الخلتيتين العليا والسفلى.

- n. hypoglossus (= hypoglossal nerve) العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِ. العصب القحفي الثاني عشر يتأصل بجذيرات من التلم الامامي الوحشي بين زيتونة وهرم النخاع المستطيل (البصلة) ويمر إلى اللسان خلال القناة تحت اللسانية ويتفرع

إلى الفروع اللسانية التي تغذي العضلات الإبرية اللسانية وتحت اللسانية والذقنية اللسانية والعضلات الداخلية للسان وهو عصب حركي.

- **n. iliohypogastricus (= Iliohypogastric nerve)** العَصَبُ الحَرْقَفِيُّ الخَلْفِيُّ. يتأصل من الضفيرة القطنية (القطني 1 وأحياناً الصدري 12) ويتفرع إلى الفرعين الجليدين الوحشي والامامي وتتوزع فروعه إلى الجلد فوق العانة وفوق الجهة الوحشية من الألية وأحياناً إلى العضلة الهرمية وهو عصب حركي حسي عام.

- **n. ilio-inguinalis (= Ilioinguinal nerve)** العَصَبُ الحَرْقَفِيُّ الأُرْبِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنية 1 وأحياناً الصدرية 12) ويرافق الحبل المنوي في القناة الأربية ويتفرع إلى الفروع الصغرية الأمامية أو الشفرية ويتوزع إلى جلد الصفن أو الشفر الكبير ومناطق الفخذ المجاورة له وهو عصب حسي عام.

- **n. Infraorbitalis (= infraorbital nerve)** العَصَبُ تَحْتَ الحَجَاج. وهو امتداد للعصب الفكي العلوي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي السفلي ويحتل الأخدود ثم القناة ثم الثقب تحت الحجاجيات على التوالي ويتفرع إلى الفروع السنخية السفلية والوسطية والعلوية والجفني السفلي والانفيين الظاهر والباطن والشفوي العلوي وهو عصب حسي عام.

- **n. infratrochlearis (= infratrochlear nerve)** العَصَبُ تَحْتَ البَكْرَةِ. عصب يتأصل من العصب الأنفي الهدبي وهو فرع من العصب العيني ويتفرع إلى الفروع الجفنية ويغذي جلد جذر الأنف وجسره والجفن السفلي والملتحمة والقناة الدمعية وهو عصب حسي عام.

- **nervi intercostales (= rami ventrales nervorum thoracicorum)** الأعصاب الوربية: الفُرُوعُ البَطْنِيَّةُ للأعصاب الصدرية.

- **nervi intercostobrachiales (= Intercostobrachial nerves)** الأعصاب الوربية العضدية. أعصاب تتأصل من العصبين الوربيين الثاني والثالث وتتوزع على جلد المنطقتين الخلفية والإنسية للعضد وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. Intermediifacialis (= n. facialis and n. Intermedius)** العصب المتوسط الوجهي:

العَصَبَانِ الوَجْهِيَّ والمتوسط.

- **n. intermedius (= intermediate n.)**

العَصَبُ المتوسط. الجذر الأصغر للعصب الوجهي يقع بين جذعه الرئيسي وبين العصب الدهليزي القوقعي ويتصل بالجذر الرئيسي للعصب الوجهي أو يندمج في العقدة الركبية عند رُكْبِيَّة العصب الوجهي ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية وتحت الفك السفلية وتحت اللسانية والثلاثين الاماميين للسان وهو عصب لا ودي وحسي خاص.

- **n. Interosseus (antebrachii) anterior (= anterior Interosseous nerve of forearm)**

العَصَبُ الأَمَامِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ. عصب يتأصل من العصب الناصف ويتوزع إلى العضلات مثنية الابهام الطويلة ومثنية الأصابع العميقة والكابة المربعة وإلى مفاصل المعصم وبين الرسغيات وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. Interosseus antebrachii posterior (= posterior Interosseous of forearm)**

العَصَبُ الخَلْفِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ. هو امتداد للفرع العميق للعصب الكعبري ويتوزع إلى العضلات مبعدة الأصابع الطويلة وباسطات الابهام والسبابة والمعصم والمفاصل بين الرسغية وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. Interosseus (antebrachii) dorsalis (= n. Interosseus antebrachii posterior)**

العَصَبُ الخَلْفِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ.


- **n. Interosseus (antebrachii) volaris (= n. Interosseus antebrachii anterior)**

العَصَبُ الأَمَامِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ.

- **n. Interosseus cruris (= Interosseous n. of leg)**

العَصَبُ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاق. عصب يتأصل من العصب الظنبوبي ويتوزع إلى الغشاء بين العظمين وإلى المرتبط الظنبوبي الشظوي وهو عصب حسي عام.

- **n. Ischiadicus (= sciatic n.)** العَصَبُ الْوَرَبِيُّ. أكبر أعصاب الجسم ويتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 4- العجزية 3) ويترك الحوض خلال الثقب الوركية ويتفرع إلى العصبين الظنبوبي والشظوي الأصلي في الثلث السفلي من الفخذ ليتوزعا في الساق وهو عصب حركي وحسي عام.



nerve, ischiadicus

الأعصاب والأوعية الدموية وعضلات المنطقة الألوية اليمنى خلف الفخذ: (1) فرع الشريان الألوي (2) العصب الألوي السفلي (3) العضلة الألوية العظمى (4) الشريان الألوي السفلي (5) للوريد والشريان الفرجيان (6) العصب الجلدي الفخذي الخلفي (7) الفروع العضلية للعصب القطنوبوي (8) العصب الوركي (9) العضلة ذات الرأسين (10) العضلة الوتيرة النصف (11) العضلة غشائية النصف (12) الوريد المابضي (13) الشريان المابضي (14) العصب القطنوبوي (15) للوريد الصافن (16) العصب الجلدي الربلي الإنسي (17) العصب الربلي الإنسي (18) العصب الشظوي الأصلي (20) العضلة ذات الرأسين (21) الشرايين الثاقبة (22) العضلة المقربة الكبيرة (23) الشريان الثاقب (24) العضلة المربعة (25) فروع الشريان المنعطف (26) العضلة المسدة الباطنة (27) العضلة الكتيرية (28) العضلة الألوية المتوسطة.

- n. jugularis (= jugular nerve) العَصَبُ الوداجي. فرع من العقدة الرقبية العلوية يتصل بالعصبين المبهم واللساني البلعومي.

- nervi labiales anteriores (= anterior labial nerve) الأعصاب الشفوية الأمامية. أعصاب تتصل من العصب الحرقفي الأربي وتتوزع إلى جلد منطقة الشفر الكبير ومناطق الفخذ المجاورة له وهي أعصاب حسية عامة.

- nervi labiales posteriores (= posterior labial nerves) الأعصاب الشفوية الخلفية. أعصاب تتصل من العصب الفرجي وتتوزع إلى الشفر الكبير وهي أعصاب حسية عامة.

- n. lacrimalis (= lacrimal nerve) العَصَبُ الدُمعي. عصب يتصل من العصب الدمعي فرع العصب ثلاثي التوائم ويدخل الحجاج من الشق الحجاجي العلوي ويتوزع إلى الغدة الدمعية والملتحمة وصوار العين الوحشي وجلد الجفن العلوي وهو عصب حسية عام.

- n. laryngalis inferior (= inferior laryngeal nerve) العَصَبُ الحنجري السفلي. يتصل من العصب الحنجري الراجع وخصوصاً من قسمه الانتهائي ويتوزع إلى العضلات الداخلية للحنجرة ما عدا العضلة الحلقية الدرقية ثم يتصل بالعصب الحنجري الباطن وهو عصب حسية عام.

- n. laryngalis recurrens (= recurrent laryngeal nerve) العَصَبُ الحنجري الراجع. عصب يتصل من العصب المبهم (وخصوصاً من القسم القحفي من العصب الإضافي) ويتفرع إلى الأعصاب الحنجري السفلي والرغامي والمريء والفرع القلبي السفلي ويتوزع إلى الأعضاء التي تغذيها هذه الأعصاب وهو عصب لا ودي وحركي ووارد حشوي.

- n. laryngalis superior (= superior laryngeal nerve) العَصَبُ الحنجري العلوي. يتصل من العقدة السفلية للعصب المبهم ويتفرع إلى الفروع الظاهرة والباطنة والموصلة ويتوزع إلى مصرة البلعوم والعضلة الحلقية الدرقية والغشاء المخاطي لظهر اللسان وللحنجرة وهو عصب حركي وحسي عام ووارد حشوي ولا ودي.

- n. lingualis (= lingual nerve) العَصَبُ اللساني. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي ويهبط إلى اللسان أولاً على الجهة الإنسية للفك السفلي ومن ثم تحت الغشاء المخاطي للخم ويتفرع إلى العصب تحت اللساني والفرع اللساني وفرع إلى برزخ الحلق وفروع موصلة بالعصب تحت اللساني وبالحبل الطلي وهو عصب حسية عام.

- nervi lumbales (= lumbar nerves) الأعصاب القطنية. الأزواج الخمسة من الأعصاب التي تنبع من القسيمات القطنية للنخاع الشوكي ويترك كل زوج منها في نقاط دون مستوى الفقرات المناسبة لها وتشارك الفروع البطنية من هذه الأعصاب في تكوين الضفيرة القطنية المعجزة.

- nervi lumbares (= nervi lumbales) الأعصاب القطنية.

- n. lumboinguinalis (= ramus femoralis nervi genitofemoralis) العَصَبُ القطني الأربي؛ الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي.

- n. mandibularis (= mandibular nerve) العَصَبُ الفكي السفلي. أحد الفروع الانتهائية الثلاثة للعصب ثلاثي التوائم والذي يمر من الثقب البيضوي إلى الحفرة تحت الصدغية ويتصل من عقدة ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الفرع السحائي والأعصاب الماضغ والصدغي العميق والجناحين الوحشي والإنسي والأذني الصدغي واللساني والسنخي السفلي ويتوزع إلى عضلات المضغ وجلد الوجه والغشاء المخاطي للخم وللأسنان وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. massetericus (= masseteric nerve) العَصَبُ الماضغي. عصب ينبع من العصب الفكي السفلي فرع العصب ثلاثي التوائم ويتوزع إلى العضلة الماضغة والمفصل الصدغي الفكي السفلي وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. masticatoricus (= radix motoria nervi trigemini) عصب الماضغة؛ الجذر الحركي للعصب الثلاثي التوائم.

- n. maxillaris (= maxillary nerve) العَصَبُ الفكي العلوي. أحد الفروع الانتهائية الثلاثة للعصب ثلاثي التوائم يمر خلال الثقب المدورة ويدخل الحفرة الجناحية الحنكية ويتصل من عقدة ثلاثي التوائم

ويتفرع إلى الفرع السحائي والعصب الوجني والفرع السنخي الخلفي العلوي والعصبين تحت الحجابي والجناحي الحنكي وإلى فروع العقدة الجناحية الحنكية ويتوزع إلى جلد الوجه والفروة والغشاء المخاطي لجيب الفك العلوي وتجويف الأنف والاسنان وهو عصب حسي عام.

- n. meatus acustici externi (= nerve of external acoustic meatus) عصب

الصماخ السمعي الظاهر. عصب يتصل من العصب الأذني الصدغي ويتوزع إلى الجلد المبطن للصماخ السمعي الظاهر وغشاء الطبل، وهو عصب حسي عام.

- n. medianus (= median nerve) العَصَبُ

النَّاصِبُ؛ العَصَبُ الْمُتَوَسِّطُ. عصب يتصل من الحبلين الوحشي والإنسي للضفيرة العضدية (الرقبي 6- الصدري 1) ويتفرع إلى العصب الأمامي بين عظمي الساعد وإلى الأعصاب الاصبعية الراحية الأصلية والفروع العضلية والراحية وفرع موصل مع العصب الزندي ويتوزع إلى جلد الجهة الوحشية الأمامية لليد ومعظم العضلات المثنية في الجزء الأمامي من الساعد ومعظم العضلات القصيرة للإبهام ولمفصل المرفق وللعديد من مفاصل اليد وهو عصب حسي عام.

- n. meningeus medius (= ramus meningeus medius nervi maxillaris)

فَرْعُ السِّحَائِيِّ الْمُتَوَسِّطِ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلَوِيِّ.

- n. mentalis (= mental nerve) العَصَبُ

الذَّقْنِي. عصب يتصل من العصب السنخي السفلي ويتفرع إلى الفرعين الذقني والشفوي السفلي ويتوزع إلى جلد الذقن والشفة السفلى وهو عصب حسي عام.

- n. mixtus (= mixed nerve) عَصَبٌ مُخْتَلَطٌ.

عصب مكون من أعصاب حسية وأردة وحركية صادرة.

- n. motorius (= motor nerve) عَصَبٌ حَرَكِيٌّ.

عصب محيطي صادر ينه تقلص العضلات.

- n. musculi quadrati femoris (= nerve of quadrate muscle of thigh) عَصَبُ

الْعُضْلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ الرَّؤُوسِ الْفَخْذِيَّةِ. عصب يتصل من الفروع البطنية لفروع العصبين التخاعيين القطنيين الرابع والخامس ويتوزع إلى العضلتين التوأمية

السفلية والمربعة الفخذية الأمامية ومفصل الورك وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. musculi tensoris tympani (= nerve of tensor tympani muscle) عَصَبُ

الْمُوتَرَةِ لِلطَّبْلِ. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي عن طريق عصب العضلة الجناحية الإنسية والعقدة الأذنية ويتوزع إلى العضلة الموترة للطبل وهو عصب حركي.

- n. musculi tensoris veli palatini (= nerve of tensor veli palatini muscle) عَصَبُ

الْعُضْلَةِ الْمُوتَرَةِ الْحَقَافِ. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي عن طريق عصب العضلة الجناحية الإنسية والعقدة الأذنية ويغذي العضلة الموترة للحقاف (شراع الحنك) وهو عصب حركي.

- n. musculocutaneous (= musculo-cutaneous nerve) العَصَبُ

الْعُضْلِيُّ الْجُلْدِيّ. عصب يتصل من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية (الرقبية 5-7) ويتفرع إلى العصب الجلدي الوحشي للساعد والفروع العضلية ويتوزع إلى العضلات الغرابوية العضدية وذات الراسين والعضدية ومفصل المرفق وجلد الجهة الكعبرية للساعد وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. mylohyoideus (= mylohyoid nerve) العَصَبُ

الْفَكِّيُّ اللَّامِيّ. عصب يتصل من العصب السنخي السفلي ويغذي العضلة الفكية اللامية والبطن الأمامية لذات البطنين وهو عصب حركي.

- n. nasociliaris (= nasociliary nerve) العَصَبُ


الْأَنْفِيُّ الْهَدْبِيّ. عصب يتصل من الفرع العيني للعصب ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الأعصاب الهدبي الطويل والغرباليين الخلفي والأمامي وتحت البكري وفرع موصل للعقدة الهدبية وهو عصب حسي عام.

- n. nasopalatinus (= nasopalatine

nerve) العَصَبُ الْأَنْفِيُّ الْحَنَكِيّ. عصب يتصل من العقدة الجناحية الحنكية ويتوزع إلى مخاطية وغدد الحاجز الأنفي والقسم الأمامي من الحنك الصلب وهو عصب لا ودي وحسي عام.


- n. obturatorius (= obturator nerve) العَصَبُ

السِّدَّادِيّ. عصب يتصل من الضفيرة القطنية (القطنيين 3-4) ويتفرع إلى الفروع الأمامية والخلفية



nerve, median

الأعصاب والشرايين العميقة الأمامية للمساعد الأيسر الذي قطعت منه العضلات المثنية والكابة: (1) الشريان الجانبي الزندي العلوي (2) العصب الزندي (3) الشريان الجانبي الزندي السفلي (4) اللقيمة الإنسية (5) العضلة العضدية (6) الشريان الزندي الراجع (7) العصب المتوسط (8) العضلات المثنية للمساعد (9) الشريان الناصف (10) الشريان بين العظام الأمامي (11) الشريان الزندي (12) العصب الزندي (13) العضلة المثنية الزندية للرسغ (14) لوتار العضلة مثنية الأصابع العميقة (15) الفرع الظهري للعصب الزندي (16) أوتار العضلة مثنية الأصابع السطحية (17) وتر العضلة المثنية الزندية للرسغ (18) الفرع الراجي السطحي للشريان الكعبري (19) وتر العضلة الراحية الطويلة (20) وتر العضلة المثنية الكعبرية للرسغ (21) للعضلة مثنية الإبهام الطويلة (22) العضلة الكابة المعرمة (23) وتر العضلة العضدية الكعبرية (24) العصب الناصف (25) الشريان الكعبري (26) الفرع السطحي للعصب الكعبري (27) وتر العضلة العضدية الكعبرية (28) للعصب بين العظام الأمامي (29) الشريان بين العظام الخلفي (30) العضلة الكابة المدورة (31) الشريان بين العظام الأصلي (32) وتر العضلة ذات الرأسين العضدية (33) الشريان الكعبري الراجع (34) الفرع العميق للعصب الكعبري (35) الفرع الأمامي للشريان الجانبي الكعبري (36) العصب الكعبري (37) العصب الناصف (38) الشريان العضدي.



nerve, median

الطبقة المتوسطة من راحة اليد يبين أعصابها وشرائنها: (1) الشريان الزندي (2) العضلة مثنية الرسغ الزندية (3) الفرع الراجي للعصب الزندي (4) العظام الحمصي (5) الفرع العميق للعصب الزندي (6) الفرع الراجي العميق (7) الفرع السطحي للعصب الزندي (8) العصب الإصبعي الراجي الخاص (9) الفرع الموصل بين العصبين الزندي والناصف (10) العصب الراجي الإصبعي الأصلي (11) الشرايين الإصبعية الراجية (12) العصيان الإصبعيان الراجيان الخاصان (13) الشرايين الإصبعية الراجية (14) العصب الإصبعي الراجي (من العصب الناصف) (15) العضلة مقربة الإبهام (16) القوس الراجية للسطحية (17) رأس العضلة مثنية الإبهام (18) العصب الناصف (19) العضلة مبعدة الإبهام القصيرة (20) قيد المثنيات (21) الفرع الراجي للعصب الناصف (22) الفرع الراجي السطحي للشريان الكعبري (23) وتر مثنية الرسغ الكعبري (24) الشريان الكعبري (25) العصب الناصف.

والعضلية ويتوزع إلى العضلات المقربة والعضلة الناحلة وجلد القسم الإنسي من الفخذ ومفصلي الورك والركبة وهو عصب حسي وحركي عام.

- n. obturatorius accessorius

العَصَبُ السِّدَائِي الإِضَافِي (= accessory obturator nerve)
السِّدَائِي الإِضَافِي. عصب يتأصل من الفروع الامامية للفروع البطنية للأعصاب الشوكية الظهرية (3-4) ويتوزع إلى العضلة العانية ومفصل الورك والعصب السدائي وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. obturatorius internus (= internal

obturator nerve) **العَصَبُ السِّدَائِي الْبَاطِنُ.**
عصب يتأصل من الفروع الامامية للفروع البطنية للأعصاب الشوكية (الظهري 5 والعجزيين 1-2) ويتوزع إلى العضلة التوامية العليا والسدادية الباطنة وهو عصب حسي عام وحركي.

- n. occipitalis major (= greater

occipital nerve) **العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِيرُ.**
عصب يتأصل من الفرع الإنسي للفرع الظهري للرقيبي الثاني ويتوزع إلى العضلة الشوكية النصفية الراسية وجلد فروة الرأس حتى قمة الرأس أماماً وهو عصب حركي وحسي عام.

- n. occipitalis minor (= lesser occipital

nerve) **العَصَبُ الْقَذَالِي الصَّغِيرُ.** عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية السطحية (الرقيبين 2-3) ويصعد خلف الأذن ويغذي بعض جلد جانب الرأس وعلى الجهة القحفية للأذن وهو عصب حسي عام.

- n. occipitalis tertius (= third occipital

nerve) **العَصَبُ الْقَذَالِي الثَّالِثُ.** عصب يتأصل من الفرع الإنسي للفرع الظاهري للعنقي 3 ويتوزع إلى جلد القسم العلوي من ظهر الرقبة والرأس وهو عصب حسي عام.

- n. octavus (= eighth nerve) (= n. vestibulocochlearis) **العَصَبُ الثَّامِنُ: العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيُّ الْفَوْقَعِي.**

- n. oculomotorius (= oculomotor

nerve) **العَصَبُ الْمُحَرِّكُ لِلْعَيْنِ.** العصب القحفي الثالث يتأصل من جذع الدماغ وينبع من الجهة الإنسية للسويقة المخية ويجري إلى الأمام في الجيب الكهفي ويتفرع إلى الفرعين العلوي والسفلي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي العلوي وتغذي فروعه رافعة

الجفن العلوية وكل عضلات العين الخارجية ما عدا المائلة العلوية والمستقيمة الوحشية كما ينقل أعصاباً لا ودية إلى العضلة الهدبية ومصرة الحدقة وهو عصب حركي ولا ودي.

- nervi olfactorii (= olfactory nerves)

الأَعْصَابُ الشَّمِيَّةُ. العصب القحفي الأول وهو عصب الشم ويحوي حوالي عشرين حزمة تنبع من الظهارة الشمية وتسير خلال اللوح المصفوي للعظم الغربالي حتى البصلة الشمية.

- n. ophthalmicus (= ophthalmic n.)

القَصَبُ الْعَيْنِي. أحد الفروع الانتهازية للعصب ثلاثي التوائم ينبع من عقدة ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الفروع الخيمية والأعصاب الجيبية والدعمية والأنفي الهدبي وينتشر إلى المقلة والملتحمة والغدة الدمعية والكيس الدمعي ومخاطية الأنف والجيب الجبهوي وخارج الأنف والجبهة وفروة الرأس وهو عصب حسي عام.

- n. opticus (= optic n.)

العَصَبُ الْبَصَرِي. وهو العصب القحفي الثاني ويتكون من المحاور والفروع المركزية لخلايا الطبقة العقدية للشبكية التي تترك الحجاج خلال القناة البصرية وتتصل بالتصالبة البصرية وتستمر حتى السبيل البصري.

- n. palatinus anterior (= n. palatinus

major) **العصب الحنكي الأمامي: العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْكَبِيرُ.**

- n. palatinus major (= greater palatine

nerve) **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْكَبِيرُ.** عصب يتأصل من العقدة الجناحية الحنكية ويتفرع إلى الفروع الأنفية الخلفية السفلية (الوحشية) ويمر من خلال الثقب الحنكية الكبيرة ليفذي الحنك وهو عصب لاودي وودي وحسي عام.

- n. palatinus medius (= middle palatine


nerve) **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْمُتَوَسِّطُ.**

- nervi palatini minores (= lesser

palatine nerves) **الأَعْصَابُ الْحَنَكِيَّةُ الصَّغِيرَةُ.** أعصاب تتأصل من العقدة الجناحية الحنكية وترى خلال الثقب الحنكية الصغيرة وتغذي الحنك الرخو واللوزة وهي أعصاب لاودية ودية وحسية عامة.


- n. palatini posterior (= posterior

palatine nerve) **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْخَلْفِي.**




nerve, olfactory

مقطع جبهى لتجاويف الأنف يبين انتشار العصب الشمي فيها: (1) للبصلة الشمية (2) الاعصاب الشمية (3) اللقرين العلوي (4) مخاطية الأنف.



nerve, olfactory

الفشاء المخاطي الشمي يبين المستقبلات والنهايات العصبية الشمية: (1) خلية سائدة (2) خلية شمعية (3) خلية قاعدية (4) خيوط عصبية (5) غدة شمعية.



nerve, optic

مقطع في العين يظهر الشرايين الطبيعية لشبكية العين والقرص البصري في الخلف ومقطع العنسة والرباط المعلق والفرجية والبؤبؤ والقرنية في الأمام والعصب البصري في الجانب العلوي.

- **n. pectoralis lateralis (= lateral pectoral nerve)** **العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الْوَحْشِيُّ.** عصب يتأصل من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية أو من القسم الأمامي من الجذعين العلوي والوسطي (الرقبية 5-7) ويتوزع عادة إلى عدة أعصاب تغذي العضلة الصدرية الصغيرة والمفصلين الأحرزمي الترقوي والمنكبي وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. pectoralis medialis (= medial pectoral nerve)** **العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الْإِنْسِي.** عصب يتأصل من الحبل الإنسي للجذع السفلي للضفيرة العضدية (الرقبي 8 والصدرى 1) ويتوزع إلى عدة أعصاب تغذي العضلتين الصدريتين الكبيرة والصغيرة وهو عصب حركي.
- **nervi perineales (= perineal nerves)** **الأعصابُ الْعِجَانِيَّةُ.** أعصاب تتأصل من العصب الفرجي في القناة الفرجية وتتفرع إلى الأعصاب العضلية والصفنية أو الشفوية الخلفية وتغذي الفروع العضلية العضلات البصلية الإسفنجية والوركية الكهفية والعجانية المستعرضة السطحية وبصلة القضيب ومصرة الشرج الظاهرة ورافعة الشرج ويغذي العصب الصفني (الشفوي) الصفن أو الشفر الكبير وهي أعصاب حركية وحسية عامة.
- **nervi perineales (= n. perineales)** **الأعصابُ الْعِجَانِيَّةُ.**
- **n. peroneus communis (= n. fibularis communis)** **العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْأَصْلِيُّ**
- **n. peroneus profundus (= n. fibularis profundus)** **العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ**
- **n. peroneus profundus accessorius (= the accessory deep peroneal nerve)** **العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ الْإِضَافِي.** فرع العصب الشظوي السطحي إلى العضلة الشظوية القصيرة وعادة ما يستمر حتى الكعب وينتهي بفروع صغيرة للعضلة القصيرة الباسطة لأصابع القدم والمفاصل المجاورة لها.
- **n. peroneus superficialis (n. fibularis superficialis)** **العَصَبُ الشَّظْوِيُّ السَّطْحِي.**
- **n. petrosus major (= greater petrosal nerve)** **العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْكَبِيرُ.** عصب يتأصل من العصب الوسطاني عن طريق العقدة الركبية ويشير

منها إلى الأمام ليتصل بالعصب الصخري العميق في القناة الجناحية ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية والبلعوم الأنفي خلال العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب لاودي وحسي عام.


- **n. petrosus minor (= lesser petrosal nerve)** **العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِيرُ.** عصب ينبع من الضفيرة الطبلية ويتوزع إلى الغدة النكفية عن طريق العقدة الأذنية والعصب الأذني الصدغي وهو عصب لا ودي.
- **n. petrosus profundus (= deep petrosal nerve)** **العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْعَمِيقُ.** عصب يتأصل من الضفيرة السباتية الباطنة ويتصل بالعصب الصخري الكبير ليكونا عصب القناة الجناحية ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية عن طريق العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب ودي.
- **n. petrosus superficialis major (= n. petrosus major)** **العصب الصخري السطحي الكبير؛ العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْكَبِيرُ.**
- **n. petrosus superficialis minor (= n. petrosus minor)** **العصب الصخري السطحي الصغير؛ العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِيرُ.**
- **nervi phrenici accessorii (= accessory phrenic nerves)** **الأعصابُ الْحَبَابِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.** مساهمة إضافية غير دائمة من العصب الرقبي الخامس إلى العصب الحجابي وتسير عند وجودها في مسلك مستقل إلى جذر الرقبة أو إلى الصدر قبل اتصالها بالعصب الحجابي.
- **n. phrenicus (= phrenic n.)** **العَصَبُ الْحَبَابِي.** عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية (الرقبيين 4-5) ويتفرع إلى الفرعين التاموري والحجابي البطني ويتوزع إلى الجنبية والتامور والحجاب الحاجز والصفاق والضفيرة الودية وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. piriformis (= piriform nerve)** **العَصَبُ الْكُفْرِيُّ الشَّكْل.** عصب يتأصل من الفروع الظهرية للفروع البطنية للأعصاب التضاعية العجزية 1-2 ويتوزع إلى العضلة الكمثرية الأمامية وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. plantaris lateralis (= lateral plantar nerve)** **العَصَبُ الْأَخْمَصِيُّ الْوَحْشِيُّ.** عصب مكون

من الفروع الانتهازية الصغيرة للعصب الظنبوبي ويتفرع إلى الفروع السطحي والعضلي والعميق ويقع بين الطبقتين الأولى والثانية للأخمص ويغذي العضلات المربعة الأخمصية ومعدة إصبع القدم الصغير ومثنية إصبع القدم الصغير القصيرة ومقربة إبهام القدم وبين العظمية والخراطينيات الثانية والثالثة والرابعة كما يعطي فروعاً جلدية ومفصلية للجهة الوحشية للأخمص وإصبعي القدم الرابع والخامس وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. plantaris medialis (= medial plantar nerve)** العَصَبُ الْأَخْمَصِيُّ الْإِنْسِي. عصب مكون من الفروع الانتهازية الكبيرة للعصب الظنبوبي ويتفرع إلى الأعصاب الأخمصية لأصابع القدم الأصلية والفروع العضلية ويتوزع إلى العضلات مقربة إبهام القدم ومثنية أصابع القدم القصيرة ومثنية إبهام القدم القصيرة والخراطينية الأولى وفروع جلدية ومفصلية للجهة الإنسية من الأخمص وإلى أصابع القدم الأول حتى الرابع وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. presacralis (= plexus hypogastricus superior)** العَصَبُ أَمَامُ الْعَجْزِ: الضفيرة الحثلية السفلية.
- **n. pterygoideus externus (= n. pterygoideus lateralis)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْوُخْشِيُّ.
- **n. pterygoideus internus (n. pterygoideus medialis)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْإِنْسِيُّ.
- **n. pterygoideus lateralis (= lateral pterygoid nerve)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْوُخْشِيُّ. عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويغذي العضلة الجناحية الوحشية وهو حركي.
- **n. pterygoideus medialis (= medial pterygoid nerves)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْإِنْسِيُّ. عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويغذي العضلات الجناحية الإنسية وموترة الطبل وموترة شراع الحنك (الحفاف) وهو عصب حركي.
- **nervi pterygopalatini (= pterygopalatine nerves)** العَصَبَاتُ الْجَنَاحِيَانِ الْحَنَكِيَانِ. العصبان اللذان يوصلان العصب الفكي العلوي بالعقدة الجناحية الحنكية وهما الجذران الحسيان لهذه العقدة.



- **n. pudendus (= pudendal nerve)** العَصَبُ الْفَرْجِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (العجزية 2-4) ويدخل القناة الفرجية ويعطي العصب المستقيمي السفلي ثم ينقسم إلى العصب العجاني وعصب ظهر القضيب (أو البظر) ويتوزع إلى عضلات وجلد العجان وأنسجة الناعظة وهو عصب حركي وحسي عام ولا ودي.

- **n. quadratus femoris (= n. musculi quadrati femoris)** عَصَبُ الْفُخْذَةِ الرَّبَاعِيَّةُ الرَّوُّوسُ الْفُخْذِيَّةُ.
- **n. radialis (= radial nerve)** العَصَبُ الْكُفْرِيُّ. عصب يتأصل من الحبل الظهري للضفيرة العجزية (الرقبية 6-8) وأحياناً (الرقبي 5- والصدري 1) ويتفرع إلى الأعصاب الجذري الخلفي والجلدي الوحشي السفلي للعضد والجذري الخلفي للساعد وإلى الفروع العضلية والعميقة والسطحية وينزل إلى ظهر العضد والساعد ويتوزع إلى جلد ظهر العضد والساعد واليد وإلى العضلات الباسطة على ظهر العضد والساعد ومفصل المرفق والعديد من مفاصل اليد وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. et ramus articularis** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْمُفَصِّلِي. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي أحد المفاصل والأنسجة المرتبطة به.
- **n. et ramus autonomici** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْمُسْتَقْلِي. أي من الأعصاب الودية أو اللاودية وفروع الجهاز العصبي المستقلي.
- **n. et ramus cutanei** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْجِلْدِي. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي منطقة جلدية معينة.
- **n. et ramus musculares** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْغَضَلِي. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي عضلة والأنسجة المرتبطة بها.
- **n. et ramus viscerales (= n. et ramus autonomici)** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْحَشَوِيّ: العَصَبُ الْمُسْتَقْلِي.
- **nervi rectales inferiores (= inferior rectal nerves)** الْأَعْصَابُ الْمُسْتَقِيمَةُ السُّفْلِيَّةُ. أعصاب تتأصل من العصب الفرجي أو بصورة مستقلة



nerva, pudendal

عجان الأنثى مبيئاً أعصابه وأوعيته وعضلاته: (1) الفروع الشفوية الخلفية للشريان الفرجي (2) العضلة البصلية الإسفنجية (3) فتحة الإحليل (4) الشفر الصغير (5) بصلة الدهليز (6) وريد بصلة الدهليز (7) عصب ظهر البظر (8) الشريان الفرجي الباطن (9) الفروع العجانية للعصب الفخذي الجذلي (10) الأعصاب الألوية السفلية (11) العصب الفرجي (12) الشريان الفرجي الباطن (13) الأعصاب العجانية (14) العضلة رافعة الشرج (15) العضلة مصصرة الشرج الخارجية (16) الرباط الشرجي العصعصي (17) الشرايين والأعصاب الشرجية العصعصية (18) الأعصاب الألوية السفلية (19) الأعصاب العجانية (20) الشريان المستقيمي السفلي (21) الشريان والوريد الفرجيان الباطنان (22) العضلة الألوية العظمى (23) العضلة العجانية السطحية المستعرضة (24) الحجاب البولي التناسلي (25) الأعصاب الشفوية الخلفية (26) العضلة الوريدية الكهفية.




ب

nerve, radial

ا - أعصاب وشرابين إصبع السبابة: (1) الشريان الإصبعي الخلفي (2) العصب الإصبعي الخلفي (3) العصب الراجي الخاص (4) الشريان الإصبعي الراجي الخلفي (5) الشريان الإصبعي الراجي الأصلي.

ب - الأعصاب والشرابين السطحية في الوجه الكعبري لليد اليمنى: (1) غمد مثنية الرسغ الكعبرية (2) العصب الجلدي الساعدي الخلفي (3) الشبكة الرسغية الخلفية (4) الفرع الرسغي الخلفي للشریان الكعبري (5) وتر باسطة الرسغ الكعبرية (6) الشريان الكعبري (7) أوتار باسطة الأصابع (8) العظم السنخي الثاني (9) الشرايين السنخية الخلفية (10) العصب الإصبعي الراجي والشریان الكعبري للسبابة (11) العصب الإصبعي الخلفي (12) العضلة الخراطينية الأولى (13) العضلة بين العظام الظهرية الأولى (14) مقربة الإبهام (15) الأعصاب والشرابين الإصبعية الخلفية (16) وتر باسطة الإبهام الطويلة (17) مبعدة الإبهام القصيرة (18) العضلة مقابلة الإبهام (19) وتر باسطة الإبهام القصيرة (20) وتر باسطة الرسغ الكعبرية (21) وتر مبعدة الإبهام (22) الشريان الكعبري (23) الفرع الراجي السطحي للشریان الكعبري (24) قيد الباسطات (25) الشريان الكعبري (26) للفروع السطحية للعصب الكعبري.



nerve, radial

اعصاب وعضلات الوجه الأمامي للذراع الأيسر بعد سحب العضلة ذات الرأسين إلى الجيب الإنسي ونزع الأوردة من الذراع: (1) الشريان الإبطي (2) العصب الإبطي (3) العضلة المدورة الكبيرة (4) العصب الكعبري (5) العصب الناصف (6) الشريان العضدي العميق (7) الرأس الطويل للعضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (8) العصب الزندي (9) الشريان الزندي الجانبي العلوي (10) العضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (11) الشريان الزندي الجانبي السفلي (12) اللقمة الإنسية (13) العضلات المثنية للساعد (14) العضلة العضدية الكعبرية (15) العصب الناصف (16) الشريان العضدي (17) العصب الساعدي الجلدي الوحشي (18) العضلة العضدية (19) العضلة ذات الرأسين العضدية (20) العصب للجلدي (21) العضلة الفرايبية العضدية (22) العضلة الصدرية الكبيرة (23) العضلة الدالية (24) العضلة الفرايبية العضدية.

من الضفيرة العجزية وتتوزع إلى مصرة الشرج الظاهرة والجلد حول الشرج وبطانة القناة الشرجية حتى الخط المشطوي وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

- n. recurrens (= n. laryngeus recurrens) العَصَبُ الحَنَجرِيُّ الرَّاجِع

- n. sacularis (= saccular nerve) العَصَبُ الكَيْسِي. فرع الجزء الدهليزي من العصب الثامن الذي يغذي بقعة الكيس.

- n. sacrales (= sacral nerves) الأَعصابُ العَجزِيَّة. الأزواج الخمسة من الأعصاب التي تنبع من القسيمات العجزية للنخاع الشوكي وتشارك الفروع البطنية للأعصاب الأربعة الأولى في تكوين الضفيرة العجزية.

- n. saphenus (= saphenous nerve) العَصَبُ الصَّافِن. عصب يتصل من نهاية العصب الفخذي وينزل أولاً مع الاوعية الفخذية ثم على الجهة الإنسية للساق والقدم ويتفرع إلى الفرعين تحت الرضفي والجلدي الساقين الإنسي ويتوزع إلى مفصل الركبة وإلى الضفيرتين الرضفية وتحت الخياطية والجلد على الجهة الإنسية للساق والقدم وهو عصب حسي عام.

- n. scrotales anteriores (= anterior scrotal nerves) الأَعصابُ الصَّفِيَّةُ الأَمَامِيَّة. أعصاب تتصل من العصب الحرقفي الأربي وتتوزع إلى جلد المنطقة الأمامية للصفن وهي أعصاب حسية عامة.

- n. scrotales posteriores (= posterior scrotal nerves) الأَعصابُ الصَّفِيَّةُ الخَلْفِيَّة. أعصاب تتصل من الأعصاب العجانية وتتوزع إلى جلد الصفن وهي أعصاب حسية عامة.

- n. sensorius (= sensory nerve) عَصَبٌ حَسِّي. عصب محيطي وارد ينقل النبضات العصبية من أعضاء الحس إلى النخاع الشوكي والدماغ.

- n. spermaticus externus (= ramus genitalis nervi genitofemorales) العَصَبُ العَنَوِيُّ الظَّاهِر. الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي.

- nervi sphenopalatini (= nervi pterygopalatini) الأَعصابُ الوَتْدِيَّةُ الحَنَكِيَّة

- nervi spinalis (= spinal nerves) الأَعصابُ الشَّعَاعِيَّة. الواحد والثلاثون زوجاً من الأعصاب التي تنبع من النخاع الشوكي والتي تمر بين الفقرات وتشمل ثمانية أزواج من الأعصاب الرقبية وإثني عشر صدرية وخمسة قطنية وخمسة عجزية وزوجاً عصبياً عصبياً واحداً.

- n. spinosus (= ramus meningeus nervi mandibularis) العَصَبُ الشُّوكِي.

- n. splanchnicus imus (= n. splanchnicus thoracicus imus) العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصدري الأدنى.


- nervi splanchnici lumbales (= lumbar splanchnic nerves) الأَعصابُ الحَشَوِيَُّّة الأَعصابُ تتصل من العقد القطنية أو من جذع الودي وتتصل أعصابها العليا بالضفيرة البطنية والصفائر المجاورة لها وتهبط أعصابها الوسطية إلى الضفيرة بين المساريقية والصفائر المجاورة لها وتهبط أعصابها السفلية إلى الضفيرة الخلفية العلوية وهي أعصاب لا ودية واردة حشوية.

- n. splanchnicus major (= n. splanchnicus thoracicus major) العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصدري الكبير.

- n. splanchnicus minor (= n. splanchnicus thoracicus minor) العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّغِير.


- nervi splanchnici pelvini (= pelvic splanchnic nerves) الأَعصابُ الحَشَوِيَُّّة الحَوَاضِيَّة. أعصاب تتصل من الضفيرة العجزية (العجزيين 3-4) وتترك الضفيرة العجزية لتدخل الضفيرة الخلفية السفلية وتغذي أعضاء الحوض وهي أعصاب قبل عقدية لا ودية وحشوية واردة.

- nervi splanchnici sacrales (= sacral splanchnic nerves) الأَعصابُ الحَشَوِيَُّّة العَجزِيَّة. أعصاب تتصل من القسم العجزى للجذع الودي وتتوزع إلى أعضاء الحوض والأوعية الدموية عن طريق الضفيرة الخلفية السفلية وهي أعصاب قبل عقدية ودية وحشوية واردة.



nerve, spinal

جنور وفروع العصب النخاعي: (1) المادة السنجابية للنخاع (2) العقدة الودية (3) فرع موصل (4) عصب نخاعي (5) عقدة نخاعية (6) قسم اولي خلفي (7) قسم اولي امامي (8) فرع إنسي (9) ضلع (10) فرع وحشي.



nerve, spinal

الأعصاب الشوكية ومناطق خروجها من النخاع والعمود الفقري. الأحمر: الفقرات والأعصاب الرقبية. الأصفر: الفقرات والأعصاب الصدرية. الأزرق: الفقرات والأعصاب القطنية. الأسود: الفقرات والأعصاب العجزية والعصمية.

- **n. splanchnicus thoracicus imus**
(= lowest thoracic splanchnic nerve)
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الأَدْنَى. عصب يتأصل من العقدة الصدرية الأخيرة لجذع الودي أو العصب الحشوي الصغير ويتوزع إلى العقدة الأبهريّة الكلوية والصفيرة المجاورة لها وهو عصب ودي وحشوي وارد.
- **n. splanchnicus thoracicus major**
(= greater thoracic splanchnic nerve)
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الكَبِير. عصب يتأصل من الجذع الودي والعقد الصدرية الثالثة حتى العاشرة وينزل خلال الحجاب الحاجز أو فتحة الأبهريّة لينتهي عند العقد والصفائر البطنية وعند عقدة حشوية توجد بالقرب من الحجاب وهو عصب قبل عقدي وحشوي وارد.
- **n. splanchnicus thoracicus minor** (= lesser thoracic splanchnic nerve)
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الصَّغِير. عصب يتأصل من العقدتين التاسعة والعاشرة الصدريتين للجذع الودي ويعطي الفرع الكلوي ثم يثقب الحجاب ليرافق العقدة الأبهريّة الكلوية والصفيرة البطنية ويتصل مع الصفائر الكلوية والمسايقية العلوية وهو عصب قبل عقدي وحشوي وارد.
- **n. stapedius** (= stapedius nerve) العَصَبُ الرِّكَابِيُّ. عصب يتأصل من العصب الوجهي ويغذي العضلة الركابية وهو عصب حركي.
- **n. subclavius** (= subclavian nerve)
العَصَبُ تَحْتَ التَّرْقُوءَةِ. عصب يتأصل من الجذع العلوي أو من الصفيرة العضدية (الرقبي 5) ويغذي العضلة تحت الترقوة والمفصل القصي الترقوي وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. subcostalis** (= subcostal nerve)
العَصَبُ تَحْتَ الصُّلْع. عصب يتأصل من الفرع البطني للعصب الصدري الثاني عشر ويتوزع إلى جلد البطن السفلي والجهة الوحشية للآلية وجزء من العضلات المستعرضة والمائلة والمستقيمة والهرمية والصفاق المجاور وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. sublingualis** (= sublingual nerve)
عَصَبُ تَحْتَ اللُّسَان. عصب يتأصل من العصب اللساني وينتشر إلى الغدة تحت اللسانية والقشاء المخاطي الذي يغطيها وهو عصب لا ودي وحسي عام.
- **n. suboccipitalis** (= suboccipital nerve)
العَصَبُ تَحْتَ القَذَال. عصب يتأصل من الفرع الظهري للعصب الرقبي الأول ويظهر فوق القوس الخلفي للفهقة ويغذي عضلات المثث تحت القذالي والعضلة الشوكية النصفية الراسية وهو عصب حركي.
- **n. subscapularis** (= subscapular nerve)
العَصَبُ تَحْتَ الكَتِف. يتأصل من الحبل الخلفي للصفيرة العضدية (الرقبي 5) وينقسم إلى عصبين أو أكثر علوي وسفلي ويغذي العضلتين تحت الكتفية والمردرة الكبيرة وهو عصب حركي.
- **nervi supraclaviculares** (= supra-clavicular nerves)
الأعصابُ فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. اسم عام يطلق على جذع مشترك وهو فرع من الصفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) والذي يظهر تحت غطاء الحافة الخلفية للعضلة القصية الترقوية الخشائية وينقسم إلى الأعصاب فوق الترقوية الوحشي والإنسي والمتوسط.
- **nervi supraclaviculares anteriores**
(= nervi supraclaviculares mediales)
الأعصابُ الأماميّة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ.
- **nervi supraclaviculares intermedii**
(= intermediate supraclavicular nerves)
الأعصابُ المتوسّطة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من الصفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) وتنزل إلى المثث الخلفي وتعبّر الترقوة وتغذي الجلد الذي يغطي المنطقتين الصدرية والذالية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi supraclaviculares laterales (posteriores)** (= lateral supraclavicular nerves)
الأعصابُ الوحشيّة (الخلفيّة) فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من الصفيره الرقبية (الرقبيين 3-4) وتنزل إلى المثث الخلفي وتعبّر الترقوة وتغذي جلد القسمين العلوي والخلفي للمنكب وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi supraclaviculares mediales**
(= medial supraclavicular nerves)
الأعصابُ الإنسيّة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من

الضفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) وتهبط الى المثلث الخلفي وتعتبر الترقوة وتغذي جلد المنطقة الإنسية تحت الترقوة وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi supraclaviculares medii (= nervi supraclaviculares intermedii)**
الأعصاب المتوسطة تحت الترقوة.

- **nervi supraclaviculares posteriores (= nervi supraclaviculares laterales)**
الأعصاب الخلفية تحت الترقوة.

- **n. supraorbitalis (= supraorbital nerve)**
العصب فوق الحاجج. هو استمرار للعصب الجبهي من العصب العيني ويتفرع إلى الفرعين الإنسي والوحشي ويترك الحاجج خلال التلمة أو الثقب فوق الحاجج ويغذي جلد الجفن العلوي والجهة وفروة الرأس الامامية حتى قمة الرأس ومخاطية الجيب الجبهي وهو عصب حسي عام.

- **n. suprascapularis (= suprascapular nerve)**
العصب فوق الكتف. عصب يتأصل من الضفيرة العنقية (الرقبيين 5-6) ويهبط خلال التلمتين فوق الكتف والشوكية الحقة ليغذي العضلة الاخرمية الترقوية ومفاصل المنكب والعضلتين فوق وتحت الشوكية وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. supratrochlearis (= supratrochlear nerve)**
العصب فوق الزكرة. عصب يتأصل من العصب الجبهي من العصب العيني ويترك الحاجج عند النهاية الإنسية للحافة فوق الجهة ويغذي الجهة والجفن العلوي وهو عصب حسي عام.

- **n. suralis (= sural nerve)**
العصب الزليلي. عصب يتأصل من العصب الربلي الجلدي الإنسي والفرع الشظوي الموصل من العصب الشظوي الاصلي ويتفرع إلى العصب الظهري الوحشي الجلدي والفروع العقبية الوحشية ويتوزع إلى جلد ظهر الساق (الربلة) والمفاصل على الجهة الوحشية للكاحل والقدم وهو عصب حسي عام.

- **nervi temporales profundi (= deep temporal nerves)**
الأعصاب الصدغية العميقة. هما عادة عصبان أمامي وخلفي يتأصلان من العصب الفكي السفلي ويغذيان العضلة الصدغية وهما عصبان حركيان.

- **n. tensor tympani (= n. musculus tensoris tympani)**
عصب العضلة مؤترزة الطبل

- **n. tensor veli palatini (= n. musculus tensoris veli palatini)**
عصب عضلة شراع الحنك

- **m. tentorii (= ramus tentorii nervi ophthalmici)**
عصب الخيمة: الفرع الخيمي للعصب العيني.


- **nervi terminales (= terminal nerves)**
الأعصاب الإنتهائية. خيوط عصبية تسمى كمجموعة بالأعصاب الانتهائية توجد في الام الحنون بين البصلة الشمية وعرف الديك وتمر خلال الصفيحة المصفوية إلى المخاطية الانفية وتوجد فيها عادة خلايا عقدية على طول مسارها.

- **nervi thoracici (= thoracic nerves)**
الأعصاب الصدريّة. الاثنا عشر زوجاً من الأعصاب النخاعية التي تتبع من القسيمات الصدرية للنخاع الشوكي ويترك كل زوج العمود الفقري تحت مستوى الفقرة المناسبة له وهي تغذي الجدارين الصدري والبطني للجسم.

- **n. thoracicus longus (= long thoracic nerve)**
العصب الصدري الطويل. عصب يتأصل من الضفيرة العنقية من الفروع البطنية (الرقبية 5-7) ويهبط خلف الضفيرة العنقية إلى العضلة المنشارية الامامية وهو عصب حركي.


- **n. thoracodorsalis (= thoracodorsal nerve)**
العصب الصدري الظهرّي. عصب يتأصل من الحبل الخلفي للضفيرة العنقية (الرقبيين 7-8) ويغذي العضلة العريضة الظهرية وهو عصب حركي.

- **n. tibialis (= tibial nerve)**
العصب التلنوبوي. عصب يتأصل من العصب الوركي (الاسكي) في القسم السفلي من الفخذ ويتفرع إلى العصب بين عظمي الساق والعصب الجلدي الإنسي للربلة والأعصاب الربلي والاحمصييين الوحشي والإنسي والفرعين العضلي والعقبى ويتوزع وهو لا يزال مع العصب الوركي ليغذي العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف والرأس الطويل لذات الراسين الفخذية والعضلة المقربة الكبيرة كما أنه يغذي مفصل الركبة ثم ينزل إلى الحفرة المابضية ويستمر إلى الساق



nerve, tibial


اعصاب واوعية وعضلات الساق: (1) الشريان المابضي (2) الشريان الركيبي السفلي (3) العضلة المابضية (4) الشريان اللفنبوبي الامامي (5) وهو يعرف سريريا بالجدع اللفنبوبي الشفوي (6) العضلة النعلية (7) الشريان اللفنبوبي الخلفي (8) العضلة اللفنبوبية الخلفية (9) العضلة مثنية الاصابع الطويلة (10) الشريان اللفنبوبي الخلفي (11) وتر العضلة اللفنبوبية الخلفية (12) الفروع الكعبية الإنسية (13) وتر العضلة مثنية الإبهام الطويلة (14) الفروع العقبية للشريان اللفنبوبي الخلفي (15) الشبكة العقبية (16) وتر العقب (العرقوب) (17) الشرايين الكعبية الوحشية (18) العضلة الشفوية القصيرة (19) العضلة مثنية الإبهام الطويلة (20) العضلة الشفوية الطويلة (21) العصب اللفنبوبي (22) الشريان الشفوي (23) العضلة النعلية (24) العضلة الأخمصية (25) العصب اللفنبوبي.



n. V, trigeminal

العصب الثلاثي التوائم وفروعه مرسوم على أقسام من الجمجمة والفك مع علاقاته بالأعصاب المجاورة: (1) العصب الثلاثي التوائم (2) العصب الصخري الكبير (3) العقدة الركبية (4) العصب الوجهي (5) العصب الطويل (6) العقدة السفلية للعصب اللساني البلعومي (7) العصب اللساني البلعومي (8) العصب الفكي السفلي (9) العصب الوجهي (10) النائي الإبري (11) العصب الأنفي الصدغي (12) العصب الأنفي الصدغي (13) العقدة الأنفية (14) العصب السنخي السفلي (15) العصب الحنكي الكبير (16) العصب اللساني (17) العقدة تحت الفك السفلي (18) العصب الفكي السفلي (19) العقدة الجناحيسية الحنكية (20) العصب الذقني (21) العصب تحت اللساني (22) العصب الحنكي الكبير (23) الفروع السنخية العلوية المتوسطة (24) الفروع السنخية العلوية الأمامية (25) الفروع السنخية العلوية الخلفية (26) الفروع الأنفية السفلية والعلوية (27) العصب تحت الحجاج (28) العصب الوجني (29) الفروع الأنفية للعصب القريبالي (30) العصب القريبالي (31) العصب فوق البكرة (32) العصب فوق الحجاج (33) الفرع الإنسي للعصب فوق الحجاج (34) العصب الوحشي فوق الحجاج (35) العصب الدمعي (36) العصب الأنفي الهبي (37) عصب نفق الجناحية (38) الفروع العضلية (39) العصب العين (40) العصب الصخري العميق (41) العصب الفكي العلوي (42) العصب الصخري الصغير.

- ليغذي عضلات وجلد الريلة وأخمص القدم وأصابعه وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. transversus colli (= transverse nerve of neck)** العَصَبُ الْمُسْتَقْرِضُ لِلرَّقَبَةِ. عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية (الرقبيين 2-3) ويتفرع إلى فرعين علوي وسفلي ويغذي جلد جانب الرقبة ووجهها وهو عصب حسي عام.
- **n. trigeminus (= trigeminal nerve)** العَصَبُ ثَلَاثِي التَّوَاتِمِ. هو العصب القحفي الخامس الذي ينبع من السطح الجانبي للجسر كجذرين حركي وحسي مع بعض الألياف الوسطية بينهما وينتشر الجذر الحسي إلى عقدة ثلاثي التوائم التي تحوي خلايا معظم الألياف العصبية الحسية وتتفرع منها الأقسام الثلاثة لهذا العصب وهي الفكي العلوي والفكي السفلي والعيني. وهو عصب حسي يغذي الوجه والأسنان والفم والتجويف الأنفي كما أنه يغذي عضلات المضغ بأعصاب حركية.
- **n. trochlearis (= trochlear nerve)** العَصَبُ الْبَكْرِيّ. هو العصب القحفي الرابع، حيث تتصلب ألياف العصبين البكريين عبر المستوى الناصف ويظهر العصب من خلف جذع الدماغ تحت مستوى السويقة السفلية ويجري إلى الأمام في جدار الجيب الوحشي ويعبر الشق الحجاجي العلوي ويغذي العضلة المائلة العلوية للمقلة بالألياف حركية.
- **n. tympanicus (= tympanic nerve)** العَصَبُ الطَّبْلِيّ. عصب يتأصل من العقدة السفلية للعصب اللساني البلعومي ويشارك في تكوين الضفيرة الطبلية ويغذي الغشاء المخاطي للتجويف الطبلي وللخلايا الخشائية الهوائية وللأنبوب السمعي كما يغذي الغدة النكفية خلال العصب الصخري الصغير والعقدة الأذنية وهو عصب حسي عام ولا ودي.
- **n. ulnaris (= ulnar nerve)** العَصَبُ الزُّنْدِيّ. عصب يتأصل من الحبلين الوحشي والإنسي للضفيرة العضدية (الرقبي 1- الصدرى 1) ويتفرع إلى الفروع العضلية والظهرية والراحية والسطحية والعميقة ويتوزع إلى جلد ظهر وجه المنطقة الإنسية لليد وإلى بعض العضلات المثنية في المنطقة الأمامية من الساعد وإلى العديد من العضلات القصيرة لليد ومفصل المرفق والعديد من مفاصل اليد وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. utricularis (= utricular nerve)** العَصَبُ الْقُرْبِيّ. هو فرع من العصب الدهليزي الذي يغذي بقعة القريبة.
- **n. utriculoampullaris** العَصَبُ الْقُرْبِيّ (= utriculoampullar nerve) الأَمْبُولِيّ. عصب ينبع كقسم طرفي من العصب الدهليزي ليغذي القريبة وأمبولات الأقية الهلالية.
- **nervi vaginales (= vaginal nerves)** الْأَعْصَابُ الْمَهْلِيَّةُ. أعصاب تتأصل من الضفيرة الرحمية المهبلية وتغذي المهبل بأعصاب ودية ولا ودية.
- **n. vagus (= vagus nerve)** العَصَبُ الْمُبْهَمُ. هو العصب القحفي العاشر ويتأصل بجذيرات عديدة من جانب النخاع المستطيل (البصلة) في الأخدود بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية ويتفرع إلى العصبين الحنجريين العلوي والراجع وإلى الفروع السحائية والأذنية والبلعومية والقلبية والقصية والمعدية والكبدية والبطنية والكلبية والصفائير البلعومية والرئوية والمريئية وإلى الجذعين الأمامي والخلفي وينزل خلال الثقبه الوداجية حيث يكوّن العقدتين العلوية والسفلية ثم يستمر خلال الرقبة والصدر إلى البطن وهو يغذي أليافاً حسية إلى الأذن واللسان والبلعوم والحنجرة وأليافاً حركية إلى البلعوم والحنجرة والمريء وأليافاً لا ودية وحشوية واردة إلى الأحشاء الصدرية والبطنية وهو عصب لا ودي وحشوي وارد وحركي وحسي عام.
- **nervi vasorum (= nerves of veins)** الْأَعْصَابُ الْوَرِيدِيَّةُ. فروع عصبية تغذي الغلالة البرانية للأوعية الدموية.
- **n. vertebralis (= vertebral nerve)** العَصَبُ الْفَقْرِيّ. عصب يتأصل من العقد الرقبية الصدرية والفقرارية ويتسلق مع الشريان الفقاري ليعطي أليافاً إلى السحايا النخاعية وللأعصاب الرقبية وللحفرة القحفية الخلفية وهو عصب ودي.
- **nervi vesicales inferiores plexus pudendi** الْأَعْصَابُ الْمَتَانِيَّةُ السَّفْلِيَّةُ لِلضْفِيرَةِ الْفُرْجِيَّةِ. مصطلح قديم لبعض الألياف العصبية التي تغذي المثانة كان يعتقد بأنها تنبع من الضفيرة الفرجية.




nerve, ulnar

اعصاب وشرايين الساعد الأيسر الأمامية: (1) الشريان العضدي (2) العصب الناحف (3) اللقيمة الإنسية (4) العضلة العضدية (5) الرأس الزندي للعضلة الكتفية المدورة (6) الشريان الزندي الراجع (7) العضلة الكتفية المدورة (8) العصب الناحف (9) العضلة المثنية الكعبرية للرسغ (10) الرأس الكعبري للعضلة مثنية الأصابع السطحية (11) الشريان الزندي (12) العصب الزندي (13) وتر العضلة المثنية الزندية للرسغ (14) الفرع الظهري للعصب الزندي (15) الفرع الرسغي الظهري للشريان الزندي (16) الفرع الراجع السطحي للشريان الكعبري (17) وتر العضلة الراحية الطويلة (18) وتر العضلة المثنية الكعبرية (19) الشريان الكعبري (20) الفرع الراجي للعصب الناحف (21) وتر العضلة العضدية الكعبرية (22) الفرع السطحي للعصب الكعبري (23) الشريان الكعبري (24) العضلة مثنية الإبهام الطويلة (25) الشريان بين العظامين الأصلي (26) العضلة الكتفية المدورة (27) العضلة العضدية الكعبرية (28) العضلة الباسطة (29) الفرع السطحي للعصب الكعبري (30) الشريان الكعبري الراجع (31) الشريان الكعبري (32) الشريان الزندي (33) الفرع العميق للعصب الكعبري (34) العصب الكعبري (35) العضلة ذات الرأسين العضدية.



nerve, ulnar

الطبقة العميقة من اعصاب وشرايين راحة اليد: (1) الشريان الكعبري (2) العضلة الكتّابة المربعة (3) الشريان الزندي (4) العضلة مثنية الرسغ الزندية (5) الفرع الرسغي الراجي للشريان الزندي (6) الفرع الراجي للعصب الزندي (7) الفرع السطحي للعصب الزندي (8) الفرع العميق للعصب الزندي (9) العضلة مبعدة الخنصر (10) الفرع الراجي العميق من الشريان الزندي (11) العضلات بين العظام الراجية (12) العضلة مقربة الإبهام (13) العضلات الخراطينية (14) أوتار العضلات المثنية (15) الشرايين السنعية الراجية (16) الأعصاب الإصبعية الراجية الخاصة (17) الشرايين الإصبعية الراجية الخاصة (18) العضلة الخراطينية الأولى (19) العضلة بين العظام الظهرية الأولى (20) الشرايين الإصبعية الراجية الخاصة (21) العضلة مبعدة الإبهام القصيرة (22) الشريان الرئيسي للإبهام (23) العضلة مقربة الإبهام (24) القوس الراجية العميقة (25) الرأس السطحي للعضلة مثنية الإبهام القصيرة (26) العضلة مقابلة الإبهام (27) وتر العضلة مثنية الإبهام الطويلة (28) قيد المثنيات (29) الفرع الراجي السطحي للشريان الكعبري (30) وتر العضلة مثنية الرسغ الكعبرية (31) الفرع الرسغي الراجي للشريان الكعبري.



الأعصاب والأوعية الدموية في الجدارين الخلفي والوحشي للبلعوم: (1) العصب المبهم (القحفي العاشر) (2) العصب اللساني البلعومي (التاسع) (3) البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن (4) الجيبان المستعرض والسيني (5) العقدة العلوية للمبهم (6) الشريان السباتي الباطن (7) الفرع الأذيني للمبهم (8) الفاتى الخشائي (9) الفرع الظاهر للعصب الإضافي (10) الفاتى الإبري (11) العقدة السفلية للمبهم (12) العصب اللساني (الثاني عشر) (13) العضلة الإبرية البلعومية (14) العصب اللساني البلعومي (التاسع) (15) الفرع البلعومي للمبهم (16) الشريان البلعومي الصاعد (17) البطن الخلفي لذات البطنين (18) العصب الحنجري العلوي (19) الشريان السباتي الظاهر (20) الفرع البلعومي للسباتي البلعومي (21) الشريان الوجهي (22) الشريان اللساني (23) الفرع الظاهر للحنجري البلعومي (24) العضلة مضيق البلعوم المتوسطة (25) الفرع الباطن للحنجري البلعومي (26) الشريان الدرقي العلوي (27) الضفيرة البلعومية (28) مضيق البلعوم السفلية (29) الفرع القلبي العلوي للمبهم (30) الغدة الدرقية (31) العصب المبهم (العاشر) (32) الشريان الدرقي السفلي (33) الفرع القلبي العلوي للمبهم (34) المريء (35) العصب القلبي المتوسط للجذع الودي (36) العقدة الرقبية السفلي (37) الشريان الدرقي السفلي (38) العقدة الرقبية المتوسطة (39) الفرع البلعومي للدرقي السفلي (40) البصلة السفلية للوريد الوداجي السفلي (41) الجذع الودي (42) الضفيرة السباتية الأصلية (43) السباتي الأصلي (44) العصب المبهم (45) الفرع البلعومي للدرقي العلوي (46) الوريد الوداجي الأصلي (47) العصب القلبي العلوي الودي (48) الشريان الدرقي العلوي (49) الفرع الظاهر للحنجري العلوي (50) الفرع الباطن للحنجري العلوي (51) الشريان اللساني (52) الشريان الوجهي (53) الشريان الحنكي الصاعد (54) الجذع الودي (55) العصب اللساني البلعومي (56) الشريان البلعومي الصاعد (57) العقدة الرقبية العلوية للجذع الودي (58) الراد (59) العصب الوداجي للجذع الودي (60) العقدة السفلية للسهم (61) العصب الإضافي (62) الشريان السباتي الباطن (63) العقدة السفلية للسباتي البلعومي (64) العصب اللساني الباطن (65) الشريان السحائي الخلفي (66) العظم الصدغي (67) الثقبة الوداجية والبصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن (68) الأوردة البلعومية (69) العضلة مضيق البلعوم العلوية (70) الفرع الباطن للعصب الإضافي.

- **nervi vesicales inferiores plexus vesicalis** الأَعْصَابُ الْمَثَانِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ vesicalis المثانية. مصطلح قديم للألياف العصبية التي تصل الضفيرة المثانية عن طريق الشريان المثاني السفلي.
- **nervi vesicales superiores plexus vesicalis** الأَعْصَابُ الْمَثَانِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ vesicalis المثانية. مصطلح قديم للألياف العصبية التي تصل الضفيرة المثانية عن طريق الشريان المثاني العلوي.
- **n. vestibularis (= vestibular nerve)** الْعَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ الْقَوَاعِيّ. القسم الخلفي من العصب الدهليزي القوقعي الذي يتحكم في وظيفة التوازن ويتكون من الياف تنبع من الخلايا ثنائية القطبين في العقدة الدهليزية وينقسم محيطياً إلى قسمين رأسي وذنبية وله مستقبلات في أمبولات الأتية الهلالية والقريبة والكيس.
- **n. vestibulocochlearis (= vestibulo-cochlear nerve)** الْعَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ الْقَوَاعِيّ. وهو العصب القحفي الثامن الذي ينبع من ساق الدماغ بين الجسر والنخاع المستطيل (الصلة) عند الزاوية المخيخية الجسرية وخلف العصب الوجهي وينقسم بالقرب من النهاية الوحشية للصماخ السمعي الباطن إلى قسمين متميزين وظيفياً ومتحدتين جزئياً وهما العصب الدهليزي والعصب القوقعي وهما مرتبطان بالدماغ بجذور مختلفة - دهليزية وقوقعية.
- **n. zygomaticus (= zygomatic nerve)** الْعَصَبُ الْوُجْنِيّ. عصب يتأصل من العصب الفكي العلوي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي السفلي ويتفرع إلى الفرعين الوجني الوجهي والوجني الصدغي ويتصل مع العصب الدمعي ويغذي جلد الصدغ والمناطق المجاورة من الوجه وهو عصب حسيّ عام.
- net** شَبَكَةٌ. بنية من خيوط متشابكة ومتراصة.
- **nerve n.** شَبَكَةٌ عَصَبِيَّةٌ. شبكة جبلية لا تشابكية من الألياف العصبية وهي نوع من النهايات العصبية الحرة التي توجد بصورة خاصة في النسيج الضام.
- network, neurofibrillar** الشَّبَكَةُ اللَّيْفِيَّةُ الْعَصَبِيَّةُ. شبكة تولد اللييفات العصبية للخلية العصبية.
- neu (= neurilemma)** غِطَاءُ اللَّيْفِ الْعَصَبِيّ.

- neurad** نَحْوُ الْعَصَبِ. متجه أو منجذب نحو العصب.
- neuragmia** تَمَرُّقُ الْجَذْعِ الْعَصَبِيّ. تمزق أو تمزيق الجذع العصبي.
- neural** عَصَبِيّ؛ أَغْصَابِيّ. 1. متعلق بالعصب أو الأعصاب 2. واقع في منطقة المحور العصبي كالقوس العصبي مثلاً.
- neuralgia** أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم انتيابي يمتد على طول أحد الأعصاب أو أكثر وهناك عدة أنواع منه تصنف حسب المنطقة المولد فيها أو حسب الحالة المسببة له.
- **cardiac n. (= angina pectoris)** ألم عصبي قلبي؛ ذَبْحَةٌ صَدْرِيَّةٌ.
- **cervicobrachial n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ رَقَبِيّ عَضُدِيّ. ألم في الرقبة ينتشر إلى الذراع بسبب انضغاط الجذور العصبية للأعصاب النخاعية الرقبية.
- **cervico-occipital n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ رَقَبِيّ قَذَالِيّ. ألم عصبي في الأعصاب الرقبية العلوية خاصة في القسم الخلفي من العصب الرقبى الثاني.
- **cranial n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ قَحْفِيّ. ألم عصبي على طول أحد الأعصاب القحفية.
- **n. facialis vera** أَلَمٌ عَصَبِيّ وَجْهِيّ؛ الألم الحقيقي للعصب الوجهي. ألم عصبي يصيب الوجه والاذن ينتج عن الهربس المنطقي مع شلل وجهي نصفي عابر.
- **Fothergill's n. (= trigeminal n.)** أَلَمُ الثَّلَاثِيّ. التَّوَامُ.
- **geniculate n. (= geniculate ganglion n.)** أَلَمُ الْعُقْدَةِ الرُّكْبِيَّةِ.
- **geniculate ganglion n.** أَلَمُ الْعُقْدَةِ الرُّكْبِيَّةِ. ألم خلف العقدتين الحجاجية والفكية العلوية كان يعتقد سابقاً بأنه يتولد عن اضطراب العقدة الركبية.
- **glossopharyngeal n.** أَلَمُ اللِّسَانِيّ الْبَلْعُومِيّ. ألم عصبي يصيب العقد الصخرية والوداجية للعصب اللساني البلعومي ويتصف بالألم انتيابي شديد في جهتي البلعوم ويمتد إلى الأذن وعادة ما يترافق مع بطء القلب أو توقفه مع الفشي.
- **hallucinatory n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ هَلُوسِيّ. انطباع نفسي عن الشعور بالألم من دون وجود أي منه مؤلم في الجسم.

- النفسي بالأم عصبي يبقى بعد زوال الألم العصبي الأصلي.
- النسبي؛ عِزْقُ النَّسَا؛ - sciatic n. (= sciatica) ألم العصب الوركي.
- الأم عَصَبِيَّ سَلَوْدَرِي. ألم عصبي - Sluder's n. في العقدة الودية الحنكية يسبب ألمًا محرقًا وثاقبًا في منطقة الفك العلوي مع انتشاره إلى الرقبة والمنكبين.
- الأم - sphenopalatine n. (= Sluder's n.) الودي الحنكي.
- الأم عَصَبِيَّ جَدْعِي. ألم عصبي - stump n. في موضع البتر.
- الأم عَصَبِيَّ فَوْقَ الْحَاجِجِي. - supraorbital n. ألم عصبي في العصب فوق الحاجج.
- الأم الثلاثي - trifacial n. (= trigeminal n.) التوائم.
- الأم الثلاثي التوائم. ألم عصبي - trigeminal n. مبرح في المنطقة التي يغذيها العصب ثلاثي التوائم وعادة ما يثيره تنبه بعض النقاط المهيجة له.
- ألم عصب فيديوس؛ ألم عصب النفق - vidian n. الجناحي. ألم عصب القناة الجناحية.
- الأم عَصَبِيَّ حَشَوِي. ألم عصبي في - visceral n. منطقة الحوض.
- متعلق بالألم العصبي. منسوب neuralgic الألم العصبي أو مصاب به.
- شبيه الألم العَصَبِي. neuralgiform
- تَجَدُّدُ الْأَعْصَاب. تجدد أو neuragenesis إعادة تكوين النسيج العصبي.
- تَعَذُّرُ الْأَدَاءِ الْعَصَبِي. عدم neurapraxia توصيل العصب للنبضات مع عدم وجود أي تغيير بنيوي فيه بسبب إصابة كليلة أو انضغاطية أو إقفارية وعادة ما تعود له وظيفته بعد فترة.
- التَحَكُّمُ الْعَصَبِي. سيطرة الجهاز neurarchy الدماغى النخاعي على الجسم.
- إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ مُفَصِّلِي. neurarthropathy (= neuroarthropathy)
- وَهْنٌ عَصَبِيٍّ. مصطلح قديم neurasthenia للدلالة على متلازمة الضعف والتعب العقلي والجسمي المزمن والذي كان يعتقد بأنه يتسبب عن إرهاق الجهاز العصبي.
- الأم عَصَبِيَّ herpetic n. (= postherpetic n.) تالٍ للهربس.
- الأم - Hunt's n. (= geniculate ganglion n.) عَصَبِيَّ عُقْدِيَّ رُكْبِي.
- الأم عَصَبِيَّ مجهول السبب. ألم - idiopathic n. عصبي غير معروف السبب وغير مصحوب بأية تغيرات عضوية.
- الأم عَصَبِيَّ وَرْبِي. ألم الأعصاب - intercostal n. الوربية.
- الأم عَصَبِيَّ ثَدْيِي. ألم عصبي - mammary n. في منطقة الثدي.
- الأم مَفْصِلَ الْفَكِّ. ألم - mandibular joint n. في قمة الرأس وفي المنطقة القذالية مع ألم الأذن واللسان وحول الأنف والعينين مع اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي السفلي.
- الأم عَصَبِيَّ شَقِيقِي. نوع من - migrainous n. داء الشقيقة يتصف بنوبات من الألم النصفي المبرح في إحدى العينين ونصف الجبهة مع ارتفاع درجة حرارتها والتدمع والثر الأنفي وقد تدمم النوبة لمدة 15-30 دقيقة وقد تأتي النوبات بمجموعات متقاربة.
- الأم عَصَبِيَّ أَنْفِيَّ هَدْيِي. ألم - nasociliary n. في العينين والحاجبين وجسر الأنف.
- الأم عَصَبِيَّ أُذْنِي. - otic n. (= geniculate n., Ramsy Hunt syndrome) متلازمة رمزي هنت.
- الأم عَصَبِيَّ مُحِيطِي. ألم على - peripheral n. مسرى أحد الأعصاب الحسية المحيطية.
- الأم عَصَبِيَّ تَالٍ للهربس. ألم - postherpetic n. محرق مع مذل أو فرط الحساسية في مناطق انتشار الأعصاب الحسية الجلدية عقب إصابتها بالهربس النطاقي والذي قد يدوم لبضعة أسابيع أو أشهر.
- إِحْمِرَاؤُ الْأَطْرَاف - red n. (= erythromelalgia) المؤلم. داء يصيب أطراف الجسم والأقدام أكثر من اليدين يتصف بتوسع الاوعية الانتيايى بالجانبين وخاصة في الأطراف مع ألم محرق شديد وارتفاع درجة حرارة الجلد واحمراره.
- الأم عَصَبِيَّ تَذْكُرِي. الشعور - reminiscent n.

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِيٌّ. ومن عصبي - acoustic n. يترافق مع فقدان السمع لدرجات متفاوتة.

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ رَضَجِيٌّ. ومن عصبي - traumatic n. يتلو الإصابة بصدمة أو رضح.

موهون عصبي؛ وَاهِنُ الأعصاب. neurasthenic مصاب بالوهن العصبي أو ما ينسب إليه.

ضمور neuratrophia (= neuratrophy) عصبي. خلل تغذية الجهاز العصبي.

ضَامِرُ الأعصاب. شخص neuratrophic مصاب بالضمور العصبي.

ضمور neuratrophy (= neuratrophia) عصبي. ضمور إحدى العضلات أو الأنسجة بسبب مرض أو اختلال عصبي.

1. المَحْوَرُ العَصَبِيّ. neuraxis
1. محوار العصبون 2. الجهاز العصبي المركزي.

المَحْوَرُ. neuraxon (= axon)

عَصَبِيَّوْن. neurone (neuron)

تَغْدِيْدُ العَصَبِ؛ مَطُّ العَصَبِ. neurectasia (= neurotony) (= nerve stretching)

قَطْعُ العَصَبِ. قطع جزء من neurectomy العصب.

عَصَبِيٌّ مَعْوِيٌّ. متعلق بالقناة neurenteric العصبية والمعوي البدائي للجنين وخصوصاً بالنسبة للقناة التي تربطهما.

عَصَبِيٌّ ظَهَارِيٌّ. neurepithelial (= neuroepithelial)

عَصَبِيٌّ ظَهَارِيٌّ. neurepithelium (= neuroepithelium) الظهارة العصبية.

عَصَبِيٌّ الْفَعْلُ. منسوب للفعل neurergic العصبي أو معتمد عليه في وظائفه.

قَلْعُ العَصَبِ. عملية تمزيق neurexeresis أو قلع العصب.

طَبُّ neuriatry (= clinical neurology) الأعصاب السريري.

غَمْدُ اللِّيفِ العَصَبِيّ؛ غَمْدُ شِفَانٍ. الغشاء الرقيق neurilemma (= sheath of Schwann) الذي يغلف طبقات الميالين الرقيقة ويلتف حول محور الليف العصبي المحيطي للألياف المغمدة وبعض الألياف غير المغمدة.

إِتِهَابٌ غَمْدِ اللِّيفِ العَصَبِيّ. neurilemmitis

وَرَمٌ neurilemmoma (= neurilemoma) غَمْدُ اللِّيفِ العَصَبِيّ؛ وَرَمٌ شِفَانِي.

وَرَمٌ غَمْدِ اللِّيفِ العَصَبِيّ؛ وَرَمٌ شِفَانِي. neurilemoma ورم غمد الليف العصبي المحيطي، وهو عادة ما يكون معزولاً ومحمّلاً.

ورم - acoustic n. (= acoustic neuroma) عصبي سَمْعِيٌّ؛ ورم غمد ليف العصب السمعي.

المَحْوَرُ. neurite (= axon)

مُتَّهَبُ العَصَبِ. منسوب لالتهاب neuritic العصب أو مصاب به.

إِتِهَابُ العَصَبِ. التهاب أحد الأعصاب neuritis وهي حالة تتصف بالألم والإيلام فوق العصب والصدر والمعدة والشلل والضمور وانعدام المنعكسات ويستعمل أيضاً للدلالة على الإصابات الالتهابية للجهاز العصبي المحيطي.

إِتِهَابُ غَمْدِ العَصَبِ. إِتِهَابٌ - adventitial n. الغلالة البرأئية للعصب.

إِتِهَابُ الأعصاب الكُحُولِيّ. التهاب - alcoholic n. بسبب عوز الثيامين في الكحولية المزمنة.

إِتِهَابُ عَصَبِيٍّ صَاعِدٍ. التهاب - ascending n. العصب الذي يبدأ من القدم ويصعد إلى الساق ثم إلى الفخذ والورك والجذع.

إِتِهَابُ العَصَبِ العَضْدِيّ؛ الضَّمُورُ العَضَلِيّ - brachial n. (= neuralgic amyotrophy) المُولِم.

التهاب - central n. (= parenchymatous n.) عَصَبِيٌّ مَرَكَزِيٌّ؛ إِتِهَابُ الأعصاب المَتَنِيّ.

إِتِهَابُ عَصَبِيٍّ نَازِلٍ. التهاب - descending n. العصب الذي يبدأ من المنكب أو الورك ثم ينتشر للأسفل حتى الأطراف ونهاياتها اليد والقدم.

إِتِهَابُ الأعصاب القَوْتِيّ؛ (beriberi) - dietetic n. (= beriberi) بري بري. داء يتولد عن نقص الثيامين (فيتامين B) في الغذاء ويتصف بالتهاب الأعصاب والوذمة واعتلال القلب.

إِتِهَابٌ - disseminated n. (= polyneuritis) الأعصاب المنتثر.

إِتِهَابُ الأعصاب - endemic n. (= beriberi) المَتَوَطَّن؛ بري بري.

إِتِهَابُ العَصَبِ الوُجْهِيّ. التهاب - fallopian n. العصب الوجهي في منطقة قناته.

- **interstitial n.** التهاب الأنسجة الضامة لخِذَع عَصَبِي.
 - **interstitial hypertrophic n.** التهاب الأنسجة الضامة. اعتلال عصبي ضخامي مترق.
 - **intraocular n.** التهاب العصب داخل المقلة. تنكس الياف الأعصاب الذي يشمل القرص البصري.
 - **lead n. (= n. saturnina)** التسمم بالرصاص. التهاب الأعصاب الرصاصي.
 - **leprous n.** التهاب الأعصاب الجذامي. نوع من التهاب الأعصاب يظهر في الجذام.
 - **malarial n.** التهاب الأعصاب الملاري. التهاب الأعصاب الذي يترافق مع الملاريا.
 - **n. migrans (= migrating n.)** التهاب الأعصاب المهاجر. التهاب العصب الذي يصيب أولاً أحد الأعصاب ثم ينتشر إلى عصب آخر.
 - **multiple n. (= polyneuritis)** التهاب الأعصاب المتعدد. التهاب عصبي متعدد.
 - **n. multiplex endemica (= beriberi)** التهاب الأعصاب المتوطن المتعدد. بري بري.
 - **n. nodosa** التهاب الأعصاب العقدي. نوع من التهاب الأعصاب يولد عقداً على الأعصاب.
 - **optic n.** التهاب العصب البصري. التهاب العصب البصري الذي يمكن أن يصيب قسمه داخل العين (التهاب العصب داخل المقلة) أو قسمه خلف العين (التهاب العصب خلف المقلة).
 - **orbital optic n. (= retrobulbar optic n.)** التهاب العصب خلف المقلة.
 - **parenchymatous n.** التهاب الأعصاب المننّي. التهاب العصب الذي يصيب المحوار وغمدته النخاعيني في الأعصاب المحيطية.
 - **periaxial n. (= segmental demyelination neuropathy)** التهاب حول محوار العصب. اعتلال الأعصاب المزيل للميالين القطعي.
 - **peripheral n.** التهاب الأعصاب المحيطيّة. أحد الأعصاب المحيطية أو النهايات العصبية.
 - **porphyric n.** التهاب الأعصاب البرفيرية. التهاب الأعصاب الذي يظهر في البرفيرية المتقطعة الحادة.
 - **postfebrile n.** التهاب الأعصاب التالي للحُمّى. التهاب الأعصاب الذي يعقب الإصابة بأحد الأمراض الطفحية.
 - **postocular n. (= retrobulbar n.)** التهاب العصب خلف المقلة.
 - **pressure n.** التهاب العصب الانضغاطي. التهاب العصب الذي يتولد عن انضغاطه.
 - **n. puerperalis traumatica** التهاب الأعصاب النفاسي الرضحي. التهاب الأعصاب الذي يحصل للمرأة نتيجة إصابتها أثناء الولادة.
 - **radiation n. (= radioneuritis)** التهاب الأعصاب الشعاعي.
 - **radicular n. (= radiculitis)** التهاب الجذور العصبية. التهاب الأعصاب الذي يشمل الجذور النخاعية للعصب.
 - **retrobulbar n.** التهاب العصب خلف المقلة. التهاب قسم العصب البصري خلف مقلة العين.
 - **rheumatic n.** التهاب الأعصاب الروماتزمي. التهاب الأعصاب الذي يترافق مع الأمراض الروماتزمية.
 - **n. saturnina** التهاب الأعصاب الرصاصي. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التسمم بالرصاص.
 - **sciatic n. (= sciatica)** النسي؛ عرق النسا.
 - **segmental n.** التهاب العصب القطعي. اعتلال عصبي يتصف بفقدان النخاعين من قسيمات عصبية من العصب.
 - **senile n.** التهاب الأعصاب الشيخوخي. التهاب الأعصاب الذي يصيب الشيوخ وغالباً ما يصيب أعصاب الأطراف.
 - **shoulder girdle n. (= neuralgic amyotrophy)** التهاب أعصاب الحزام الكتفي؛ الضمور العضلي المؤلم.
 - **syphilitic n.** التهاب الأعصاب الزهري. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن داء الزهري.
 - **tabetic n.** التهاب الأعصاب التابيسي. التهاب الأعصاب المرافق للتأيس الظهري.
 - **toxic n.** التهاب الأعصاب التسممي. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التسمم بمادة سامة.
 - **traumatic n.** التهاب العصب الرضحي. التهاب العصب الذي يعقب الإصابة الرضحية ويتولد عنها.
- أُرْجِيَّة عَصَبِيَّة.** أرجية النسيج العصبي.
- neuroallergy**

neuroamebiasis التهابُ الأغصَابِ الأَمِيبِيّ. التهابُ الأعصابِ الذي يتولد عن داءِ الأميبات.

neuroanastomosis مُفَاغَرَةٌ عَصَبِيَّةٌ. إجراءُ مفَاغرةٍ بين الأعصابِ جراحياً.

neuroanatomy التَشْرِيحُ العَصَبِيّ. علمُ تشريحِ الجهازِ العصبي.

neuroarthropathy إغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ مُفَصِّلِيٍّ. مرضُ بنياتِ المفاصلِ الذي يترافق مع أمراضِ الجهازِ العصبي المركزي أو المحيطي.

neuroastrocytoma وَرَمٌ نَجْمِي عَصَبِيٌّ. وَرَمٌ دُبُقِيّ يتكون بصورة رئيسية من الخلايا النجمية وهو شبيه بالورم النجمي وغالباً ما يوجد في قاع البطين الثالث والفصوص الصدغية ومن الممكن أن يتكون في أي قسم من أقسام الجهاز العصبي.

neurobehavioral سلوكي عَصَبِيٌّ. نسبة إلى الحالة العصبية للشخص الذي يتعرف عليها بملاحظة سلوكه.

neurobiologist اختصاصي البيولوجيا العصبية. مختص البيولوجيا العصبية.

neurobiology البيولوجيا العصبية؛ عِلْمُ الحَيَاةِ العَصَبِيَّةِ. علمُ الجهازِ العصبي الذي يشمل علومه التشريحية والفيزيولوجية والكيميائية الحيوية والباثولوجيا العصبية وعلم الأدوية العصبية.

neurobiotaxis إِتِّحَاءٌ حَيَاتِيٌّ عَصَبِيٌّ. النظرية التي تنص على أن لأجسام الخلايا العصبية النزعة للهجرة أثناء تطورها بالاتجاه الذي تستلم منه عادة منبهاتها.

neuroblast أَرْوَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ. أي من الخلايا الجنينية التي تتطور إلى خلية عصبية أثناء مراحل تناميها وعادة ما تكون خلية عصبية غير ناضجة.

neuroblastoma وَرَمٌ الأَرْوَمَةِ العَصَبِيَّةِ. ساركومة من مصدر عصبي يتكون غالباً من أرومات عصبية ويصيب عادة الرضع والأطفال حتى سن العاشرة وغالباً ما ينمو من الخلايا العصبية الودية أو من نخاع الغدة الكظرية.

neurocanal (= canalis vertebralis) القَنَاةُ الفَقْرِيَّةُ.

neurocardiac عَصَبِيٌّ قَلْبِيٌّ. نسبة للجهازين العصبي والقلبي.

neuroceptor مُتَقَبِّلٌ عَصَبِيٌّ. أحد العناصر

الانتهازية للتغصنات العصبية التي تستلم المنبهات من الناقلات العصبية للعصبونات المجاورة.

neuroceratin (= neurokeratin) قَرَاتِينٌ عَصَبِيٌّ.

neurochemistry الكِيمِيَاءُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم العصبية الذي يعنى بكيمياء الجهاز العصبي.

neurochitin كَيْتِينٌ عَصَبِيٌّ. المادة التي تكون الهيكل الذي يسند الألياف العصبية.

neurochondrite الغُضُرُوفُ العَصَبِيَّةُ. أحد العناصر الجنينية التي تتطور إلى القوس العصبي الفقرية.

neurochorioretinitis التهابُ العَصَبِ البَصَرِيِّ والعُشْمِيَّةِ والشَبَكِيَّةِ.

neurochoroiditis التهابُ العَصَبِ البَصَرِيِّ والعُشْمِيَّةِ.

neurocladism تَفَرُّعٌ عَصَبِيٌّ. تكوين فروع جديدة من نواتئ العصبون وخصوصاً عند تجدد الأعصاب المقطوعة حيث تنجذب الفروع الجديدة المكونة من جدعة القسم الداني من العصب نحو جدعة القسم الطرفي لتكوّنا سوية جسراً بين النهايتين.

neuroclonic عَصَبِيٌّ رَمَعِيٌّ. يتميز بالتشنجات العصبية.

neurocommunications المُوَاصَلَاتُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم العصبية الذي يعنى بانتقال المعلومات العصبية وتناسقها ضمن الجهاز العصبي المركزي.

neurocranial عَصَبِيٌّ قَحْفِيٌّ. متعلق بالقحف العصبي.

neurocranium القَحْفُ العَصَبِيٌّ. قسم الجمجمة الذي يحوي الدماغ.

neurocrine صَمَاوِيٌّ عَصَبِيٌّ. 1. تأثير صماوي على الأعصاب أو بواسطتها 2. إفراز عصبي.

neurocristopathy إغْتِلَالٌ عُرْفِيٌّ عَصَبِيٌّ. أي مرض ينتج عن سوء تنامي العرف العصبي.

neurocutaneous عَصَبِيٌّ جُلْدِيٌّ. نسبة للعصب والجلد أو للعصب الجلدي.

neurocyte (= neuron) خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ؛ عَصَبُونٌ. خلية عصبية من أي نوع كان.

neurocytology عِلْمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة. فرع العلوم العصبية الذي يعني بدراسة المكونات الخلوية للجهاز العصبي.

neurocytolysin حَالُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة. أحد مكونات سم بعض الأفاعي (كالكوبرا) الذي يحلل الخلايا العصبية.

neurocytoma (= neuroepithelioma)

وَرَمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة؛ ورم ظهاري عصبي. ورم دماغي يتكون من خلايا عصبية غير متميزة أي أنها خلايا تشبه خلايا الورم الظهاري العصبي.

neurodealgia أَلَمُ الشَّبَكِيَّة. ألم شبكية العين.

neurodeatrophia ضَمُورُ الشَّبَكِيَّة. ضمور شبكية العين.

neurodegenerative تَتَكَسِّي عَصَبِي؛ مُتَتَكَسِّ عَصَبِيًّا. ينتسب أو يتصف بالتتكس العصبي.

neurodendrite (= dendrite) تَغْصُن.

neurodendron (= dendrite) تَغْصُن.

neuroderm (= neural ectoderm) الأديمُ الْعَصَبِي. قسم الأديم الظاهر الذي يتطور ليولد الأنبوب العصبي.

neurodermatitis جِلْدَاءُ عَصَبِي؛ الْتِهَابُ الْجِلْدِ الْعَصَبِي. التهاب جلدي اكزيمي متباين يعتبر استجابة جلدية لحك الجلد أو لتدليك أو لقرصه المستمر للتفريغ عن الحكة الشديدة مما يولد آفات متعددة الأشكال في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة والتي تتباين كثيراً في شكلها وأدوارها وشدتها عند مختلف الأشخاص ويعتقد البعض أنها ناتجة عن اضطراب نفسي المنشأ.

- exudative n. (= nummular eczema) إِكْزِيْمَةٌ دَرَهْمِيَّة.

- nummular n. (= nummular eczema) إِكْزِيْمَةٌ دَرَهْمِيَّة؛ التهاب الجلد الدرهمي.

neurodiagnosis تَشْخِيصٌ عَصَبِي. تشخيص الأمراض العصبية.

neurodynamic دِيْنَامِيكِي عَصَبِي. متعلق بالطاقة العصبية.

neurodynia (= neuralgia) أَلَمٌ عَصَبِي. ألم يمتد على مجرى أحد الأعصاب أو أكثر.

neuroectoderm الأديمُ الْعَصَبِي الظَّاهِر.

قسم الأديم الظاهر للجنين الذي يتطور ليكون الجهازين العصبي المركزي والمحيطي وبعض الخلايا الدبقية.

neuroeffector عَصَبِيٌّ مُسْتَفْعَلِي. متعلق بالاتصال بين العصبون والعضو المستفعل الذي يغذيه.

neuroelectricity الْكَهْرَبَائِيَّةُ الْعَصَبِيَّة. الإشارات أو التيارات أو الفولتية الكهربائية التي يولدها الجهاز العصبي.

neuroencephalomyelopathy اغْتِلَالٌ عَصَبِيٌّ دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ. مرض يصيب الدماغ والنخاع والأعصاب.

- optic n. (= neuromyelitis optica) الْتِهَابُ الْبَصَرِيِّ وَالنُّخَاعِ وَالْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ؛ الالتهاب المياليني للعصب البصري.

neuroendocrine عَصَبِيٌّ صَمَاوِيٌّ. متعلق بالتأثيرين العصبي والصماوي وخصوصاً بالتفاعل بين الجهازين العصبي والصماوي والهرمونات التي تتكون في الجهاز العصبي ومن ثم تفرزها الغدد الصماوية مثل هرمون الفازوبريسين.

neuroendocrinology عِلْمُ الصَّمَاوِيَّاتِ الْعَصَبِيَّة. مبحث التفاعلات بين الجهازين العصبي والصماوي.

neuroenteric (= neuterteric) عَصَبِيٌّ مَعْوِيٌّ.

neuroepidermal عَصَبِيٌّ بَشْرَوِيٌّ. متعلق بالأنسجة العصبية والبشرية أو المولد لهما.

neuroepithelial ظَهَارِيٌّ عَصَبِيٌّ. متعلق بالظاهرة العصبية أو مكون منها.

neuroepithelioma (= neurocytoma) ورم ظهاري عصبي؛ وَرَمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة.

neuroepithelium ظَهَارَةُ عَصَبِيَّة. 1. خلايا أسطوانية بسيطة متخصصة تعمل كخلايا حسية لاستلام المنبهات الخارجية كخلايا القوقعة أو الدهليز أو الأنف أو اللسان. 2. ظاهرة البشرة التي يتطور منها الجهاز العصبي.

- n. crista ampullaris (= n. of ampullary crest) الظَهَارَةُ الْعَصَبِيَّةُ لِلْعُرْفِ الْأَمْبُولِيِّ. الظهارة المتخصصة للعرف الأمبولي للثني والتي تحوي الخلايا المستقبلية التي تبرز الشعيرات من بعضها لداخل القبية.

- n. macularum (= n. of maculae)

الظَاهَرَةُ العَصَبِيَّةُ للْبَقْع. الظاهرة المتخصصة لبقع التيه والتي تحوي الخلايا الحسية المستقبلية والتي تبرز الشعيرات من بعضها لداخل غشاء غبار الأذن.

neurofiber (= nerve fiber) لَيْفٌ عَصَبِيٌّ.

neurofibra (= nerve fiber) لَيْفٌ عَصَبِيٌّ.

neurofibrae (= nerve fibers) أَلْيَافٌ عَصَبِيَّةٌ.

neurofibril لَيْفٌ عَصَبِيٌّ. أي من الخيوط الدقيقة التي تمر خلال هيولي جسم العصبون وتمتد من أحد التفتضات للتفتضات الأخرى أو للمحوار وقد يظهر بالفحص المجهر الإلكتروني بأنه مكون من تجمعات من الخيوط والنيبيات العصبية.

neurofibrilla (= neurofibril) لَيْفٌ عَصَبِيٌّ.

neurofibrillae لَيْفَاتٌ عَصَبِيَّةٌ.

neurofibroma وَرَمٌ لَيْفِيٌّ عَصَبِيٌّ. ورم العصب المحيطي الذي يتكون من التكاثر الشاذ لخلايا شفان.

neurofibromatosis وَرَامٌ لَيْفِيٌّ عَصَبِيٌّ. حالة تتصف بتغيرات تطورية في الجهاز العصبي والعضلات والعظام والجلد وتتصف سطحياً بتكون العديد من الأورام اللينة المسوكة (أورام ليفية عصبية) والمنتشرة في كل أنحاء الجسم والمترافقة مع مناطق انصبغية.

neurofilament خَيْطٌ عَصَبِيٌّ. أحد العناصر الخيطية الدقيقة جداً التي تكون مع النيبيات العصبية الليف العصبي وهي تشابه الخيوطات الصفرة التي توجد في العديد من خلايا الجسم غير العصبية فهي تقوم بنقل بعض المستقبلات عند تكوين هيكل الليف العصبي داخل الخلية العصبية.

neuroganglitis إِثْتِهَابُ الْعُقْدَةِ العَصَبِيَّةِ. التهاب إحدى العقد العصبية.

neuroganglion عُقْدَةٌ عَصَبِيَّةٌ. عقدة أو كتلة من الخلايا أو المواد العصبية.

neurogastric عَصَبِيٌّ مَعِدِيٌّ. يتولد بأعصاب المعدة أو منسوب إليها.

neurogen مُؤَلِّدُ العَصَبِ. المادة الكيميائية التي تساعد على تطور اللوح العصبي في الجنين.

neurogenesis تَكْوُنُ العَصَبِ. عملية تكون النسيج العصبي.

1. مُكُونُ العَصَبِ 2. عَصَبِيٌّ neurogenic العُنْشَا. 1. ما يكون النسيج العصبي أو ينبه الطاقة العصبية 2. ما ينشأ من الجهاز العصبي.

neurogenous عَصَبِيٌّ العُنْشَا. ما يتولد من الجهاز العصبي أو من أفة فيه.

neuroglia دَبْقٌ عَصَبِيٌّ. المادة الساندة للنسيج العصبي التي تتكون من شبكة نسيجية مكونة من عناصر أديمية ظاهرة محورة تضم خلايا متفرعة خاصة تسمى الخلايا الدبقية أو الدبقيات العصبية وهناك ثلاثة أنواع منها: الخلايا النجمية وقليلات التفتض، وهي نوعان الدبقيات الكبيرة والدبقيات الصغرية وهي من أصل أديمي متوسط وتقوم هذه الخلايا بدور في تكوين النخاعين ونقل المواد للعصبونات والحفاظ على محيطها الأيوني.

الدَبْقُ العَصَبِيُّ بَيْنَ الحَزَم. interfascicular n. - الدبقيات قليات التفتض التي توجد في المادة البيضاء على طول الغمد النخاعي.

الدَبْقُ العَصَبِيُّ المُحِيطِي. غمد peripheral n. - الليف العصبي وخلايا شفان والخلايا التابعة للجهاز العصبي المحيطي.

دَبْقِيٌّ عَصَبِيٌّ. neuroglial (= neurogliar) منسوب للدبق العصبي.

خَلِيَّةٌ دَبْقِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. خلية neurogliocyte الدبق العصبي.

وَرَمٌ دَبْقِيٌّ neurogliocytoma (= glioma) عَصَبِيٌّ. ورم يتكون من خلايا الدبق العصبي.

neurogliomatosis (= neurogliosis) وَرَامٌ دَبْقِيٌّ عَصَبِيٌّ.

وَرَامٌ دَبْقِيٌّ عَصَبِيٌّ. حالة neurogliosis تتصف بتوليد عدة أورام دبقية منتشرة في أنحاء الجسم.

اعتلال عصبي بنقص neuroglycopenia السكر. نقص سكر الدم المزمن للحد الذي يضعف وظائف الدماغ ويؤدي إلى تغيير الشخصية وتؤدي التفكير.

رصيد الخبرة العصبية. بقيا وآثار neurogram الفعاليات الدماغية القديمة التي تؤثر على طراز الوظائف الدماغية للشخص وبهذا تشارك في تكوين شخصيته.

neurography بحث عصبي. رسالة أو وصف للأعصاب أو للجهاز العصبي.

neurohormonal عَصَبِيٌّ هُزْمُونِيٌّ. ذو تأثير عصبي وهرموني.

neurohormone هُزْمُونٌ عَصَبِيٌّ. هرمون ينبه وظيفة عصبية.

neurohumor خَلَطٌ عَصَبِيٌّ. مادة كيميائية تتكون في العصبون تتمكن من تنشيط أو تعديل وظيفة العصبون أو العضلة أو الغدة القريبة منها.

neurohumoralism الخَلْطِيَّةُ العَصَبِيَّةُ. النظرية التي تنص على أن فعالية الأعصاب الذاتية على الأعضاء المحيطة تتولد بواسطة مواد كيميائية (أخلاط عصبية) تفرز عند نهايات الأعصاب المنشطة.

neurohypophyseal (= neurohypophysial) نُخَامِيٌّ عَصَبِيٌّ.

neurohypophysectomy اسْتِنْصَالُ النُّخَامِيَّةِ العَصَبِيَّةِ. إزالة الفص العصبي للغدة النخامية جراحياً.

neurohypophysial نُخَامِيٌّ عَصَبِيٌّ. منسوب للنخامى العصبية.

neurohypophysis النُّخَامِيَّةُ العَصَبِيَّةُ. الفص الخلفي (العصبي) للغدة النخامية وهو مركز خزن الفازوبرسين والاوسيتوسين والنيورفيزين.

neuroid عَصَبَانِيٌّ؛ شَبِيهُ العَصَبِ.

neuroimmunologic مَنَاعِيٌّ عَصَبِيٌّ. منسوب للمناعة العصبية.

neuroimmunology المَنَاعَةُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم الذي يعنى بتفاعل الجهازين العصبي والمناعي أثناء الصحة والمرض مثل تأثيرات الجهاز العصبي الذاتي على الاستجابات المناعية أو دور الأضداد في الوهن العضلي الوبيل.

neuroinidia نَقْصُ التَغْذِيَّةِ العَصَبِيَّةِ. نقص تغذية الخلايا العصبية.

neurokeratin قَرَاتِينٌ عَصَبِيٌّ. نوع من القراتين يعتقد بأنه يولد الشبكة السائدة للغمد النخاعيني للألياف العصبية المغمدة.

neurokinet مَطْرَقَةُ العَصَبِ. آلة تستعمل لتنبيه العصب بالطرق.

neurokyme مَفْعُولٌ عَصَبِيٌّ؛ عَمَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.

أية عملية عصبية بصورة عامة.

neuro labyrinthitis الْتِهَابُ عَصَبِيٌّ تَيْهِيٌّ. التهاب البنيات العصبية للتيه.

neuro lathyris m (= lathyris m) التَّسْنُمُ بِالْجُلْبَانِ.

neurolemma (= neurilemma) غَمْدُ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neurolemmitis (= neurilemmitis) الْتِهَابُ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neurolemmoma (= neurilemmoma) وَرَمٌ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neuroleptanalgesia تَسْكِينٌ تَطْمِينِيٌّ. حالة همود وتغير الوعي مع التسكين يتولد عن تناول أي مركب يحوي مسكناً مخدراً وعاملاً مضاداً للذهان.

neuroleptanalgesic مُسَكِّنٌ تَطْمِينِيٌّ. مادة تولد تسكيناً مضاداً للذهان.

neuroleptanesthesia تَخْدِيرٌ تَسْكِينِيٌّ تَطْمِينِيٌّ. حالة تسكين بمضاد للذهان مع فقدان الوعي تتولد عن تناول مركب يحوي مسكناً مخدراً وعاملاً مضاداً للذهان مع استنشاق أكسيد النتروجين والأكسجين.

neuroleptanesthetic مُخَدِّرٌ تَطْمِينِيٌّ. مادة تولد تخديراً مضاداً للذهان.

neuroleptic (= antipsychotic) مُضَادٌّ لِلذَّهَانِ. مصطلح يستعمل للدلالة على تأثير الأدوية المضادة للذهان على السلوك والاستعراف والتي تولد حالة من الخمول وضعف المبادرة والعاطفة ولكنها تقلل من حالة التخليط والهياج لدى المريض النفسي وتعدل الفعاليات النفسية الحركية لديه.

neuro lipomatosis وُرَامٌ شَحْمِيٌّ عَصَبِيٌّ. حالة تنصف بتكون ترسبات شحمية متعددة تحت الجلد مع الضغط على الأعصاب فتولد الألم والإيلام والمذل.

- n. dolorosa (= adiposis dolorosa) شَحَامَةٌ مُؤَلِمَةٌ؛ وُرَامٌ شَحْمِيٌّ عَصَبِيٌّ مُؤَلِمٌ.

neurologia (= neurology) طِبُّ الْجِهَازِ العَصَبِيِّ.

neurologic طَبِّيّ عَصَبِيٌّ. متعلق بطب الجهاز العصبي أو بالجهاز العصبي نفسه.

neurologist طَبِيبُ الأعْصَابِ. اختصاصي في طبابة الجهاز العصبي.

neurology طبُّ الجهازِ العَصَبِيِّ. فرع العلوم الطبية الذي يعنى بدراسة الجهاز العصبي السوي والمرضي وأمراضه.

- clinical n. طبُّ الجهازِ العَصَبِيِّ السَّرِيرِيِّ. فرع الطب الذي يهتم بتشخيص امراض الجهاز العصبي واضطراباته وبمعالجتها.

neurolues (= neurosyphilis) الزهري العَصَبِيِّ.

neurolymph (= cerebrospinal fluid) السائلُ الدِّمَاغِيُّ الفَخَاعِيُّ.

neurolymphomatosis وُزَامٌ لِمَفْي عَصَبِيّ. ارتشاح أرومي لمفاوي في العصب.

neurolysin حَالُ العَصَبِ. حال الخلية الذي له فعل تخريبي نوعي خاص على الخلايا العصبية.

neurolysis افتكاك العصب؛ حُلُّ العَصَبِ. 1. تحرير غمد العصب بقطعه طولياً 2. عملية قطع الالتصاقات حول العصبية 3. تفريغ الضغط عن العصب المضغوط 4. إرهاق الطاقة العصبية 5. تخريب أو حل النسيج العصبي.

neurolytic حَالُ العَصَبِ. مخرب للأنسجة العصبية.

neuroma وُزَمٌ عَصَبِيّ. ورم مكون بصورة رئيسية من خلايا والياف عصبية أو ورم ينمو من أحد الأعصاب.

- acoustic n. وُزَمٌ عَصَبِيّ سَمْعِيّ. ورم حميد يتضخم تدريجياً داخل القناة السمعية وينمو من العصب السمعي وتختلف أعراضه حسب حجمه وموقعه والتي يمكن أن تشمل فقدان السمع والصداع واضطرابات التوازن والمشي وتتمل الوجه والألم والطنين ويمكن أن تكون في إحدى الجهات أو في الجهتين.

- amputation n. وُزَمٌ عَصَبِيّ تَالٍ لِلبَتَرِ. وُزَمٌ عَصَبِيّ رضحي يعقب بتر أحد الأعضاء أو الأطراف.

- amyelinic n. وُزَمٌ عَصَبِيّ لَا مِيَالِينِي. وُزَمٌ عَصَبِيّ يحتوي على الياف عصبية غير مغمدة فقط.

- n. cutis وُزَمٌ عَصَبِيّ جِلْدِيّ. وُزَمٌ عَصَبِيّ متوضع في الجلد.

- cystic n. وُزَمٌ عَصَبِيّ كَيْسِيّ. وُزَمٌ عَصَبِيّ كاذب أو وُزَمٌ عَصَبِيّ تحول إلى شكل كيسي.

- false n. وُزَمٌ عَصَبِيّ كَاذِب. وُزَمٌ عَصَبِيّ لا يحوي عناصر عصبية.

- fascicular n. (= medullated n.) وُزَمٌ عَصَبِيّ مِيَالِينِي.

- ganglionar n. وُزَمٌ عَصَبِيّ عُقْدِيّ. وُزَمٌ عَصَبِيّ مكون من خلايا عصبية.

- ganglionic n. (= ganglionar n.) وُزَمٌ عَصَبِيّ عُقْدِيّ.

- malignant n. وُزَمٌ عَصَبِيّ خَبِيث. ساركومة البنيات العصبية وعادة ما تكون خلايا مغزلية.

- medullated n. وُزَمٌ عَصَبِيّ مِيَالِينِي. وُزَمٌ عَصَبِيّ مكون من الياف عصبية نخاعية.

- multiple n. (= neuromatosis) وُزَامٌ عَصَبِيّ متعدّد.

- myelinic n. وُزَمٌ عَصَبِيّ مِيَالِينِي. وُزَمٌ عَصَبِيّ يحوي اليافا عصبية مياينية.

- nevoid n. (= telangiectodes n.) وُزَمٌ عَصَبِيّ وُخْمَانِيّ.

- plexiform n. وُزَمٌ عَصَبِيّ ضَفِيرِيّ. وُزَمٌ عَصَبِيّ مكون من جذوع عصبية ملتوية.

- telangiectodes n. وُزَمٌ عَصَبِيّ مُتَوَسِّع الشعيرات. وُزَمٌ عَصَبِيّ يحوي الكثير من الاوعية الدموية المتوسعة.

- traumatic n. وُزَمٌ عَصَبِيّ رَضَحِيّ. كتلة من الاليف العصبية البصلية أو العقدية غير المنتظمة مع انسجتها السائدة التي تتكون بعد رضح العصب العارضي أو القطع القصدي.

- true n. وُزَمٌ عَصَبِيّ حَقِيقِيّ. وُزَمٌ عَصَبِيّ يتكون من أنسجة عصبية.

- Verneuil's n. (= plexiform n.) وُزَمٌ عَصَبِيّ ضَفِيرِيّ.

neuromalacia تَلَيُّنُ الأعصاب. تلين الأعصاب المرخي.

neuromalakia (= neuromalacia) تَلَيُّنُ الأعصاب.

neuromatosis وُزَامٌ عَصَبِيّ. مرض يتصف بوجود عدة أورام عصبية.

neuromatous متعلق بالورم العصبي. مصاب بالورم العصبي أو ما يتصف أو يتعلق به.

neuromechanism الآليّة العَصَبِيّة. بنية الجهاز العصبي وترتيبه وتنسيقه بالنسبة لوظائفه.

neuromeningeal عَصَبِيّ سِخَانِيّ. منسوب إلى الأنسجة العصبية والسحايا أو ما يصيبهما.

neuromere قَسَمٌ عَصَبِيٌّ. 1. أي من الشدقات المتتالية على طول الأنبوب العصبي للجنين المتطور وقد يستعمل الاصطلاح للدلالة على الشدقات المتتالية في الدماغ المؤخر الناضج. 2. شذفة من النخاع الشوكي يتصل بها زوج من الجذور الظهرية وزوج من الجذور البطنية.

neuromimesis مُحَاكَاةٌ هِسْتِيرِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. التقليد الهستيرى لأحد الأمراض العصبية.

neuromimetic مُحَاكِيُ الْفِعْلِ الْعَصَبِيِّ. 1. توليد استجابة في الأعضاء المستفلة تشابه تلك التي تولدها الدفقات العصبية. 2. عامل يولد مثل هذه الاستجابة. 3. نسبة إلى المحاكاة العصبية.

neuromittor (= neurotransmitter) نَاقِلٌ عَصَبِيٌّ. أحد العناصر الانتهازية في النهاية الطرفية للعصبون توصل المنبه إلى المتقبل العصبي للعصبون المجاور.

neuromodulation تَفْرِيجٌ عَصَبِيٌّ. التنبيه الكهربائي لأحد الأعصاب المحيطة أو للنخاع الشوكي أو للدماغ للتفريج عن الألم ومن الممكن أن يجري ذلك عبر الجلد أو خلال منبه مغروس.

neuromotor عَصَبِيٌّ حَرَكِيٌّ. يشمل العصب والعضل أو منسوب لكليهما.

neuromuscular عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. منسوب للعصب وللعضل.

neuromyasthenia وَهْنٌ عَضَلِيٌّ عَصَبِيٌّ. وهن عضلي يترافق مع تقلقل عاطفي.

- epidemic n. وَهْنٌ عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ وَبَائِيٌّ. داء يشبه التهاب سنجابية النخاع لحد ما ويحدث عادة كمرض وبائي ويتصف بالصداع والألم العضلي واعتلال الغدد اللمفية الرقبية والحمى والشلل أحياناً ولكنه من دون ضمور مع فرط المنعكسية.

neuromyelitis الْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. التهاب المادة العصبية والنخاعية، أي التهاب النخاع المترافق مع التهاب الأعصاب.

- n. optica الْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ. زوال الميالين من العصب البصري ومن النخاع الشوكي ويتصف بضعف البصر أو العمى مع الشلل الرخو في الأطراف وباضطراب الوظائف الحسية والتناسلية البولية.

neuromyic (= neuromuscular) عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ.

neuromyon الْعَصَبُ الْعَضَلِيُّ. العناصر العصبية في العضلات.

neuromyopathic مُعْتَلٌّ عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. ما يتصف بالاعتلال العصبي العضلي ويشمل العضلة القلبية أو منسوب إليه.

neuromyositis الْتِهَابُ الْأَعْصَابِ وَالْعَضَلِ. التهاب العصب المختلط مع التهاب العضل.

neuromyotonia (= myokymia) تَمَوُّجٌ عَضَلِيٌّ. تشنُّجٌ توتري عضلي تسببه فعالية كهربائية لعصب محيطي تنصف بالتيتيس ثم الارتخاء البطيء والارتجاف الحزمي والتقلص الموجي.

neuron عَصْبُونٌ. (ج: عَصْبُونَاتٌ). أي من الخلايا الموصلة في الجهاز العصبي المركزي وتتكون عادة من جسم الخلية الذي يحوي النواة والهياكل المحيطة بها مع عدة فروع قصيرة (التغصنات) التي تنتهي بغصينات انتهائية (تغصن انتهائي) مع فروع جانبية لها، كما أن لها محاوراً مغطى بغمد يكون عادة الليف العصبي.

- afferent n. عَصْبُونٌ وَارِدٌ. عصبون ينقل الدفقات من المستقبلات إلى المركز العصبي.

- alpha motor n. عَصْبُونٌ أَلْفَا الْحَرَكِيِّ. عصبون مركزي يغذي محواره المحيطي أليافاً حركية عضلية وينقل النبضات بسرعة كبيرة.

- autonomic n. عَصْبُونٌ مُسْتَقْلٍ. أي من العصبونات قبل أو بعد العقدة الذي يغذي عضلة ملء أو قلبية أو إحدى الغدد.

- bipolar n. عَصْبُونٌ ذُو قُطْبَيْنِ: عصبون ثنائي القطب. عصبون ذو فرعين ينبع كل واحد منهما من إحدى جهتي جسم العصبون.


- central n. عَصْبُونٌ مَرْكَزِيٌّ. عصبون يوجد داخل الجهاز العصبي المركزي بصورة كاملة.

- connector n. (= interneuron) عَصْبُونٌ رَابِطٌ: عَصْبُونٌ بَيْنِيٌّ. عصبون تتشابك كل تغصناته ومحواره مع عصبونات أخرى.

- correlation n. عَصْبُونٌ تَرَابُطِيٌّ. عصبون يساهم في وظيفة تناسق وترباط مختلف المنبهات لتوليد استجابة مناسبة.


- efferent n. عَصْبُونٌ صَادِرٌ. عصبون ينقل الدفقات العصبية من أحد المراكز العصبية إلى أحد الأعضاء المحيطة.

- exciter n. (= motor n.) عَصْبُونٌ مُثَبِّرٌ. عصبون حركي.




neurone

رسم تخطيطي للعصبون يبين مختلف أقسامه




neutrons

شكل تخطيطي يبين مختلف الأقسام الوظيفية للأنواع المختلفة من العصبونات.




عصبون حركي



عصبون حسي

neurone

عصبونان حسي وحركي: (1) ألياف عضلية (2) صفيحة انتهائية حركية (3) غمد الليف المصبي (4) المحوار (5) العقد المياليني (6) فرع راند (7) نويات مركزية (8) جسيمات نيسل (9) نواة العصبون (10) خلايا تابعة (سائلة) (11) عقدة رانقيه (12) الجلد (13) نهايات عصبية حرة (14) نهايات عصبية اشتباكية.



neurone

المعصبون الحركي الذي يبدأ في داخل الجهاز العصبي المركزي ويمتد إلى خارجه إلى الجهاز العصبي المحيطي: (1) عقدة رانفقيه (2) خلية قليلة التغصن (3) جسيمات نيسل (4) تغصنات (5) تشابك (6) حوالي النواة (7) نقيير المحوار (8) غمد الميالين (9) المحوار (10) خلية شوان (11) فرع جانبي (12) صفيحة حركية انتهائية.

- **first order n. (= primary n.)** عَصْبُونٌ أُولَى. عصبون أولي.
- **gamma n. (= gamma motor n.)** عَصْبُونٌ غَامَا حَرَكَي. عصبون غاما حركي.
- **gamma motor n.** عَصْبُونٌ غَامَا حَرَكَي. عصبون مركزي يغذي محواره الالياف العضلية داخل المغزل العضلي وينقل الدفعات العصبية بمعدل سرعة توصيل ألياف غاما العصبية وهو معدل عال.
- **Golgi type I n's** 1. عَصْبُونَاتٌ غُولْجِي نَمَط 1. عصبونات قشرية هرمية الشكل ذات محاور طويلة تترك المادة السنجابية للجهاز العصبي المركزي وتعتبر المادة البيضاء وتنتهي في الأقسام المحيطية.
- **Golgi type II n's** 2. عَصْبُونَاتٌ غُولْجِي نَمَط 2. عصبونات نجمية توجد في المادة السنجابية لقشرة المخ والمخيخ والشبكية وذات محاور قصيرة ولا تترك المادة السنجابية.
- **intercalary n. (= interneuron)** عَصْبُونٌ مُقَحَّم: عَصْبُونٌ بَيْنِي. عصبون متوسط.
- **internuncial n. (= interneuron)** عَصْبُونٌ مُقَحَّم: عَصْبُونٌ بَيْنِي. عصبون متوسط.
- **long n.** عَصْبُونٌ طَوِيل. عصبون ذو محوار طويل.
- **motor n. (= motoneuron)** عَصْبُونٌ حَرَكَي. عصبون له وظيفة حركية أو عصبون صادر ينقل الدفعات الحركية للعضلات.
- **multiform n. (= multipolar n.)** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَشْكَال: عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب. عصبون متعدد الأشكال.
- **multipolar n.** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب. عصبون ذو فروع متعددة تختلف في الشكل حسب ترتيب فروعها وتكثر بين الخلايا الهرمية والنجمية.
- **peripheral sensory n.** عَصْبُونٌ حِسِّي مُحِيطِي. عصبون يكون القسم الأول من القوس العصبي المحيطي وهو يقع خارج الجهاز العصبي المركزي ولكن له فرع يدخله وهو يكون مع العصبين البيني والحركي قوس المنعكس المحيطي.
- **polymorphic n. (= multipolar n.)** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَشْكَال: عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب. عصبون متعدد الأشكال.
- **postganglionic n's.** عَصْبُونَاتٌ بَعْدَ الْعُقْدَةِ. عصبونات توجد أجسام خلاياها في العقد المستقلة ووظيفتها ترحيل الدفعات العصبية إلى ما بعدها من بنيات.
- **preganglionic n's.** عَصْبُونَاتٌ قَبْلَ الْعُقْدَةِ. عصبونات توجد أجسام خلاياها في الجهاز العصبي المركزي وتنتهي فروعها الانتهازية في العقد المستقلة.
- **premotor n.** عَصْبُونٌ قَبْلَ الْحَرَكَي. عصبون غير مرتبط مباشرة بالعضلة ولكنه يعمل كمركز ارتباط يتحكم في توصيل الدفعات الحركية إلى عصب حركي معين واحد أو أكثر.
- **primary n.** عَصْبُونٌ أُولَى. عصبون في السبيل العصبي يعمل كمستقبل حسي ويتشابك محواره مع عصبون ثانٍ (العصبون الثانوي) وينقل إليه الدفعات العصبية.
- **primary sensory n.** عَصْبُونٌ حِسِّي أُولَى. عصبون عقدة الجذر الظهري له فرع يمر إلى عضو الحس المحيطي وآخر يدخل الجهاز العصبي المركزي.
- **projection n.** عَصْبُونٌ إِسْقَاطِي. عصبون يعمل في نقل الدفعات العصبية سواء كانت حسية أو حركية بين القشرة الدماغية والمراكز دون القشرية أو بالعكس.
- **pseudounipolar n.** عَصْبُونٌ أَحَادِي الْقُطْب. عصبون أحادي القطب كان أصلاً ذا قطبين ولكنهما اندغما أثناء تطورها ليكونا فرعاً واحداً يتوزع بدوره إلى فرعين بعد مسافة من جسم الخلية.
- **pyramidal n. (= pyramidal cell)** خَلِيَّةٌ هَرَمِيَّة. عصبون حسي له وظيفة حسية وهو عصبون واحد ينقل النبضات العصبية من المحيط نحو الجهاز العصبي المركزي.
- **short n.** عَصْبُونٌ قَصِير. عصبون يتفرع محواره إلى فروع عديدة بالقرب من جسم خلية ويصل إلى الخلايا الجاورة له في المادة السنجابية.
- **unipolar n.** عَصْبُونٌ أَحَادِي الْقُطْبِيَّة. عصبون ذو قطب واحد.
- neuronagenesis** قلة العصبيونات. عدم تكوّن العصبيونات.
- neuronal** عَصْبُونِي. نسبة للعصبون.
- neuronatrophy** ضُمُورُ العصبونات. مصطلح يستخدم للدلالة على أي مرض يتسبب عن تصلب العصبونات وضمورها.
- neurone (= neuron)** عَصْبُونٌ.
- neuronephric** عَصْبِي كُلَوِي. نسبة للجهازين العصبي والكُلَوِي.
- neuronevus** وَحْمَةٌ عَصْبِيَّة. وحة تتمايز خلاياها إلى ما يشبه البنيات العصبية وقد تسبب سريراً الليفوم العصبي أو قد تكون لها أوصاف سريرية تشبه الوحة المشعرة العملاقة.

- neuronic** عَصْبُونِيّ. متعلق بالعصبون أو مؤثر فيه.
- neuronin** نِيُورُونِين. البروتين الرئيسي في محوار العصبون.
- neuronitis** إِتِهَابٌ عَصْبُونِيّ. مصطلح يستعمل للدلالة على اضطراب مجهول المنشأ.
- neuronophage** بلعم العصيونات. عاثية. تبتلع الخلايا العصبية.
- neuronophagia** بلعمة العَصْبُونَات. تخريب الخلايا العصبية بعملية ابتلاعها.
- neuronophagy (= neuronophagia)** بَلْعَمَةُ العَصْبُونَات.
- neuronosis** عُصَاب؛ اعتلال عصبي. أي مرض يتولد من أصل عصبي.
- neuronotropic** أَلِفٌ العَصْبُونَات. ماله ألفة للعصبونات.
- neuronymy** التَّسْمِيَةُ العَصْبِيَّة. التسمية النظامية لأقسام الجهاز العصبي.
- neuro-ophthalmology** طِبُّ الأَعْصَابِ العَيْنِيَّة. فرع الطب الذي يتخصص في أقسام الجهاز العصبي المتعلقة بالعين.
- neuro-otology** طِبُّ الأَعْصَابِ الأُذُنِيَّة. فرع الطب الذي يتخصص في أقسام الجهاز العصبي المتعلقة بالأذن.
- neuropacemaker** نَاطِقَةٌ عَصْبِيَّة. ناظمة غرسية تخرج عن الألام الناتج عن إصابات الأعصاب.
- neuropapillitis (= papillitis)** التَّهَابُ الخَلِيمَةُ العَصْبِيَّة؛ إِتِهَابُ الخَلِيمَةِ.
- neuroparalysis** شَلَلٌ عَصْبِيّ. شلل يتولد عن مرض العصب أو الأعصاب.
- neuropathic** إِغْتِلَالِيّ عَصْبِيّ. متعلق بالاعتلال العصبي أو متصف به.
- neuropathogenesis** إِفْرَاضٌ عَصْبِيّ. توليد مرض الجهاز العصبي.
- neuropathogenicity** إِفْرَاضِيَّةٌ عَصْبِيَّة. صفة توليد أو قابلية توليد تغييرات مرضية في الأنسجة العصبية.
- neuropathology** العَرَضِيَّاتُ العَصْبِيَّة؛ الباثولوجيا العَصْبِيَّة. فرع الطب الذي يعنى بدراسة التغييرات أَلَشْكِيَّة والعضوية والمرضية للجهاز العصبي.
- neuropathy** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ. مصطلح يدل على التغييرات الوظيفية أو المرضية أو كليهما التي تصيب الجهاز العصبي المحيطي ويستعمل غالباً للأمراض العصبية المحيطية الالتهابية.
- alcoholic n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ كُحُولِيّ. اعتلال عصبي بسبب نقص الثيامين الذي يتولد عن الإدمان على الكحول.
- ascending n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ صَاعِد. اعتلال عصبي يبدأ من الأسفل كالقدم ويتسلق إلى الساق والفخذ والورك والجذع حتى المنكبين والرأس.
- descending n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ نَازِل. اعتلال عصبي يبدأ من الأعلى كالمنكب أو الورك ويهبط للأسفل حتى اليد أو القدم.
- diabetic n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ سَكْرِيّ. اعتلال عصبي متعدد مزمن ومتناظر يصيب ابتداء أعصاب الأطراف السفلي وغالباً ما يصيب الأعصاب الودية ويتصف مرضياً بزوال الميالين القسيمي من الأعصاب ويتصف النوع الحاد منه بآلم وخيم وضعف العضلات وضومورها وفقدان المنعكسات الوترية وخلل الحس المحيطي أما اعتلال الأعصاب الذاتية فإنه يتصف بنقص الضغط القيامي والإسهال الليلي وانحباس البول والعانة وتضييق الحديقة.
- entrapment n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ إِنْجَبَاسِيّ. أي من مجموع الاعتلالات العصبية التي تشمل متلازمة النفق الرسغي أو متلازمة النفق الرسغي أو ألم الفخذ المذلي حيث يصاب العصب المحيطي بانضغاطه في مرمره في نفق ليفي أو ليفي عظمي أو في نقطة يغير عندها اتجاهه بصورة مفاجئة خلال غلالة عميقة على شريط ليفي أو عضلي، ومن أمثلته متلازمة النفق الرسغي.
- hereditary sensory radicular n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ وَرَاثِيّ حِسِّيٌّ جَذَرِيّ. اضطراب وراثي سائد يتصف بعلامات فقدان الحس الجذري في الأطراف العلوية والسفلية مع ألم برقي وتقرح الأقدام المزمن غير المؤلم وأحياناً الصمم. ويشاهد تنكس أولي لعقدة الجذر الظهري مع علامات تنكس النواة اللوزية والعصب البصري والمخيخ.
- periaxial n. (= segmental n.)** اعتلال عصبي محيط بالمحوار؛ إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ قِطْعِيّ.
- progressive hypertrophic interstitial n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ ضَخَامِيّ مُتَرَقِّ جِلَاطِيّ. حالة تنكس بفرط تنسج النسيج الضام الخلالي مسبباً تنخس جذوع الأعصاب المحيطية والجذور الظهرية

وتصلب الاعمدة الظهرية للنخاع الشوكي وهو مرض عائلي مترق وبطيء يبدأ في مقتبل العمر ويتصف بضمور الاقسام السفلية للساقين وضعف المنعكسات الوترية والحس.

اعتلال عصبي قطعي (مزيل الميالين) - segmental (demyelination) n.
اعتلال عصبي يتصف بزوال الميالين من قسيمات من العصب.

اعتلال عصبي مصلّي - serum n.
يشمل الاعصاب الرقبية او الضفيرة العضدية يحدث بعد يومين إلى ثمانية ايام بعد حقن بروتين اجنبي مثل مصل ضدي او ترياق من اصل حيواني ويتصف بالم موضعى مع اضطرابات حسية او الشلل.

ببتيد عصبي - neuropeptide
الذي يتكون من سلسلة قصيرة من الحموض الامينية ويوجد في أنسجة الدماغ ويتوضع عادة في نهايات المحاور عند التشابكات ويصنف باعتباره ناقل عصبي بالرغم من أن بعض هذه السلاسل هي هرمونات.

غائثة - neurophage (= neuronophage)
عصبونية (بلعم عصبي).

علم أدوية الجهاز العصبي - neuropharmacology
فرع علم الادوية الذي يعنى بدراسة تأثير الادوية على مختلف اقسام وامراض الجهاز العصبي.

موجة - neurophilic (= neurotropic)
للغصّب؛ عصبي الالفة.

غصاب صراخي - neurophonia
مصاحب بصراخ المريض وعويله وأحياناً إصدار أصوات تشابه أصوات الحيوانات.

طب الأعصاب العينية - neurophthalmology (= neuro-ophthalmology)

ضمور عصبي - neurophthisis
ضمور النسيج العصبي.

فيزيولوجيا الجهاز العصبي - neurophysiology
فرع من علم الفيزيولوجيا يدرس وظائف الجهاز العصبي.

اللبد العصبي - neuropil
الخلايا العصبية متشابكة تشابكاً كثيفاً مكوناً من تفصينات ومحاور مع خلايا دبقية في الجهاز العصبي المركزي وفي بعض اقسام الجهاز العصبي المحيطي.

اللبد العصبي - neuropile (= neuropil)

الجبلة العصبية - neuropiasm
الجبلة القعدة غير المتميزة الموجودة بالخلية العصبية.

زأب الغصّب - neuroplasty
الجراحة الرابية للعصب.

ضفيرة عصبية - neuroplexus
ضفيرة أعصاب.

أقدام عصبية - neuropodia

قدم عصبية - neuropodien (= neuropodium)
قدم عصبية.

قدم عصبية - neuropodium
نهاية بصلية ل أحد المحاور في بعض أنواع التشابكات.

مسّم عصبي - neuropore
النهاية الامامية المفتوحة (الثقب الامامية) او النهاية الخلفية المفتوحة (الثقب الخلفية) للأنبوب العصبي للجنين الابتدائي وتغلّق هذه الفتحات تدريجياً مع تنامي الأنبوب وفي حوالي الاسبوع الرابع من تطوره.

المسّم العصبي - anterior n. (= nostral n.)
الأمامي. الفتحة الجنينية في الجزء الامامي من الدماغ المقدم التي تغلق في مرحلة العشرين جسيمة.

المسّم العصبي - posterior n. (= caudal n.)
الخلفي. الفتحة الجنينية في الجزء الخلفي من القناة العصبية التي تغلق في مرحلة الخمس وعشرين جسيمة (حوالي 26 يوماً).

الجهد العصبي - neuropotential
الجهود العصبي. الجهد او الطاقة العصبية.

الطب النفسى العصبي - neuropsychiatry
فرع الطب الذي يشمل الطب النفسى وطب الجهاز العصبي.

عصبي نفسى - neuropsychic
متعلق بالمراكز العصبية المتخصصة بالعمليات النفسية.

إعتلال عصبي نفسى - neuropsychopathy
اعتلال الاعصاب والنفس.

علم الأدوية - neuropsychopharmacology (= psychopharmacology)
النفسية.

ذهان - neuropsychosis (= psychosis)

علم الأشعة العصبية - neuroradiology
علم أشعة الجهاز العصبي.

neurorecidive نَاقِصٌ عَصَبِيًّا.

neurorecurrence (= neurorelapse)

إِنْتِكَاسٌ عَصَبِيٌّ.

neurorelapse إِنْكَاسٌ عَصَبِيٌّ. هِجَانٌ مَفَاجِئٌ

للزهرري العصبي ينتج عن عدم كفاءة علاجه بالارسفينامين ويتصف بأعراض عصبية عديدة.

neuroretinitis إِنْتَهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ
وَالشَّبَكِيَّةِ.

neuroretinopathy إِنْتِلَالُ الْقُرْصِ الْبَصَرِيِّ

وَالشَّبَكِيَّةِ. تَوَرُّمُ الْقُرْصِ الْبَصَرِيِّ وَتَكْوِينُ تَرْسِبَاتٍ
فَبَرِينِيَّةٍ وَمَصْلِيَّةٍ فِي الشَّبَكِيَّةِ وَيَحْصُلُ فِي فَرْطِ
ضَغْطِ الدَّمِ الْوَحْمِ.

neuroroentgenography (= neu-
roradiology) عِلْمُ الْأَشْعَةِ الْعَصَبِيَّةِ: التَّصَوُّيرُ
الشَّعَاعِيُّ الْعَصَبِيٌّ.

neurorrhaphy رَفْقُ الْعَصَبِ. خِيَاطَةُ الْعَصَبِ
الْمَقْطُوعِ.

neurosarcocleisis تَشْمِيلُ الْعَصَبِ

بِالْعُضَلَاتِ: التَّضْمِينُ الْعَضْلِيُّ لِلْعَصَبِ. عَمَلِيَّةٌ
تَجْرِي لِمُعَالَجَةِ الْأَلَمِ الْعَصَبِيِّ وَتَجْرِي بِإِزَالَةِ الضَّغْطِ
عَنِ الْعَصَبِ الْمَصَابِ بِالْقَطْعِ الْجَزْئِيِّ لِلْقَنَاةِ الْعَظْمِيَّةِ
الَّتِي يَمُرُّ مِنْهَا وَغَرَسَ الْعَصَبُ فِي النَسِيجِ الرَّخْوِ
لِإِحْدَى الْعُضَلَاتِ الْمَجَاوِرَةِ.

neurosarcoma سَارْكُومَةُ عَصَبِيَّةٌ. سَارْكُومَةُ
تَحْوِي أَنْسِجَةً عَصَبِيَّةً.

neurosciences الْعُلُومُ الْعَصَبِيَّةُ. مَجْمُوعَةُ
الْعُلُومِ الَّتِي تَعْنِي بِدِرَاسَةِ تَطَوُّرِ وَتَنَامِي الْجِهَازِ
الْعَصَبِيِّ وَتَشْرِيحِهِ وَفِيْزْيُولُوجِيَّتِهِ وَكِيْمِيَاثِيَّتِهِ وَعِلْمِ
أَدْوِيَّتِهِ وَمَرْضِيَّاتِهِ وَحَتَّى طَبِّهِ وَأَمْرَاضِهِ النَّفْسِيَّةِ
وَعِلْمِ النَّفْسِ.

neurosclerosis تَصَلُّبٌ عَصَبِيٌّ. تَصَلُّبُ
مَادَّةِ الْعَصَبِ أَوْ الْمَرْكَزِ الْعَصَبِيِّ.

neurosecretion إِفْرَازٌ عَصَبِيٌّ. 1. الْفَعَالِيَّاتُ
الْإِفْرَازِيَّةُ لِلْخَلِيَّةِ الْعَصَبِيَّةِ كِإِفْرَازِ الْهَرْمُونَاتِ
الْمَحْرُورَةِ وَالْفَازُوْبَرِيْسِيْنَ وَالنَّاقِلَاتِ الْعَصَبِيَّةِ
2. الْإِفْرَازَاتُ الَّتِي تُولِّدُهَا هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ.

neurosegmental شَدَفِيٌّ عَصَبِيٌّ. يَنْتَسِبُ
إِلَى زَوْجٍ مِنَ الْجُذُورِ النَّخَاعِيَّةِ الشُّوكِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ
وَالْبَطْنِيَّةِ أَوْ مِنْطَقَةِ الْجِسْمِ الَّتِي تُغْذِيهَا.

neurosensory عَصَبِيٌّ حِسِّيٌّ. مَنْسُوبٌ إِلَى
الْعَصَبِ الْحَسِّيِّ.

neuroses عُصَابَاتٌ. جَمْعُ عَصَابٍ.

neurosis 1. اضْطِرَابٌ نَفْسِيٌّ وَظَلْفِيٌّ
يَتَصَفُّ بِأَعْرَاضٍ خَلَّلَ تَوْتَرَ الذَّاتِ (الْأَنَا) كَالْوَسْوَاسِ
وَنُوبَاتِ الْقَلْقِ وَالرَّهَابِ 2. أَمَّا فِي نَظَرِيَّةِ التَّحْلِيلِ
النَّفْسِيِّ فَهِيَ الْعَمَلِيَّةُ السَّبَبِيَّةُ الَّتِي لَا تُولِّدُ الْعَصَابَ
فَقَطْ (الْمَوْصُوفُ أَعْلَاهُ) بَلْ تُوْدِي أَيْضاً إِلَى
اضْطِرَابَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَاضْطِرَابَاتِ نَفْسِيَّةٍ. وَتُوْدِي
الصَّرَاعَاتِ الْإِلْشَعُورِيَّةِ لِلرَّغَبَاتِ الْمُتَضَارِبَةِ أَوْ
لِلرَّغَبَاتِ الطُّفُولِيَّةِ الْمَكْبُوتَةِ إِلَى تَوَقُّعِ الْإِخْطَارِ مِمَّا
يَسَبِّبُ الْقَلْقَ وَإِلَى آيَاتٍ دِفَاعِيَّةٍ لَا شَعُورِيَّةٍ يَحْسُ
بِهَا الْمَرِيضُ وَالْأَشْخَاصُ الْآخَرِينَ بِشَكْلِ أَعْرَاضٍ
عَصَبِيَّةٍ أَوْ نَزَعَاتِ مَرَضِ الشَّخْصِيَّةِ.

عُصَابُ الْقَلْقِ. عَصَابٌ يَتَصَفُّ بِقَلْقٍ
شَدِيدٍ ظَاهِرٍ وَيَتَطَوَّرُ أحياناً إِلَى الْهَلْمِ وَغَالِباً مَا يَتَرَفَّقُ
مَعَ أَعْرَاضٍ جَسَدِيَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرِ مُرْتَبِطَةٍ مَعَ آيَةٍ
فَعَالِيَّةٍ أُخْرَى.

عُصَابُ التَّعَادِي. حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ
تَتَوَلَّدُ ثَانِيَةً لِحَالَةٍ قَدِيمَةٍ مَعَ كُلِّ خَوَاصِهَا الْجَسَدِيَّةِ
وَالْفِكْرِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ الشَّخْصُ آيَةَ فِكْرَةٍ
مُرْتَبِطَةٍ بِهَا تَمَرُّ بِهَا.

عُصَابٌ قَلْبِيٌّ. وَهْنٌ دَوْرَانِيٌّ عَصَبِيٌّ.

عُصَابٌ أَخْلَاقِيٌّ. اضْطِرَابٌ سُلُوكٍ
الشَّخْصِ أَوْ شَخْصِيَّتِهِ.

عُصَابُ الْفَعْرَكَةِ. اضْطِرَابٌ كَرْبِيٌّ
بَعْدَ الرِّضْحِ وَالْإِصَابَةِ نَتِيجَةً الْعَرَاكِ الْفَعْلِيِّ.

عُصَابٌ تَعْوِيْضِيٌّ. اضْطِرَابٌ
مُصْطَنَعٌ يُولِّدُ الْمَصَابَ بِهِ أَعْرَاضاً إِرَادِيَّةً كَيْ يَحْصَلَ
عَلَى التَّعْوِيْضِ أَوْ التَّمَامِيْنِ أَوْ التَّقَاعِدِ.

compulsion n. (= obsessive
compulsive disorder) عُصَابٌ إِجْبَارِيٌّ.
عَصَابٌ وَسْوَاسِيٌّ قَسْرِيٌّ.

conversion n. (= conversion disorder)
عُصَابٌ تَحْوِيلِيٌّ.

depersonalization n. (= deper-
sonalization disorder) عُصَابٌ يَتَبَدَّدُ
الشَّخْصِيَّةُ: عُصَابٌ جَهْلُ الذَّاتِ.

depressive n. (= dysthymia) عُصَابٌ
إِكْتِنَابِيٌّ.

experimental n. عُصَابٌ تَجْرِيْبِيٌّ. عَصَابٌ يُولِّدُ
فِي الْحَيَوَانَاتِ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا إِلَى التَّنَاقُضَاتِ أَوْ الْخِيْبَةِ
فَيَتَوَلَّدُ لَدَيْهَا عَصَابٌ شَبِيهِ مِمَّا يَصِيبُ الْإِنْسَانَ.

- hypochondriacal n. (= hypochondriasis) المُرَاق؛ عُصَابُ مُرَاقِي. عُصَابُ تَوْفَم المرض.
- hysterical n. (= hysteria) عُصَابُ هِسْتِيرِي؛ عُصَابُ هُرَاعِي. هِسْتِيرِيَا.
- neurasthenic n. (= neurasthenia) وَهَنٌ عَصَبِيّ.
- obsessional n. عُصَابٌ وَسْوَاسِيّ. اضطراب عصبي يتصف بالسواس.
- obsessive compulsive n. (= obsessive compulsive disorder) عُصَابٌ وَسْوَاسِيّ قَسْرِيّ.
- occupational n. عُصَابٌ مِهْنِيّ. عصاب نفسي يعيق المرء عن العمل.
- pension n. (= compensation n.) عُصَابٌ تَغْوِيضِيّ.
- phobic n. (= phobia) عُصَابٌ رَهَابِيّ.
- transference n. عُصَابُ التَحْوُل. ظاهرة تحدث أثناء التحليل النفسي حيث يقوم المريض بتكرار تناقضات طفولته والشعور بأحاسيسها تجاه والديه والتي ينقلها الآن للمحلل النفسي.
- traumatic n. عُصَابٌ رَضَجِيّ. عصاب يتلو الإصابة برضح جسدي أو نفسي.
- vegetative n. (= acrodynia) عُصَابُ إنبَاتِيّ؛ وَجَعُ الْأَطْرَاف.
- war n. عُصَابُ الْحَرْب. الاضطرابات النفسانية التي تصيب بعض المحاربين أثناء المعارك.
- neuroskeletal عَصَبِيّ هَيْكَلِيّ. نسبة للأنسجة العصبية وأنسجة العضلات الهيكلية.
- neuroskeleton (= endoskeleton) الْهَيْكَلُ الدَّاخِلِيّ. الهيكل العظمي والغضروفي للجسم.
- 1. جِسْمُ الْعَصَبِيَّاتِ 2. الْجُسَيْمَاتِ neurosome الْعَصَبِيَّة. 1. جسم الخلية العصبية 2. أي من مجموعة الجسيمات الدقيقة الموجودة في المادة الأساسية لجبلّة العصبون.
- neurospasm تَشَنُّجٌ عَصَبِيّ. النفضان العصبي للعضلة.

- neurosplanchnic عَصَبِيّ حَشَوِيّ. نسبة إلى الجهازين العصبيين الدماغي النخاعي والودي.
- neurospingioma (= glioma) وَرَمٌ دُبْقِيّ.
- neurospingium الْإِسْفَنْجُ الْعَصَبِيّ.
- 1. المكونات الخيطية للعصبونات 2. شبكة من الألياف العصبية خصوصاً الطبقة الشبكية الداخلية لشبكية العين.
- neurosthenia النَشَاطُ الْعَصَبِيّ. الطاقة العصبية المفرطة الإثارة.
- neurosurgeon جِرَّاحُ الْأَعْصَاب. الجراح الذي يجري العمليات على الجهاز العصبي.
- neurosurgery جِرَّاحَةُ الْأَعْصَاب. جراحة الجهاز العصبي.
- functional n. الْجِرَّاحَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْوُظَيْفِيَّة. الجراحة العصبية التي تستهدف إعادة الوظيفة السوية إلى الألياف العصبية أو تحسين جريان الدم إلى الأنسجة العصبية أو تخفيف المرض النفسي.
- neurosuture (= neurorrhaphy) رَفْوُ الْعَصَب.
- neurosyphilis الزهري الْعَصَبِيّ. الزهري الثالثي الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي وهناك نوعان منه المصحوب بالأعراض وديم الأعراض. ويشمل الأول الزهري العصبي السحائي الوعائي والزهري المتني العصبي.
- asymptomatic n. الزهري الْعَصَبِيّ عديم الأعراض. زهري يشخص عند وجود اختبار موجب للسائل الدماغي النخاعي مؤكداً من قبل مختبر بحوث الأمراض الزهرية وعند غياب أية أعراض أو علامات مرضية عصبية خاصة.
- meningovascular n. الزهري الْعَصَبِيّ السَّحَائِيّ الْوَعَائِيّ. زهري يتصف بأفة بؤرية أو سحائية وعائية منتشرة، وتولد الآفات البؤرية الشلل الجانبي أو الاعتلال العصبي الانتقائي أما الآفات المنتشرة فتولد الصداع الوخيم والاضطرابات العقلية والاختلاج.
- parenchymatous n. الزهري الْعَصَبِيّ الْعَتْنِيّ. الزهري يتصف بتخريب منتشر في الأنسجة العصبية المتنية.

- paretic n. (= general paresis) الزهري
العصبي الخزلي؛ الخزل العام.

- tabetic n. (= tabes dorsalis) الزهري العصبي
التابي؛ التابس الظهرى.

neurotagma ترتيب عصبي. ترتيب خطي
للعناصر المتتية للخلية العصبية.

neurotendinous عصبي وترى. منسوب
للعصب وللوتر.

neurotensin نوروتنسين. مادة عزلت من
وطاء البقر توسع الاوعية وتهبط ضغط الدم كما
انها توجد في معى الإنسان وفي دماغه ويعتقد
بانها مادة ناقلة عصبية.

neuroterminal نهاية عصبية. عضو عصبي
انتهائي لعصب طرفي.

neurothele حليلة عصبية. حليلة عصبية
حسية في الأدمة.

neurotic عصابي. منسوب للعصاب أو مصاب
به.

neuroticism (= neurosis) عصاب.

neurotogenic مؤلّد العصاب. عامل يولد
العصاب.

neurotization تجدد العصب. تجدد العصب
بعد قطعه.

neurotmesis تهتك العصب؛ تمزق العصب.
تمزيق أو قطع العصب الكلي أو الجزئي مع تهتك
المحاور وغمدته النخاعيني والانسجة الضامة
المحيطة به ولا يحصل أي تجدد فيه.

neurotology (= neuro-otology) طب
الأذن العصبي. قسم طب الآذان الذي يعني
بأعصابها.

neurotome مبضع العصب. 1. سكين إبري
الشكل لتشريح العصب 2. قسيم عصبي.

neurotomography تصوير مقطعي عصبي.
التصوير المقطعي للجهاز العصبي المركزي.

neurotomy بضع العصب. 1. تشريح العصب
2. القطع الجراحي للعصب.

- radiofrequency n. بضع العصب بالتردد

الإشعاعي. قطع الجذور العصبية بالتخثير بالموجات
الإشعاعية.

- retrogasserian n. (= retrogasserian
rhizotomy) بضع الجذر خلف عقدة الثلاثي
التوائيم.

neurotonia ضعف القوة العصبية. عدم
استقرار قوة الجهاز العصبي الذاتي.

neurotonic منشط عصبي. له تأثير منشط
على الجهاز العصبي.

neurotony مط العصب؛ شد العصب. تمديد
العصب بهدف تفريغ الألم.

neurotoxic سام للعصب. مادة سامة أو
مبيدة للنسيج العصبي.

neurotoxicity سمية عصبية. صفة المادة
في إبادة النسيج العصبي أو تسميمه.

neurotoxin ذيفان عصبي. ذيفان سام
أو مبيد للنسيج العصبي.

neurotransducer تزجاء عصبي. عصبون
يركب ويحرر هرمونات ارتباطية بين الجهاز
العصبي والغدة النخامية.

neurotransmission انتقال عصبي.

العملية التي بواسطتها تطلق الناقلة العصبية التي
تعبر التشابك وتولد تأثيرها في الخلية المستهدفة.

neurotransmitter ناقل عصبي. إحدى
المواد التي تحرر من نهاية محوار العصبون قبل
الاشتباك في الجهاز العصبي المركزي أو
المحيطي عند إثارته وتعتبر هذه المادة الفلح
التشابكي حتى تثير أو تثبط الخلية المستهدفة.
ومن هذه الناقلات العصبية الاسيتيل كولين
والنورابينفرين والايبنفرين والدوبامين والغليسين
والغاما امينو بيوتيريت وحمض الفلوتاميك ومادة
بي والإنكيفالين والإندورفين والسيروتونين.

- false n. ناقل عصبي كاذب. أمين مثل الاوكتوبامين
الذي يمكن أن يخزن ويحرر من الحويصلات قبل
التشابكية ولكن له تأثير ضعيف على المستقبلات بعد
التشابكية.

neurotrauma رضخ عصبي. إصابة آلية
للعصب.

وَهَنْ التَغْذِيَةُ الْعَصَبِيَّةُ. neurotrophasthenia
التغذية المعيبة للجهاز العصبي.

تَغْذِيَوِيَّ عَصَبِيَّ. neurotrophic
منسوب للتغذية العصبية.

التَغْذِيَةُ الْعَصَبِيَّةُ. تغذية الأنسجة neurotrophы
وإدامتها التي ينظمها الجهاز العصبي ويتحكم فيها.

عَصَبِيَّ الْأَلْفَةُ؛ مُوجَّهٌ لِلْعَصَبِ. neurotropic
ذو ألفة انتقائية للنسيج العصبي أو ما يولد تأثيره
الرئيسي على الأنسجة العصبية.

التَّوَجُّهُ الْعَصَبِيَّ. 1. صفة neurotropism
الألفة الانتقائية الخاصة للنسيج العصبي 2. ميل
الآلياف العصبية المتجددة للنمو نحو جزء محيطي
معين.

التَّوَجُّهُ (= neurotropism) neurotropy
العَصَبِيَّ

رَضْحُ (= neurotrauma) neurotrosis
عَصَبِيَّ.

نُتَيْبٌ عَصَبِيَّ. أي من النبيبات neurotubule
المستقيمة والطويلة والمتوازية في داخل العصبون
والتي تكون مع الخيوط العصبية الليفيات العصبية
وهي تشابه النبيبات التي توجد في العديد من
الخلايا خارج الجهاز العصبي.

لِقَاحٌ عَصَبِيَّ. فيروس الجدري neurovaccine
الذي يحضر بتنميته في دماغ الأرنب.

دَوَالِيَةٌ عَصَبِيَّةٌ. حالة تدلي neurovaricose
الآلاف العصب.

لِقَاحٌ (= neurovaccine) neurovariola
عَصَبِيَّ.

عَصَبِيَّ وَعَائِيَّ. منسوب neurovascular
للأعصاب والأوعية أو منسوب للأعصاب التي
تسيطر على أقطار الأوعية الدموية.

عَصَبِيَّ مُسْتَقْلِيٍّ عَصَبِيَّ neurovegetative
إنبائتي. نسبة إلى الجهاز العصبي المستقل.

فَوَعَةٌ عَصَبِيَّةٌ. قدرة العامل neurovirulence
العدواني على توليد تأثير مرضي في الجهاز
العصبي.

فَيْرُوسٌ عَصَبِيَّ. فيروس الجدري neurovirus
الذي يحور بإمراره خلال التسيج العصبي.

neurovisceral (= neurosplanchnic)
عَصَبِيَّ حَشَوِيٍّ.

الْعَصَبِيَّةُ. المضغة المبكرة في دور neurula
تنامي الأنبوب العصبي من الصفيحة العصبية التي
تؤشر أول ظهور للجهاز العصبي للجنين ويكون
ذلك حوالي 19-26 يوماً بعد الإخصاب.

تَكُونُ الْعَصَبِيَّةُ. تكون الصفيحة neurulation
العصبية وانغلاقها وتكون الأنبوب العصبي في
المضغة.

نِيَالَامِيد. دواء يستعمل كمضاد nialamide
للكآبة.

نِيَكُوتِين. قلواني سام يستحصل nicotine
من التبغ أو ينتج صناعياً ويستعمل في التجارب
الفيزيولوجية والدوائية فهو يبنه الجهاز العصبي
الذاتي والاتصالات العصبية العضلية مبدئياً ثم
يثبطها.

نِيَكُوتِينِيَّ. متعلق بالنيكوتين أو nicotinic
يقوم بعمل مشابه له.

إِنْسِمَامٌ نِيَكُوتِينِيَّ. الانسمام nicotinism
بالنيكوتين ويتصف بتنبيه الجهاز العصبي المستقل
مبدئياً ثم بتثبيطه وينتهي بالموت بشلل التنفس.

حَالُ النِيَكُوتِين. مادة تحل nicotinolytic
النيكوتين أو تمنع تأثيره السمي.

رَمَشٌ؛ رَفُّ الْجَفْنِ. (= nictitation) nictation

رَمَشٌ؛ رَفُّ الْجَفْنِ. عملية رف الجفن. nictitation

بُؤْرِيَّةٌ مَرَضِيَّةٌ. منسوب إلى البؤرة nidal
المرضية.

1. بُؤْرَةٌ مَرَضِيَّةٌ 2. نَوَاةٌ. 1. نقطة منشأ nidus
أو بؤرة عملية مرضية 2. مجموعة من الخلايا
العصبية في داخل الجهاز العصبي المركزي لها
ارتباط مباشر مع الآلياف العصبية لأحد الأعصاب
المعينة.

البُؤْرَةُ الْخُطَافِيَّةُ؛ عَشَّ السُّنُونُو. انخساف n. avis
في المخيخ بين الشراع الخلفي ولهاة الدودة وهو
موضع لوزة المخيخ.

البُؤْرَةُ الْخُطَافِيَّةُ: (= n. avis) n. hirundinis
عش السنونو.

nightmare كابُوس. حلم مفزع أو نوبة قلق أثناء الحلم ترافقها استجابة ذاتية معتدلة.

nigra (= substantia nigra) المَاءَةُ السُّودَاءُ

nigrosin نِيغْرُوسِين. صباغ انيليني له الفة شديدة لخلايا العقد العصبية يستعمل كملون لانسجة الجهاز العصبي المركزي.

nigrostriatal سَوْدَاوِيٌّ مُخَطَّطِي. منسوب إلى الالياف التي تمر أو تسقط من المادة السوداء إلى الجسم المخطط.

nihilism الْعَدَمِيَّةُ؛ الْفَيْسِيَّةُ. 1. حالة التشكك بالقيم والمعتقدات التقليدية 2. توهم بعدم وجود الذات أو العالم كله.

- therapeutic n. الْفَيْسِيَّةُ الدَّوَائِيَّةُ. التشكك بالفائدة العلاجية للأدوية أو بالطرق العلاجية.

nikethamide نِيكِيتَامِيد. مادة منبهة مركزية وتنفسية تستعمل كدواء مضاد للخمود التنفسي أو العصبي المركزي أو فشل القلب.

nociassociation تَرَابِطٌ ضَرُورِيٌّ؛ تَدَاعِي الْإِصَابَةِ. إفراغ لا شعوري للطاقة العصبية استجابة للتنبيه بالإصابة كالذي يحصل في حالة الصدمة الجراحية.

nociceptive مُسْتَقْبِلُ الْأَلَمِ. ما يستقبل التنبيه بالإصابة المؤذية ويولد حس الألم.

nociceptor مُسْتَقْبِلَةُ الْأَلَمِ. مستقبلات تنبيه بالأصابة المؤذية فتولد حس الألم.

- polymodal n. مُسْتَقْبِلَةُ الْأَلَمِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْخَوَاصِ. مستقبلات ألم الإحساسات الحرارية أو الكيميائية أو الميكانيكية أو تلك المولدة عن الالتهابات التي تسببها الإصابات المؤذية.

nocifensor دَافِعُ الْأَذَى؛ مُقَاوِمُ الْأَذَى. إحدى مجموعات الأعصاب التي توجد في الجلد والأغشية المخاطية، والتي تدافع عنه ضد الألم والإصابات المؤذية.

noci-influence تَأْثِيرٌ مُؤْذٍ. تأثير يولد المرض أو الإصابة المؤذية.

nociperception إِدْرَاكُ الْأَذَى. إدراك الشخص للمنبهات التي تولدها الإصابات المؤذية.

noctambulation (= somnambulism)

سَيَرٌ نَوْمِي.

noctambulic سَيَرِيٌّ نَوْمِي. منسوب للسير النومي أو مصاب به.

noctiphobia رَهَابُ الظَّلَامِ. الخوف من الظلام أو من الليل.

nocturia بُوَالٌ لَيْلِي. كثرة التبول أثناء الليل.

nodal عُقْدِي. منسوب للعقدة.

node عُقْدَةٌ. (ج: عُقَد). كتلة صغيرة من الأنسجة على شكل ورم أو عقدة أو ناشزة وهي إما أن تكون طبيعية أو مرضية.

- lymph n. عُقْدَةٌ لِيْمْفِيَّة. كتلة أنسجة لمفاوية منظم للعمل كعضو لمفاوي ويتراوح قطره بين 1 و 25 ملمتراً ويوجد على طول مجرى الأوعية اللمفاوية.

- n's. of Ranvier عُقَدُ رَانْفِيَّيْهِ. تضيقات توجد في الالياف العصبية المقعدة وعلى مسافات منتظمة تبعد عن بعضها حوالي المليمتر الواحد وينعدم الميالين في هذه العقد وتغطيها فقط نتوءات من خلايا شفان.

nodule عُقْدِيَّة. (ج: عُقْدَات)؛ عقدة صغيرة.

- n. of cerebellum (= nodulus cerebelli) عُقْدِيَّةُ الْمُخِيخِ.

- n. of vermis (= nodulus cerebelli) عُقْدِيَّةُ الْمُخِيخِ.


nodulus (= nodule) عُقْدِيَّة.

- n. cerebelli عُقْدِيَّةُ الْمُخِيخِ. القسم البطني الأدنى من السطح الذنبي من الدودة والمتصل على جهتيه بالجناح النخاعي الذنبي ويكون القسم المركزي من الفص الندفي العقدي.

- n. vermis (= n. cerebelli) الْعُقْدَةُ الدَوْدِيَّةُ؛ عُقْدِيَّةُ الْمُخِيخِ.

noematachograph مَخْطَاطُ الْعَمَلِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ؛ مُسَجِّلُ سُرْعَةِ التَّفَكُّيرِ. آلة تسجل سرعة القيام بالعمليات الفكرية.

noematachometer مَقْيَاسُ الْعَمَلِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ؛ مَقْيَاسُ سُرْعَةِ التَّفَكُّيرِ. آلة تقيس سرعة القيام بالعمليات الفكرية.



node of Ranvier

عقدة رانفيليه وتنخع الليف العصبي
رسم تخطيطي يبين طبقات النخاعين التي تتولد حول محور الليف العصبي وتوليد عقدة رانفيليه.

noematic فِكْرِيّ. متعلق بالفكر أو بالعمليات النفسية.

noesis (= cognition) اِسْتِفْرَاف؛ تَفْكِير. عملية الإدراك والفكر.

noetic فِكْرِيّ؛ اِسْتِفْرَافِيّ. منسوب للفكر أو للاستعراف.

non compos mentis مُخْتَلُّ الْعَقْل. ذو عقل غير سليم أو غير مالك لقواه العقلية.

nonmedullated (= unmyelinated) عَدِيمُ الْمِيَالِين.

nonmyelinated (= unmyelinated) عَدِيمُ الْمِيَالِين.

non-neuronal عديم العصبونات؛ لا عَصَبُونِيّ. منسوب إلى، أو مكون من، خلايا غير ناقلة في الجهاز العصبي مثل الخلايا الدبقية.

nonus (= hypoglossal nerve) الْعَصَبُ تَحْتَ اللِّسَان.

noradrenaline (= norepinephrine) نُورَادِرِينَالِين.

noradrenergic نُورَادِرِينَالِينِيّ الْفِعْل. ينشط بالنورادرينالين أو يفرزه.

norepinephrine نُورَابِينَفَرِين. أحد الكاتاكول أمينات الطبيعية التي توجد في الجسم وهو هرمون عصبي تحرره الاعصاب الأدرينالينية الفعل بعد العقدة وهو المادة الأساسية للعصبونات

الأدرينالينية الفعل وله نشاط أدرينالي ألفا بصورة رئيسية مع قليل من النشاط الأدرينالي بيتا، كما يفرزه نخاع الغدة الكظرية استجابة للتنبيه الحشوي ويخزن في الحبيبات الأليف الكروم ويحرر منها بصورة عامة عند هبوط ضغط الدم فهو موثر وعائي نشيط ويستعمل دوائياً بشكل ملح ثنائي الطرقات.

1. سَوِيّ؛ طبيعي 2. عِيَارِيّ. 1. منسجم normal مع الأنماط النظامية الثابتة 2. في الكيمياء يعني محلولاً يحوي 1 غرام وزن مكافئ من المادة الفعالة في كل لتر من المحلول.

1. السَوَاء 2. العِيَارِيَّة. 1. حالة normality الانسجام مع الأنماط السوية 2. عدد غرامات الوزن المكافئ في لتر من المحلول.

إِسْوَاء. عملية إعادة الحالة normalization السوية.

سَوِيّ العَمَل. يستجيب بطريقة normergic سوية.

الدِّمَاغُ nosebrain (= rhinencephalon) الشَّمْعِيّ.

nosomania (= hypochondriasis) هَوَسُ المَرَض. اعتقاد خاطئ للمريض بأنه مصاب بأحد الأمراض.

الرَّغْبَةُ بِالْمَرَض. الرغبة في المرض. nosophilia رَهَابُ المَرَض. الخوف من nosophobia المرض.

أَبَابَة. الرغبة للعودة للوطن أو nostalgia للمحيط المألوف.

هَوَسُ الأَبَابَة. الرغبة العارمة nostomania بالعودة إلى الوطن التي لا تقاوم.

مِنْخَر. إحدى فتحتي الأنف الخارجيتين. nostril

أَلَمُ الظَّهْرِ. notalgia (= dorsalgia)

إِنْعِدَامُ مُؤَخَّرِ الرَّأْس. الغياب notancephalia الخلقي لمؤخرة القحف.

إِنْعِدَامُ المَخِيخ. الغياب notanencephalia الخلقي للمخيخ.

ثُلْمَة. انخساف أو تلثم خاصة في إحدى notch حواف العظم أو أحد الأعضاء.

- cerebellar n., anterior (= incisura cerebelli anterior) الثُلْمَة المَخِيخِيَّة الأَمَامِيَّة.

- cerebellar n., posterior (= incisura cerebelli posterior) الثُلْمَة المَخِيخِيَّة الخَلْفِيَّة.

- frontal n. (= incisura frontalis) الثُلْمَة الجَبْهِيَّة.

- tentorial n. (= incisura tentorii) ثُلْمَة الخِيَمَة المَخِيخِيَّة.

notencephalocoele قَبْلَة دماغية قَفَوِيَّة؛ قَبْلَة دِمَاعِيَّة خَلْفِيَّة. بروز الدماغ أو انفثاقه من القسم الخلفي من الرأس.

إِلْتِهَابُ النُّخَاع. التهاب النخاع notomyelitis الشوكي.

ضَار؛ مُؤَذِّ. مؤذ ومخرب للأنسجة. noxious

NREM (non rapid eye movements) غِيَاب الحَرَكَات العَيْنِيَّة السَّرِيعَة. أنظر sleep.

نَوَاة. (ج: نَوَى). 1. نواة الخلية، وهي nucleus جسم كروي في داخل الخلية يتكون من عدد من العضيات وله غشاء نووي رقيق وفيه نوية أو عدة نويات وحبيبات كروماتينية غير منتظمة وخويطات اللابنين والهيوولي النووية 2. مجموعة من الخلايا العصبية توجد في داخل الجهاز العصبي المركزي وتتعلق مباشرة بالياف أحد الأعصاب.

- n. alae cinereae (= n. dorsalis nervi vagi) النَوَاة الجَنَاحِيَّة الرَّمَادِيَّة؛ النَوَاة الظَّهْرِيَّة للغَصَبِ المَبْهَم.

- n. ambiguus (= ambiguous n. = vagoglossopharyngeal n.) النَوَاة المُلْتَبِسَة. النواة التي تتأصل منها الألياف الحركية للأعصاب المبهم واللساني البلعومي والإضافي التي تغذي العضلات المخططة للحنجرة والبلعوم وتتكون من عمود متقطع من الخلايا في وسط الحبل الوحشي للنخاع المستطيل (البصلة) بين نهايتها الذنبية ومستوى خروج العصب اللساني البلعومي.

- amygdaloid n. (= corpus amygdaloi-deum) الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

- n. amygdaliformis of Stilling (= n. subthalamicus) النواة تحت المهادية.

- n. ansae lenticularis نواة العروة العدسية. مجموعة من العصبونات في العروة العدسية عند موضع استدارتها حول الحافة الإنسية للكرة الشاحبة.

- nuclei anteriores thalami (= anterior nuclei of thalamus) النوى الأمامية للمهاد. النوى الثلاث في القسم الأمامي من المهاد وهي النوى الأمامية البطنية والأمامية الظهرية والأمامية الإنسية وثلاثتها تستلم ارتباطات من الجسم الحلمي وترسل أليافها إلى الجسم الحزامي.

- arcuate nuclei of medulla oblongata (= nuclei arcuati medullae oblongatae) النوى المقوسية للبصلة.

- nuclei arcuati medullae oblongatae النوى المقوسية للبصلة. كتل صغيرة غير منتظمة من المادة السنجابية توجد على طول الناحية البطنية الإنسية لهرم النخاع المستطيل (البصلة) وتصلها ألياف واردة من قشرة الدماغ كما أنها ترسل أليافها الصادرة إلى المخيخ بشكل الألياف المقوسة المتصالبة الظاهرة.

- n. arcuatus hypothalami (= n. infundibularis hypothalami) النواة القمعية للوطاء.

- nuclei areae H, H₁, H₂ نوى باحات H, H₁, H₂. مجموعة من النوى في المهاد البطني تحوي نواة الساحة أمام الحمراء (باحة H لفوريل) وعصبونات منتشرة على طول الحزم المهادية والعدسية في باحات H و 2H لفوريل.

- auditory n., large cell (= n. vestibularis lateralis) النواة السمعية الكبيرة الخلايا؛ النواة الدهليزية الوحشية.

- autonomic n. (= n. oculomotoris accessorius) النواة المستقلة؛ نواة محرك العين الإضافية

- basal n. (= n. olivaris) النواة القاعدية؛ النواة الزيتونية. النواة القاعدية.

- basal nuclei النوى القاعدية. مجموعات من الكتل المترابطة من المادة السنجابية توجد في عمق

نصف كرة المخ وفي القسم العلوي من جذع الدماغ وبالرغم من النوى العديدة التي تعتبر من ضمن النوى القاعدية ولكن التسمية التشريحية الرسمية تضم الجسم المخطط (الذي يشمل النواتين المذنبتة والعدسية الشكل) والعائق والجسم الزيتوني والمحفظتين الظاهرة والباطنة.

- Bekhterev's n. (= cranial (superior) vestibular n.) النواة الدهليزية الحقفية.

- Blumenau's n. نواة بلومناو. الجزء الوحشي من النواة المذنبة.

- n. of Burdach's column (= n. cuneatus) النواة الإسفينية.

- n. caeruleus (= n. ceruleus) النواة الزرقاء. تجمع كثيف لعصبونات منصيفة توجد بجوار الموضع الأزرق.

- n. caudalis centralis (= central caudate n.) النواة المذنبة المركزية. تجمع خلوي غير مزدوج في الثلث الذنب من المعقد النووي لمحرك العين ويقع في الرفاء الناصف وبالظهر من النوى الوحشية.

- n. caudatus (= caudate n.) النواة المذنبة. كتلة سنجابية مقوسة طولانية مرتبطة بالبطين الجانبي على كل طولها وتتكون من رأس وجسد وذنب وتكون النواتان المذنبتة وقشرة النواة العدسية وحدة وظيفية واحدة (المخطط الجديد) للجسم المخطط.

- n. centralis lateralis thalami النواة (= lateral central n. of thalamus) الوحشية المركزية للمهاد. إحدى النوى الصغيرة داخل صفيحات المهاد تقع في الجهة الظهرية للصفيحة النخاعية الباطنة.

- n. centralis medialis thalami (= medial central n. of thalamus) النواة الإنسية المركزية للمهاد. إحدى النوى الصغيرة داخل صفيحات المهاد تقع في الجهة الإنسية للصفيحة النخاعية الباطنة.

- central n. of ventral column of spinal cord النواة المركزية للعمود البطني للنخاع. مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية بالمنطقة المركزية للعمود البطني للنخاع الشوكي.

- n. centromedianus thalami

النَّوَاةُ (= centromedian n. of thalamus)
المَرْكَزِيَّةُ النَّاصِفِيَّةُ لِلْمِهَادِ. أكبر نوى داخل صفيحات
المهاد وأقربها لجهته الظهرية الذنبية وترتبط بصورة
رئيسية مع الجسم المخطط.

- nuclei cerebelli (= nuclei of cerebellum)

نَوَى المَخْيِخِ. أربعة تجمعات من المادة السنجابية في
مادة المخيخ البيضاء تتكون من النوى المسننة
والصمية الشكل والكروية والبرحاء.

- n. of cerebellum, dentate (= dentate n.)

النَّوَاةُ المَخْيِخِيَّةُ المُسَنَّنَةُ.

- n. of cerebellum, medullary (= corpus medullare cerebelli)

الجِسْمُ النُّخَاعِيّ لِلْمَخْيِخِ.

- cervical n. (= n. lateralis cervicalis)

النَّوَاةُ الرَّقَبِيَّةُ الوَحْشِيَّةُ.

- n. cinereum (= substantia grisea medullae spinalis)

النَّوَاةُ السِّنْجَابِيَّةُ.

المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

- Clark's n. (= columna thoracica)

الْعَمُودُ

الصدري.

- cleavage n. (= segmentation n.)

النَّوَاةُ

التَشَطُّرِيَّةُ.

- nuclei cochleares (= cochlear nuclei)

النَّوَاتَانِ القَوَّعِيَّتَانِ. النواتان البطنية والظهرية
اللذان تحيطان جزئياً بالسويقة المخيخية السفلية عند
اتصال الجسر والنخاع المستطيل حيث تنتهي فيهما
الياف الفرع القوقعي للعصب الدهليزي القوقعي.

- n. cochlearis anterior (= n. cochlearis ventralis)

النَّوَاةُ القَوَّعِيَّةُ البَطْنِيَّةُ.

- n. cochlearis dorsalis (= dorsal cochlear n.)

النَّوَاةُ القَوَّعِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ. نواة

من خلايا عصبية على الناحية الظهرية من السويقة
المخيخية الذنبية والتي تكون بارزة تدعى الحديبة
السمعية على الجهة الوحشية من الباحة الدهليزية على
قاع البطين الرابع.

- n. cochlearis posterior (= n. cochlearis dorsalis)

النَّوَاةُ القَوَّعِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ.

- n. cochlearis ventralis (= ventral cochlear n.)

النَّوَاةُ القَوَّعِيَّةُ البَطْنِيَّةُ. نواة

من خلايا عصبية على الناحية البطنية الوحشية من
السويقة المخيخية الذنبية والتي تستلم الفروع
المتسلقة الكبيرة من العصب القوقعي.

- nuclei of cochlear nerve (= nuclei cochleares)

النَّوَاتَانِ القَوَّعِيَّتَانِ.

- n. colliculi caudalis (= n. of caudal colliculus)

نَوَاةُ الأَكَيْمَةِ الذَّنْبِيَّةِ. المجموعة

الكبيرة البيضاء الشكل التي تكون معظم مادة الأكيمة
الذنبية.

- n. colliculi inferioris (= n. colliculi caudalis)

نَوَاةُ الأَكَيْمَةِ الذَّنْبِيَّةِ.

- n. commissuralis (= commissural n.)

النَّوَاةُ الصَّوَارِيَّةُ. مجموعة من العصبونات
الادرينالية الفعل التي تحيط بالناحية الظهرية
الوحشية لنواة العصب تحت اللسان والتي تصل حتى
القاع البطني العصبي للبطين الرابع.

- n. corporis geniculati lateralis (= n. of lateral geniculate body)

نَوَاةُ الجِسْمِ
الرُّكْبِيّ الوَحْشِيّ. نواة في داخل الجسم الركبى
الوحشى تتكون من قسم بطني صغير وآخر ظهري
كبير يتكون من ست طبقات متراكزة من الخلايا التي
تستلم اليافاً عابرة وغير عابرة من السبيل البصري
والمترتبة مع القشرة البصرية.

- n. corporis geniculati medialis (= n. of medial geniculate body)

نَوَاةُ الجِسْمِ
الرُّكْبِيّ الإنْسِيّ. نواة في داخل الجسم الركبى الإنسى
تتكون من قسمين ظهري وبطني يستلمان الالياف
السمعية الصاعدة ويسقطانها إلى القشرة السمعية
للمخ.

- nuclei corporis mamillaris mediales et laterales (= lateral & medial nuclei of mamillary body)

نَوَاتَا الجِسْمِ الحَلِيمِيّ الإنْسِيّ
والوَحْشِيَّةِ. النواتان الرئيسيتان للجسم الحلمي
واللذان تستلمان اليافاً من الباحات الشمية القاعدية
والقبر يسقطانها إلى المهاد والدماغ الوسطي بواسطة
الحزمتين الحلمية المهادية والحلمية السقفية.

- n. of corpus striatum, intraventricular

(= n. caudatus) النَّوَاةُ المُذَنَّبِيَّةُ.

- n. cuneatus (= cuneate n.)

النَّوَاةُ الإسْفِينِيَّةُ.

- نواة في النخاع المستطيل عند النهاية الراسية للحزمة الإسفينية حيث تترحل منها الياف هذه الحزمة ثم تسقط الخلايا اليافا إلى المهاد بواسطة الفتيل الإنسي.
- **n. cuneatus accessorius (= accessory cuneate n.)** **النواة الإسفينية الإضافية.** مجموعة من الخلايا العصبية توجد على الجهة الوحشية للنواة الإسفينية تنقل الدفعات من الياف الأطراف العليا في الحزمة الإسفينية إلى المخيخ (السبيل النخاعي المخيخي الراسي) بواسطة الياف المقوسة الظاهرة والسويقة المخيخية السفلية.
- **Darksheвич's n.** **نواة داركشيفيتش.** نواة صغيرة على ظهر الحزمة الطولانية الإنسية للمادة السنجابية المركزية في النهاية الراسية للمسار المخيخي ويعتقد بأنها تستلم اليافاً من الحزمة الطولانية الوحشية ومن الأكمة العلوية.
- **Deiter's n. (= n. vestibularis lateralis)** **نواة دايترس؛ النواة الدهليزية الوحشية.**
- **n. dentatus (= dentate n.)** **النواة المسننة.** أكبر النوى المخيخية العميقة التي توجد في المادة البيضاء للمخيخ مباشرة على الجهة الوحشية للنواة الصماوية الشكل وتستلم الياف خلايا بركنجي من المخيخ الجديد وتكون محاورها معظم الياف السويقة المخيخية القحفية وتسقط بصورة رئيسية على النواة الحمراء بالجهة المقابلة وعلى المهاد.
- **n. dorsalis (= dorsal n. of Clark)** **النواة الظهرية.** (= columna thoracica) العمود الصدري.
- **n. dorsalis corporis trapezoidi (= dorsal n. of trapezoid body)** **النواة الظهرية للجسم المنحرفي.** مجموعة من أجسام الخلايا العصبية توجد على الجهة الظهرية الوحشية للجسم المنحرفي وتستلم اليافاً قوقعية وتشارك في تكوين الجسم المنحرفي والفتيل الوحشي.
- **n. dorsalis nervi glossopharyngei (dorsal n. of glossopharyngeal nerve)** **النواة الظهرية للعصب اللساني البلعومي.** القطب القحفي للنواة الظهرية للعصب المبهم التي يعتقد بأنها تعطي بعض الياف اللاودية إلى العصب اللساني البلعومي ويعتقد البعض بأنها هي النواة اللعابية الذنبية.

- **n. dorsalis nervi vagi (= dorsal nucleus of vagus nerve)** **النواة الظهرية للعصب المبهم.** نواة تتأصل منها الياف اللاودية للعصب المبهم وتوجد في مثلث العصب المبهم في قاع البطين الرابع وعلى الجهة الوحشية لنواة العصب تحت اللسان.
- **n. dorsolateralis (= dorsolateral n.)** **النواة الظهرية الوحشية.** خلايا عصبية متوضعة بالجهة الظهرية وفي القسم الوحشي من معقد نوى العصب محرك العين وهي معزولة تماماً عن النوى البطنية في الثلث الوسطي من هذا المعقد وتعطي اليافاً حركية جسمية.
- **n. dorsolateralis columnae ventralis (= dorsolateral n. of ventral column of spinal cord)** **النواة الظهرية الوحشية للعمود البطني للنخاع.** مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الظهرية الوحشية للعمود البطني للنخاع الشوكي.
- **n. dorsomedialis columnae ventralis (= columnae ventralis medullae spinalis = dorsomedial n. of ventral column of spinal cord)** **النواة الظهرية الإنسية للعمود البطني للنخاع.** مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الظهرية الإنسية للعمود البطني للنخاع الشوكي.
- **Duval's n.** **نواة دوفال.** مجموعة من الخلايا العقدية عديدات الأقطاب توجد على الجهة البطنية الوحشية من نواة العصب تحت اللسان في النخاع المستطيل.
- **Edinger's n. (= Edinger-Westphal n. = n. oculomotorius accessorius)** **نواة إيدنغر؛ نواة محرك العين الإضافية.**
- **n. emboliformis cerebelli (= emboliform n.)** **النواة الصماوية الشكل.** كتلة صغيرة توجد بين النواتين المسنة والكروية وتشارك في تكوين السويقة المخيخية القحفية.
- **end nuclei (= terminal nuclei)** **النوى الإنتائية.**
- **n. entopeduncularis (= entopeduncular n.)** **نواة باطن السويقة.** مجموعة

- من العصبونات الموجودة في المحفظة الباطنة بجوار الحافة الإنسية للكرة الشاحبة وعلى الجهة الظهرية الوحشية للنواة الوطائية الوحشية.
- **n. fastigii (= fastigial n.)** : **النواة الأوجية**: النواة الأكثر إنسية من باقي النوى المخيخية العميقة بالقرب من الخط الوسطي في سقف البطين الرابع وتبرز إلى الجسر والنخاع المستطيل وبصورة خاصة إلى النوى الدهليزية.
- **geniculate n., lateral (= n. corporis geniculati lateralis)** : **نواة الجسم الركبي الوحشية**.
- **geniculate n., medial (= n. corporis geniculati medialis)** : **نواة الجسم الركبي الإنسية**.
- **gingival n.** : **النواة اللثوية**. جزء من المخيخ أثناء الشهرين الرابع والخامس في الجنين.
- **n. globosus cerebelli (= globose n.)** : **النواة الكروية**. نواة مخيخية عميقة تقع بين النواتين الصماوية الشكل والبرحاء (الأوجية) وترسل اليافها خلال السويقة المخيخية القذالية.
- **n. of Goll's column (= n. gracillis)** : **النواة الناجلة**.
- **n. gracillis** : **النواة الناجلة**. نواة في النخاع المستطيل في النهاية الراسية للحزمة الناجلة للنخاع الشوكي حيث تتشابك فيها ألياف هذه الحزمة ثم تسقط الخلايا أليافها إلى المهاد بواسطة الفتيل الإنسي.
- **grav n. (= substantia grisea medullae spinalis)** : **المادة السنجابية للنخاع**.
- **nuclei habenulae medialis et lateralis (= medial & lateral habenular nuclei)** : **نوى العنان الإنسية والوحشية**. مجموعتان من الخلايا العصبية، إنسية ووحشية، تقعان عميقاً في المثلث العناني وتستلمان أليافاً من السطور البصلية للمهاد.
- **n. hypothalamicus anterior (= anterior hypothalamic n.)** : **نواة الوطاء الأمامية**. مجموعة من الخلايا العصبية في المنطقة الأمامية للوطاء.
- **n. hypothalamicus dorsalis (= dorsal hypothalamic n.)** : **نواة الوطاء الظهرية**. مجموعة من الخلايا العصبية في القسم الظهري من المنطقة الوسطية للوطاء.
- **n. hypothalamicus dorsomedialis (= dorsomedial hypothalamic n.)** : **نواة الوطاء الظهرية الإنسية**. مجموعة من الخلايا العصبية توجد في القسم الظهري من المنطقة الوسطية للوطاء.
- **n. hypothalamicus posterior (= posterior hypothalamic n.)** : **نواة الوطاء البطنية الإنسية**. مجموعة من أجسام الخلايا العصبية التي توجد في القسم البطني من المنطقة الوسطية للوطاء تشارك في العديد من الوظائف مثل تناول الطعام والسلوك الجنسي.
- **inferior nervi trigemini (= n. spinalis nervi trigemini)** : **نواة العصب الثلاثي التوائم السفلية**.
- **n. Infundibularis hypothalami (= infundibular. n. of hypothalamus)** : **نواة الوطاء القمعية**. نواة مكونة من خلايا عصبية في المنطقة الخلفية للوطاء تمتد إلى البارزة الناصفية وتحيط بقاعدة القمع بصورة كاملة تقريباً.
- **n. intercalatus** : **النواة المقحمة**: **النواة المُندسة**. مجموعة من الخلايا العصبية بين النواة الظهرية للعصب المبهم ونواة العصب تحت اللسان وتكون جزءاً من المعقد النووي تحت اللساني.
- **n. Intermediolateralis (= intermediolateral n.)** : **النواة المتوسطة الوحشية**. نواة تقع في المادة الوسطية الوحشية في المستويين الصدري والقطني العلوي للنخاع الشوكي وتكون قرونة الوحشية وتعطي خلاياها الألياف الودية قبل العقدية.
- **n. Intermediomedialis (= Intermediomedial n.)** : **النواة المتوسطة الإنسية**. نواة مكونة من خلاياها منتشرة تقع في المادة الوسطية المركزية وبالجهة الإنسية من النواة الوسطية الوحشية، وهي أكثر بروزاً في النخاع الشوكي الرقبي ويعتقد بأن ارتباطاتها حسية عميقة شوكية.

- **n. interpeduncularis (= interpeduncular n.)** النواة بين السويقتين. نواة تقع بين السويقتين المخيتين وعلى الجهة الظهرية من الحفرة بين السويقتين مباشرة وتستلم الحزمة المنعطفة للخلف.

- **n. Interstitialis (= interstitial n.)** النواة الخلالية. نواة النهاية الراسية للحزمة الطولانية الإنسية في سقيفة الدماغ المتوسط وارتباطها الوحيد هو ارتباط متبادل مع النوى الدهليزية كما أنها تسقط اليافها على النخاع الشوكي.

- **nuclei intralaminares thalami** نوى المهاد داخل الصفائح. نوى في داخل الصفائح النخاعية الداخلية للمهاد متوضعة بين النواة الظهرية لوحشية من فوق والنواة الوحشية الخلفية من تحت وتحوي النوى المركزية الناصفية وجنوب الحزمة والنواتين المركزيتين الوحشية والإنسية.

- **Kaiser's nuclei** نوى كيزر. نوى طولانية حركية في التضخمات الرقبية والقطنية للنخاع الشوكي بين العمودين الوسطي الوحشي والناصف.

- **n. lateralis cervicalis (= lateral cervical n.)** النواة الرقبية الوحشية. مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية توجد في الحبل الوحشي للشذفتين العنقيتين الأولى والثانية للنخاع الشوكي وتكون محطة ترحيل في السبيل النخاعي الرقبي المهادي.

- **n. lateralis medullae oblongatae (= lateral nucleus of medulla oblongata)** النواة الوحشية للبصلة. نواة في المادة الشبكية للنخاع المستطيل (البصلة) على الجهة الظهرية الوحشية للنواة اللوزية وهي ترخل الدفعات النخاعية المارة إلى المخيخ.

- **n. lemnisci lateralis (= n. of lateral lemniscus)** نواة الفتيل الوحشي. مجموعات خلوية عصبية متعددة ومنتشرة في طريق الفتيل الوحشي في الجسر.

- **n. lentiformis (= lenticular n.)** النواة العدسية. قسم الجسم المخطط الشبيه بالعدسة المحدة الوجهين وتنقسم إلى القسمين الظاهر الأكبر والوحشي وهو القشرة، وإلى الأصفر الباطن والإنسي

والافتح لوناً وهو الكرة الشاحبة التي تنقسم بدورها إلى قسم إنسي صغير وقسم وحشي كبير بواسطة الصفيحة النخاعية الإنسية.

- **n. of Luys (= n. subthalamicus)** نواة لويز؛ النواة تحت المهاد.

- **n. magnocellularis (= n. vestibularis lateralis)** النواة الدهليزية الوحشية.

- **n. medialis dorsalis thalami (= dorsal medial n. of thalamus)** النواة الظهرية الإنسية للمهاد. أكبر نوى المهاد الإنسية لها قسم رأسي ضخم الخلايا وقسم ذنبى وحشي صغير الخلايا ويكون كلاهما ارتباطات واسعة مع معظم نوى المهاد الأخرى.

- **nuclei mediales thalami (= medial nuclei of thalamus)** النوى الإنسية للمهاد. مجموعة من الخلايا العصبية توجد بين الصفيحة النخاعية الباطنة على الجهة الوحشية وتسقط اليافها نحو البطانة العصبية للبطين الثالث على جهتها الإنسية وهي تشمل النواة الكبيرة الوحشية الظهرية والعديد من النوى الصغيرة المجهولة الأهمية والارتباطات.

- **nuclei of median raphe (= nuclei raphe medullae oblongatae)** نواة الرفاء الناصف؛ نوى رفاء البصلة.

- **nuclei mediani thalami (= median nuclei of thalamus)** النوى الناصفية للمهاد. مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية اللانوعية المنتشرة في المادة السنجابية حول البطين وتصل القسم الإنسي من المهاد عن البطانة العصبية للبطين الثالث وتكون جزئياً الالتصاق بين المهادين وتشتمل هذه المجموعة على النوى المجاورة للبطين الأمامية والخلفية والنوى المعينية والارتباطية.

- **n. mesencephalicus nervi trigemini (= mesencephalic n. of trigeminal nerve)** نواة الدماغ المتوسط للعصب الثلاثي التوائم. عمود رفيع من الخلايا العصبية في القسم الوحشي من المادة السنجابية المركزية للجزء الراسي من البطين الرابع والسويقة المخية وهو الموقع الوحيد في الجهاز العصبي المركزي للعصبونات الحسية الأولية وتشبه خلاياه خلايا عقدة الجذر الظهرية وتوصل فروعها المحيطة التي تكون السبيل الدماغى

- المتوسط دفعات الحس العميق أما فروعها المركزية فلها ارتباطات مخيخية وجذعية دماغية واسعة وتشمل النواة الحركية لثلاثي التوائم.
- **Monakow's n.** **نَوَاةٌ مُوَنَّاكُوف.** القسم الوحشي للنواة الإسفينية
- **motor n.** **نَوَاةٌ حَرَكَيةٌ.** أي من التجمعات الخلوية العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تجهز أليافاً عصبية حركية للأعصاب.
- **n. motorius nervi trigemini (= motor n. of trigeminal nerve)** **النَوَاةُ الحَرَكَيةُ للعَصَبِ الثَلَاثِيّ التَوَائِم.** النواة التي تتصلب منها الألياف الحركية للعصب الثلاثي التوائم وتقع في القسم الظهري الوحشي من الجسر وعلى الجهة الإنسانية مباشرة للنواة الحسية الرئيسية وللجذر الحسي الداخل.
- **n. nervi abducentis (= n. of abducent nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ المُبْعِد.** النواة التي يتصلب منها العصب المبعد وتقع في القسم السفلي من الجسر وتكون القسم الوحشي من الأكمة الوجهية في قاع البطين الرابع وتكون ألياف العصب الوجهي عروة معقدة حولها.
- **n. nervi accessorii (= n. of accessory nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الإِضَافِيّ.** مجموعة غير منتظمة الشكل من الخلايا العصبية تتكون من دخول محاور الخلايا العصبية التي تدخل القسم النخاعي من العصب الإضافي وتوجد في الحافة البطنية من العمود البطني من النخاع الشوكي في موضع متوسط أو مركزي.
- **nuclei nervorum cranialium (= nuclei of cranial nerves)** **نَوَى الأَعْصَابِ القَحْفِيَّة.** مجموعات الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تجهز أو تنقل أو تستلم النبضات من المكونات الحركية أو الحسية للأعصاب القحفية.
- **n. nervi facialis (= n. of facial nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الوَجْهِيّ.** النواة التي تتصلب منها الألياف الحركية للعصب الوجهي والتي تغذي عضلات الوجه التعبيرية وتقع هذه النواة في القسم البطني الوحشي للقسم السفلي من الجسر وتكون الألياف الصادرة منها عروة معقدة حول نواة العصب المبعد.
- **n. nervi glossopharyngeal (= n. of glossopharyngeal nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ اللِّسَانِيّ البَلْعُومِيّ.** نواة أصل وانتهاء العصب اللساني البلعومي تقع في النخاع المستطيل وتشمل النواة الإلحابية السفلية والنواة الملتبسة (قسمها الراسي) ونواة السبيل المفرد.
- **n. nervi hypoglossal (= n. of hypoglossal nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَان.** نواة أصل العصب تحت اللسان التي تكون عموداً في المادة السنجابية المركزية للبارزة الإنسية من تحت مستوى الزيتونة السفلية حتى القسم العلوي للنخاع المستطيل (البصلة).
- **n. nervi oculomotorii (= n. of oculomotor nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ المُحَرِّك.** نواة أصل ألياف العصب المحرك للعين تقع في سقيفة الدماغ المتوسط على الجهة البطنية المباشرة للمادة السنجابية المركزية حيث تكون مجموعة خلاياها معقداً بين الحزم الطولانية الإنسانية. ويتكون المعقد من مجموعتين وحشيتين مزدوجتين ومجموعة مفردة ناصفية ومجموعتين ظهريتين مستقلتين (لا وديتين) مزدوجتين. وتغذي المجموعة الجسدية العضلة رافعة الجفن العلوي وكل عضلات العين الخارجية ما عدا العضلتين المستقيمتين الوحشية والمائلة العلوية. وتغذي المجموعة المستقلة المستقلة الهدبية ومصرة الحدقة.
- **n. nervi phrenici (= n. of phrenic nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الجِجَابِيّ.** مجموعة من الخلايا العصبية مركزية التوضع في المادة السنجابية للعمود البطني للنخاع الشوكي تمتد من الشدفة الرقبية الثالثة حتى السابعة وتغذي الحجاب الحاجز.
- **nuclei nervi trigemini (= nuclei of trigeminal nerve)** **نَوَى العَصَبِ الثَلَاثِيّ التَوَائِم.** نوى تتوضع بصورة رئيسية في الجسر والنخاع المستطيل وكذلك في الدماغ المتوسط والنخاع الرقبي العلوي.
- **n. nervi trochlearis (= n. of trochlear nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ البَكَرِيّ.** نواة أصل الألياف الحركية للعصب البكري تقع في المادة السنجابية المركزية على السطح الظهري للحزمة الطولانية الإنسانية في القسم السفلي من الدماغ المتوسط.

- **n. nerve vagi (= n. of vagus nerve)** **نَوَاةُ الْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.** نواة بداية ونهاية العصب المبهم تقع في النخاع المستطيل وتشمل النوى الظهرية والملتبسة ونواة السبيل المفرد.

- **nuclei nervi vestibulocochlearis** **نَوَى الْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ الْقَوَقَعِيِّ.** نوى أصل الألياف الحسية للفرعين الدهليزي والقوقعي للعصب القحفي الثامن وتشمل النواتين القوقعيتين الظهرية والبطنية والنوى الدهليزية الإنسية والوحشية والسفلية والعلوية.

- **n. oculomotorius accessorius** **النَّوَاةُ الْإِضَافِيَّةُ (= accessory oculomotor n.)** **لِمَحْرَكِ الْعَيْنِ.** مجموعة من الخلايا الصغيرة التي تقع بالجهة الظهرية من القسم العلوي من المجموعات الجسدية من معقد نوى المحرك للعين والتي تشمل الألياف اللاودية الصادرة خلال العقدة الهدبية للعضلة الهدبية ولمصرة الحدقة.

- **n. olivaris accessorius dorsalis** **النَّوَاةُ (= dorsal accessory olivary n.)** **الرَّيْتُوْنِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.** شريط الخلايا الذي يقع على ظهر النواة الزيتونية الذنبية وتسقط اليافاً إلى الجهة المعاكسة من المخيخ وخصوصاً لدودته.

- **n. olivaris accessorius medialis** **النَّوَاةُ (= medial accessory olivary n.)** **الرَّيْتُوْنِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.** شريط المادة السنجابية الذي يقع على الجهة الإنسية من النواة الزيتونية الذنبية والذي يسقط اليافاً إلى الجهة المعاكسة من المخيخ وخصوصاً لدودته.

- **n. olivaris accessorius posterior (= n. olivaris accessorius dorsalis)** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.**

- **n. olivaris caudalis (= caudal olivary** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ.** شريط مطوي من المادة السنجابية يضم لباً أبيض (نقيير النواة الزيتونية الذنبية) ويكون حدية على البصلة (النخاع المستطيل) يسمى «الزيتونة» وهو معقد نووي يستلم إسقاطات كثيفة من النخاع الشوكي والدماغ المتوسط وقشرة المخ ويرسل اليافاً عن طريق السويقة المخيخية الذنبية المعاكسة جزئياً إلى الدودة ولكن بصورة رئيسية إلى المخيخ الجديد.

- **n. olivaris rostralis (= rostral olivary** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الرَّأْسِيَّةُ.** شريط من المادة السنجابية يقع بالجهة الوحشية عند مستوى الاتصال الجسري النخاعي الشوكي وأعلى من النواة الزيتونية السفلية وتكوّن اليافه السبيل الزيتوني القوقعي.

- **olivary n. (1. = n. olivaris caudalis** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ 2. oliva)** **الزيتونة.**

- **nuclei originis (= nuclei of origin)** **نَوَى** المنشأ. مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي تتبع منها الألياف العصبية الحركية أو الصادرة للأعصاب القحفية.

- **Pander's n. (= n. subthalamic)** **نَوَاةُ باندر:** النَّوَاةُ تَحْتَ الْمِهَادِ.

- **n. paracentralis thalami (= paracentral** **النَّوَاةُ الْمِهَادِيَّةُ المجاورة** **n. of thalamus)** **لِلْمُرَكَّزِ.** إحدى النوى الصغيرة من نوى داخل الصفائح المهادية للمهاد الظهري تقع على الجهة البطنية الوحشية للنواة الظهرية الإنسية وعلى الجهة الإنسية للنواة المركزية الوحشية.

- **n. parafascicularis thalami (= para** **النَّوَاةُ الْمِهَادِيَّةُ** **fascicular n. of thalamus)** **المجاورة لِلْحَزْمَةِ.** إحدى النوى الصغيرة من نوى داخل الصفائح المهادية للمهاد وتقع على الجهة الإنسية للنواة المركزية الناصفية وبالجهة البطنية للنواة الظهرية الإنسية.

- **n. paramedianus dorsalis (= dorsal** **النَّوَاةُ الظَّهْرِيَّةُ المجاورة** **paramedian n.)** **لِلنَّاصِفِ.** مجموعة من الخلايا العصبية تقع بالقرب من السطح الظهري للنخاع المستطيل مكونة جزء من المعقد النووي حول تحت اللساني.

- **n. parasolitaris (= parasolitary n.)** **النَّوَاةُ المجاورة لِلْمُفْرَدَةِ.** تجمع خلايا عصبية يقع على الجهة البطنية الوحشية للنواة المفردة.

- **nuclei parasympathici sacrales** **النَّوَى (= parasympathetic sacral nuclei)** **العَجْزِيَّةُ الْأَوْدِيَّةُ.** مجموعة من الخلايا العصبية التي توجد في قسيمات النخاع الشوكي العجزية الثانية

حتى الرابعة وتقع على الجهة الوحشية من القناة المركزية والمادة الجلاتينية المركزية بين قاعدتي العمودين السنجابين البطني والظهري وهذه الخلايا هي مصدر الألياف اللاودية العجزية قبل العقدية.

- n. paraventricularis hypothalami

(= paraventricular n. of hypothalamus)

النواة الوطائية المُجاوِرة للبُطين. شريط محدد من الخلايا العصبية في جدار البطين الثالث في القسم الأمامي من منطقة الوطاء ولمعظم خلاياها وظيفة إفرازية عصبية وتفرز الأوسيتوسين الذي ينقل إلى الفص الخلفي للغة النخامية بواسطة ألياف السبيل المجاورة للبطيني - النخامي.

- n. periventricularis posterior

النواة (= posterior periventricular n.)

حول البُطين الخَلْفِيَّة. نواة من الخلايا العصبية في المنطقة الوطائية المتوسطة تقع في القسم الخلفي من البطين الثالث.

- Perlia's n.

نواة بِيْرْلِيَا. مجموعة من الخلايا العصبية في الخط الوسطي لنواة محرك العين يعتقد بأن لها علاقة بتقريب العينين

- nuclei pontis (= pontine nuclei)

النوى الجَسْرِيَّة. كتل من الخلايا العصبية منتشرة خلال القسم البطني من الجسر تنتهي فيها الألياف الطولانية للجسر وتعبّر محاورها بدورها إلى الجهة المعاكسة وتولد السويقة المخيخية الوسطية التي تنقل الألياف إلى المخيخ الجديد.

- n. pontinus nervi trigemini (= pontine

النواة الجَسْرِيَّة للعَصَب الثلاثي التوائم. نواة انتهاء الألياف الواردة للعصب الثلاثي التوائم والتي تحمل نبضات حس للمس والضغط وتقع في القسم الظهري الوحشي من وسط الجسر مباشرة على الجهة الوحشية لمدخل جذور ألياف العصب الثلاثي التوائم.

- nuclei posteriores thalami

النوى (= posterior nuclei of thalamus)

الخَلْفِيَّة للمهاد. النوى التي تكوّن النهاية الخلفية لظهر المهاد والتي تحوي الوسادة والنوى الوحشية والإنسية للجسمين الركبيين.

- nuclei preoptici medialis et lateralis

(= medial & lateral preoptic nuclei)

النوى الإنسيَّة والوَخْشِيَّة أمام العَيْنِيَّة. تجمع من الخلايا العصبية في القسمين الإنسي والوحشي في المنطقة الوطائية الأمامية.

- n. of prerubral field

مجموعات من العصبونات منتشرة على طول الحافة الذنبية الإنسية للمنطقة العائرة في ساحة فوريل H.

- n. pretectalis (= pretactal n.)

النواة أمام السَّقْف. كتلة غير محددة من الخلايا العصبية في المنطقة أمام السقف تستلم الدفعات العصبية من السبيل البصري وتسقطها إلى النواة الإضافية لنواة العصب المحرك للعين وتكوّن مركز الدماغ المتوسط لنعكس الحدة الضوئي.

- n. proprius

النواة المَخْصُوصَة. عمود من العصبونات الكبيرة تمتد خلال القرن الظهري للنخاع الشوكي على الجهة البطنية من المادة الجلاتينية.

- n. pulposus disci intervertebralis

النواة اللبنيَّة للقرص بَيْن الفقرتين. كتلة شبه سائلة من الألياف دقيقة بيضاء ومرنة تكوّن الجزء المركزي للقرص بين الفقار وتعتبر الجزء المتبقي من الحبل الظهري الجنيني.

- nuclei pulvinares thalami

النوى الوَسَادِيَّة. النوى التي تكون الجسم الوحشي البارز للمهاد. الوسادة للنهاية الخلفية للمهاد (الوسادة).

- pyramidal n. (= n. olivaris accessoris

medialis) النواة الزَيْتُونِيَّة الإنسيَّة الإضافية.

- n. radialis descentis nervi trigemini

(= n. tractus mesencephalicus nervi trigemini) نواة السبيل الدُمَاعِي المَتَوَسِّط للعَصَب الثلاثي التوائم.

- nuclei raphae medullae oblongatae

نوى رَفَاء البَصَلَة. نوى شبكية متجمعة في صفائح عمودية ضيقة على طول المستوى الناصف للنخاع المستطيل (البصلة) وللجسر والدماغ المتوسط وتحوي البعض من خلاياها مادة السيروتونين.

- red n. (= n. ruber)

النواة الحُمْراء.

- reticular n., lateral (= n. lateralis

medullae oblongatae) النواة الوَخْشِيَّة للبَصَلَة.

- n. reticularis tegmenti النواة الشبكية السقيفية. نواة في سقيفة الجسر تستلم اليافاً من قشرة المخ والدماغ المتوسط وترسل اليافاً إلى المخيخ الجديد عن طريق السويقة المخيخية الوسطية.

- n. reticularis thalami (= reticular n. of thalamus) النواة الشبكية المهادية. طبقة خفيفة من الخلايا على السطح الوحشي للمهاد في داخل وخارج الصفيحة النخاعية الظاهرة.

- n. retrodorsolateralis columnae ventralis medullae spinalis (= retrodorsolateral n. of ventral column of spinal cord) النواة الخلفية الظهرية الوحشية للعمود البطني للنخاع. مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الخلفية الظهرية الوحشية للعمود البطني للنخاع الشوكي والتي تغذي عضلات الأصابع.

- Roller's n. نواة رولر. 1. نواة تحت اللساني. 2. خلايا توجد بالقرب من نقيز النواة اللوزية.

- roof nuclei النوى السقيفية. مصطلح يستعمل أحياناً للدلالة على نوى المخيخ لأن بعضها يقع بالقرب من سطح البطين الرابع للدماغ.

- n. ruber (= red n.) النواة الحمراء. نواة بيضوية مميزة (وردية حمراء اللون في النماذج الحديثة من الدماغ بسبب وجود صبغ حاد للحديد في العديد من خلاياها) وهي متوضعة في منطقة مركزية في التكوين الشبكي في أعلى الدماغ المتوسط وتستلم اليافاً من النوى المخيخية العميقة وقشرة الدماغ وترسل اليافاً إلى المخيخ وجذع الدماغ والنخاع الشوكي ولربما إلى المهاد أيضاً وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما ضخم الخلايا والآخر صغير الخلايا.

- n. salivatorius caudalis (= caudal salivatory n.) النواة اللعابية الذنبية. القسم الذنبى لعمود الخلايا المنتشرة في القسم الظهري الوحشي للتكوين الشبكي في أسفل الجسر وأعلى النخاع المستطيل (البصلة) وتكون خلاياه مصدر الألياف اللاودية للعصب اللساني البلعومي التي تغذي الغدة النكفية.

- n. salivatorius rostralis (= rostral salivatory n.) النواة اللعابية الرأسية. عمود غير محدد من الخلايا العصبية التي تنتشر في القسم

الظهري الوحشي للتكوين الشبكي لظهر الجسر والتي تصدر الألياف اللاودية للعصب الوجهي التي تغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية وتحت اللسانية وتحت الفككية وتتواصل هذه النواة مع اللعابية الذنبية.

- n. of Sappey (= n. ruber) نواة سابي: النواة الحمراء.

- Schwalbe's n (= n. vestibularis medialis) نواة شفالبي: النواة الدهليزية الإنسية.

- sensory n. نواة حسية. نواة نهايات الألياف الواردة (الحسية) للأعصاب المحيطية.

- n. solitarius (= solitary n.) النواة المفردة.

نواة نهايات الألياف الحشوية الواردة للأعصاب الوجهي واللساني البلعومي والمبهم والتي تدخل السبيل المفرد وهي تحيط بالسبيل المفرد وتتصل النهايات الذنبية لنواتي الجانبين ببعضهما البعض.

- spherical n. (= n. globosus) النواة الكروية.

- n. spinalis nervi accessorii (= spinal n. of accessory nerve) النواة النخاعية للعصب الإضافي.

مجموعة الخلايا العصبية في المستويات الخمسة أو الستة الرقبية العلوية التي تكون الجذور النخاعية للعصب الإضافي.

- n. spinalis nervi trigemini (= spinal n. of trigeminal nerve) النواة النخاعية للعصب الثلاثي التوائم.

عمود من الخلايا التي تتوضع على طول الناحية الجانبية للسبيل النخاعي الشوكي ويمتد من مستوى دخول العصب الثلاثي التوائم إلى الجسر حتى القسيمة الرقبية الثانية حيث يتواصل مع العمود السنجابي الظهري وينقسم هذا العمود إلى مجموعات خلوية متعددة وتنتهي فيها الألياف السبيل النخاعي للعصب الثلاثي التوائم.

- Spitzka's n. (= Perlia's n.) نواة سبيتسكا: نواة بيرليا.

- Stilling's n. (= columna thoracica) نواة ستيلنج: العمود الصدري.

- Stilling's sacral n. (= sacral n.) النواة العجزية.

- n. subcaeruleus (= n. subceruleus) النواة تحت الزرقاء. مجموعة من العصبونات

المجاورة للنواة الزرقاء في العمود الشبكي الوحشي
الصغري الخلايا في القسم الامامي من الجسر.

- subependymal n. (= dorsal cochlear n.)
النواة تحت البطانة العصبية: النواة القوقعية
الظهرية.

- sublingual n. نواة تحت اللساني.
واضحة التحديد تقع إلى الجهة البطنية من نواة
العصب تحت اللسان وتكون جزءاً من المعقد النووي
حول تحت اللساني.

- n. subthalamicus (= subthalamie n.)
النواة تحت المهاد. كتلة من مادة سنجابية محدبة
الوجهين على الجهة الإنسية من موصل المحفظة
الباطنة مع الساق المخية وترتبط ارتباطاً رئيسياً مع
الكرة الشاحبة.

- n. supraopticus hypothalami (= supra-
optic n. of hypothalamus) النواة الوطائية
فوق البصرية. نواة محددة بوضوح مكونة من خلايا
عصبية تقع في المنطقة الوطائية الامامية مباشرة فوق
القسم الوحشي من التصالبة البصرية والعديد من
خلاياها إفرازية عصبية تفرز الهرمون مضاد للإبالة
الذي يحمل إلى الفص الخلفي للنخامية بواسطة الياف
السييل فوق البصري - النخامي كما توجد فيها خلايا
مستقبلات التناضح التي تستجيب لارتفاع الضغط
التناضحي الأمر الذي يحفز تحرير هرمون مضاد
الإبالة من الفص الخلفي للنخامي.

- n. taeniaeformis (= corpus amyg-
daloideum) الجسم اللوزي.

- n. tecti (= n. fastigi) النواة
الأوجية.

- nuclei tegmenti (= tegmental nuclei)
النوى السقيفية. عدة كتل نووية توجد في التكوين
الشبكي للجسر والدماغ المتوسط خاصة في الأخير
منها حيث تتوضع بالقرب من السويقتين المخيخيتين
القحفييتين.

- nuclei terminationis (= terminal
nuclei) النوى المطرافية: النوى الإنتهائية.
مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي
المركزي تتشابه عليها محاور العصبونات الواردة
الأولية للعديد من الاعصاب القحفية.

- thoracic n. (= columna thoracica)
النواة الصدرية: العمود الصدري.

- nuclei of trigeminal nerve نوى العصب
الثلاثي التوائم.

- nuclei tuberis lateralis (= lateral
tuberal nuclei) النوى الحديبة الوحشية.
نوى خلايا عصبية تقع على الجهة البطنية للمنطقة
الوطائية المتوسطة وبصورة رئيسية في الباحة
الوطائية الوحشية.

- n. vagalis dorsalis النواة المبهمية الظهرانية.

- n. ventralis corporis trapezoidei النواة
البطنية للجسم المنحرفي. مجموعة من الخلايا
العصبية متداخلة مع الياف الجسم المنحرفي على
الجهتين البطنية والظهرية للنواة الزيتونية العليا وهي
تشارك في تجهيز الياف للفتيل الوحشي.

- n. ventralis intermedius thalami (= n.
ventralis lateralis thalami) النواة البطنية
الوحشية للمهاد.

- nuclei ventrolaterales thalami
(= ventrolateral nuclei of thalamus)

النوى البطنية الوحشية للمهاد. مجموعة كبيرة من
النوى المتوضعة بين الصفيحة النخاعية الباطنة
والمحفظة الباطنة وتنقسم إلى قسم بطني كبير وآخر
وحشي صغير. ويتكون القسم البطني من النوى
البطنية الامامية والبطنية الوحشية والبطنية الإنسية
والبطنية الخلفية والبطنية الخلفية الوحشية والبطنية
الخلفية الإنسية وتختص هذه النوى بترحيل الدفعات
العصبية إلى مناطق معينة في قشرة المخ أما القسم
الوحشي فإنه يتكون من التويتين الوحشية الخلفية
والظهرية الوحشية. ترتبط الأولى منهما مع التلفيف
الحزامي أما الثانية فلها ارتباطات واسعة مع قشرة
المخ.

- n. ventromedialis (= ventromedial n.)
النواة البطنية الإنسية. خلايا عصبية متوضعة في
القسم الوحشي البطني للمعقد النووي لمحرك العين
وهي تختلف تماماً عن الخلايا المتوضعة في الثلث
الوسطي من القسم العلوي من هذا المعقد والتي لها
وظائف حركية.

- nuclei vestibulares (= vestibular
nuclei) النوى الدهليزية. الكتل الخلوية الأربع

التي توجد في قاع البطين الرابع وهي النواة الراسية أو القحفية أو العلوية والنواة الإنسية والنواة الوحشية والنواة الذنبية أو السفلية حيث تنتهي عندها الفروع القصيرة الصاعدة والطويلة النازلة من الجزء الدهليزي من العصب الثامن وهي تستلم إسقاطات مخيخية، كما أنها تكون جهازاً عصبياً حسياً خاصاً واسع الانتشار عن طريق إسقاطاتها إلى النوى الحركية العديدة في جذع الدماغ والنخاع الشوكي الرقبى بواسطة الحزم الطولانية الإنسية من كل النوى الدهليزية إلى المخيخ (وبصورة رئيسية من النواتين الذنبية والإنسية) وإلى الخلايا الحركية على طول النخاع الشوكي (من النواة الوحشية) كما تعطي اتصالات إضافية لعمليات الإدراك الواعي والاستجابات الذاتية للتنبيهات الدهليزية.

- **n. vestibularis caudalis (= caudal vestibular n.)** النواة الدهليزية الذنبية. نواة خلايا عصبية تتوضع على الجهة الوحشية من النواة الإنسية وتقع بينها وبين السويقة المخيخية الذنبية.
- **n. vestibularis lateralis (= lateral vestibular n.)** النواة الدهليزية الوحشية. نواة تتكون من خلايا عصبية كبيرة عديدة الفروع وتتوضع على الجهة الراسية من النواة الدهليزية الذنبية مباشرة وتتواصل نهايتها العلوية مع النواة الدهليزية القحفية وتسمى أيضاً نواة ديتر.
- **n. vestibularis medialis (= medial vestibular n.)** النواة الدهليزية الإنسية. نواة من الخلايا العصبية تتوضع في قاع البطين الرابع وتمتد إلى الأعلى من النخاع المستطيل والجسر.
- **n. vestibularis rostralis (= rostral vestibular n.)** النواة الدهليزية الرأسية. نواة من الخلايا العصبية تتوضع فوق النواة الدهليزية الوحشية وهي إما أن تكون بمستوى داخل القحف وتسمى عند ذاك النواة الدهليزية القحفية أو أن تكون دون مستوى القحف وتسمى عند ذاك النواة الدهليزية النخاعية.
- **vestibulocochlear nuclei (= nuclei nervi vestibulocochlearis)** النوى الدهليزية القوقعية.
- **Volt's n.** نواة فويت. نواة مخيخية إضافية للنواة الذنبية.
- **Westphal's n. (= n. oculomotorius)**

- accessorius** نواة ويستفال: النواة الإضافية لمحرك العين.
- nudomania** هوس الثُعْرَي. الرغبة الشاذة بالتعري.
- nudophobia** رهَابُ الثُعْرَي. الخوف الشاذ من التعري.
- numbness** تنَمُل. فقدان أو قلة الحس في أحد أقسام الجسم.
- nunnation** نَأْنَاءة. كثرة استعمال حرف النون في الكلام.
- nutation** إنغاض؛ إحناء الرأس. الاهتزاز المتكرر اللاإرادي للرأس.
- nutrient** مُغْذِي. ما يغذي أو يوفر الغذاء أو المادة المغذية كالطعام.
- nyctalgalia** أَلَمٌ نَوْمِي. ألم يشعر به المريض أثناء النوم فقط.
- nyctalopia** عَمْسِي؛ عَمْسَاوَة. عمى ليلي، عدم الرؤية الجيدة أثناء الليل أو في المحلات المظلمة أو قليلة الإضاءة.
- nyctaphonia** صَمَاتٌ لَيْلِي. عدم القدرة على الكلام أثناء الليل.
- nyctophilia** الْوَلَعُ بِاللَّيْلِ. تفضيل الليل على النهار.
- nyctophobia** رَهَابُ الظَّلَام. الخوف الشاذ من الظلام.
- nyctophonia** صَمَاتٌ نَهَارِي. عدم القدرة على الكلام أثناء النهار ولكن المصاب يتمكن من النطق أثناء الليل.
- nycturia** بُؤَالٌ لَيْلِي. كثرة التبول أثناء الليل وأكثر مما هو أثناء النهار.
- nymphomania** غُلْمَة. رغبة جنسية شديدة لا تشبع عند الإناث.
- nystagmic** زَارَائِي. متعلق بالرأرأة. أو يتصف بالرأرأة أو مصاب بها.
- nystagmograph** مِخْطَاطُ الرَّأْرَاءَة. جهاز يسجل حركات العين أثناء الرأرأة.

nystagmoid شَبِيهَةُ الرَّأْرَاءِ. حركات شبيهة بالرأْرَاءِ.

nystagmus رأْرَاءٌ. حركات العين النظامية السريعة اللاإرادية والتي يمكن أن تكون أفقية أو عمودية أو دائرية أو مختلطة، أي من نوعين منها، وقد تكون على شكل حركة سريعة لإحدى الجهتين تتلوها حركة بطيئة للجهة المعاكسة لها.

- **amaurotic n.** رأْرَاءٌ كُفْمِيَّةٌ. رأْرَاءُ الأعمى أو المصاب بعيب بصري مركزي.

- **amblyopic n.** رأْرَاءٌ غَمَشِيَّةٌ. رأْرَاءٌ بسبب إصابة تؤثر على وظائف البصر المركزية.

- **ataxic n.** رأْرَاءٌ رنحية. رأْرَاءٌ في إحدى العينين تصاحب التصلب المتعدد وتتصف بضعف الحملقة المقترنة.

- **aural n.** رأْرَاءٌ أُذُنِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تنتج عن إصابة التيه وتكون عادة نظامية وعلى شكل حركات سريعة لإحدى الجهات تتلوها حركة بطيئة للجهة المعاكسة لها.

- **caloric n.** رأْرَاءٌ حَرَارِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تستحث بفصل الأذن بسائل أو هواء حار أو بارد.

- **central n.** رأْرَاءٌ مَرْكَزِيَّةٌ. رأْرَاءٌ نقضية بسبب آفة في الجهاز الدهليزي.

- **congenital n. (= congenital hereditary n.)** رأْرَاءٌ خَلْقِيَّةٌ.

- **congenital hereditary n.** رأْرَاءٌ خَلْقِيَّةٌ وَراثِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تظهر عادة عند الولادة وهي عادة ما تكون أفقية ونواسية وأحياناً نقضية ونواسية ويمكن أن تتسبب أو تترافق مع الضمور البصري أو الثلامة أو البرص أو الإصابات البقعية بالعينين أو الساد الخلقي أو اللابؤرية الشديدة أو الزرق.

- **convergence n.** رأْرَاءٌ التَقَارُوبِ. نذبة العين النظامية التي تتصف بحركة تقاربية سريعة للعينين بالنسبة لكل منهما تتلوها حركة تباعدية بطيئة وعادة ما تنتج عن ورم في المسال المخي أو البطين الثالث أو الدماغ المتوسط وعادة ما تترافق مع رأْرَاءٍ انكماشية.

- **disjunctive n.** رأْرَاءٌ انفصاليَّةٌ. رأْرَاءٌ تتحرك فيها العينان نحو بعضهما وثم تباعدان عن بعضهما.

- **dissociative n.** رأْرَاءٌ متفارقة؛ رأْرَاءٌ تَفَارِقِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تكون فيها حركة العينين مختلفة عن بعضهما.

- **downbeat n.** رأْرَاءٌ سُفْلِيَّةُ الحَرَكَةِ. رأْرَاءٌ عمودية تكون فيها الحركات السريعة نحو الأسفل وتحدث في إصابات الاتصال النخاعي البصلي.

- **end position n.** رأْرَاءٌ انتهائية الموضع؛ رأْرَاءٌ الوُضْعِ الأخير. رأْرَاءٌ تحدث عند الحملقة الشديدة لأحدى الجهات.

- **fixation n.** رأْرَاءٌ التَثْبِيثِ. رأْرَاءٌ تظهر عند تثبيت البصر على أحد المواضع.

- **galvanic n.** رأْرَاءٌ غَلْفَانِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تنتج عن التنبيه الكهربائي لتيه الأذن الداخلية.

- **gaze n.** رأْرَاءُ الحَمْلَقَةِ. رأْرَاءٌ تظهر عند النظر إلى إحدى الجهتين، اليمين أو اليسار.

- **jerk n. (= jerky n.)** رأْرَاءٌ نَفْضِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تتكون من حركة بطيئة إلى إحدى الجهات تتلوها حركة سريعة إلى الجهة المعاكسة.

- **labyrinthine n. (= vestibular n.)** رأْرَاءٌ تَيْهِيَّةٌ.

- **latent n.** رأْرَاءٌ كَامِنَةٌ. رأْرَاءٌ تظهر فقط عند تغطية إحدى العينين.

- **lateral n.** رأْرَاءٌ جَانِبِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تكون فيها حركة العينين من جانب لآخر.

- **miner's n.** رأْرَاءُ عَمَالِ المَنَاجِمِ. رأْرَاءٌ مهنية تظهر عند عمال مناجم الفحم تتكون من حركات عينية شاذة مع أعراض أخرى يعتبرها البعض بسبب سوء الإنارة ويعتبرها آخرون اضطرابات وظيفية.

- **ocular n. (= amaurotic n.)** رأْرَاءٌ كُفْمِيَّةٌ.

- **optokinetic n. (= optokinetic n.)** رأْرَاءٌ بَصَرِيَّةُ حَرَكَةٍ. الرأْرَاءُ الطبيعية التي تحدث عند النظر إلى الأشياء التي تمر عبر الساحة البصرية كالنظر إلى الخارج من قطار أو سيارة متحركة.

- **oscillating n. (= pendular n.)** رأْرَاءٌ نَوَاسِيَّةٌ.

- **paretic n.** رأْرَاءٌ حَرْبِيَّةٌ. رأْرَاءٌ كاذبة تحدث عند وجود ضعف في عضلات العين.

- **pendular n.** رأْرَاءٌ نَوَاسِيَّةٌ. رأْرَاءٌ تكون فيها نذببات العين متساوية في سرعتها ومداتها واتجاهها ومنمطها.

- **periodic alternating n.** رأْرَاءٌ دَوْرِيَّةٌ

- رَأَاةٌ بَلَقَانِيَّةٌ. رارة تحدث من الرارة النفضية تتصف بتغيير
نظمي في شدتها واتجاهها مع فترات توقف دوري بين
النوبات.
- **positional n.** رَأَاةٌ وَضْعِيَّةٌ. رارة تحدث
أو تتغير في نمطها أو شدتها بتغير أوضاع الرأس.
- **railroad n. (= optokinetic n.)** رارة سكة
القطار؛ رَأَاةٌ بَصَرِيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ.
- **resilient n. (= jerk n.)** رَأَاةٌ نَفْضِيَّةٌ.
- **retraction n. (= n. retractorius)** رَأَاةٌ
إِنْكَمَاشِيَّةٌ. انكماش تشنجي للخلف لمقلة العين يحدث
عند محاولة تحريكها وهذه إحدى علامات مرض الدماغ
المتوسط.
- **rhythmical n. (= jerk n.)** رَأَاةٌ نَفْضِيَّةٌ.
- **rotatory n.** رَأَاةٌ دَوْرَانِيَّةٌ. رارة تكون فيها
الحركة حول محور العين.
- **secondary n.** رَأَاةٌ ثَانَوِيَّةٌ. رارة تحدث بعد
توقف دوران الرأس المفاجيء تنتج عن استمرار حركة
سوائل التيه.
- **see-saw n.** رَأَاةٌ اَرْجُوجِيَّةٌ. رارة تتحرك
فيها إحدى العينين إلى الأعلى بينما تتحرك الثانية إلى
الأسفل.
- **spontaneous n.** رَأَاةٌ بَلَقَانِيَّةٌ. رارة تحدث من
دون أي تنبيه للجهاز الدهليزي.
- **undulatory n. (= pendular n.)** رَأَاةٌ
نَوَاسِيَّةٌ.
- **unilateral n.** رَأَاةٌ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ. رارة تظهر
في إحدى العينين فقط.
- **upbeat n.** رَأَاةٌ عُلوِيَّةٌ الحَرَكَةِ. رارة عمودية
تكون فيها الحركات السريعة نحو الأعلى وتحدث في
أفان دودة المخيخ.
- **vertical n.** رَأَاةٌ عَمُودِيَّةٌ. حركات رأوية إلى
الأعلى والأسفل.
- **vestibular n.** رَأَاةٌ دَهْلِيْزِيَّةٌ. رارة تتولد عن
اضطرابات الدهليز وتكون فيها الحركات نظمية سريعة
وبطيئة.
- **vibratory n. (= pendular n.)** رَأَاةٌ نَوَاسِيَّةٌ.
- **visual n.** رَأَاةٌ بَصَرِيَّةٌ. رارة تتصف بحركات
نواسية الشكل ومنظمة.
- **voluntary n.** رَأَاةٌ إِرَادِيَّةٌ. حركات عينية سريعة
تصل إلى سرعة 80 حركة بالثانية يمكن أن يجربها
بعض الأشخاص الأسوياء.
- nystaxis (= nystagmus)** رَأَاةٌ.

O

obex العزّاج. الموصل الميطن بالبطانة العصبية الذي يوصل شرائط البطين الرابع عند الزاوية السفلية.

1. أَجْبَرٌ 2. إجْبَارِيّ. ليس بالاختياري **obligate** ولا يتمكن من البقاء إلا تحت ظروف إجبارية معينة خاصة فقط.

obligatory إجْبَارِيّ.

obliteration طَمَسٌ؛ مَحْوٌ؛ إِزَالَةٌ. إزالة كاملة سواء بالمرض أو بالتنكس أو بالجراحة أو بالاشعاع أو بأية وسيلة أخرى.

cortical o. مَحْوٌ قَشْرِيّ. نصول قشري وهي حالة تتصف بظهور بقع في القشرة المخية تزول منها الخلايا العقدية.

oblongata مُسْتَطِيل. تستعمل أحياناً للدلالة على البصلة أو النخاع المستطيل.

medulla o. النَخَاعُ المُسْتَطِيل؛ البَصْلَةُ. انظر medulla.

obnubilation تَغْطِيقٌ الوَعْي. فقدان الوعي الجزئي.

obsession وَسْوَاسٌ؛ وَسْوَسة. فكرة أو صورة أو منه غير مرغوب ومزعج يعاود لا إرادياً وبصورة دائمة بالرغم من محاولة المصاب كبته وإبعاده عن فكره وتشمل الوسواس غالباً أفكار العنف والتلوث وفقدان الثقة بالنفس.

obsessive وَسْوَاسِيّ. متعلق بالوسواس أو مصاب به.

obsessive-compulsive وَسْوَاسِيّ قَشْرِيّ. متعلق بالوسواس والإجبار أو

بالاضطرابات الوسواسية القسرية أو بالاضطرابات الشخصية القسرية.

obtusion تَبْلُذُ الحَس. كلاله الحس والإدراك وضعفهما.

occipital قَذَالِيّ. متعلق بالقذال أو متوضع بالقرب من العظم القذالي مثل الفص القذالي للمخ.

occipitalis القَذَالِيَّة. القسم الخلفي من العضلة القذالية الجبهية.

occipitalization تَقَذُل. الالتحام العظمي بين الفهقة والعظم القذالي.

occipitoatloid قَذَالِيّ فَهْقِيّ. متعلق بالقذال والفهقة.

occipitoaxoid قَذَالِيّ مَحْوَرِيّ. متعلق بالقذال والمحور.

occipitobasilar قَذَالِيّ قَاعِيّ. متعلق بالقذال وقاعدة القحف.

occipitobregmatic قَذَالِيّ هَامِيّ. متعلق بالقذال والهامة.

occipitocervical قَذَالِيّ رَقَبِيّ. متعلق بالقذال والرقبة.

occipitofacial قَذَالِيّ وَجْهِيّ. متعلق بالقذال والوجه.

occipitofrontal قَذَالِيّ جَبْهِيّ. متعلق بالقذال والجبهة.

occipitomastoid قَذَالِيّ خُشْنَانِيّ. متعلق بالعظم القذالي والناتئ الخشائي.

occipitomental قَذَالِيّ ذَقْنِيّ. متعلق بالقذال والذقن.



obsession

مریضة مصابة بوسواس نكف الشعر من راسها فتنتف شعراتها الواحدة تلو الأخرى.

occipitoparietal قَذَالِيٌّ جِدَارِيٌّ. متعلق
بالعظمين أو الفصين القذالي والجداري.

occipitotemporal قَذَالِيٌّ صُدْغِيٌّ. متعلق
بالعظمين أو الفصين القذالي والصدغي.

occipitothalamic قَذَالِيٌّ مِهَادِيٌّ. متعلق
بالفص القذالي وبالمهاد.

occiput الْقَذَالُ؛ مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ. القسم الخلفي
من الرأس.

ochlophobia رَهَابُ الْإِزْبَاحِ. رهاب
التجمعات المزدحمة.

ocular 1. عَيْنِيٌّ 2. الْعَيْنِيَّةُ. 1. متعلق
بالعين 2. عدسة المجهر العينية.

- oculocephalogyric** حَرَكَى رَأْسِي بَصَرِي. منسوب لحركة الرأس المتعلقة بالبصر.
- oculogyration** حركة العين الالتفافية؛ دَوَّرَانُ الْمُقَلَّة. حركة العين حول محورها الامامي الخلفي.
- oculomotor** مُحَرِّكُ الْعَيْن. منسوب إلى حركة العين أو ما يولدها.
- oculomotorius (= oculomotor nerve)** الْعَصَبُ الْمُحَرِّكُ لِلْعَيْن.
- oculospinal** عَيْنِي نُخَاعِي. متعلق بالعين والنخاع الشوكي.
- oculus (= the eye)** الْعَيْن.
- odaxismus** عَضُّ اللِّسَان. عض اللسان أو الحَدَّ أثناء نوبة الصرع.
- odaxetic** عَضُوض؛ مُثِيرُ الْحَك. ما يولد حس العض أو الحك.
- odogenesis (= neurocladism)** تَفَرُّعٌ عَصَبِي؛ تَغصُّنُ الْعَصَب.
- odontalgia (= toothache)** أَلَمُ السِّن.
- odontectomy** قَلْعُ السِّن. قلع السن أو استئصاله أو قطعه.
- odontophobia** رُهَابُ الْأَسْنَان. الخوف من رؤية الأسنان أو من قلعها أو معالجاتها.
- odontoprisia (= bruxism)** صَرِيْفُ الْأَسْنَان.
- odynia** أَلَمٌ؛ وَجَعٌ. (لاحقة).
- odynometer** مِقْيَاسُ الْوَجَع. آلة لقياس الوجع.
- odynophagia** بَلْعٌ مؤلم؛ وَجَعُ الْبَلْع. الألم الذي يترافق مع بلع الطعام أو السوائل.
- odynphagia (= odyndophagia)** بَلْعٌ مؤلم؛ وَجَعُ الْبَلْع.
- oedipal** أَوْدِيْبِي. متعلق بعقدة أوديب.
- oedipism (= edipism)** الْأَوْدِيْبِيَّة؛ إِضْرَارُ الْعَيْنِ الذَّاتِي. (أوديب ملك أسطوري لطيفة قتل أباه غلطاً وتزوج أمه فقلع عينيه حزناً) ويستعمل المصطلح للدلالة على إصابة الشخص لعينه بأضرار عمداً وعن قصد.
- oedipus complex** عُقْدَةُ أَوْدِيْب. في نظرية التحليل النفسي هي المشاعر والتناقضات التي تحدث للطفل أثناء المرحلة القضيبية من مراحل تطوره الجنسي النفسي التي تحدث من الانجذاب الجنسي للوالد المخالف جنسياً (الأم بالنسبة للولد أو الأب بالنسبة للبنات) والتي تشمل أيضاً مشاعر الحقد والحسد نحو الوالد المماثل جنسياً والتي يكتبها الشخص خوفاً من انتقام الوالد منه.
- olfaction** الشَّم. عملية الشم أو حس الشم.
- olfactism** شَمٌّ لَا شَمِي التنبية؛ تَنْبِيَةٌ شَمِّي؛ إِسْتِشْشَام. حس الشم الذي يتولد عن التنبية بغير المنبهات الشمية.
- olfactometer** مِقْيَاسُ الشَّم. آلة لقياس حس الشم.
- olfactory** شَمِّي. منسوب لحس الشم.
- oligodendroblastoma (= oligodendroglioma)** وَرَمُ الدِّبْقِيَّاتِ قَلِيلَاتِ التَغصُّن.
- oligodendroglia** دِبْقِيَّاتٌ قَلِيلَاتِ التَغصُّن. الخلايا اللاعصبية التي تنشأ من الأديم الظاهر والتي تكون جزءاً من البنية البرانية (الدبق العصبي) للجهاز العصبي المركزي وتلتف التفصنات التي تبرز من أغشيتها وتلف حول محاور العديد من العصبونات لتكون أغمادها النخاعية في المادة البيضاء كما أنها تكون مع الدبقيات الصغيرة الخلايا التابعة حول عصبونات المادة السنجابية.
- oligodendroglioma** وَرَمُ الدِّبْقِيَّاتِ قَلِيلَاتِ التَغصُّن. ورم يتكون من الخلايا القليلة التغصن في مراحل تناميها المختلفة.
- oligodipsia** قَلَّةُ الْعَطَش. قلة العطش الشاذ.
- oligoencephalon (= micrencephalon)** الدِّمَاغُ الصَّغِير. الدِّمَاغُ الصَّغِيرُ الشاذ.
- oligoglia (= oligodendroglia)** دِبْقِيَّاتٌ قَلِيلَاتِ التَغصُّن.
- oligophrenia** تَخَلُّفٌ عَقْلِي.

- moral o. (= moral insanity) جُنُونٌ أخلاقي.

oligoposia قَلَّةُ الشَّرْبِ. قلة تناول السوائل الشاذ.

oligosynaptic قَلِيلُ التَّشَابُكَاتِ. سبيل عصبي قليل التشابكات وبذلك يكون أيضاً قليل العصيونات.

oliva الزَيْتُونَةُ. حبة مدورة على الجهة الوحشية من كل من هرمي النخاع المستطيل (البصلة) بين التلمين البطني الوحشي والظهري الوحشي وتولدها كتلة سنجابية غير منتظمة الشكل (النواة الزيتونية الذنبية) تقع تحت سطحها مباشرة.

- o. cerebellaris (= nucleus dentatus) النَوَاةُ المُسَنَّنة.

olive الزَيْتُونَةُ. زيتونة النخاع المستطيل.

- inferior o. (= oliva) الزَيْتُونَةُ السُّفْلِيَّة.

- superior o. (= nucleus dorsalis corporis trapezoidei) الزَيْتُونَةُ العُلْوِيَّة؛ النواة الظهرية للجسم المنحرفي.

olivifugal مبتعد عن الزيتونة. أو ينقل الدفعات بعيداً عنها.

olivipetal متجه نحو الزيتونة. أو ينقل الدفعات نحوها.

olivopontocerebellar زَيْتُونِي جِسْرِي مُخِخِي. متعلق بالزيتونتين والسويقتين المتوسطتين وقشرة المخيخ.

omalgia أَلَمُ الكَتِف. ألم في منطقة الكتف.

omodynia أَلَمُ الكَتِف.

oncoma وَرَمٌ؛ تَوَرُّم.

oncotomy بَضْعُ الوَرَم. بضع الورم أو التورم.

oneirism وَغَيٌّ أخلامي؛ حالة أحلامية. حالة الوعي الشاذة الشبيهة بالحلم.

oneirodynia (= nightmare) كابُوس. أحلام مزعجة.

oneirogenic مُحَلِّم. ما يولد الأحلام.

oneirogmus إختِلَامٌ. قذف المنى الذي يرافق الأحلام.

oneirophrenia فَصَامٌ أخلامي. نوع من الفصام يتصف بتغيم الوعي.

oneiroscopy تَفْسِيرُ الأحلام. تفسير الأحلام لغرض تشخيص الحالة العقلية للمريض.

onomatomania هَوَسٌ تَرِيدُ الكلمات. هوس ترديد بعض الأسماء أو الكلمات.

onomatophobia زُهَابُ سَمَاعِ الكلمات. الخوف والآنزعاج من سماع بعض الأسماء أو الكلمات.

onomatopoesis هَذَرٌ. النطق بكلمات لا معنى لها.

onychophagia قَضْمُ الأظفار. عادة قضم الأظفار.

onychophagy (= onychophagia) قَضْمُ الأظفار.

oophoralgia (= ovarialgia) أَلَمُ المَبِيض.

opening فَتْحَةٌ. فوهة أو فتحة أو حيز مفتوح.

operant 1. إِشْرَاطٌ فعال 2. إِسْتِجَابَةٌ دَاتِيَّة.

1. استجابة أو نمط رد فعل يتصف بتأثيره الفعال على المحيط وقدرته في الحصول على فائدة أو تعزيز 2. نوع من الإشرط يقوم الحيوان أو الشخص فيه بعمل معين عند تنبيهه بمنبه بسيط بأمل الحصول على جائزة أو فائدة 3. في علم النفس استجابة لا يثيرها منبه خارجي معين ولكنه يعاود بتناوب معين تحت ظروف خاصة.

operation عَمَلِيَّة. أي عمل جراحي يقوم به الجراح بيديه أو بواسطة آلة جراحية.

operculum الوِصَاد. غطاء يغطي أحد الفتحات أو الأعضاء لوقايتها.

- frontal o. (= o. frontale) الوِصَادُ الجَبْهِي

- o. frontale (= pars opercularis gyri

frontalis inferioris) الوِصَادُ الجَبْهِي. الجزء الوصادي للتلفيف الجبهي السفلي.

- frontoparietal o. الوِصَادُ الجَبْهِي الجِدَارِي.

جزء التليف الجبهي السفلي خلف الفرع الصاعد من التلم الوحشي بالإضافة إلى النهايتين السفليتين الاماميتين للفصيص الجداري السفلي وهو يغطي جزء من فصيص الجزيرة.

- opercula of insula أَوْصِدَةُ الْجَزِيرَةِ. باحات قشرة المخ التي تغطي جزيرة (فص الجزيرة) نصف كرة المخ والتي تكون حواف التلم الوحشي والتي تقسمها وتفصلها عن بعضها.

- occipital o. الْوِصَادُ الْقَذَالِي. جزء من الفص القذالي للدماغ يحده التلم الهلالي عند وجوده.

- temporal o. الْوِصَادُ الصَّدْغِي. أقسام من التليف الصدغي العلوي والتليف الصدغي المستعرض التي تغطي قسماً من فص الجزيرة.

ophthalmagra أَلَمٌ عَيْنِيٌّ مُفَاجِئٌ. ألم يصيب العين بصورة مفاجئة.

ophthalmalgia أَلَمُ الْعَيْنِ.

ophthalmatrophia ضُمُورُ الْعَيْنِ.

ophthalmectomy اسْتِنْصَالُ الْعَيْنِ: قَلْعُ الْعَيْنِ. إزالة العين جراحياً.

ophthalmencephalon المادة العصبية الإبصارية: الدِّمَاغُ الْعَيْنِي. الشبكية والعصب البصري والجهاز البصري الدماغى.

ophthalmocele (= exophthalmos) جُحُوظُ الْعَيْنِ.

ophthalmoplegia شَلْلُ الْعَيْنِ. شلل عضلات العين.

- basal o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْقَاعِي. شلل العين بسبب آفة في قاعدة الدماغ.

- exophthalmic o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُحُوظِي. خزل العين الخارجى مع جحوظها الذي يحصل في مرض غريفز (فرط الدرقية).

- external o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْخَارِجِي. شلل عضلات العين الخارجية.

- fascicular o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْحَزْمِي. شلل عضلات العين بسبب آفة في الجسر.

- internal o. شَلْلُ الْعَيْنِ الدَّاخِلِي. شلل عضلات القرنية والجهاز الهدبي.

- internuclear o. شَلْلُ الْعَيْنِ بَيْنَ النَّوَى. شلل

العين الحركي المستعرض بسبب آفة في الحزمة الطولانية الإنسية.

- nuclear o. شَلْلُ الْعَيْنِ النَّوَوِي. شلل العين بسبب إصابة نوى أعصاب العين.

- orbital o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْحَاجَاجِي. شلل العين بسبب إصابة آفة في الحجاج.

- partial o شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُزْئِي. شلل يصيب إحدى عضلات العين أو اثنتين منها.

- progressive external o. شَلْلُ الْعَيْنِ الْخَارِجِي الْمُتَقَرِّقِي. اعتلال عضلي مترق بطيء يصيب العينين وعادة ما يصيب عضلات العين الخارجية ولكنه قد يصيب عضلة العين الدويرية أحياناً كما أنه غالباً ما يصيب العضلة الرافعة للجفن مبكراً ويؤدي إلى جحوظ العين ويتطور تدريجياً إلى شلل كامل.

- total o. شَلْلُ الْعَيْنِ التَّام. شلل يصيب كل عضلات العين الخارجية والداخلية.

ophthalmoptosis (= exophthalmos) جُحُوظُ الْعَيْنِ.

ophthalmoscope مِنتَظَارُ الْعَيْنِ. آلة لتنظير داخل العين.

ophthalmoscopy تَنْظِيرُ الْعَيْنِ. عملية فحص داخل العين بواسطة المنظار وتنظير القرص البصري وأوعية داخل العين وشبكيتها وقاعها.

- medical o. تَنْظِيرُ الْعَيْنِ الطَّبِي. تنظير داخل العين بهدف تشخيص بعض الأمراض الجهازية كالبول السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أورام الدماغ.

opiate أَفْيُونِي. 1. دواء يحوي الأفيون أو مستمد منه 2. دواء منوم.

opiomania إِدْمَانُ الْأَفْيُونِ.

opipramol hydrochloride هَيْدِرُوكْلُورِيدُ الْأُوبِيْپِرَامُول. دواء مضاد الكآبة ومسكن معتدل.

opisthencephalon (= the cerebellum) الْمُخَيِّخ.

opisthotonos التَشَنُّجُ الظَّهْرِي. نوع من التشنج يتصف بانثناء الرأس والكاكل للخلف والجسم إلى الامام.

opisthotonus (= opisthotonos) التَشَنُّجُ الظَّهْرِي.

opium أفيون. عصير ثمار بعض أنواع نبات الخشخاش ويستخلص من العديد من قلوانياته كالمورفين والكودائين والبابايرين والشيائين ويستعمل لخواصه التنويمية والتسكينية ولكنه يولد الإدمان.

opiumism إدمان الأفيون.

opposition of thumb تقابل الإبهام. مقابلة الإبهام لأصابع اليد الأخرى.

opsialgia (= geniculate neuralgia) ألم العقدة الركبية.

opsomania هوس طعامي؛ هوس الطعام. الرغبة في بعض أنواع الطعام المعينة.

optesthesia حس الإيضار. القدرة على إدراك المنبهات البصرية.

optic عيني. متعلق بالعين.

optical بصري. متعلق بالبصر.

opticociasmatic بصري تصالبي. متعلق بالعصب البصري وبالتصالب البصري.

optiociliary بصري هدي. متعلق بالعصبين البصري والهدبي.

optiopupillary بصري حدقي. متعلق بالعصب البصري وبحدة العين.

optics البصريّات. العلم الذي يعنى بدراسة الضوء والبصر.

optimal أمثل؛ مثلى. الأحسن أو الأكثر مناسبة.

optimum الأمثل؛ المثلى. 1. حالة المحيط الأكثر مناسبة للوظائف الطبيعية للكائن 2. أفضل كمية مناسبة من الطعام الكافية للفرد في أحوال معينة.

optochlasmic (= opticochiasmic) بصري تصالبي.

optokinetic حركي بصري. متعلق بحركات العينين والأجسام في المجال البصري.

optomeninx (= the retina) الشبكية.

orbit الحجاج. التجويف العظمي الذي يحوي مقلة العين وعضلاتها وأوعيتها وأعصابها وتساهم عدة عظام قحفية في تكوينه.

orbitotemporal حجاجي صدغي. متعلق بالمنطقتين الحجاجية والصدغية.

orchialgia ألم الخصية. ألم في الخصية.

orchidalgia (= orchialgia) ألم الخصية.

organ عضو. قسم مستقل من الجسم يقوم بوظيفة معينة خاصة.

- effector o. عضو مُستفعل. عضلة تنقلص أو غدة تفرز استجابة للنبضات العصبية.

- end o. (= end-organ) عضو إنتهائي.

- essential o. of thalamus العضو الأساسي للمهاد. أحد أجزاء المهاد ومن المحتمل أن تكون النواة الإنسانية التي تعمل كمركز تكامل في الحيوانات التي لا تملك قشرة مخية أو قليلاً منها وهي تعمل بنفس الأسلوب حتى في الكائنات العليا.

- Golgi tendon o. عضو غولجي الوترى. مستقبلية توجد في أوتار عضلات الحيوانات الثديية والحساسة للتغيير الميكانيكي للوتر الذي يتولد إما عن تمديده المنفعل أو عن تقلصها اللاتقصري مما يزيد في توتر الوتر الذي ينبه هذه المستقبلات. وهي المسؤولة عن استجابة التحويل واستجابة السكين المطواة.

- gustatory o. عضو الذوق. الأعضاء المسؤولة عن حس الذوق.

- olfactory o. عضو الشم. العضو المسؤول عن حس الشم.


- sense o's. أعضاء الحس. مختلف أعضاء الحس في الجسم.

- special sense o's. أعضاء الحس الخاصة. أعضاء حس البصر والسمع والذوق والشم والحس الدهليزي القوقعي.

- terminal o. عضو إنتهائي. عضو يوجد في نهايتي القوس المنعكسي.

- vestibulocochlear o. العضو الدهليزي القوقعي. البنات الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي والمسؤولة عن الوظائف الدهليزية والسمعية.

- visual o. العضو البصري. العين.



organ, special sense

القسام اذن الإنسان وملحقاتها: (1) العضلة الصدغية (2) غضروف الأذن (3) الزنمة (5) الصماخ السمعي الظاهر الغضروفي (6) الصماخ السمعي الظاهر العظمي (8) غشاء الطبل (9) عظيمات الأذن (11) الأذن الداخلية (12) العصب اليمليزي (14) العصب الوجهي (15) العصب القوقعي (16) الشريان السباتي الباطن (19) النخير (22) الشريان السباتي الباطن (23) الوريد الوداجي الباطن (24) النخاع الأبري (25) العصب الوجهي (26) النخاع الخشائي.

- organism** كَائِنٌ حَيٌّ. أي مخلوق حي سواء كان حيواناً أو نباتاً.
- organization** 1. مُنَظَّمَةٌ. 2. تَنْظِيمٌ. 3. تَعْضِي. 1. المجموعة المنظمة والمرتبطة والمتخصصة بالقيام بوظيفة منسقة. 2. عملية ترتيب وتنظيم. 3. عملية تحول خثرة الدم إلى نسيج ليفي.
- organon (= organ)** عُضْوٌ. عضو مستقل في وظائفه في الجسم منظم بشكل بنيوي خاص ليقوم بوظيفة أو عدة وظائف معينة خاصة ويتكون من أنسجة مختلفة يقوم أحدها بالوظيفة الرئيسية الخاصة.
- organum (= organ)** عُضْوٌ.
- orgasm** الإِنْغَافُ: الإِرْجَازُ: هَزَّةُ الْجَمَاعِ. ذروة التهيح الجنسي.
- orientation** تَوَجُّهُ: الإِهْتِدَاءُ. إدراك الشخص لمحيطه بالنسبة للموقع والوقت والناس المحيطين به.
- orphenadrine** أَوْرَفِينَادْرِين. دواء مضاد للفعول الكوليني ولل هستامين وللتشنج مع تأثير شحمي.
- o. hydrochloride** هَيْدُرُوكْلُورِيد الأَوْرَفِينَادْرِين. دواء يستعمل في معالجة الاستجابات خارج الهرمية والباركنسونية المولدة من استعمال بعض الأدوية المسببة له.
- orthochromatic** سَوِيُّ اللَّوْنِ. سوي الانصباع أو اللون.
- orthodromic** سَوِيُّ التَّوَصِيلِ. عصب يوصل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.
- orthophony** سَوَاءُ النُّطْقِ. التصويت الصحيح والنطق السوي للكلمات.
- orthopsychiatry** الطِبُّ النَّفْسِيّ الإسْوَانِيّ. فرع الطب النفسي الذي يعني بدراسة وممارسة إدامة الحالة النفسية السوية أو إعادتها عند اختلالها وذلك باستعمال مناهج علم النفس أو كالا اجتماع أو الحقول العلمية الأخرى ويهتم بالصحة النفسية للمجتمع بصورة عامة.
- orthostatic** قِيَامِيّ: إِنْتِصَابِيّ. متعلق بالوضع القياسي للجسم أو مولد عنه.
- orthostatism** إِنْتِصَابُ الْجِسْمِ: قِيَامُ الْجِسْمِ: الانتصابية الجسم. الوضع القائم المنتصب للجسم.
- orthosympathetic** الْجَهَازُ الْوَدِيّ. الجهاز المستقل الودي.
- orthotherapy** مُعَالَجَةٌ تَقْوِيْمِيَّةٌ. معالجة الاختلالات والاضطرابات الجسدية بتصحيح وضع الجسم.
- orthotonos** تَشْنِجٌ انْتِصَابِيّ: تَوَثُّرٌ إِنْتِصَابِيّ. التثيت الكزازي للرأس والأطراف في خط مستقيم جاسي.
- orthotonus (= orthotonos)** تَشْنِجٌ انْتِصَابِيّ: تَوَثُّرٌ إِنْتِصَابِيّ.
- os** 1. الفَمُ. 2. عَظْمٌ. 1. أية فتحة في الجسم أو فتحة الفم. 2. عظم.
- oscillation** تَذْبُذْبٌ: ذَبْذَبَةٌ. حركة اهتزازية أو حركة نواسية من الامام للخلف أو من جانب لآخر.
- bradykinetic o.** ذَبْذَبَةٌ حَرَكِيَّةٌ بَطِيئَةٌ. حركات رقصية بطيئة معاودة تشاهد في التهاب الدماغ الوبائي.
- oscillator** مُوَلِّدُ الذَّبْذَبَاتِ. جهاز يولد الذبذبات بمختلف درجات التردد أو بتردد ثابت.
- oscillopsia** بَصَرٌ مُذْبَذِبٌ. حالة تظهر فيها الأجسام المتطورة تتحرك من الامام للخلف وبالعكس أو تقفز أو تتمتعج ويحدث ذلك في التصلب المتعدد.
- oscilloscope** مِنْظَاظُ الذَّبْذَبَةِ. آلة تعرض صورة بصرية للتغيرات الكهربائية على الشاشة التالقية لأنبوب الأشعة المهبطية.
- oscitation (= yawning)** تَنَاقُوبٌ.
- osmesthesia (= olfactory sensibility)** حِسُّ الشَّمِّ.
- osmoceptor (= osmoreceptor)** 1. مُسْتَقْبِلَةُ الرَّائِحَةِ. 2. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُجِ كَرَاهِيَةُ الرَّائِحَةِ. كراهية الشخص لإحدى الروائح.
- osmodysphoria** 1. مُسْتَقْبِلَةُ الرَّائِحَةِ

2. مُسْتَقْبَلَةُ التَّنَاضُح. 1. مستقبلية توجد في الانف حساسة للروائح 2. أحد العصبونات المتخصصة التي توجد في النوى فوق البصرية للوطاء والتي تتحسس لزيادة التناضحية (وبصورة خاصة لزيادة تركيز الصوديوم في السائل خارج الخلايا) ويؤدي تنبيهها إلى تحرير هرمون مضاد الإيالة من الفص الخلفي للنخامي.

ostealgia ألم عظمي. ألم في أحد العظام أو أكثر.

osteoscope وَجَعٌ عَظْمِيٌّ مَبْرَح. ألم في العظم أو العظام ينتج عن داء الزهري فيها.

osteodynia وَجَعٌ عَظْمِيٌّ. ألم في أحد العظام.

osteoneuralgia ألمٌ عَصَبِيٌّ عَظْمِيٌّ. ألم عصبي في أحد العظام.

otagra (= otalgia) ألمٌ أُذُنِيٌّ.

otalgia ألمٌ أُذُنِيٌّ. ألم في الأذن.

- geniculate o. (= geniculate neuralgia) ألم الأذن الركيبي المنشأ؛ ألم العُقْدَةِ الرُكْبِيَّة. ألم الأذن المسبب بهربس الموجه الذي يصيب العصبين الوجهي والسمعي.

- tabetic o. ألمٌ أُذُنِيٌّ تَابِيسِيٌّ. ألم أذني يظهر في التابس الظهري بسبب تنكس الجذر المتوسط للعصب الوجهي.

otic أُذُنِيٌّ. متعلق بالأذن أو منسوب إليها.

otocerebritis إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الأُذُنِيّ المَنْشَأ. التهاب الدماغ الناتج عن أمراض الأذن.

otocranium القِخْفُ الأُذُنِيّ. قسم العظم الصدغي للقحف الذي يحوي الأذن الداخلية ويسمى أيضاً الخشاء الصدغي.

otoencephalitis إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الأُذُنِيّ المَنْشَأ. التهاب الدماغ الذي يمتد إليه من الأذن الوسطى الملتبئة.

otoneuralgia ألمٌ أُذُنِيٌّ عَصَبِيٌّ. ألم عصبي في الأذن.

otoneurasthenia وَهْنٌ عَصَبِيٌّ أُذُنِيٌّ المَنْشَأ. وهن عصبي ينتج عن مرض الأذن.

otoneurology (= neuro-otology) طِبُّ الأَغْصَابِ الأُذُنِيَّة.

ovarialgia (= oophoralgia) ألمٌ المَبِيض. استمرار جريان السائل سَلَسٌ. كالبول أو الدمع.

overstrain فَرْطُ الإِزْهَاق. درجة عالية شاذة من التعب تتولد عن فرط الفعالية وهي درجة متوسطة بين التعب والانهك.

overstress فَرْطُ الإِجْهَاد. فرط الفعالية الشديدة الذي يؤدي إلى فرط الإرهاق.

oxazepam أوكسازيبام. دواء مهدئ يستعمل في معالجة القلق وخصوصاً عند الشيوخ أو لتهذئة المريض المدمن على الكحول عند انقطاعه عنه.

oxyachresia نقص غُلُوكُوزِ الدِّمَاغ. نقص في تجهيز الغلوكوز للدماغ الذي يؤدي إلى سبات نقص الغلوكوز.

oxycephalia (= oxycephaly) تَسَنُّمٌ الرُّأْس.

oxycephalic (= oxycephalous) مُسَنَّمُ الرُّأْس. مصاب بتسمن الرأس.

oxycephaly تَسَنُّمُ الرُّأْس. حالة تكون فيها قمة الرأس مدببة أو مخروطية بسبب الانسداد المبكر للدريزتين اللامي والإكليلاني.

oxycinesia (= kinesialgia) ألمُ الحَرَكَةِ. الألم الذي يتولد عند الحركة.

oxyesthesia احتداد الحس؛ فَرْطُ الإِحْسَاس. فرط حدة الإحساس الشاذ أو المرضي.

oxylalia هَزَوَلَةُ الكَلَام. سرعة الكلام.

oxymorphone hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ الأُكْسِيْمُورْفُون. دواء صناعي يستعمل كمسكن مخدر.

oxytocin أوكسيتوسين. أحد الهرمونين اللذين تولدهما الخلايا العصبية للوطاء ويخزنان في الفص الخلفي للنخامية ويعمل على تنبيه تقلص الرحم وإدراج الحليب.

ozostomia نَقَاةُ النَفْس. سوء رائحة النفس أو الفم.

P

pacemaker نَاضِطَةٌ. مادة أو شيء أو آلة تؤثر في سرعة إحدى الوظائف النظمية ويستعمل المصطلح بمفرده للدلالة على ناضطة القلب.

pachycephalia (= pachycephaly)

تَخَنُّ الرُّأْس.

pachycephalic

تَخِنُ الرُّأْس.

pachycephaly

تَخَنُّ الرُّأْس. ثخن عظام

القحف كما يحدث في داء ضخامة النهايات.

pachygyria (= macrogyria)

ضَخَامَةُ

التَّلَافُيف.

pachyleptomeningitis

التَّهَابُ الجَافِيَّة

والخَنُون. التهاب السحايا السمكة والرقيقة.

pachymeningitis

التَّهَابُ الجَافِيَّة. التهاب

الأم الجافية وتشابه أعراضها أعراض التهاب السحايا.

- cerebral p.

التَّهَابُ الجَافِيَّة الدُّمَاغِيَّة. التهاب

جافية الدماغ.

- circumscribed p.

التَّهَابُ الجَافِيَّة المُتَحَدِّد.

التهاب منطقة محددة من الجافية.

- external p.

التَّهَابُ ظَاهِر الجَافِيَّة.

التهاب الوجه الظاهر للجافية.

- hemorrhagic internal p.

التَّهَابُ بَاطِن

الجَافِيَّة النَّزْفِي. التهاب باطن الجافية مع ورم دموي فيها.

- internal p.

التَّهَابُ بَاطِن الجَافِيَّة. التهاب الوجه

الباطن للجافية.

- intralamellar p. (= Intradural abscess)

خُرَاجٌ دَاخِل الجَافِيَّة.

- purulent p.

التَّهَابُ الجَافِيَّة الفُحِّي.

خراج الجافية.

- serous internal p. (= communicating

hydrocephalus)

التَّهَابُ بَاطِن الجَافِيَّة

المُضَلِّي. مؤه الرأس الخارجي.

- spinal p.

التَّهَابُ الجَافِيَّة النُّخَاعِيَّة. التهاب

جافية النخاع الشوكي.

- syphilitic p.

التَّهَابُ الجَافِيَّة الزَّهْرِي. التهاب

الجافية الذي يسببه داء الزهري.

pachymeningopathy

إِغْتِلَالُ الجَافِيَّة.

أي من الأمراض غير الالتهابية في الجافية.

pachymeninx (= the dura mater)

السَّحَايا الثَّخِينَةُ؛ الأُمُ الجَافِيَّة.

pain

أَلَم. (ج: آلام). حس غير مريح

ومزعج في منطقة محددة تقريباً مع ضائقة وكراب ويتولد عن تنبيه نهايات عصبية خاصة وينتج عن

تخريب الأنسجة أو عن التهديد بتخريبها ويخدم كآلية وقائية تحمي الجسم وتنبيهه للابتعاد عن

العامل المسبب والمؤذي للجسم.

- affective p.

أَلَمٌ عَاطِفِي؛ أَلَمٌ إِنْفِعَالِي. ألم

نفسي يؤثر على عواطف الشخص.

- atypical facial p. (= atypical facial

neuralgia)

أَلَمٌ عَصَبِيٌّ وَجْهِيٌّ لَا نَعْطِي.

- bearing down p.

أَلَمُ الحَرَق؛ طَلَق. ألم

يرافق وضع الجنين في المرحلة الثانية من الولادة

وينتج عن تقلص عضلات الرحم.

- boring p.

أَلَمٌ ثَاقِب. حس مؤلم يشعر

المصاب به كأن آلة حادة دقيقة وطويلة تنقب الجزء

المؤلم من جسمه.

- Brodie's p.

أَلَمٌ بَرْوِي. ألم يتولد عن طي

الجلد بالقرب من مفصل مصاب بالآلم العصبي.

- burning p. أَلَمٌ مُّحْرِقٌ؛ أَلَمٌ حَارِقٌ. ألم يصاحب الحرق أو يشابه الحس بالحرق.
- central p. أَلَمٌ مَرْكَزِيٌّ. ألم يتولد عن آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- Charcot's p's. أَلَامٌ شَارَكُوت. روماتزم إحدى الخصيتين.
- cord p. أَلَمٌ نَخَاعِيّ المَنَشَا. ألم تلقائي يتولد عن آفة في النخاع الشوكي وعادة ما يصيب مناطق دخول الجذور الخلفية والسبل النخاعية المهادية أو الألياف العصبية المتصالبة بالقرب من القناة المركزية كما يحصل في تكهف النخاع.
- dilating p. طَلَقٌ مُوسِعٌ. ألم المرحلة الأولى من الولادة.
- dull p. أَلَمٌ كَلِيلٌ. ألم غير حاد.
- evoked contralateral p. أَلَمٌ مُسْتَنَارٌّ بِالْجِهَةِ الْمُعَابِلَةِ. ألم عرق النسا (النس) في الطرف السفلي يستثار عند ثني وتقريب ساق الجهة المقابلة أو ثني الطرف السفلي المعاكس عند مفصل الورك مع بسط الساق عند الكاحل.
- expulsive p. (= bearing down P.) طَلَقٌ طَارِدٌ.
- false p's. أَلَامٌ كَاذِبَةٌ. آلام غير مؤثرة تشبه آلام الطلق ولكنها لا تولد أي توسيع لعنق الرحم.
- fast p. أَلَامٌ السَّرِيع. الألم الذي يتولد مباشرة بعد التنبيه وبعد فترة كمون قصيرة جداً.
- fulgurant p. (= lightning p.) أَلَمٌ بَارِقٌ.
- gas p's. أَلَامٌ غَازِيَّةٌ. آلام تنتج عن تمدد المعدة أو الأمعاء بتجمّع الهواء أو الغازات الأخرى فيها نتيجة تناول أغذية مولدة للغازات.
- girdle p. ألم حزامي؛ ألم نِطَاقِيّ. حس مؤلم شبيه بالنطاق حول الخصر.
- growing p's. أَلَامٌ مُتَنَامِيَّةٌ. آلام معاودة شبيهة بالآلام الروماتزمية في الأطراف وهي آلام عضلية هيكلية تحدث في الأحداث.
- heterotopic p. (= referred p.) أَلَمٌ مُخَوَّلٌ؛ أَلَمٌ رَاجِعٌ.
- homotopic p. أَلَمٌ مُوَضَّعٌ. ألم يحس به في منطقة الإصابة.
- hunger p. أَلَمٌ الْجُوع. ألم يظهر عند الشعور بالجوع وهو عرض لاضطرابات المعدة.
- Ideogenous p. (= psychogenic p.) أَلَمٌ نَفْسِيّ المَنَشَا.
- imperative p. (= psychogenic p.) أَلَمٌ نَفْسِيّ المَنَشَا.
- Intermenstrual p. (= mittelschmerz) أَلَمٌ الْقُرْء؛ أَلَامٌ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ. ألم في الفترة بين الحيضين وعادة في منتصفها عند طرح البويضة.
- Internal p. أَلَمٌ دَاخِلِيّ. ألم داخل الجسم.
- Intractable p. أَلَمٌ غَيْرٌ مُخْتَمَلٌ. ألم يصعب تسكينه.
- Ischemic p. أَلَمٌ إِقْفَارِيّ. ألم يتولد عن إقفار المنطقة وتوقف دورتها الدموية.
- jumping p. أَلَمٌ قَفَاز. ألم يتولد في امراض المفاصل عندما يتكشف العظم بسبب تقرح غضروفه.
- labor p's. أَلَامٌ المَخَاض. آلام نظمية تزداد شدتها وترددها تدريجياً أثناء الولادة بسبب تقلصات عضلات الرحم.
- lancinating p. أَلَمٌ رَامِح. ألم سهمي حاد.
- lightning p's. أَلَامٌ بَارَقَةٌ. آلام سهمية قاطعة وشديدة تظهر في التابس الظهري.
- low back p. أَلَمٌ اسْفَلِ الظَّهْرِ. ألم في القسم السفلي من الظهر.
- malingering p. أَلَمٌ التَّمَارُض. ألم الأشخاص المتمارضين.
- middle p. (= intermenstrual p.) أَلَمٌ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
- nerve p. أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم يتولد عن إصابة العصب أو انضغاطه أو مرضه.
- osteocopic p. (= osteocope) الْوَجَعُ الْعَظْمِيّ. الألم الذي يصيب العظام بسبب إصابتها بداء الزهري.
- phantom limb p. أَلَمٌ الطَّرْفِ الشَّبَحِيّ. ألم يحس به المريض المبتور الطرف على أنه صادر من الجزء المقطوع من الطرف وكأنه لا زال في موضعه.
- postprandial p. أَلَمٌ تَالٍ لِلأَكْلِ. ألم في البطن يحدث بعد تناول الطعام.

- **premonitory p's.** آلامٌ إنذارية. آلام تقلصية خفيفة تظهر قبل بداية الولادة الحقيقية.
- **pricking p.** ألمٌ وأخز. ألم وخزي يشعر به الشخص وكأنه وخزات إبرية.
- **psychic p. (= psychalgia)** ألمٌ نفسي. ألم في الرأس يشعر به المريض وكأنه ألم عاطفي المنشأ ويمكن أن يترافق مع أفكار غير محتملة أو مع وسواس أو هلاس.
- **psychogenic p.** ألمٌ نفسي المنشأ. أعراض آلام جسمية ذات أسباب نفسية.
- **radiating p.** ألمٌ مُشعّ. ألم في منطقة معينة ولكنه ينتشر منها إلى المناطق المحيطة بها.
- **radicular p.** ألمٌ جذري. ألم ينتج عن انضغاط الجذور الخلفية للنخاع الشوكي أو عن إصابتها أو مرضها ويحس به في المناطق الجلدية التي تغذيها.
- **referred p.** ألمٌ محوّل. ألمٌ رَجِيع. ألم يحس به في قسم من الجسم غير القسم المسبب فيه.
- **rest p.** ألمٌ الراحة. ألم محرق ومستمر في الأقسام السفلية من الأطراف السفلية وعادة في مقدمة القدم يبدأ أو يزداد شدة عند الاستلقاء ويخف أو يزول عند الوقوف ويتسبب عن إقفار الطرف.
- **root p. (= radicular p.)** ألمٌ جذري.
- **sharp p.** ألمٌ حاد. ألم شديد مفاجئ.
- **shooting p's. (= lightning p's)** آلامٌ بارقة.
- **slow p.** الألم البطيء. حس الألم الذي يتلو حس الألم السريع وله فترة كمون طويلة نسبياً.
- **somatic p.** ألمٌ جسدي. ألم في إحدى المناطق الجسدية.
- **spinal root p. (= root p.)** ألمٌ جذري.
- **spot p's.** آلامٌ بقعية؛ آلامٌ لطخية. آلام تتوضع في نقاط متفرقة من الجسم.
- **starting p.** ألمٌ الإغفاء. ألم مع تشنج عضلي يظهر مع بدء النوم.
- **startling p.** ألمٌ مذهل. ألم مروع وشديد.
- **superficial p.** ألمٌ سطحي. ألم في منطقة سطحية من الجسم.
- **terberant p. (= terberating p. = boring p.)** ألمٌ ثاقب.

- **thalamic p.** ألمٌ مهدي. ألم تلقائي يتولد عن أفة المهاد أو مرضه.
- **visceral p.** ألمٌ حشوي. ألم يصيب أحد الأحشاء.
- **wandering p.** ألمٌ متجول. ألم يغير موضعه باستمرار.
- pains** آلام. وعادة ما يطلق على آلام الوضع.
- paleocerebellum** المخيخ القديم. اسم يطلق على الأقسام التطورية القديمة للمخيخ ولكنه يطلق اليوم بصورة خاصة على أقسامه التي تستلم أليافاً واردة من السبل النخاعية المخيخية التي تشمل في الإنسان الفص القحفي باستثناء اللسين والهرم ولها دودة الجزء الذنبي من المخيخ.
- paleocortex** القشرة القديمة. قسم قشرة المخ التي تتطور مع القشرة البدائية وبالترافق مع الجهاز الشمي وهي أقدم وأقل تطبيقاً من القشرة الحديثة وتتكون بصورة رئيسية من القشرة الكثرية الشكل والتلفيف حول الحصيني.
- palatoplegia** شلل الحنك. شلل شراع الحنك أو الحنك الرخو.
- paleoencephalon** الدماغ القديم. الدماغ القديم تطورياً ويشمل كل الدماغ ما عدا قشرة المخ وتوابعها.
- paleocerebellum (= palaeocerebellum)** المخيخ القديم.
- paleocortex (= palaeocortex)** القشرة القديمة.
- paleoencephalon (= paleoencephalon)** الدماغ القديم.
- paleokinetic** حركي قديم. مصطلح يطلق على الآلية العصبية الحركية المختصة بالحركات التلقائية المرافقة وهي تحت سيطرة الجسم المخطط وتمثل نوعاً من التحكم العصبي القديم تطورياً.
- paleoneurology** علم أعصاب المتحجرات. علم يدرس الأجهزة العصبية لافحورات الحيوانات المتحجرة.
- paleopallium (= paleocortex)** القشرة القديمة.

paleosensation الحسُّ القديم. حس الألم الشديد والاختلافات الحرارية الكبيرة واللمس الخشن بالمقارنة مع الحس الحديث الذي يشمل اللمس الرقيق والاختلافات البسيطة في درجات الحرارة والحواس الدقيقة.

paleostriatum المَخْطُطُ القديم. القسم القديم تطورياً من الجسم المخطط وهو يشمل الكرة الشاحبة.

paleothalamus المِهَادُ القديم. الجزء القديم تطورياً من المهاد ويتكون من قسمه الإنسي الذي لا توجد فيه ارتباطات متبادلة مع القشرة الجديدة.

palikinesia (= palicinesia) تَكَرَّارِيَّة الحَرَكَة. تكرار الحركات المرضي.

palilalia لَجَلَجَلَة. حالة التكرار المرضي للألفاظ أو الكلمات أو المقاطع بسرعة كبيرة.

palingraphia تَكَرَّارِيَّة الكِتَابَة. حالة مرضية يكرر المصاب بها كتابة الأحرف أو الكلمات أو المقاطع.

palinmnesis تَذَكُّرُ القديم. ذكرى الحوادث أو التجارب القديمة.

palinopsia (= visual perseveration) وَظُوبُ الرُّؤْيَة. الحالة المرضية لبقاء أو لتكرر الحس البصري بعد زوال المنبه المولد له.

palinphrasia تَكَرَّارِيَّة الكلام. حالة التكرار المرضي للكلمات والمقاطع.

paliphrasia (= palinphrasia) تَكَرَّارِيَّة الكلام.

pallanesthesia فَقْدُ حِسِّ الِاهْتِزَاز. فقدان حس الاهتزاز كاهتزاز الشوكة الرنانة.

pallesthesia حِسُّ الِاهْتِزَاز. حس الاهتزاز الذي يشعر به الشخص عند وضع شوكة رنانة مهتزة على ناتئة عظمية تحت جلدية في الجسم.

pallhypesthesia نَقْصُ حِسِّ الِاهْتِزَاز.

pallial قِشْرِيٌّ مُخَي. منسوب لقشرة المخ.

palliate مُلَطَّف. ينقص من شدة المرض أو الأعراض.

palliative مُلَطَّف. ما يفرج عن المرض أو الأعراض ولكنه لا يشفيها.

pallidal كَرْوِيٌّ شَاجِبِي. نسبة للكرة الشاحبة.

pallidectomy قَطْعُ الشَّاجِبَة. قطع الكرة الشاحبة أو استئصالها جراحياً أو كيميائياً.

pallidoansection قَطْعُ الشَّاجِبَة والغُرْوَة. بضع الكرة الشاحبة والعروة العدسية.

pallidoansotomy بَضْعُ الشَّاجِبَة والغُرْوَة. بضع الكرة الشاحبة والعروة العدسية وتوليد آفة فيها.

pallidofugal مُبْتَعِدُ عَنِ الشَّاجِبَة. ينقل دفعات عصبية بعيداً عن الكرة الشاحبة.

pallidotomy بَضْعُ الشَّاجِبَة. بضع الكرة الشاحبة جراحياً وتوليد آفة فيها.

pallidum (= globus pallidus) الْكَوْرَة الشَّاجِبَة.

p. I الْكَوْرَة الشَّاجِبَة 1. الكرة الشاحبة الإنسية.

p. II الْكَوْرَة الشَّاجِبَة 2. الكرة الشاحبة الوحشية.

pallium (= cerebral cortex) قِشْرَة المَخ. ما يشمل كل القشرة السنجابية التي تغطي نصفي كرة المخ كما أنه يعني قشرة المخ أثناء مرحلة تطورها.

palmanesthesia (= pallesthesia) فَقدَان حِسِّ الِاهْتِزَاز.

palmesthesia (= pallesthesia) حِسُّ الِاهْتِزَاز.

palmus (= 1. palpitation 2. saltatory spasm) 1. خَفَقَان 2. تَشَنُّجٌ قَفْزِيٌّ

palpable مَحْسُوس. محسوس بالجلس.

palpatometry قِيَاسُ الجِس. قياس مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحملة الشخص من دون حدوث أي ألم له.

palpebration (= winking) رَفُّ الْأَجْفَان، غَفْرٌ؛ غَفَار. رف الأجفان المتكرر مثل الذي يحدث في العرة.

palsy (= paralysis) شَلْلٌ.

Bell's p. شَلْلٌ بِل. شلل وجهي شقي ومفاجيء بسبب آفة العصب الوجهي ويولد تشوهاً وجهياً مميزاً.

- birth p. شَلْلٌ بِالْوِلَادَةِ. شلل يصيب الجنين أثناء ولادته.
- brachial p. شَلْلٌ عَضْدِيّ. انظر brachial paralysis.
- bulbar p. شَلْلٌ بَصَلِيّ. انظر bulbar paralysis.
- cerebral p. شَلْلٌ دِمَاعِيّ. اضطراب حركي دائم وشلل يظهر قبل سن الثالثة ينتج عن تلف دماغي غير مترقّ أو مرض دماغي للجنين في داخل الرحم.
- crossed leg p. شَلْلٌ تَصَالِبُ السَّاقِ. شلل العصب الشظوي الذي ينتج عن تصالب الساقين إحداهما فوق الأخرى عند الجلوس.
- Erb's p. (= Erb's paralysis) شَلْلٌ إِرْب. شَلْلٌ الْوَجْه. (= Bell's p.)
- facial p. (= Bell's p.) شَلْلٌ مِطْرَقِيّ. شلل يتولد عند استمرار العمل الشاق بالمطرقة.
- hammer p. شَلْلٌ مِطْرَقِيّ. شلل يتولد عند استمرار العمل الشاق بالمطرقة.
- ischemic p. (= ischemic paralysis) شَلْلٌ إِقْفَارِيّ. شَلْلٌ كَلْبِيكَة.
- Klumpke's p. (= Klumpke's paralysis) شَلْلٌ لَانْدَرِيّ؛ إِتِهَابُ الْأَعْصَابِ (polyneuritis) الْخُمُويّ الْخَادّ.
- maternal obstetric p. الشَّلْلُ الْأُمُومِي الْوِلَادِيّ. شلل بعض أقسام الأطراف السفلية للام بسبب انضغاط أعصابها عند ولادة جنين كبير الحجم.
- printer's p. شَلْلُ الطَّبَاعِينَ. شلل يصيب عمال المطابع بسبب تسعّمهم العزمن بالانتيمون والذي يتصف بالتهاب الأعصاب والشلل والم العانة والطفح الحطاطي.
- progressive supranuclear p. الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ (= pseudobulbar paralysis) الْكَاذِب.
- pseudobulbar p. (= pseudobulbar paralysis) الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ الْكَاذِب.
- radial p. (= radial paralysis) الشَّلْلُ الْكُفْبِرِيّ.
- saturday night p. (= musculospiral paralysis) شَلْلٌ لَيْلَةُ السَّبْتِ؛ الشَّلْلُ الْعَضَلِيّ الْحَزُونِيّ. شلل العصب الكعبري.
- scrivener's p. (= writer's cramp) الشَّلْلُ الْكَاتِبِ؛ مَعْصُ الْكَاتِبِ.
- shaking p. (= paralysis agitans) شَلْلٌ رَعْشِيّ.
- spastic bulbar p. (= pseudobulbar paralysis) الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ الْكَاذِب.
- tardy median p. (= carpal tunnel syndrome) شلل العصب المتوسط؛ مُتَلَازِمَةُ نَفَقِ الرُّسْغ.
- tardy ulnar p. (= cubital tunnel syndrome) شلل العصب الزندي، مُتَلَازِمَةُ النَفَقِ الْمَرْفَقِيّ.
- Todd's p. (= Todd's paralysis) شَلْلٌ تُود.
- transverse p. (= crossed paralysis) شَلْلٌ مُتَصَالِب.
- wasting p. (= spinal muscular atrophy) شَلْلٌ عَضَلِيّ نَخَاعِيّ الْمُنْشَا.
- pamphlegia شَلْلٌ شَامِل. شلل تام شامل.
- pananxiety قلقٌ شَامِل. قلق عام.
- analgesic p. (= Morvan's syndrome) قلق شامل مسكّن؛ مُتَلَازِمَةُ مُورْفَان.
- pancrealgia أَلَمُ الْبَنْكَرِيَّاس.
- pancreatalgia أَلَمُ الْبَنْكَرِيَّاس.
- panencephalitis إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ النَّاتِج أَكْثَرُ احْتِمَالاً عَنِ الْفَيروسِ الَّذِي يُولدُ أَجْسَاماً احْتَوَائِيَّةً (نمط 1) دَاخِلَ النُّوَى أَوْ دَاخِلَ الْهَيُولَى وَالَّذِي يُولدُ آفَةً مَتْنِيَّةً تَصِيبُ الْمَادَتَيْنِ السَّنْجَابِيَّةَ وَالْبَيضَاءَ الدِّمَاغِيَّتَيْنِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ.
- Pette-Doring p. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. لَيْت - دُورِينْغ. نوع من التهاب الدماغ دون الحاد يصيب المادتين السنجابية والبيضاء الدماغيتين وبصورة خاصة العقد القاعدية.
- subacute sclerosing p. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِلُ الْمُصَلِّبُ دُونَ الْخَادّ. نوع من التهاب بيضاء الدماغ النادر والمدمر وعادة ما يصيب الأطفال

والأحداث ويبدأ بداية مختلة ويولد بصورة خاصة خللاً وظيفياً دماغياً مترقياً يستمر لعدة أسابيع أو لعدة أشهر وينتهي بالموت خلال عام واحد. ويتصف مرضياً بالإضافة للآفة التي يولدها للمادة البيضاء بنزع النخاعين ووجود الأجسام الاشتمالية في الخلايا العصبية وفي الدبقيات قليلة التفرص مما يوحي بأن المرض فيروسي المنشأ.

panesthesia الحِسُّ الشَّامِل. مجموع الإحساسات التي يحس بها الشخص.

panhypopituitarism قُصُورُ النِّخَامِيَّة الشَّامِل. قصور نخامي عام بسبب غياب أو تخريب الغدة النخامية والذي يولد في حالة قصورها الكامل غياب وظائف الغدد التناسلية وقصور الوظائف الدرقية والقشرية الكظرية ويولد القزامة وتراجع الصفات الجنسية الثانوية وفقدان الوزن وسرعة الإرهاق وبطء القلب وهبوط ضغط الدم والاضطراب والكآبة والأعراض العديدة الأخرى.

panic هَلَج. قلق شديد حاد مع اضطراب الشخصية والوظائف.

homosexual p. هَلَجُ اسْتِهْاءِ الجِنْسِ المِثَالِ: هَلَجُ الجُنُوسِيَّة. حالة قلق شديد حادة تظهر في ظروف خاصة وتعرض الخوف اللاشعوري من أن يصبح الشخص جنوسياً أو أن يرضخ لمحضرات اللواط.

panneurosis عُصَابٌ شَّامِل. الإصابة في وقت واحد بكل الأعراض العصبية التي تشمل القلق والأعراض التحولية والرهاب والوسواس.

panniculalgia (= adiposalgia) أَلَمُ الشَّحْمِ الجِلْدِيِّ. ألم السبلة الشحمية تحت الجلدية.

panophobia (= panphobia) رُهابٌ شَّامِل.

panphobia رُهابٌ شَّامِل. الخوف من كل شيء وهو خوف مرضي من شر مجهول.

panplegia (= pamplegia) شَلْلٌ شَّامِل.

pantalgia أَلَمٌ شَّامِل. ألم يشمل الجسم كله.

pantanencephaly انْعِدَامُ الدِّمَاغِ. انعدام كل الدماغ في الجنين.

pantophobia (= panphobia) رُهابٌ شَّامِل.

papilla الخَلْمَةُ؛ خُلَيْمَةٌ. بروز صغير حلمي الشكل أو بنية حلمية الشكل.

- acoustic p. (= spiral organ) العُضْوُ الحَلَزُونِي. العضو المستقر على الغشاء القاعدي للقوقعة والذي يحوي مستقبلات السمع.

- arcuate papillae of tongue (= papillae filiformis) الخُلَيْمَاتُ الخَيْطِيَّة.

- caliciform papillae (= papillae vallatae) الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

- capitate papillae الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

- circumvallate papillae الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

- clavate papillae (= papillae fungiformis) الخُلَيْمَاتُ الكَمْنِيَّة.

- conical papillae الخُلَيْمَاتُ المَحْرُوطِيَّة. حليمات كبيرة على سطح اللسان تعتبر نوعاً محوراً من الحليمات الخيطية.

- papillae filiformis (= filiform papillae) الخُلَيْمَاتُ الخَيْطِيَّة. حليمات خيطية الشكل تغطي معظم سطح اللسان.

- papillae foliatae (= foliate papillae) الخُلَيْمَاتُ الوَرَقِيَّة. طبقات مخاطية متوازية على حواف اللسان عند منطقة اتصال جسمه مع جذره.

- fungiform papillae (papillae fungiformis) الخُلَيْمَاتُ الكَمْنِيَّة. نتوءات عقدية تبرز من سطح اللسان بوحدات مفردة تنتشر بين الحليمات الخيطية.

- gustatory papillae (= lingual papillae) الخُلَيْمَاتُ الذَوَقِيَّة؛ الخُلَيْمَاتُ اللِّسَانِيَّة.

- lingual papillae الخُلَيْمَاتُ اللِّسَانِيَّة. الحليمات الخيطية والورقية والكاسية والمخروطية الموجودة على سطح اللسان.

- p. nervi optici (= discus nervi optici) خُلَيْمَةُ العَصَبِ البَصَرِيِّ.

- papillae vallatae (= vallate papillae) الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة. أكبر حليمات اللسان وهي 8-12 حليلة مرتبة بشكل V أمام الثلم الانتهائي للسان.

papilledema وَذَمَّةُ الْخَلِيْفَةِ الْبَصَرِيَّةِ.

قرص مختنق، وهي وذمة القرص البصري والتي غالباً ما تنتج عن ارتفاع الضغط داخل القحف أو ارتفاع ضغط الدم الوبيل أو خثار الوريد الشبكي المركزي.

para-analgesia تسكين أسفل الجسم؛ فَقْدَانُ حِسِّ أَلَمِ أَسْفَلِ الْجِسْمِ. فقدان حس الألم في القسم السفلي من الجسم ويشمل الأطراف السفلية.

para-anesthesia خَدَرُ أَسْفَلِ الْجِسْمِ. خدر القسم السفلي من الجسم والساقين.

parablepsia خَطَلُ الْبَصَرِ. اختلال البصر وخطأه أو شذوذه.

parabulia ضَلَالُ الْإِرَادَةِ. شذوذ يتصف بقيام المصاب به بعمل عكس الذي يبتغيه ولا علاقة له بما يريده.

paracenesthesia خَطَلُ حِسِّ الرَّاحَةِ. شذوذ يتصف بفقدان الحس العام بالراحة والاستقرار النفسي.

paracerebellar مُخَيِّخِي وَخَشِي. منسوب إلى القسم الوحشي من المخيخ.

paracinesia (= parakinesia) خَطَلُ الْحَرَكَةِ.

paracinesis (= parakinesia) خَطَلُ الْحَرَكَةِ.

paracoxalgia نَظِيرُ الْوَرَاكِ. ألم يشابه الألم المرافق لالتهاب الورك.

paracusia خَطَلُ السَّمْعِ. أي اختلال في حس السمع.

p. acris شِدَّةُ السَّمْعِ. شدة حدة السمع المتواصلة.

p. duplicata (= diplacusis) تَضَاعَفُ السَّمْعِ؛ إِذْوَاجُ السَّمْعِ. سمع صوتين عند تنبيه الشخص بمنبه صوتي واحد.

p. loci خَطَلُ تَوْضِيعِ السَّمْعِ. عدم المقدرة على معرفة موضع مصدر الصوت.

paraepilepsy نَظِيرُ الصَّرَعِ؛ صَرْعٌ بَوْرِيٌّ صَغِيرٌ.

parafalx مجاور المَنَجَل. جنب منجل المخيخ أو المخ

paraflocculus (= accessory flocculus) النُّذْفَةُ الْإِضَافِيَّةُ. فصيص

في نصف كرة المخيخ يقع بالجهة الخلفية من ندفته ويكون أحياناً جزءاً بارزاً منه.

parafunction إِخْتِلَالُ الْوُظَيْفَةِ. اضطراب الوظيفة أو شذوذها.

paraganglioma ورم المُسْتَقْتِمَاتِ.

- medullary p. (= pheochromocytoma) وَرَمُ المُسْتَقْتِمَاتِ اللَّيْنَةِ.

- nonchromaffin p. (= chemodectoma) وَرَمُ المُسْتَقْتِمَاتِ غَيْرِ الْمُلَوَّنَةِ. ورم المستقبلات الكيميائية عديمة اللون كتلك التي توجد في الأجسام السباتي أو الأبهري أو الطلي.

paraganglion (= pheochrome body) المُسْتَقْتِمُ. مجموعة من الخلايا الليفية للكروم التي تستمد من الأديم الظاهر العصبي والتي توجد خارج لب الغدة الكظرية وغالباً بالقرب من العقد الودية ومتعلقة بالأبهر وفروعه وتفرز معظمها الأدرينالين أو النورادرينالين.

parageusia 1. خَطَلُ الذُّوقِ 2. ذَوْقٌ كَرِيه. 1. شذوذ حس الذوق 2. حس ذوقي كريه في الفم.

paragrammatism خَطَلُ الْكَلَامِ؛ خَطَلٌ نَحْوِيٌّ. اضطراب الكلام حيث يخلط المصاب في ترتيب الكلمات وفي تنظيم قواعدها النحوية.

paragraphia خَطَلُ الْكِتَابَةِ. اضطراب كتابة الكلمات بصورة صحيحة أو في ترتيبها ترتيباً أصولياً منتظماً.

parahypnosis خَطَلُ النَّوْمِ؛ تَنْوِيمٌ شَاذٌ. نوم أو تنويم شاذ كذلك الذي يولد بالتبنيج.

parakinesia خَطَلُ الْحَرَكَةِ. اضطراب الوظائف الحركية الذي يولد حركات غريبة شاذة.

paralalia خَطَلُ التَّلَفُّظِ. تلفظ شاذ يولد ألفاظاً شاذة مخالفة لما يقصده المتكلم كإبدال مواقع حروف الكلمات وتغيير مواضعها.

- p. literalis خَطَلُ التَّلَفُّظِ الْحَرْفِيِّ. عدم المقدرة على تلفظ بعض الحروف.

paraldehyde بارالدهايد. دواء مركن

ومنوم يستعمل لمعالجة الأرق والإثارة والهباج والهذيان والاختلاج.

paralepsy (= psycholepsy) صرغٌ نفسي؛ نوبةٌ نفسية.

paralexia خطلُ القراءة. اضطرابُ المقدرة على القراءة ويتصف بتحويل الكلمات من مواقعها بحيث لا تعبر عن كلام مفهوم.

paralgesia (= painful paraesthesia) مَذَلٌ مؤلم. خطلٌ أو شذوذٌ حسي مؤلم.

paralgia (= paralgesia) مَذَلٌ مؤلم.

paralogia خطلُ المنطق. في الأمراض النفسية هو كبت فكرة معينة تتولد عن فكرة أولية منطقية وإبدالها بفكرة أخرى مغايرة ولكنها قريبة منها.

- thematic p. خطلُ المنطق الموضوعي. خطل منطقي حول موضوع واحد محدد يشغل فكر الشخص.

paralogism هذر؛ كلامٌ خاطيء. كلام بدون معنى أو غير منطقي يتقوه به المصاب بداء نفسي.

paralysis شللٌ. (ج: شُلُول). فقدان أو اضطراب الوظائف الحركية لأحد الأعضاء أو الأقسام في الجسم بسبب آفة عصبية أو عضلية وبالمقارنة بذلك يمكن أن يكون الشلل حسياً بسبب آفة أحد الأعصاب أو الأعضاء الحسية.

- abducens p. شللُ المُعَبِّد. شلل العضلة المستقيمة للعين بسبب آفة العصب المبعد والذي يولد الحول والشفخ (ازدواج الرؤية).

- p. of accommodation شللُ التكيف. شلل العضلات الهدبية مما يمنع تكيف البصر.

- acute ascending spinal p. (= acute febrile polyneuritis) الشَّلْلُ النُّخَاعِيُّ الصَّاعِدُ. التهاب الأعصاب الحُموي الحاد.

- acute bulbar p. الشَّلْلُ البَصْلِيُّ الحَاد. شلل البصلة الذي يتولد عن آفات الدماغ النخاعية وغالباً ما تكون آفات نزفية أو خثارية.

- acute infections p. (= epidemic poliomyelitis) الشَّلْلُ العدواني الحَاد. التهاب سنجابية النخاع الوبائي.

- p. agitans (= Parkinson's disease)

الشَّلْلُ الرَّعْشِيُّ. نوع من الباركنسونية مجهولة السبببات تحدث في أواخر العمر بالرغم من حدوث حالات قليلة في مقتبل الحياة. وهو مرض متروقي بطيء يتصف بسحنة قناعية الشكل ورعشة، خاصة في العضلات المستقرة، وبطء الحركات الإرادية ومشية مهرولة ووضع خاص مع ضعف العضلات، وقد يرافق ذلك فرط التعرق والشعور بالحرارة المفرطة.

- p. agitans, juvenile الشَّلْلُ الرَّعْشِيُّ اليَفْعِيُّ. حالة تظهر في مقتبل العمر وهي عادة ما تكون عائلية وقد تحدث بصورة منفردة وتتصف بفرط التوتر العضلي مع سحنة وجهية تشبه سحنة الشلل الرعشي. وهي تنتج عن التنكس المتروقي للكرة الشاحبة مع احتمال إصابة السبل خارج الهرمية والمادة السوداء.

- alcoholic p. شَلْلٌ كُحُولِي. شلل يتولد عن إدمان الكحول.

- alternate p. (= alternate hemiplegia) فَالِجٌ مُتَنَاقِبٌ؛ شَلْلٌ شَقِيّ مُتَنَاقِبٌ.

- anesthesia p. شَلْلٌ التَّبْنِيج. شلل يتلو التبنيج.

- anterior spinal p. (= anterior poliomyelitis) شَلْلٌ نُّخَاعِيٌّ أَمَامِيّ. التهاب سنجابية النخاع الأمامية.

- arsenical p. شَلْلٌ زُرْنِيخِي. شلل يتولد عن التسمم بالزرنيخ.

- ascending p. شَلْلٌ صَّاعِدٌ. شلل نخاعي يتقدم تدريجياً نحو الدماغ.

- association p. (= bulbar p.) شللٌ تَرَابِطِيّ؛ شَلْلٌ بَصْلِيّ.

- asthenic bulbar p. (= myasthenia gravis pseudoparalytica) شَلْلٌ بَصْلِيّ وَهَنِيّ. وهن عضلي شللي كاذب.

- asthenobulbospinal p. (= myasthenia gravis) وَهَنٌ عَضَلِيّ وَبِيل.

- Bell's p. (= Bell's palsy) شَلْلٌ بِيل.

- birth p. شَلْلٌ تَوَلِيدِيّ. شلل ينتج عن إصابة تحدث أثناء الولادة.

- brachial p. شَلْلٌ عَضْدِيّ. شلل أحد الأذرع بسبب آفة الضفيرة العضدية.



paralysis

شلل القدم المولد من متلازمة النفق الرسغي.

- brachiofacial p. شَلَلٌ عَضْدِيٌّ وَجْهِيٌّ. شلل يصيب الذراع والوجه.
- Brown-Sequard's p. (= Brown sequard 's syndromes) شَلَلٌ بَرَاوْن سِيْكَوَار. شلل يتولد عن اضطرابات في المراكز الحركية للبصلة (النخاع المستطيل) وهو مرض مزمن ومميت ويصيب الأشخاص بعد سن الخمسين عاماً ولكنه قد يحصل في التصلب الوحشي الضموري أو في تكهف البصلة أو التصلب المتعدد ويتصف بالشلل المترقي لعضلات الشفتين واللسان والفم والبلعوم والحنجرة وينتج عن تنكس النوى العصبية في قاعدة البطين الرابع.
- bulbospinal p. (= myasthenia gravis) وَهْنٌ عَضَلِيٌّ وَخِيم. شَلَلٌ مَرْكَزِيٌّ. شلل يتولد عن إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي.
- central p. شَلَلٌ مَحْفَظِيٌّ مَرْكَزِيٌّ. شلل يتولد عن آفة في المحفظة الباطنة للدماغ.
- cerebro p. شَلَلٌ دِمَاعِيٌّ. شلل يتولد عن آفة داخل القحف.
- circumflex p. شَلَلٌ الْمُنْعَطِف. شلل العصب المنعطف.
- complete p. شَلَلٌ كَامِل. شلل حركي وحسي ووظيفي كامل.
- compression p. شَلَلٌ انْضِغَاطِيٌّ. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب اثناء النوم مثلاً أو بالعكازات.
- conjugate p. شَلَلٌ مُقْتَرِن. شلل يؤدي إلى عدم إمكان الشخص من إجراء حركات عينية متوازية ومقتزنة.
- cortical p. شَلَلٌ قَشْرِيٌّ. شلل ينتج عن آفة تصيب قشرة المخ.
- crossed p. (= cruciate p.) شَلَلٌ مُتَصَالِب. شلل يصيب أحد نصفي الوجه ونصف الجسم المعاكس له.
- crural p. شَلَلٌ فَخْذِيٌّ. شلل يصيب الفخذ أو الفخذين بصورة خاصة.
- crutch p. شَلَلٌ عُكَاذِيٌّ. شلل في أحد الذراعين أو في كليهما ينتج عن انضغاط الأعصاب في الإبط بالعكازة.
- Cruvelhier's p. (= progressive muscular atrophy) ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ مَتَرَقٍ. شَلَلٌ الْإِسْتِقَاء. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب بسبب النوم بوضع واحد لفترة طويلة.
- diaphragmatic p. شَلَلٌ جَنَابِيٌّ. شلل أحد جانبي الحجاب.
- diphtheric p. (= diphtheritic p.) شَلَلٌ خَنَاقِيٌّ. شلل جزئي يتلو أحياناً الإصابة بالخناق وغالباً ما يصيب عضلات البلعوم والحناف (شراع البلعوم).
- diphtheritic p. شَلَلٌ خَنَاقِيٌّ. شلل جزئي يتلو أحياناً الإصابة بالخناق وغالباً ما يصيب عضلات البلعوم والحناف (شراع البلعوم).
- diver's p. شَلَلٌ الْغَوَاص. شلل يصيب الغطاسين في المياه العميقة بسبب هبوط الضغط السريع عند خروجهم من الماء.
- Duchenne's p. (= 1. progressive bulbar p. 2. Erb's-Duchenne p.) 1. شَلَلٌ بَصَلِيٌّ مَتَرَقٍ 2. شَلَلٌ إِرْب دُوشِين. 3. شَلَلٌ إِرْب دُوشِين. شلل إرب دوشين.
- epidemic infantile p. (= epidemic poliomyelitis) الْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاع الْوَبَائِي. شلل الأطفال الوبائي.
- Erb's p. 1. شَلَلٌ إِرْب دُوشِين 2. شلل سفلي تشنجي 3. حثل عضلي ضخامي كاذب.
- Erb-Duchenne p. شَلَلٌ إِرْب - دُوشِين. شلل عضدي بالذراع العلوي ينتج عن شلل الجذور العلوية للضفيرة العضدية ينتج عن تخريب الجذور الرقبية الخامسة والسادسة ويتصف بشلل العضلات الصغيرة لليد.
- facial p. شَلَلٌ الْعَصَبِ الْوَجْهِي. شلل أو ضعف العصب الوجهي كما يحدث في شلل بيل.
- familial periodic p. (= periodic p.) شَلَلٌ دَوْرِيٌّ عَائِلِيٌّ. شلل رخو. شلل مع فقدان التوتر العضلي في القسم المشلول وفقدان المنعكسات الوترية فيه.
- flaccid p. شَلَلٌ رَخْو. شلل مع فقدان التوتر العضلي في القسم المشلول وفقدان المنعكسات الوترية فيه.
- functional p. شَلَلٌ وَظِيفِيٌّ. شلل وقتي لا يتولد عن آفة عصبية، ومن الممكن أن يكون نفسي المنشأ أحياناً.



paralysis, facial

شلل الجانب الايمن نتيجة شلل العصب الثلاثي التوائم.

- **p. of gaze** شَلْلُ الحَمَلَّة. شلل يتولد عن آفات مرضية في المراكز فوق النوية للعصب محرك العين أو في سبله المركزية مما يولد شلل الحملقة الأفقية أو العمودية.
- **general p. (= general paresis)** الشَّلْلُ العام.
- **general p. of the insane (= general paresis of the insane)** الشَّلْلُ العام.
- **glossolabial p. (= bulbar p.)** الشَّلْلُ اللِّسَانِي الشَّقَوِي
- **glossopharyngolabial (= labial p.)** الشَّلْلُ اللِّسَانِي البَلْعَوِي الشَّقَوِي.
- **hereditary cerebrosplinal p.** الشَّلْلُ الدِّمَاغِي النَّخَاعِي الوراثي. حالة وراثية تظهر عادة في بداية سن الشباب وتتطور تدريجياً ويمكن أن تتصف بشلل في الأطراف العليا أو السفلى أو في كليهما أو في جهة واحدة أو في كل الأطراف الأربعة.
- **histrionic p.** الشَّلْلُ التَّعْبِيرِي. شلل بعض عضلات الوجه مما يولد سحنة وجهية عاطفية خاصة.
- **hypoglossal p.** شَلْلُ تَحْتَ اللِّسَانِي. شلل العصب تحت اللسان بسبب آفة تصيب نواته أو سبله العصبية المركزية.
- **hysterical p.** شَلْلٌ هِسْتِيرِي. فقدان القدرة الحركية الظاهرة من دون وجود أي سبب عضوي عصبي.
- **incomplete p. (= paresis)** شَلْلٌ نَاقِص؛ خَرْج.
- **Infantile p. (= poliomyelitis)** شَلْلُ الْأَطْفَال. التهاب سنجابية نخاع.
- **Infantile cerebral ataxic p.** شَلْلٌ طِفْلِي مُجَيَّ وَنَحِي. حالة تنتج عن سوء تطور المناطق الجبهية للمخ توجد عند الولادة وتؤثر على كل الأطراف ولكنها ليست متروقة.

- infantile cerebrotocerebellar diplegic p. شَلْلٌ طِفْلِيٌّ مُخَيٍّ مُخَيَّيٍّ مُزْدَوِجٌ. حالة تظهر في الولدان وتؤثر على كل الأطراف وتنتج عن فشل تطور أو تخريب الأجزاء المتبادلة في المخ والمخيخ.
- Infantile spastic p. (= cerebral p.) شَلْلٌ طِفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ.
- infantile spinal p. (= acute anterior poliomyelitis) شَلْلٌ طِفْلِيٌّ نُخَاعِيٌّ. التهاب سنجابية النخاع الأمامي الحاد.
- infectious bulbar p. (= pseudorabies) شَلْلٌ بَصْلِيٌّ عَدَوَاتِيٌّ؛ داء الكلب الكاذب.
- ischemic p. شَلْلٌ إِقْفَارِيٌّ. شلل موضعي بسبب انسداد الدورة الدموية للموضع كما يحصل في الخثار أو الانصمام.
- juvenile p. شَلْلٌ يَفْعِيٌّ. شلل عام يصيب الأحداث.
- Klumpke's p. (= Klumpke-Dejerine p.) شَلْلٌ كُلُومِبِكَةٌ.
- Klumpke-Dejerine p. شَلْلٌ كُلُومِبِكَةٌ - دِيجِرِين. نمط الشلل العضدي السفلي للذراع الذي يتصف بشلل عضلات الذراع واليد وينتج عن آفة العصبين الرقبين الثامن والصدرى الأول. وغالباً ما يصيب الولدان الذين يولدون بالتوليد المقعدي.
- Kussmaul-Landry p. (= acute febrile polyneuritis) شَلْلٌ كُوسْمَاوُل - لَانْدْرِي. التهاب الأعصاب الحُموي الحاد.
- laryngeal p. شَلْلٌ حَنَجَرِيٌّ. شلل إحدى عضلات الحنجرة.
- lead p. شَلْلٌ الرِّصَاصِ. شلل يتولد عن التسمم بالرصاص وينتج عن التهاب الأعصاب المحيطية ويتصف بتدلي الرسغ.
- Lissauer's p. شَلْلٌ لِيَسَاوَر. نمط سكتي الشكل للخرف الشللي.
- local p. شَلْلٌ مُوَضِعِيٌّ. شلل عضلة واحدة أو مجموعة عضلات موضعية.
- masticatory p. شَلْلٌ مَضْغِيٌّ. شلل عضلات المضغ.
- medullary tegmental p's. شُلُولٌ بَصْلِيَّةٌ

- سَقِيْفِيَّة. شلل يتولد عن آفات سقيفة النخاع المستطيل وتشمل الفالج المتناوب وبعض المتلازمات العصبية كمتلازمة سيستان ومتلازمة تايبا.
- mimetic p. شَلْلٌ مُحاكِي. شلل عضلات الوجه.
- mixed p. شَلْلٌ مُخْتَلَط. شلل حركي وحسي مختلط.
- motor p. شَلْلٌ حَرَكِي. شلل العضلات الإرادية.
- musculospiral p. (= radial p. = Saturday night palsy) الشلل العضلي الحلزوني؛ شَلْلٌ الكَعْبَرِي. شلل العضلات الباسطة للرسغ وللأصابع يتولد غالباً عن انضغاط العصب العضلي اللولبي (العصب الكعبري). ويختلف نوع الشلل حسب قسم العصب المصاب وقد يترافق مع ضعف انبساط المرفق أيضاً.
- myopathic p. شَلْلٌ إغْتِلَالِيٌّ عَضَلِيٌّ. شلل يتولد عن اعتلال العضلة نفسها.
- narcosis p. شَلْلٌ التَّخْدِير. الشلل الذي يتولد عند التبنج سواء بالضغط أو بالتبريد أو بالكوراري.
- p. notarium (= writer's cramp) مَقْعَصُ الكَاتِب.
- nuclear p. شَلْلٌ نَوَوِيٌّ. شلل يتولد عن إصابة إحدى النوى العصبية.
- obstetric p. (= birth p.) شَلْلٌ تَوَلِيدِيٌّ.
- oculomotor p. شَلْلٌ مُحَرِّكُ الْعَيْن. شلل العصب محرك العين.
- organic p. شلل عُضْوِي. شلل ينتج عن إصابة نسيج أو بنية عصبية.
- parotitic p. شَلْلٌ نَكَافِي. شلل يترافق مع داء النكاف.
- periodic familial p. شَلْلٌ دَوْرِيٌّ عَائِلِيٌّ. خلة وراثية جسدية سائدة تتصف بنوبات معاودة من شلل رخو مترقي سريع.
- peripheral p. شَلْلٌ مُحِيطِيٌّ. شلل يتولد عن إصابة العصب في موقع بين نواته ونهايته في العضلة.
- peroneal p. (= crossed leg palsy) شَلْلٌ شَطْوِيٌّ؛ شَلْلٌ تَصَالِبُ السَّاقِ
- phonetic p. شَلْلٌ التَّصَوُّيَّة. شلل عضلات النطق.

- postdiphtheric p. شَلَلٌ تَالِيٌّ لِلْخَنَاقِ. شلل يتلو الإصابة بالخناق.
- posthemiplegic p. شَلَلٌ تَالِيٌّ لِلْمَآلِجِ. ضعف عضلي يتلو سكتة الفالج.
- posticus p. شَلَلٌ خَلْفِيٌّ. شلل العضلة الحلقية الدرقية الخلفية.
- pressure p. شَلَلٌ انْضَغَاطِيٌّ. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب وهو عادة ما يكون وقتياً.
- pseudobulbar p. شَلَلٌ بَصْلِيٌّ كَاذِبٌ. ضعف تشنجي في العضلات التي تغذيها الأعصاب القحفية وهي عضلات الوجه والبلعوم واللسان بسبب آفة السبيل القشري النخاعي بالجانبين وعادة ما يترافق ذلك مع الضحك أو العويل الذي لا يمكن التحكم بهما.
- pseudohypertrophic muscular p. شَلَلٌ عَضَلِيٌّ ضَخَامِيٌّ كَاذِبٌ. انظر dystrophy.
- radial p. (= musculospinal p.) شَلَلٌ الْكُفْبَرِيّ.
- Ramsay- Hunt p. (= juvenile paralysis agitans) شَلَلٌ زَمْزِيٌّ - هَنْت. شلل رعشي حداثي.
- reflex p. شَلَلٌ مُنْعَكِسِيٌّ. شلل ينتج عن تهيج محيطي ولكنه يحدث أحياناً بسبب بعض آفات النخاع الشوكي نفسه.
- Remak's p. شَلَلٌ رِيْمَاك. شلل العضلات الباسطة للرسغ والأصابع.
- rucksack p. شَلَلٌ حَقِيبِيَّةُ الظَّهْرِ. اضطراب حسي حركي في وظائف الأطراف العلوية ينتج عن أذى يصيب الضفيرة العضدية نتيجة ارتداء حقيبة الظهر.
- saturday night p. (= musculospiral p.) شَلَلٌ لَيْلَةُ السَّبْتِ. شَلَلٌ الْكُفْبَرِيّ.
- sensory p. شَلَلٌ جِسْمِيٌّ. فقدان الحس الذي يتولد عن إصابة مرضية للعصب الحسي.
- serum p. شَلَلٌ مُصْلِيٌّ. شلل عصبي محيطي يتولد عن زرق مصل للجسم.
- sleep p. شَلَلٌ تَالِيٌّ لِلنَّوْمِ؛ شَلَلٌ نَوْمِيٌّ. شلل يحدث عند أول الاستيقاظ أو عند بدء النوم وهو امتداد لحالة النوم إلى اليقظة.
- spastic p. شَلَلٌ تَشَنُّجِيٌّ. شلل يتصف بتشنج عضلات القسم المشلول من الجسم مع زيادة المنعكسات الوترية بسبب آفة العصبون الحركي العلوي.
- spastic spinal p. شَلَلٌ تَشَنُّجِيٌّ نَخَاعِيٌّ. شلل تشنجي مترقي ومتقطع من دون أي فقدان حسي، وكان يعتقد بأنه يتسبب عن التهاب النخاع والسحايا الزهري.
- spinomuscular p. شَلَلٌ نَخَاعِيٌّ عَضَلِيٌّ. شلل يتولد عن آفة المادة السنجابية للنخاع الشوكي أو للأعصاب التي تنبع منها.



paralysis, spastic

تشنج اليد في الشلل الدماغي يظهر كب الساعد وثني الرسغ والإبهام مع ثني المفاصل السنعية السليمة.

- supranuclear p. (= pseudobulbar p.)

شَلَلٌ بَصَلِّيٌّ كَاذِبٌ.

- Todd's p.

شَلَلٌ تُوْد. فالج (شلل شقي)

أو شلل أحادي يتلو نوبة الصرع.

- trigeminal p. شَلَلُ الثَّلَاثِي التَّوَائِم. شلل العصب

الفحفي الخامس (ثلاثي التوائم) بسبب آفة فيه ويتصف بفقدان الحس في الوجه مع ضعف عضلات المضغ.

- ulnar nerve p. شَلَلُ الْعَصَبِ الزُّنْدِيِّ. شلل

يؤدي إلى ضعف حركة انثناء الإصبعين الخنصر والبنصر مع ضمور كل العضلات الصغيرة في اليد ما عدا تلك الموجودة في النصف الوحشي في ألية اليد مع فقدان الحس في الناحية الإنسية لأسفل الساعد وراحة اليد ويدوم لبضعة دقائق أو ساعات وقد يدوم أحياناً إلى عدة أيام بعد النوبة.

- p. vacillans (= chorea) رَقَصٌ.

- vasomotor p. شَلَلُ الْمُحَرِّكِ الْوَعَائِيِّ. توقف

سيطرة المحرك الوعائي.

- waking p. (= sleep p.) شَلَلٌ اسْتَيْقَاطِيٌّ. حالة

ارتخاء تنويمي عند الاستيقاظ خاصة في حالات السبخ (النوم الانتبائي).

- wasting p. شَلَلٌ ضَمُورِيٌّ. ضمور عضلي

نخاعي المنشأ.

- writer's p. (= writer's cramp) مَعْصُ الْكَاتِبِ

دَاءُ الشَّلَلِ الشَّلِّيّ

1. مَشْلُول (أشل؛ شلاء) 2. شَلَلِيٌّ. paralytic

1. شخص مصاب بالشلل 2. منسوب للشلل.

paralytogenic مَوْلِدُ الشَّلَل؛ مُشَلٌّ. ما

يولد الشلل.

paralyze شَلٌّ. يولد حالة الشلل.

paralyzer مُشَلٌّ؛ مُلَبِّطٌ. مادة تمنع أو

تبطئ التفاعل الكيميائي.

paramethadione بَارَامِيثَادِيُون. دواء مضاد

للاختلاج يستعمل في علاج نوبات الصرع الصغير.

paramimia خَطَلُ الْإِيْمَاء؛ خَطَلُ التَّأْشِيرِ.

حالة سوء استعمال الإشارات للتعبير عن الأفكار أو

استعمال إيماءات غير مناسبة أثناء الكلام.

paramnesia شُرُودُ الذَّاكِرَةِ. 1. حالة

اضطراب الذاكرة يختلط فيها الخيال مع الحقائق

2. حالة يتذكر فيها الشخص الكلمات ولكنه

يستعملها من دون فهم معانيها.

paramusia فَقْدَانُ الْجِسْمِ الْمَوْسِيقِيِّ.

شدوذ أو فقدان الحس والتعبير الموسيقيين.

paramyoclonus رَمْعٌ عَضَلِيٌّ مُنْعَدَّد.

حالة تتصف بتقلصات عضلية رمعية في عدد من

العضلات.

- p. multiplex رَمْعٌ عَضَلِيٌّ شَامِلٌ. حالة تحدث

في الذكور أكثر مما تحدث في الإناث وتتصف بتقلصات عضلية فجائية تصيب أولاً العضلات القصوية للذراع وحزام الكتف ومن ثم عضلات الجذع والقسم السفلي من الأطراف ومن ثم عضلات الوجه والعضلات القصوية

داء التشنج العضلي التوتري. paramyotonia

داء يتصف بتشنج توتري بسبب اضطراب التوتر

العضلي وهو مرض وراثي وخلقي.

- ataxic p. داء التشنج العضلي التوتري الرنحي.

تشنج عضلي مع رنح بسيط عند محاولة الحركة.

- p. congenita داء التشنج العضلي التوتري

الخلقي. اضطراب وراثي جسدي سائد يشبه التوتر العضلي الخلقي ما عدا أنه يحفز بالتعرض للبرد ويزداد عند الحركة الفعالة ويصيب عضلات الاقسام العلوية من الأطراف والاجفان واللسان.

- symptomatic p. داء التشنج العضلي التوتري

الأعراضية. تيبس موقت عند بدء المشي يشاهد في

الشلل الرعشي.

paramyotonus تَشَنُّجٌ عَضَلِيٌّ تَوْتَرِيٌّ.

حالة تتصف بتشنج العضلات التوتري.

paranalgesia (= para- analgesia)

تَسْكِينُ الْأَطْرَافِ السُّفْلِيَّةِ.

paranesthesia (= para- anesthesia)

خَذَرٌ اسْفَلِ الْجِسْمِ.

paraneural جَنْبُ الْعَصَبِ. بجانب العصب أو

محاذٍ له.

paranoia زَوَرٌ؛ دُهَانٌ كِبْرِيَائِيٌّ. اضطراب

ذهاني يتصف بتوهم ثابت بالاضطهاد أو بالغيرة

والحسد ويسلوك الشخصية الزورانية كالتشكك

وفقدان الثقة والرغبة بالخصام والقتال. وهناك

خمسة أنواع منه: الاضطهادي والحسدي والهوسي
العشقي والجسدي والكبريائي.

paranoiac اُزُور؛ زُوراء. مصاب بالزور
أو منسوب إليه.

paranoid زُوراني. شبيه بالزور.

paranomia حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ. حبسة تتصف
بعدم المقدرة على تسمية الاجسام الملموسة أو
المنظورة.

myotactic p. حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْمَفُوسَات. عدم
المقدرة على تسمية الاجسام الملموسة.

visual p. حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْمَنْظُورَات. عدم
المقدرة على تسمية الاجسام المنظورة.

paraparesis خَزَلٌ سُفْلِي. خزل الاطراف
السفلية.

paraphasia (= nominal aphasia) حُبْسَةُ
التسمية؛ خَطَلُ التسمية. حبسة جزئية يستعمل
فيها المريض كلمات مغلوبة أو يستعمل كلمات في
تركيبات لا تؤدي إلى معنى صحيح.

central p. حُبْسَةُ التسمية المركزية. حبسة
جزئية تنتج عن آفة دماغية.

literal p. حُبْسَةُ التسمية اللاحرفية. حبسة
كلامية تستعمل فيها بعض الاصوات في مواضع بعض
حروف الكلمات.

verbal p. حُبْسَةُ التسمية اللفظية. إبدال بعض
الكلمات أو المقاطع الكلامية بكلمات ومقاطع بديلة قد لا
تؤدي المعنى المطلوب لعدم ارتباطها بالكلام المقصود.

paraphemia شذوذ الكلمات؛ حُبْسَةُ كَلَامِيَّة. حبسة
يستعمل فيها المريض كلمات مغلوبة غير
المقصودة.

paraphilia شذوذ جنسي. اضطراب جنسي
نفسي يتصف بالرغبة الجنسية بأجسام غير بشرية
وممارسات جنسية شاذة وهناك أنواع عديدة منه.

paraphobia رُهابٌ بِسَيْط. رهاب خفيف.

paraphonia تَغْيِيرُ الصَّوْت. تغير الصوت
المرخي أو انعدام الصوت الجزئي.

p. puberum تَغْيِيرُ الصَّوْتِ الْبُلُوغِي. تغير
صوت الأحداث عند سن البلوغ.

paraphora خَلَلٌ عَقْلِي. اضطراب عقلي بسيط.

paraphrasia (= paraphasia) حُبْسَةُ

التسمية؛ شذوذ العبارة. حبسة الجمل الجزئية وهي
وعيب كلامي يتصف بعدم انتظام ترتيب الكلمات المنطوقة.

paraphrenia اُزُورار؛ دُهَانٌ تَخَلِّي. زور
أو فصام زوراني يتصف بتوهم خيالي سخي
وكامل الترابط ويدوم لسنين طويلة من دون أي
ترد شديد في شخصية المصاب وهي حالة وسطية
بين الزور والفصام الزوراني.

paraphrenitis اِلْتِهَابُ مجاورات الحجاب. التهاب
الحجاب الحاجز وحواليه.

paraphysis النَّاتِيءُ الْجَانِبِي. ناتئ رقيق
الجدران يبرز من الصفيحة السطحية للدماغ
الانتهازي ويظهر لفترة مؤقتة في جنين الإنسان.

paraplectic (= paraplegic) مَشْلُولُ
الأسفل؛ شَلَلِي سُفْلِي.

paraplegia شَلَلٌ سُفْلِي؛ شَلَلٌ بَصْفِي سُفْلِي. شلل
الاطراف السفلية والقسم السفلي من الجسم.
شَلَلٌ سُفْلِي كُحُولِي. شلل سفلي
يتولد عن إدمان الكحول المزمّن وقد يتسبب عن التهاب
الاعصاب المحيطية.

**ataxic p. (= acute combined
degeneration of spinal cord)** شَلَلٌ سُفْلِي
رَنَحِي. تنكس مشترك حاد للنخاع الشوكي.

cerebral p. شَلَلٌ سُفْلِي دِمَاعِي. شلل سفلي
يتولد عن آفة تصيب جهتي الدماغ.

Erb's spastic p. شَلَلٌ اِزْبِ السُّفْلِي التَّشَنُّجِي. نوع
نادر من الزهري السحاثي الوعائي الذي يتصف
بتشنج مترقي مع ضعف الساقين والشلل السفلي
والضمور العضلي والمذل وزيادة المنعكسات الركبية
والكاحلية والسلس.

**Erb's syphilitic spastic p. (= Erb's
spastic p.)** شَلَلٌ اِزْبِ السُّفْلِي الزَّهْرِي التَّشَنُّجِي.

flaccid p. شَلَلٌ سُفْلِي رَخْو. شلل سفلي مع
فقدان توتر عضلات الاقسام المشلولة من الجسم
وفقدان المنعكسات الوترية.

peripherat p. شَلَلٌ سُفْلِي مُحِيطِي. شلل سفلي
بسبب آفة العصبون الحركي السفلي.

Pott's p. شَلَلٌ بُوتِ السُّفْلِي. شلل سفلي
يتولد عن تسوس الفقرات أو عن سل السيساء.

reflex p. شَلَلٌ سُفْلِي اِنْعَكَاسِي. شلل الاطراف

السفلية الذي يتولد عن التهيج المحيطي للمراكز العصبية.

- **senile p.** شَلَلٌ سَفَلِيٌّ شَيْخُوخِيٌّ. نوع من الشلل السفلي الذي يتصف بتشنج توتري للعضلات المشلولة مع زيادة منعكساتها وهو يتسبب عادة عن آفات أفقية في النخاع الشوكي أو عن التصلب الأمامي الجانبي.

- **spastic p.** شَلَلٌ سَفَلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ. شلل سفلي يتصف بتشنج عضلات القسم المشلول من الجسم مع زيادة المنعكسات الوترية بسبب إصابة السبيل القشري النخاعي.

- **spastic p., congenital** شَلَلٌ سَفَلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ خِلَقِيٌّ. شلل سفلي تشنجي يوجد عند الولادة ويتسبب عن إصابات الولادة أو النزف الدماغي قبل الولادة أو عن التكون الشاذ للدماغ.

- **spastic p., infantile (= spastic p., congenital)** شلل سفلي تشنجي طفلي: شَلَلٌ سَفَلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ خِلَقِيٌّ.

- **spastic p., primary** شَلَلٌ سَفَلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ أَوَّلِيٌّ. نوع من الشلل السفلي الذي يعتقد بأنه يتولد عن التنكس الأولي في السبيل الهرمي.

- **p. superior** شَلَلٌ نَصْفِيٌّ عُلوِيٌّ. شلل الأطراف العلوية.

- **syphilitic p. (= Erb's p.)** شَلَلٌ إِرْبُ السَفَلِيِّ.

- **toxic p.** شَلَلٌ سَفَلِيٌّ تَسَمُّمِيٌّ. شلل سفلي يتولد عن تسمم الدم.

1. شَلَلِيٌّ سَفَلِيٌّ 2. مَشْلُولُ الْأَسْفَلِ. **paraplegic** منسوب أو متصف بالشلل السفلي أو مصاب به.

شَبِيهَةُ الشَّلَلِ السَفَلِيِّ. **paraplegiform**

شَبِيهَةُ السَّكَنَةِ. حالة شبيهة **parapoplexy** بالسكتة.

خَطَلُ الْأَدَاءِ. **parapraxia (= parapraxis)**

خَطَلُ الْأَدَاءِ. خطأ في أداء الأعمال مثل زلات اللسان عند الكلام أو سوء وضع المواد في غير مواقعها ومن دون قصد وبلا وعي.

parapsia (= parapsis = paraphia) شَذُوذُ اللَّفْسِ.

شَذُوذُ اللَّفْسِ. شذوذ في حس اللمس. **parapsis**

parapsychology الباراسيكولوجيا. دراسة التأثيرات والتجارب النفسية التي تقع خارج نطاق القوانين الفيزيائية كالتخاطر والتبصر.

parareflexia اضْطِرَابُ الْمُنْعَكَسَاتِ. خلل المنعكسات واضطرابها.

parasexuality شَذُوذُ جِنْسِيٍّ. انحراف جنسي ذكري أو أنثوي.

1. تَعَذُّرُ الْإِسْتِجَابَةِ 2. اضْطِرَابُ **parasomnia** نَوْمِيٍّ. 1. حالة عدم استجابة المصاب للمنبهات الكلامية أو العقلية سوى الاستجابة للمنبهات المنعكسية 2. سلوك نومي شاذ مثل السير النومي أو بوال الفراش أو صريف الأسنان.

paraspasm تَشْنُجٌ مُتَنَاطِرٌ. تشنج عضلي متناظر بجهتي الجسم.

تَشْنُجٌ **paraspasmus (= paraspasm)** مُتَنَاطِرٌ.

تَشْنُجٌ وَجْهِيٌّ مُتَنَاطِرٌ. اضطراب **p. faciale** حركي تشنجي غير مؤلم بجهتي الوجه.

الأَوْدِي. متعلق بقسم **parasympathetic** اللاودي من الجهاز العصبي المستقل والذي يتكون من الأقسام البصرية والبصلية والعجزية.

parasympathicotonia (= vagotonia) غلبة اللاودي؛ غلبة المُبْهِمِ.

بَارَاسَمْبَاثِين. مادة فرضية **parasympathin** يعتقد بأنها تفرز عند تنبيه عصب قحفي مستقل له تأثير تنبيهي على الجهاز العصبي اللاودي.

حَالُ الْأَوْدِي. ما **parasympatholytic** يولد تأثيراً مشابهاً لقطع العصب اللاودي الذي يغذي أحد الأقسام أو الأعضاء أو أية مادة تقوم بمثل هذا العمل.

مُحَاكِ الْأَوْدِي. **parasympathomimetic** ما يولد تأثيراً مشابهاً لتنبيه العصب اللاودي الذي يغذي أحد الأقسام أو الأعضاء أو أية مادة تقوم بمثل هذا العمل.

خَطَلُ الْمِرْجَاجِ. شذوذ المزاج **parathymia** أو مزاج معكوس أو غير مناسب.

إِخْتِلَالُ التَّوَثُّرِ. اختلال التوتر **paratonia** العضلي أو غيره.

parectasia (= parectasis) فَرْطُ التَّمَدُّدِ.

parectasis فَرْطُ التَّمَدُّدِ. فرط تمدد أحد الأقسام أو الأعضاء.

parectropia (= apraxia) تَعَدُّرُ الأداءِ.

parencephalia غَيْبُ دِمَاجِيٍّ خَلْقِيٍّ. عيب خلقي في تكوين الدماغ أو أحد أقسامه.

parencephalous مَعْيِبُ الدِّمَاغِ. المصاب بعيب الدماغ الخلقي.

parergasia (= schizophrenic psychosis) ذُهَانٌ قُصَامِيٌّ.

paresis خَزَلٌ. شلل بسيط أو جزئي.

- canal p. خَزَلٌ قَنَاتِيَّ العُنْشَا. عدم استجابة إحدى الأذنين أو كليهما للمنبهات الحرارية الباردة أو الحارة بسبب خلل دهلبيزي.

- galloping p. خَزَلٌ خَبِيْثٌ. خزل عام يتطور بسرعة كبيرة.

- general p. خَزَلٌ عَامٌ. زهري عصبي متني يولد فيه التهاب السحائي الدماغية المزمن فقدان وظائف القشرة تدريجياً ويسبب الخرف المترقي والشلل العام وهو يحدث عادة بعد 10-20 سنة بعد الإصابة الأولية بالزهري.

- juvenile p. خَزَلٌ يَفْعِيٌّ. الخزل الذي يحدث في الأطفال أو الأحداث أو الشباب بسبب داء الزهري الخلقي.

- vestibular p. (= canal p.) الخَزَلُ الدُّهْلَبِيْزِيٌّ.

paresonalgesia خَزَلٌ خَدْرِيٌّ. خزل مع فقدان حس الألم في الأقسام المصابة.

paresthesia مَذَلٌ. حس مرضي شاذ كحس محرق أو وخزي أو تنملي وما شاكل ذلك يظهر ذاتياً حتى من دون أي تنبيه أو أية استجابة لمتعكس.

- Berger's p. مَذَلٌ بِرْغَر. مذل في أحد الأطراف السفلية أو في كليهما وضعفهما ولكن من دون أية أعراض ظاهرة أخرى ويصيب الأحداث.

- Bernhardt's p. (= meralgia paresthetica) أَلَمُ الْفَخْذِ الْمَذَلِّي.

- visceral p. مَذَلٌ حَشَوِيٌّ. حس شاذ في أحد الأحشاء وهو حس غريب وليس زيادة أو فقدان إحدى الحواس الطبيعية للحشو.

paresthetic مَذَلِيٌّ. متعلق بالمذل أو متصف به.

paretic خَزَلِيٌّ؛ أَخْزَلٌ؛ خَزَلَاءٌ. متعلق بالخزل أو مصاب به.

parietal جِدَارِيٌّ. 1. متعلق بجدار أحد الكهوف 2. متعلق أو قريب من العظم الجداري مثل الفص الجداري للدماغ.

parkinsonian بَارِكِنْسُونِيٌّ. متعلق أو منسوب للباركنسونية.

parkinsonism البَارِكِنْسُونِيَّةُ. مجموعة من الاضطرابات العصبية تتصف بقلّة الحركة والرعاش والصلل العضلي.

- postencephalic p. (= parkinsonian syndrome) البَارِكِنْسُونِيَّةُ التَّالِيَةُ لِالْتِهَابِ الدِّمَاغِ. انظر syndrome

paroniria كَابُوسٌ؛ حُلْمٌ مَرَضِيٌّ. حلم مرعب شاذ.

parorexia (= pica) وحم؛ قَطَا؛ شَذُوذُ الشَّهِيَّةِ.

parosmia خَطَلُ الشَّمِّ. حس شمّي شاذ.

parosphresia اضْطِرَابُ الشَّمِّ.

paroxysm 1. انْتِيَابٌ. 2. اشْتِدَادٌ. 1. نوبة أو تشنّج 2. عودة أحد الأعراض أو اشتداده المفاجيء.

paroxysmal انْتِيَابِيٌّ. يعاود على شكل نوبات.

pars جُزْءٌ. (ج: أَجْزَاءٌ). قسم من عضو أو بنية كبيرة.

- p. anterior commissurae anterioris cerebri (= p. anterior commissurae rostralis cerebri) الْجُزْءُ الْأَمَامِيُّ لِلصُّوَارِ الْمُخَيِّ الْأَمَامِيِّ.

- p. anterior lobuli quadrangularis (= p. quadrangularis cerebelli) الْجُزْءُ الْأَمَامِيُّ لِلْفُصَيْصِ الْمُرَبَّعِ الْمُخَيِّ.

- p. anterior pedunculi cerebri (= p. ventralis pedunculi cerebri) الْجُزْءُ الْأَمَامِيُّ لِسُوقِيَّةِ الْمُخِ.

- p. autonómica systematis nervosi الْجُزْءُ الْمَسْتَقْلَلِيَّ لِلجِهَانِ الْعَصْبِيِّ. قسم الجهاز العصبي الذي يتحكم في تنظيم فعاليات العضلات القلبية والمساواة والغدد.

- p. basilaris pontis (= p. ventralis pontis) الجزء القاعدي للجسر.
- p. basolateralis corporis amygdaloidei الجزء القاعدي الوحشي للجسم اللوزي. القسم القاعدي للجسم اللوزي الذي يحوي النوى الوحشية والقاعدية والقاعدية الإضافية اللوزية.
- p. buccalis hypophyseos (= Rathke's pouch) جزء النخامية الشذقي. جراب راتكة.
- p. caudalis lobuli quadrangularis الفصيص (= lobulus simplex cerebelli) المخيخي البسيط.
- p. caudalis nervi vestibularis الجزء الذنبى للعصب الدهليزي. الفرع الذنبى أو السفلي للعصب الدهليزي الذي ينتهي في العرف الامبولي للقناة الهلالية الخلفية وفي بقعة الكيبس.
- p. centralis systematis nervosi الجزء المركزي للجهاز العصبي. الجزء الذي يحوي الدماغ والنخاع الشوكي.
- p. cephalica et cervicalis systematis الجزء الراسي والرقبي للجهاز المستقل. جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الراس والرقبة وينبع قسمه الودي من الحبل الصدري العلوي ويترحل في العقد الرقبية الودية. وينبع قسمه اللاودي من جذع الدماغ خلال الاعصاب محرك العين والوجهي واللساني البلعومي والمبهم والإضافي ويترحل في العقد الهدبية والجناحية الحنكية والاذنية وتحت الفك السفلية والعقد الداخلية.
- p. cerebri arteriae carotidis internaie الجزء الدماغية للشريان السباتي الباطن. الجزء الدماغية الانتهائي للشريان السباتي الباطن الذي ينقسم إلى القسمين الامامي والخلفي في الحفرة القحفية الوسطية.
- p. cervicalis medullae spinalis الجزء الرقبى للنخاع. قسم النخاع الشوكي الذي يوجد في القسم الرقبى من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الثمانية من الاعصاب الشوكية الرقبية.
- p. coccygea medullae spinalis الجزء العصعصي للنخاع. قسم النخاع الشوكي الموجود في القسم العصعصي من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الثلاثة من الاعصاب الشوكية العصعصية.
- p. cochlearis nervi octavi (= nervus cochlearis) الجزء القوقعي من العصب الثامن: cochlearis العصب القوقعي.
- p. cochlearis nervi vestibulocochlearis (= nervus cochlearis) الجزء القوقعي من العصب الدهليزي القوقعي.
- p. compacta الجزء المكتنز. الجزء الظهري من المادة السوداء وهو يحوي خلايا متوسطة الحجم ومعظمها منصيفة.
- p. corticomedialis corporis الجزء القشري الإنسي للجسم اللوزي. الجزء الذي يحوي النوى اللوزية الإنسية والمركزية والقشرية ونواة السطر الشمي الوحشي والباحة اللوزية المتحولة الامامية.
- p. cranialis lobuli quadrangularis الجزء الخفي للفصيص المربع (= lobulus quadrangularis cerebelli).
- p. distalis adenohypophyseos الجزء القاصي للنخامية الغدية.
- p. dorsalis corporis geniculati الجزء الظهري للجسم الركبي الوحشي. lateralis
- p. dorsalis corporis geniculati الجزء الظهري للجسم الركبي الإنسي. medialis
- p. dorsalis diencephali الجزء الظهري للدماغ البيني. جزء الدماغ البيني فوق التلم الوطائي والذي يتكون من المهاد الفوقي والمهاد الظهري والمهاد التالي.
- p. dorsalis pedunculi cerebri الجزء الظهري للسويقة المخية. جزء السويقة المخية المتواصل عبر المستوى الناصف والذي يكون سقيفة الدماغ المتوسط.
- p. dorsalis pontis الجزء الظهري للجسر. الجزء السقيفي للجسر والذي يشبه النخاع المستطيل في بنيته والمتواصل مع سقيفة الدماغ المتوسط.
- p. frontalis capsulae internaie (= crus anterius capsulae internaie) الساق الامامية للمخفظة الداخلية.
- p. frontalis radiationis corporis callosi الجزء الجبهي لشع الجسم القفني. الشع الذي

- يتكون من الياف تنحدر من الركبة إلى الفص الجبهي.
- p. grisea hypothalami **الجزءُ السِّنْجَابِيُّ**
للوطاء. الكتل النووية للوطاء.
 - p. inferior gyri frontalis medii **الجزءُ**
السُّفْلِيُّ لِلتَّلْفِيفِ الجَبْهِيِّ الوَسْطِيِّ.
 - p. inferior nervi vestibularis (= p. caudalis nervi vestibularis) **الجزءُ الذَّنْبِيُّ**
للْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ.
 - p. inferior partis vestibularis nervi octavi **الجزءُ الذَّنْبِيُّ لِلْقِسْمِ الدَّهْلِيْزِيِّ**
لِلْعَصَبِ الثَّامِنِ.
 - p. infraclavicularis plexus brachialis **الجزءُ تَحْتَ التَّرْقُويِّ لِلضَّفِيرَةِ العَضْدِيَّةِ.** جزء الضفيرة العضدية الذي يقع في الإبط تحت مستوى الترقوة وتتفرع منه الأعصاب الصدرية الإنسية والوحشية والعضلية الجلدية والجلدي العضدي الإنسي وأمام الجلدي العضدي الإنسي والناصف والزندى والكعبري وتحت الكتفي والصدرى الظهرى والإبطي.
 - p. infundibularis lobi anterioris hypophyseos (= p. tuberalis adenohypophyseos) **الجزءُ الحَدْبِيُّ لِلنَّخَامِيَّةِ الغُدِّيَّةِ.**
 - p. insularis arteriae cerebri mediae **الجزءُ الجَزِيرِيُّ لِلشَّرَيَانِ المَخِّيِّ المُتَوَسِّطِ.** فروع الشريان المخي المتوسط التي تغذي الجزيرة والمناطق المجاورة لها والتي تتكون من الشرايين الجزيري والجبهي القاعدي الوحشي والصدغي الأمامي والمتوسط والخلفي.
 - p. intermedia adenohypophyseos **الجزءُ النَخَامِيَّةِ الغُدِّيَّةِ المُتَوَسِّطِ.**
 - p. intracranialis nervi optici **الجزءُ العَصَبِ البَصَرِيِّ دَاخِلَ القَنَاةِ.** جزء العصب البصري الذي يمر خلال القناة البصرية.
 - p. intracranialis nervi optici **الجزءُ العَصَبِ البَصَرِيِّ دَاخِلَ القَنَاةِ.** جزء العصب البصري الذي يمتد بين القناة البصرية والتصالبة البصرية.
 - p. intralaminaris nervi optici **الجزءُ العَصَبِ البَصَرِيِّ دَاخِلَ الصَّفِيْحَةِ.** جزء العصب البصري داخل العقلة الذي يمتد خلال الصفيحة المصفوية للصلبة.
 - p. intraocularis nervi optici **الجزءُ العَصَبِ البَصَرِيِّ دَاخِلَ المَقْلَةِ.** جزء العصب البصري الذي يوجد داخل مقلة العين والذي ينقسم إلى الأقسام خلف الصفيحة وداخل الصفيحة وأمام الصفيحة.
 - p. lenticulothalamicus capsulae internae (= p. thalamolenticularis capsulae internae) **الجزءُ العَدْسِيُّ المِهَادِيُّ**
لِلْمَحْفَظَةِ البَاطِنَةِ.
 - p. libera columnae fornicis **الجزءُ الحُرُّ**
لِعَمُودِ القُبُوبِ. أقسام عمود القُبُوبِ خلف الصوار.
 - p. lumbalis medullae spinalis **الجزءُ القَطْنِيُّ لِلنُّخَاعِ.** جزء النخاع الشوكي الذي يوجد في القسم الصدري السفلي للأنبوب الفقري (في البالغين) والذي يعطي الأزواج الخمسة من الأعصاب الشوكية القطنية.
 - p. magnocellularis nuclei rubri **الجزءُ الخَلَائِيَا الكَبِيرِيَّةُ لِلنَّوَاةِ الحَمْرَاءِ.** في الإنسان هو الجزء الذنبى من النواة الحمراء الذي يحوي مجموعة من الخلايا الكبيرة عديدة الأقطاب وهي أقل عدداً من الخلايا الصغيرة المنتشرة خلال النواة.
 - p. mamillaris hypothalami (= the mamillary bodies) **الجزءُ الحَلْمِيُّ للمهاد؛**
الأجسامُ الحَلْمِيَّةُ.
 - p. marginalis sulci singuli **الجزءُ الهَامِشِيُّ**
لِلْقَلَمِ الحَزَامِيِّ. جزء التلم الحزامي الذي ينتهي بزاوية قائمة ويتجه نحو الحافة الظهرية لنصف كرة المخ.
 - p. nervosa hypophyseos **الجزءُ النَخَامِيَّةُ**
العَصْبِيَّةُ.
 - p. nervosa retinae **الجزءُ الشَبَكِيَّةُ العَصْبِيَّةُ.**
وهو القسم الداخلي الشفاف من الشبكية والحساس للضوء والذي يحوي تسع طبقات.
 - p. occipitalis capsulae internae (= crus posterius capsulae internae) **الجزءُ القَذَالِيَّ لِلْمَحْفَظَةِ البَاطِنَةِ؛ السَّاقُ الخَلْفِيَّةُ**
لِلْمَحْفَظَةِ الغَائِرَةِ.
 - p. occipitalis coronae radiatae **الجزءُ القَذَالِيَّ لِلإِكْلِيلِ المُتَشَقِّعِ.** جزء الإكليل المتشقق الذي يوجد في الفص القذالي.

- **p. olfactoria corporis amygdaloidei**
(= **p. corticomediales corporis amygdaloidei**) **الجزء القشري الإنسي للجسم اللوزي.**
- **p. opercularis gyri frontalis inferioris**
الجزء الوصادي للتلفيف الجبهي السفلي. جزء التلفيف الجبهي السفلي الذي يقع خلف الذراع الصاعد للتمم الوحشي والذي يغطي فص الجزيرة.
- **p. optica retinae** **جزء الشبكية البصري.**
جزء الشبكية الذي يحوي المستقبلات الحساسة للضوء والذي يمتد إلى الخلف من الحافة المشرشرة على الجهة الداخلية لسطح المشيمية والمتواصل عند القرص البصري مع العصب البصري.
- **p. orbitalis gyri frontalis inferioris** **الجزء الحجاجي للتلفيف الجبهي السفلي.** جزء التلفيف الجبهي السفلي الذي يقع تحت الذراع الامامي للتمم الوحشي والذي يدور حول الحافة فوق الهدبية نحو السطح الحجاجي للفص الجبهي لنصف كرة المخ.
- **p. orbitalis nervi optici** **الجزء الحجاجي للعصب البصري.** جزء العصب البصري الذي يقع بين القناة البصرية والمقلة.
- **p. parasympathica systematis nervosi autonomici** **الجزء اللاؤدي للجهاز العصبي المستقلي.** القسم القحفي العجزي للجهاز العصبي المستقلي الذي تجري اليافه قبل العقدية في الاعصاب القحفية الثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والجدور الامامية للاعصاب الشوكية العجزية الثاني والثالث والرابع. وتغذي اليافه القلب والعضلات الملساء وغدد الرأس والرقبة والاحشاء الصدرية والبطنية والحوضية وتقع العقد التي تتشابك معها هذه الالياف غالباً بالقرب من الاعضاء التي تغذيها.
- **p. parietalis coronae radiatae** **الجزء الجداري للإكليل المنتشع.** جزء الإكليل المنتشع الذي يوجد في الفص الجداري.
- **p. parvocellularis nuclei rubri** **جزء الخلايا الصغرى للنواة الحمراء.** قسم الخلايا الصغيرة المنتشرة في النواة الحمراء والتي يكثر انتشارها في القسم الذنب من هذه النواة في الإنسان.
- **p. pelvica systematis autonomici** **الجزء**

- الخوضي للجهاز المستقل.** جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الحوض والذي يحوي اربع أو خمس عقد عجزية والمتصل بالقسم البطني أو القطني للجهاز.
- **p. peripherica systematis nervosi** **الجزء المحيطي للجهاز العصبي.** جزء الجهاز العصبي المكون من الاعصاب والعقد الموجودة خارج الدماغ والنخاع الشوكي.
- **p. posterior commissurae anterioris cerebri** **الجزء الخلفي للصوار المخي الأمامي.**
- **p. posterior commissurae rostralis cerebri** **الجزء الخلفي للصوار المخي الراسي.** الجزء الذي تربط اليافه التلفيفين الصدغيين الوسطي والسفلي والتلفيف حول الحصين مع الجسيمين اللوزيين للجهتين.
- **p. posterior pedunculi cerebri (= p. dorsalis pedunculi cerebri)** **الجزء الظهري لسويقة المخ.**
- **p. postlaminaris nervi optici** **جزء العصب البصري خلف الصفيحة.** جزء العصب البصري خلف الصفيحة المصفوية للصلبة داخل العين.
- **p. prelaminaris nervi optici** **جزء العصب البصري أمام الصفيحة.** جزء العصب البصري أمام الصفيحة المصفوية للصلبة العين.
- **p. reticularis** **الجزء الشبكي.** الجزء البطني من المادة السوداء الذي يحوي خلايا أقل مما يوجد في الجزء المكتنز منها ويحوي بعضها القليل من الصبغة.
- **p. retrolentiformis capsulae internae** **جزء المحفظة الغائرة خلف النواة العدسية.** قسم المحفظة الداخلية المستقر على السطح الوحشي للمهاد خلف النواة العدسية ويحتوي التشقع المهادي الخلفي.
- **p. rostralis nervi vestibularis** **الجزء المنقاري للعصب الدهليزي.** الفرع الراسي أو العلوي للعصب الدهليزي والذي تنتهي اليافه في العرف الامبولي للقناتين الهاليتين الامامية والوحشية وفي بقعة القربة.
- **p. sacralis medullae spinalis** **الجزء العجزي للنخاع.** قسم النخاع الشوكي الذي يوجد في القسم العجزي من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الخمسة من الاعصاب الشوكية.

- p. spinalis nervi accessorii (= radices spinales nervi accessorii) **الْجُزْءُ النَّخَاعِيّ**
للعصب الإضافي. الجذور النخاعية للعصب الإضافي.
- p. sublentiformis capsulae internaе **جُزْءُ الْمَحْفَظَةِ الْغَائِرَةِ تَحْتَ النُّوَاةِ الْعَدْسِيَّةِ**. جزء المحفظة الباطنة الذي يقع بالجهة البطنية للقسم الظهري من النواة العدسية والذي يحوي الالياف الصدىية الجسرية والركبية المهادية والشع السعمي.
- p. superior gyri frontalis medii **الْجُزْءُ الْعُلَوِيّ لِلتَّلْفِيْفِ الْجَبْهِيّ الْوَسْطِيّ**.
- p. superior partis vestibularis nervi octavi (= p. rostralis nervi vestibularis) **الجزء العلوي للقسم الدهليزي للعصب الثامن**.
- p. supraclavicularis plexus brachialis **الْجُزْءُ فَوْقَ التَّرْقَوِيّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ**. قسم الضفيرة العضدية الذي يقع في المنطقة الرقبية فوق مستوى الترقوة والذي تتفرع منه الاعصاب الكتفي الظهري والصدرى الطويل وفوق الكتفي وعصب العضلة تحت الكتفية.
- p. sympathetica systematis nervosi autonomici **الْجُزْءُ الْوُدِّي لِلْجِهَازِ الْعَصْبِيّ الْمَسْتَقْل**.
- p. sympathica systematis nervosi autonomici **الْجُزْءُ الْوُدِّي لِلْجِهَازِ الْعَصْبِيّ الْمَسْتَقْل**. جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يستلم ألياف اتصاله مع الجهاز العصبي المركزي خلال التدفق الصدري القطني للالياف الحشوية الصادرة وتنبع هذه الالياف قبل العقدية من خلايا في المستويين الصدري والقطني للنخاع الشوكي وتتركه خلاله جذوره الامامية وتم تدخل عن طريق الفروع الموصلة إلى الجذع الودي حيث تتشابه بعضها مع خلايا عقده. وتم تعود هذه الالياف بعد العقدية إلى الاعصاب الشوكية خلال الفروع الموصلة لتغذي الاعوية الدموية والغدد والعضلات الملساء للجذع والاطراف أو تمر إلى الفروع الحشوية لتغذي الاعوية الدموية والعضلات الملساء وغدد الرقبة والرأس واحشاء الصدر والبطن. وتمر بعض الالياف قبل العقدية خلال الجذع الودي وتتشابه في العقد أمام الفقرية كما تغذي الالياف بعد العقدية من هذه العقد الاحشاء المجاورة.
- p. temporalis radiationis corporis callosi **الْجُزْءُ الصَّدْعِيّ لِشُعِّ الْجِسْمِ الثَّقَنِيّ**. ألياف شع الجسم الثقني التي تمر إلى الفص الصدغي.
- p. thalamolenticularis capsulae internaе **الْجُزْءُ الْمِهَادِيّ الْعَدْسِيّ لِلْمَحْفَظَةِ الْغَائِرَةِ**. قسم الذراع الخلفي للمحفظة الغائرة المجاور للمهاد وللنواة العدسية والمكون من الياف من الشع المهادي والالياف القشرية النخاعية والقشرية الحمراء والقشرية الشبكية والقشرية المهادية والمهادية الجدارية والشع المهادي المركزي.
- p. thoracalis systematis autonomici **الْجُزْءُ الصَّدْرِيّ لِلْجِهَازِ الْمَسْتَقْل**. جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الصدر ويستمد جزءه الودي من الحبل الصدري العلوي وجزءه اللاودي من العصب المبهم كما انه يحوي اليافاً ودية قبل العقدية التي تصل الاحشاء البطنية عن طريق الاعصاب الحشوية الصدرية.
- p. thoracica medullae spinalis **الْجُزْءُ الصَّدْرِيّ لِلنُّخَاعِ**. جزء النخاع الشوكي الذي يوجد في الأرباع الثلاثة العلوية من القسم الصدري من القناة الفقرية (في البالغين) والذي يعطي الأزواج العصبية الشوكية الصدرية الإثنا عشرية.
- p. triangularis gyri frontalis inferioris **الْجُزْءُ الْمُثَلَّثُ لِلتَّلْفِيْفِ الْجَبْهِيّ السُّفْلِيّ**. الجزء الإسفيني الشكل للفص الجبهي السفلي الذي يقع بين الفرعين الصاعد والامامي للتمم الوحشي لنصف كرة المخ.
- p. tuberalis adenohypophysis **الْجُزْءُ الْأَنْبُوبِيّ لِلنَّخَامِيَّةِ الْغَدِيَّةِ** (= hypophyseal or pituitary stalk).
- p. vagalis nervi accessorii (= radices craniales nervi accessorii) **الْجُذُورُ الْخَفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيّ**.
- p. ventralis corporis geniculati lateralis (= nucleus corporis geniculati lateralis) **نُوَاةُ الْجِسْمِ الرُّكْبِيّ الْإِنْسِيّ؛ الْجُزْءُ الْبَطْنِيّ لِلْجِسْمِ الرُّكْبِيّ الْوَحْشِيّ**.
- p. ventralis corporis geniculati medialis (= nucleus corporis geniculati medialis) **الْجُزْءُ الْبَطْنِيّ لِلْجِسْمِ الرُّكْبِيّ الْإِنْسِيّ**.

- **p. ventralis diencephali** **الجزء البطني**
للدماغ البطني. جزء الدماغ البيني تحت النجم الوطاني والمكون من المهاد البطني (تحت المهاد) والوطاء.

- **p. ventralis pedunculi cerebri** **الجزء البطني للسويقة المخية**. جزء السويقة البطني المكون من حزم كبيرة من سبل الألياف العصبية.

- **p. ventralis pontis** **الجزء البطني للجسر**. جزء الجسر الذي يربط المخ والمخيخ والنخاع المستطيل (البصلة) وهو شريط عريض مستعرض ينحني عبر السطح البطني من القسم السفلي للدماغ المؤخر ثم يتضيق على الجهتين ليدخل المخيخ كالسويقة المخيخي الوسطي، وهو يحوي أليافاً طولانية تتأصل من القشرة المخية وأليافاً مستعرضة وكثلاً من المادة السنجابية والنوى الجسرية.

- **p. vestibularis nervi octavi (= nervus vestibularis)** **الجزء الدهليزي للعصب الثامن: العصب الدهليزي**.

parthenophobia **رهاب العذاري؛ رهاب البنات**. الخوف المرضي من البنات.

passive **لا فاعل**. غير نشط وغير تلقائي أو غير مولد عن طريق جهد فعال.

passivism **الاستسلام السلبي**. في الطب النفسي هو الشذوذ الجنسي الذي يتصف بالاستسلام والرضوخ الجنسي السلبي.

passivity **السلبيّة**. في علم النفس هي عدم المقدرة أو عدم الرغبة في القيام بأية مبادرة أو أخذ أية مسؤولية اعتيادية في الحياة اليومية.

patella **الرَضْفَة**. عظم سمسماني مثلث يقع أمام الركبة في وتر مغرز العضلة الرباعية الرؤوس الفخذية الباسطة.

pathetic **عَصَبِيٌّ بَكَرِيٌّ**. متعلق أو منسوب للعصب البكري.

pathomimesis (= malingering) **تَمَارُض**. محاكاة المرض.

pathomimia (= malingering) **تَمَارُض**. محاكاة المرض.

pathomimicry (= malingering) **تَمَارُض**. محاكاة المرض.

pathoneurosis **عُصَابٌ مَرَضِيٌّ**. أعراض هستيرية تنتج عن مرض مزمن.

pathophobia (= nosophobia) **رُهَابُ المَرَض**.

pathopsychology **عِلْمُ النَّفْسِ المَرَضِيّ**. علم نفس الأمراض النفسية.

pathopsychosis **دُهَانٌ مَرَضِيٌّ**. ذهان يتولد عن مرض عضوي كأورام الدماغ أو التهاباته.

pathway **سَبِيلٌ؛ مَسْلَكٌ**. في العلوم العصبية هو الطريق العصبي الذي تسلكه الدفعات الحسية التي تنقل للجهاز العصبي المركزي وقشرة المخ (الإشارات الواردة) أو تسلكه الدفعات العصبية الحركية من الدماغ إلى العضلات المنفذة (الإشارات الصادرة).

- **final common p.** **السَبِيلُ الْإِنْتِهَائِي الْعَامُّ**. العصبونات الحركية التي تمر خلالها كل الدفعات العصبية الصادرة من مختلف المراكز العصبية لتصل العضلات والغدد المحيطية.

- **internuncial p.** **السَبِيلُ الْبَيْنِيّ**. سبيل ترابطي يربط مختلف المراكز أو العصبونات في داخل الجهاز العصبي المركزي.

pattern **طَرَاز؛ غَرَار**. 1. تصميم يتبع عند بناء أو تركيب أية بنية أو آلة 2. مجموعة خاصة ومميزة من الخلات أو الفعاليات مثل الطرز السلوكية.

- **action p. (= instinct)** **غَرِيْزَة؛ فِطْرَة**. أسلوب السلوك الموروث حيث تؤدي بعض المنبهات إلى استجابات نوعية خاصة لدى الفرد.

- **muscle p.** **طَرَازُ عَضَلِيّ**. عدد من العضلات المرتبة بنسق معين وتستجيب كلها مرة واحدة كوحدة وظيفية.

pavor (= terror) **فَوْع؛ رُغْب**.

- **p. diurnus (= day terroris)** **رُغْبٌ نَهَارِيّ**. نوبات قلق عند الأطفال تحدث أثناء نوم القيلولة بعد الظهر.

- **p. nocturnus** **رُغْبٌ لَيْلِيّ**. اضطراب نومي عند الأطفال يتصف بقلق ورعب شديدين بعد بدء النوم بفترة قصيرة مع اضطرابات الجهاز المستقل وعدم تذكر الأحلام أو الكوابيس.


pedialgia ألم القدم.

pedophilia حُبُّ الأطفال. 1. الحب المفرط الشاذ للأطفال 2. ممارسة الكبار الجنسية مع الأطفال أو الرغبة الملحة الشاذة لعمل ذلك.

pedophobia رُهابُ الأطفال. الخوف الشاذ من الأطفال.

peduncle سَوَيْقَة. قسم رابط شبيه بالساق يربط بنية سائبة بجسم العضو.

cerebellar p., caudal السَوَيْقَة المَخِيخِيَّة حزمة كبيرة من الألياف العصبية تربط النخاع الشوكي والنخاع المستطيل بالمخيخ وهي تمر حول الحافة الوحشية للبطين الرابع وتدور ظهرياً نحو المخيخ.



السبيل البصري


pathway, visual

أحد الأنظمة الحسية العصبية الذي يبدأ من العين ويمر حتى قشرة المخ

- cerebellar p., cranial السُّويقة المَخِيخيَّة القَحْفِيَّة. حزمة كبيرة من الألياف العصبية الإسقاطية تنبع بصورة رئيسية من النواة المسننة من كل من نصفي كرة المخيخ وتصل لتتصلب في الدماغ المتوسط وتنتهي بصورة رئيسية في النواة الحمراء والمهاد.

- cerebellar p., inferior (= cerebellar p., caudal) السُّويقة المَخِيخيَّة السُّفْلِيَّة.

- cerebellar p., middle السُّويقة المَخِيخيَّة المُتَوَسِّطَة. حزمة كبيرة من الألياف عصبية إسقاطية تتصل في النوى الجسرية للجهة المقابلة وتدخل



pathway, visual

السيبل العصبى البصرى المركزى (منظوراً من أسفل الدماغ) وممتداً من النصفين الأيسرين لشبكتي العينين وخلال التوصيل البصرية ثم النواة الركبية وإلى القشرة البصرية في الفص القذالي للمخ.

المخيخ ناقلة نبضات من قشرة المخ إلى المخيخ الجديد وتتواصل مع الجسر عند خط اتصال العصب الثلاثي التوائم به.

- cerebellar p., pontine (= middle cerebellar p.) السُّوَيْقَةُ المَخِيخِيَّةُ الجَسْرِيَّةُ؛ السُّوَيْقَةُ المَخِيخِيَّةُ المُتَوَسِّطَةُ.

- cerebellar p., rostral (= caudal cerebellar p.) السُّوَيْقَةُ المَخِيخِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ.

- cerebellar p., superior (= cranial cerebellar p.) السُّوَيْقَةُ المَخِيخِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.

- p's. of cerebellum سُوَيْقَاتُ المَخِيخِ. الحزم الكبيرة الثلاث من الألياف العصبية الإسقاطية على جهتي المخيخ والتي تربطه مع أقسام الدماغ الأخرى ومع النخاع الشوكي.

- cerebral p. سُوَيْقَةُ المَخ. الكتلتان الكبيرتان من المادة العصبية التي تهبط من نصفي كرة المخ والمفصولتان عن بعضهما بالحفرة بين السويقتين قبل أن تلتقيا عند دخولهما إلى الجسر حيث تكونان الجزء البطني للدماغ المتوسط وتنقسم كل سويقة إلى قسم بطني يتكون من حزمة من ألياف عصبية (قاعدة سويقة المخ) وقسم ظهري يتواصل عبر المستوى الناصف مكوناً سقيفة الدماغ المتوسط وتفصل المادة السوداء القسمين عن بعضهما البعض.

- p. of flocculus سُوَيْقَةُ الذُّفَّة. حزمة ضيقة من الألياف العصبية الواردة والصادرة تربط عقيدة المخيخ بالندفة ويتواصل قسمها الظهري مع القسم الأمامي الوحشي للشرع البصلي الذنبى والذي تشق منه معظم أليافها.

- olfactory p. السُّوَيْقَةُ الشَّمِيَّةُ. سويقة الألياف الشمية خصوصاً عند اتصالها بنصف كرة المخ.

- pineal p. (= habenula) السُّوَيْقَةُ الصَّنَوْبَرِيَّةُ؛ العَيْنَان.

- p's. of thalamus سُوَيْقَاتُ المِهَاد. الإشعاعات الأربعة من الألياف المهادية القشرية ذات الاتجاهين التي تربط المهاد الظهري مع أقسام عديدة من قشرة المخ والتي تكون بمجموعها القسم الأكبر من المحفظة الداخلية والإكليل المتشعب. وتربط السويقة الأمامية الفص الجبهي للمخ مع المهادين الأمامي والإنسي وتربط السويقة العلوية التلفيفين أمام المركزي وخلف

المركزي والأقسام المجاورة لهما من الفصين الجبهي والجداري للمخ مع المهادين البطني والوحشي وتربط السويقة الخلفية القشريتين القذالية والجدارية مع المهادين الخلفي والوحشي وتربط السويقة السفلية الجسم الركبي الإنسي والمهاد الخلفي مع بعض مناطق قشرة الفص الصدغي للمخ.

- p. of thalamus, caudal (= inferior thalamic p.) سُوَيْقَةُ المِهَادِ السُّفْلِيَّةِ.

pedunculotomy قَطْعُ السُّوَيْقَةِ. قطع السويقة المخية والألياف الهرمية وخارج الهرمية للتفريق عن الرعاش في داء باركنسون.

pedunculus (= peduncle) سُوَيْقَةُ.

PEG (= pneumoencephalography) التَّصَوُّيْرُ الغَايَرِيُّ الدِّمَاغِي.

pellagra بِلْغَرَّة. متلازمة عوز سريرية لمادة النياسين تتصف بالتهاب الجلد والاعشبة المخاطية والإسهال واضطرابات نفسية تشمل الكآبة والإثارة والقلق والتخليط والتوهم والتوهان والهلوسة.

pentobarbital بِنْتُوْبَارِبِيْتَال. دواء يستعمل عن طريق الفم كمهدئ ومنوم.

- p. sodium بِنْتُوْبَارِبِيْتَال الصُّوْدِيُّوم. دواء يستعمل كنوم ومهدئ ومضاد للاختلاج وعند بدء التبنيج أو معزز له وكدواء نساوي عند الولادة.

peotillomania هَوَسُ سَحْبِ القَضِيْب. هوس عادة سحب القضييب واللعب به.

percept المُدْرَك. الصورة الفكرية التي تكونها الحواس للمواد والأشياء الموجودة في المحيط.

perception إدْرَاك. التسجيل الفكري الواعي للمنبهات الحسية.

- depth p. إدْرَاكُ العُمق. إدراك عمق المحيط أو البعد النسبي لمختلف الأجسام والمواد المنظورة في المحيط.

- extrasensory p. (ESP) إدْرَاكٌ خَارِجُ الحَسِّ. إدراك خارج الحس أو استجابات لأفكار أو أحداث خارجية من دون الحواس.

- stereognostic p. إدْرَاكٌ تَجَسِّمِيّ، إدْرَاكُ
الأجسام والأشياء بواسطة حسّ اللمس.

perceptivity الإدْرَاكِيَّة. المقدرة على
إدراك الانطباعات الحسية.

perceptorium (= sensorium) مَحَسَّن.

percipient 1. إدْرَاكِي 2. مُدْرِك.
1. منسوب للإدراك 2. شخص يدرك أو قادر على
الإدراك.

perencephaly (= porencephalia) تَنْقُبُ
الدِّمَاغ. وُجُودُ المَسَامِ في الدِّمَاغ.

perfectionism تَحَرِّي الكَمَال؛ الكَمَالِيَّة.
خِلة شخصية تتصف بوضع مقاييس مثالية كاملة
لتصرفات الشخص وأعماله وأخلاقه وغالباً أعلى
من المقاييس التي تقتضيها الحالات المختلفة أو
الممكن تطبيقها.

periaqueductal حَوْلَ المَسَال. حول أحد
المسالات.

periaxonal حَوْلَ المِحْوَار. حول أحد
المحاور.

pericallosal حَوْلَ الثَّقَنِي. حول الجسم
الثقني.

pericephalic حَوْلَ الرُّأْس. يحيط بالرأس.

pericranium سَفْحَاقُ القُحْف. السّمحاق
الخارجي للقحف.

peridural حَوْلَ الجَافِيَّة. حول أو خارج
الجافية.

peridurogram صُورَةُ حَوْلَ الجَافِيَّة.

peridurography تَصْوِيرُ حَوْلَ الجَافِيَّة.
التصوير الشعاعي للقناة النخاعية والباحات
الخلالية بعد زرق مادة تباينية حول الجافية.

periencephalitis إِبْتِهَابٌ مُحِيطُ الدِّمَاغ.
التهاب سطح الدماغ أو التهاب السحايا وقشرة
الدماغ.

periencephalography تَصْوِيرُ مُحِيطُ
الدِّمَاغ. التصوير الشعاعي لسحايا الدماغ.

periglial حَوْلَ الدِّبْقِي. حول دُبقيات الدماغ.

perikaryon جِسْمُ العَصَبُون. جسم الخلية
العصبية ما عدا نواتها وتشعباتها.

perimedullary حَوْلَ البَصَلَّة. حول
النخاع المستطيل.

perimeningitis (= pachymeningitis)
إِبْتِهَابُ الجَافِيَّة.

perimyelitis (= spinal meningitis)
إِبْتِهَابُ السَّحَايَا النُّخَاعِيَّة.

perimyelography تَصْوِيرُ حَوْلَ النُّخَاع.
التصوير الشعاعي بعد زرق مادة تباينية في الحيز
تحت العنكبوتية النخاعية.

perineural حَوْلَ العَصَب. يحيط بالعصب
أو بالأعصاب.

perineurial متعلِّقُ بِغَمْدِ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة.

perineuritis إِبْتِهَابُ غَمْدِ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة.

perineurium ظَهَارَةُ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة؛ غَمْدُ
الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة. غمد النسيج الضام الذي يحيط
بحزمة من الألياف العصبية المحيطة.

period دَوْر. (ج: أَدْوَار). فترة زمنية
أو الوقت اللازم الطبيعي لعودة إحدى الظواهر أو
العمليات.

- absolute refractory p. دَوْرُ الجِرَانِ المُطْلَق.
جزء فترة الحران عندما لا يتمكن فيها العصب أو
العضل من الاستجابة لأي منبه مهما كان شديداً بعكس
دور الحران النسبي.

- isoelectric p. دَوْرُ تَسَاوِي التَّكْهَرُب. اللحظة
في التقلص العضلي عندما تتساوى عندها الكهربائية
العضلية ولا يظهر أي تغيير في جهاز قياس هذه
الفعالية.

- p. of isometric contraction (= pres-
phygmic p.) دور التقلص المتساوي القياسات؛
دور التقلص الالْتَقْصُرِي.

- p. of isometric relaxation (= postsp-
hygmic p.) دور الإنْبِسَاطِ المتساوي القياسات؛
دور الإنْبِسَاطِ الالْتَقْصُرِي.

- isovolumic p. (= presphygmic p.) دَوْرُ
إِسْوِيَّة الحَجْم.

- latency p. (= latent p.) دَوْرُ الكُمُون. الدور
غير الفعال ظاهرياً الذي يمر بين تنبيه النسيج وبدء

ظهور الاستجابة أو بين التعرض للعامل المخرب و ظهور أعراض التخريب.

- **postsphygmic p.** الفترة التالية للنَّيْض. الفترة القصيرة بعد انبساط البطين التي تتلو فترة النبض عندما تنبسط العضلة من دون تغيير طولها.

- **presphygmic p.** الفترة السابقة للنَّيْض. الطور الأول لتقلص البطين عندما تنقلص العضلة من دون تغيير طولها ولكن بزيادة توترها.

- **reaction p. (= reaction time)** دَوْرُ الإِسْتِجَابَةِ. هي الفترة التي تمر بين التنبيه أو الإصابة وبين رد الفعل أو الإستجابة لأي منهم.

- **refractory p.** دَوْرُ الحِرَان. فترة زوال استقطاب غشاء الخلية بعد تهيجها ولا تتمكن خلالها العضلة أو العصب من الاستجابة لمنبهات أخرى.

- **relative refractory p.** دَوْرُ الحِرَان النسبي. الفترة القصيرة التي تتلو دور الحران المطلق يعود خلالها الاستقطاب تدريجياً لحِدٍ يمكن الليف العصبي أو العضلي من الاستجابة للمنبهات الشديدة ولو بمستوى أضعف من حالة الراحة.

periodic دَوْرِي. يعاود بفترات متقطعة ولكنها منتظمة.

peripheral مُحِيطِيّ. ما يقع عند أو بالقرب من المحيط وخارج المركز أو البنية المركزية.

peripherocentral مُحِيطِيّ مَرْكَزِيّ. محيطي ومركزي.

periphereceptor مُسْتَقْبَلَةٌ مُحِيطِيَّة. أي من المستقبلات الموجودة في النهايات المحيطية للعصبونات الحسية والتي تستلم المنبهات.

peripheromittor نَهَايَةٌ تَنْبِيهِيَّة مُحِيطِيَّة. نهاية انتهائية توجد بالقرب من مستقبل ليف عضلي أو خلية غدية تقوم بنقل النبضات للليف أو للخلية الغدية وتنبيهها.

peritonealgia أَلَمُ الصِّفاق. ألم في الصفاق.

personality شَخْصِيَّة. الطريقة الخاصة المميزة التي يفكر بها الشخص ويشعر ويسلك بها في تصرفاته وهي تشمل المواقف الواعية والقيم والأساليب بالإضافة للمتناقضات دون الواعية والفعالية الدفاعية.

- **affective p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّة عَاطِفِيَّة: شخصية دوروية المزاج.

- **alternating p. (= multiple p.)** شَخْصِيَّة تَنَاقُوبِيَّة.

- **anakastic p. (= obsessive compulsive p.)** شَخْصِيَّة وَسْوَاسِيَّة قَسْرِيَّة.

- **antisocial p.** شخصية مُعَادِيَّة للمجتمع؛ شَخْصِيَّة لَا إِجْتِمَاعِيَّة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بسلوك معاد للمجتمع مزمن ومستمر ينتهك المصاب به حقوق الآخرين ويتوافق مع ذلك التهور والتركيز على الذات وعدم القدرة على تحمل المسؤولية والعلل أو الإخفاق والإثارة والعدوانية والطيش والكذب وعدم التمكن من مواصلة العمل وتحمل المسؤولية في المعاملة أو في تربية الأولاد.

- **asthenic p.** شَخْصِيَّة وَاهِنَة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بسرعة التعب والإعياء والضعف وعدم الحماس للعمل أو التلذذ به وفرط الحساسية للكرب الجسدي أو العاطفي.

- **avoidant d.** شَخْصِيَّة إِجْتِنَابِيَّة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بالانزعاج الاجتماعي وفرط الحساسية للانتقاد وتجنب الفعاليات التي تقتضي الاتصال بالآخرين مع القلق والمبالغة في الصعوبات والجنب العام والتلهف للعطف والقبول من الآخرين والخوف من رفضهم له.

- **borderline p.** شَخْصِيَّة حَدِيَّة: شخصية مُبْهَمَة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بعدم الاستقرار وسرعة انفعال المزاج واضطراب العلاقات الشخصية مع الذات ومع الآخرين مع أفعال تهوُّرية وإيذاء للذات وحالات غضب لا يكبت والشعور المزمن بالضجر والفراغ ولوم الذات ومحاولة الانتحار.

- **compulsive p. (= obsessive compulsive p.)** شخصية استحواذية؛ شَخْصِيَّة قَسْرِيَّة.

- **cycloid p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّة دَوْرَوِيَّة المَزَاج.

- **cyclothymic p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّة دَوْرَوِيَّة المَزَاج.

- **dependent p.** شَخْصِيَّة إِتْكَالِيَّة. اضطراب

الشخصية الذي يتصف بالشعور بالعجز عند الانفرد أو عند ترك المقربين له والشعور بهجرانهم له مع الصعوبة في أخذ القرارات من دون استشارة الآخرين وسماع نصائحهم مع شدة الحساسية للانتقاد والمعارضة.

- double p. (= dual p. = multiple p.)

شخصية إزدواجية.

- epileptoid p. شخصية شبه صرعية. اضطراب انفجاري متقطع.

- explosive p. شخصية انفجارية. اضطراب انفجاري متقطع.

- histrionic p. (= hysterical p.) شخصية متكلفة.

اضطراب الشخصية الذي يتصف بفرط العاطفية والبحث عن اهتمام الآخرين به مع فرط الاهتمام بالمظهر الخارجي والجاذبية الجنسية والانتعاج الشديد من عدم شكر الآخرين له مع سرعة التغير العاطفي وضحالة التعبير عنه.

- hysterical d. (= histrionic p.) شخصية هستيرية.

- inadequate p. شخصية غير كافية. صنف تشخيصي للأشخاص غير الكفوئين اجتماعياً وثقافياً وجسدياً وهم غير مشمولين بأي من تصنيف الشخصية الأخرى.

- multiple p. شخصية متعددة. اضطراب نفسي وظيفي يتصف بوجود شخصيتين أو ثلاث أو أكثر في شخصية واحدة ولكل من هذه الشخصيات المتميزة ذاكرته الخاصة وسلوكه الخاص وعلاقاته الاجتماعية الخاصة التي تقرر تصرفاته عند طغيان أي من تلك الشخصيات عليه ويمكن أن يكون الانتقال من إحدى الشخصيات للآخرى مفاجئاً ولا تشعر الشخصية الأساسية بوجود هذه الشخصيات الإضافية المتعددة لديه ولكنه يشعر فقط بوجود فجوات زمنية في حسه العام.

- narcissistic p. شخصية نرجسية.

اضطراب الشخصية الذي يتصف بالشعور بالمعظمة (في السلوك أو في التخيل) وقلة الاهتمام العاطفي الاجتماعي مع فرط الحساسية لأحكام الآخرين والانفجار معهم والحس بالاهمية وبضرورة الاهتمام به ومواصلة مدحه.

- obsessive p. (= obsessive compulsive p.) شخصية وسواسية قسرية.

- obsessive compulsive p. شخصية وسواسية قسرية.

اضطراب الشخصية الذي يتصف بسلوك ضيق وتقليدي جدي وعرفي مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل الدقيقة بالقواعد والاصول والنظم والجدول والقوائم والالاحاح الشديد على تنفيذ الامور بطريقته الخاصة من دون اعتبار لآراء الآخرين مع الإخلاص الشديد للعمل والإنتاج حتى على حساب الإضرار بالعلاقة مع الآخرين بالإضافة إلى التردد في اتخاذ القرارات للخوف من الوقوع بالفلط.

- paranoid p. شخصية زوانية. اضطراب

الشخصية الذي يؤدي بالمصاب إلى اعتبار الآخرين أعداء له أو منحرفين لا يمكن الثقة بهم مع رد فعل عدواني للفشل أو للحوادث التي يتصورها مهينة له ويرافق ذلك الشك بإخلاص الاصدقاء له وحمل الضغينة ضدهم وحمل كلماتهم البسيطة على محمل سوء وتفسيرها بأنها إهانة له.

- passive aggressive p. شخصية عدوانية

لا فاعلة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بمقاومة المصاب غير المباشرة عند الطلب منه باتباع السلوك المهني الاجتماعي المناسب وغبضه ومقاومته لسلطة رؤسائه أو لمطالب الآخرين والتي تظهر على شكل التعويق والتأجيل والعناد والتواني والتناسي وفقد الكفاءة المقصودة.

- psychopathic p. (= antisocial p.)

شخصية معتلة نفسياً؛ شخصية لا اجتماعية. شخصية معادية للمجتمع.

- sadistic p. شخصية سادية. اضطراب الشخصية

الذي يتصف بنمط سلوكي عدواني وقاسي والحط من قدر الآخرين. ويتلذذ المصاب بتهديد الآخرين وإهانتهم وإكراههم على طاعته مع هيجان المزاج عند النقاش والتلذذ بإيذاء الآخرين وإضرارهم والاعتداء عليهم بالعنف والحساسية المفرطة والسيادة.

- schizoid p. شخصية شبه فصامية. اضطراب

الشخصية الذي يتصف بعدم الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية ومع ضيق الخبرات والتعبير العاطفية ويشمل أيضاً ضعف المقدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية والتكبر وعدم الاهتمام بالنقد أو الاطراء أو بمشاعر الآخرين بصورة عامة.

- schizotypal p. شَخْصِيَّةٌ فَصَامِيَّةُ النَّمط. اضطراب الشخصية الذي يتصف بضعف العلاقات مع الآخرين وغرابة أطوار التفكير والمظهر والسلوك كالاقتناعات الغريبة أو التفكير السحري وقلة الأصدقاء والقلق الاجتماعي والشك والتفكير الزوراني.

- seclusive p., shut-in p. (= schizoid p.) شَخْصِيَّةٌ شَبَه فَصَامِيَّة.

- self-defeating p. شَخْصِيَّةٌ ذَاتِيَّةُ الإخْفَاق. اضطراب الشخصية الذي يتصف بالشعور بالعذاب المستديم وبالانحراف الذي يؤدي به إلى المشاكل والعلاقات الصعبة والفشل في إنجاز المهمات الضرورية للحياة مع الرغبة في الانصراف إلى المبالغة بالتضحية بالذات وعدم المقدرة على التلذذ بمكافآت نجاحه.

- sociopathic P. (= antisocial p.) شَخْصِيَّةٌ لَا إِجْتِمَاعِيَّة.

- split p. شَخْصِيَّةٌ إِزْدَوَاجِيَّة. كان يستعمل هذا المصطلح للدلالة على مرض الفصام ولكنه يستعمل اليوم للدلالة على الشخصية الازدواجية.

personology عِلْمُ الشَخْصِيَّة. علم دراسة الشخصية.

pervert مُنْحَرِف؛ ضُلُول. شخص منحرف يمارس أفعالا جنسية غير طبيعية.

pes قَدَم. (ج: أَقْدَام). قدم الساق أو قسم مشابه لها.

- p. abductus قَدَمٌ بَعْدَاء. قدم مشوهة قسمها الأمامي منحرف ويبعدها إلى خارج المحور العمودي للساق.

- p. adductus قَدَمٌ قَرَبَاء. قدم مشوهة قسمها الأمامي منحرف ويقربها إلى داخل المحور العمودي للساق.

- p. anserinus (goose's foot) القَدَمُ الوَرِيَّة. 1. الضفيرة النكفية للعصب الوجهي 2. المغرز المشترك للامتداد الوترى للعضلات الخياطية والناحلة والوترية النصف.

- p. cavus قَدَمٌ كَهْفِيَّة. زيادة كبيرة في ارتفاع القوس الطولانية للقدم الذي يوجد عند الولادة أو يظهر بعد ذلك بسبب تقفع العضلات أو خلل توازنها.

- p. hippocampi قَدَمُ الخُصَيْن. تكوين من ارتفاعين أو ثلاثة ارتفاعات على النهاية الرأسية للسطح البطني للحصين.

- p. hippocampi major (= p. hippocampi) قَدَمُ الخُصَيْنِ الكبيرة.

- p. hippocampi minor (= calcar avis) قَدَمُ الخُصَيْنِ الصغيرة؛ مِهْمَازُ الطَيْر.

- p. pedunculi (= crus cerebri) القدم السُّوَيْقِيَّة؛ سَاقُ المَخ.

- p. planovalgus (= p. planus = flatfoot) قَدَمٌ رَحَاء. قدم مشوهة تكون فيها مواضع عظامها بالنسبة لأحدهما للأخر متغيرة مما يؤدي إلى انخفاض اقواس القدم.

- p. pronatus قَدَمٌ كَبَاء. قدم مشوهة تكون الحافة الخارجية لقسمها الأمامي أعلى من حافتها الداخلية.

- p. supinatus قَدَمٌ بَطْحَاء. قدم مشوهة تكون الحافة الداخلية لقسمها الأمامي أعلى من حافتها الخارجية.

- p. valgus (= flatfoot) قَدَمٌ رَحَاء.

- p. varus (= talipes varus) قَدَمٌ فَخْجَاء؛ خَنْفٌ فَحْجِي.

pessimum تَقْلُصٌ تَلَوِي. تقلص العضلة الضعيف الذي يتلو تقلصها الشديد الذي يتولد استجابة لتنبه جهازها العصبي العضلي بتيار كهربائي عالي الذبذبة.

pethidine hydrochloride (= meperidine hydrochloride)

هَيْدُرُوكُلُورِيدُ البِثِيدِين. مخدر موضعي يستعمل بالحقن.

petit mal الصَّرْعُ الصَّغِير. انظر epilepsy.

petropharyngeus الصَخْرِيَّةُ البُلْعُومِيَّة. عضلة توجد أحيانا متصلة في السطح السفلي للقسم الصخري من العظم الصدغي وتنغرز في البلعوم.

petrosalpingostaphylinus (= musculus levator veli palatini)

العَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِشِرَازِ الحَنَك.

petrostaphylinus (= musculus

levator veli palatini) الْعَصَلَةُ الرَّافِعَةُ

لِشِرَازِ الْحَنَكِ.

phagomania هَوَسُ الْأَكْلِ. الرغبة الجامحة

للطعام أو الاهتمام الوسواسي بالأكل.

phagophobia رُهابُ الْأَكْلِ. الخوف بدون

سبب من الأكل.

phakoma وَرَمٌ عَدَسِيٌّ. ورم عابي يظهر

كافة كيسية عديدة العقد الصفراء تنمو من القرص

البصري وتمثل ورم النسيج الدبقي.

phakomatosis مُتَلَاَزِمَةٌ عَدَسِيَّة. مجموعة

من العيوب الخلقية الوراثية التي تتولد من نسيج

الاديم الظاهر (الجهاز العصبي المركزي والعين

والجلد) وتولد أوراماً عابية منتشرة في أنسجة هذه

الأعضاء وتتكون عادة من نسيج دبقي ومن أهم

ظواهرها ورم ليفي عصبي وتصلب تدريجي وتوسع

الشعيرات الرنحية وداء هيبيل - ليندا ومتلازمة

شتوركة سويبر.

phantasia (= fantasy) الْمُخَيَّلَةُ؛ اخْلَامٌ

البَقْطَةُ.

phantasm وَهْمٌ؛ خَيَالٌ. انطباع أو صورة

ذهنية لا تتولد عن تنبيه حقيقي.

phantasy (= fantasy) تَخَيُّلٌ؛ الْمُخَيَّلَةُ؛

اخْلَامٌ الْبَقْطَةُ.

phantogeusia ذَوْقٌ وَهْمِيٌّ. ذوق شاذ

مستمر في الفم وعادة ما يكون ذوقاً معدنياً أو

ملحياً ومن دون وجود منبه له.

phantom شَبَحِيٌّ. 1. وهم، خيال

2. نموذج الجسم أو لجزء منه.

p. limb طَرَفٌ شَبَحِيٌّ. انظر limb.

pharmacophilia هَوَسُ الْأَدْوِيَةِ. الرغبة

الملحة الشاذة في تعاطي الادوية.

pharmacophobia رُهابُ الْأَدْوِيَةِ.

الخوف بدون سبب من تعاطي الادوية.

pharmacopsychosis ذُهَانٌ الْأَدْوِيَةِ.

الذهان الذي يتولد عن تعاطي الكحول أو العقاقير

أو السموم.

pharyngism (= pharyngismus)

تَشَنُّجُ الْبُلْعُومِ.

pharyngismus تَشَنُّجُ الْبُلْعُومِ. تشنج

عضلات البلعوم.

pharyngodynia وَجَعُ الْبُلْعُومِ. ألم في

البلعوم أو في منطقته.

pharyngoplegia شَلْلُ الْبُلْعُومِ. شلل

عضلات البلعوم.

phemitone فِيمِيتُون.

انظر mephobarbital.

phenacemide فِينَاسِيَمِيد. دواء يستعمل

في الصرع الحركي النفسي والصرع الكبير

والصغير وفي حالات الصرع المختلطة.

phenacetin فِينَاسِيَتِين. دواء مسكن

ومضاد للحمى.

phenaglycodol فِينَاغْلِيكُودُول. دواء مهدئ.

phenantoin . mephentyoin فِينَانْتُون. انظر

phenazocine hydrobromide

هَيْدُرُوزِيُومِيد فِينَازُوسِين. دواء صناعي مسكن

مخدر.

phencyclidine hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيد الْفِينَيْسِيكْلِيدِين. دواء يستعمل

كمسكن ومخدر.

phenelzine sulfale سَلْفَاتُ الْفِينِلَزِين.

دواء يعطى عن طريق الفم كمضاد للكآبة.

phengophobia (= photophobia) رُهابُ

الضوء.

phenmetrazine hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيد الْفِينِمِتْرَازِين. دواء منبه للجهاز

العصبي المركزي كدواء مقهم فيقلل الشهية

للطعام.

phenobarbitone (= phenobarbital)

فِينُوبَارْبِيْتُون.

phenomenon ظَاهِرَةٌ. (ج: ظَوَاهِر).

أية علامة أو عرض ظاهر وملاحظ.

- Babinski's p. ظَاهِرَةُ بَابِنْسكي. شني خلفي

- لإبهام القدم وانثناء أصابعها الأخرى وتباعدها عوضاً عن الثني الأخصي لكل الأصابع عند تنبيه أخمص القدم وهي علامة تلف السبيل القشري النخاعي.
- **cheek p.** **ظاهرةُ الخدّ.** عند ضغط الخدين تحت اللسان الوجيه في حالات التهاب السحايا ينتفض الذراعان للأعلى مع انثناء المرفقين.
- **cogwheel p.** **ظاهرةُ الدوّالَب المُسنّن.** عند تمديد عضلة مفرطة التوتر بصورة لا فاعلة فإنها تقاوم التمديد بطريقة نفضية ارتجاجية غير منتظمة.
- **finger p.** **ظاهرةُ الأصابع.** انبساط كل أصابع اليد أو الإبهام والسبابة عند الضغط على العظم الحمصي الشكل في الشلل الشقي (الفالج).
- **Grasset's p.** **ظاهرةُ غِرَاسِيَت.** عدم استطاعة المريض رفع ساقيه سوية بالرغم من استطاعته رفع كل واحدة منهما على انفراد ويشاهد ذلك في الشلل الشقي العضوي غير الكامل.
- **Grasset- Gaussel p. (= Grasset's p.)** **ظاهرةُ غِرَاسِيَت.**
- **hip- flexion p.** **ظاهرةُ ثني الورك.** في حالات الشلل السفلي عندما يحاول المريض الجلوس من وضع الاستلقاء يثني ورك الجهة المشلولة.
- **Hochsinger's p.** **ظاهرةُ هُوَحْسِنْجَر.** يؤدي الضغط على الجهة الداخلية للعضلة ذات الرأسين إلى انقباض قبضة اليد في حالة التكرز.
- **Hoffmann's p.** **ظاهرةُ هُوَفَمَان.** زيادة استثارية الأعصاب الحسية للمنبهات الكهربائية وعادة ما يفحص العصب الزندي لقياس ذلك.
- **Hunt's paradoxical p.** **ظاهرةُ هُنْت المُتَنَاقِضَة.** في حالة خلل التوتر العضلي المشوه عندما يحاول الفاحص ثني القدم بشدة نحو الأخصم يزداد تشنجهما الظهري ولكن لو طلب من المريض بسط قدمه فإنه يثنى نحو الأخصم.
- **Kohnstamm's p. (= aftermovement)** **حَرَكَةٌ تَلَوِيَّة.** ظاهرة كونستام.
- **Lust's p.** **ظاهرةُ لُسْت.** ثني خلفي وتباعدها القدم عند طرق العصب المأبضي الظاهر تحت رأس الشظية مباشرة وهو دلالة على سرعة التشنج.
- **muscle p.** **ظاهرةُ عَضَلِيَّة.** نزعة العضلة المخططة على التقلص بكتل صلبة عند طرقها.
- **Negro's p. (= cogwheel p.)** **ظاهرةُ الدوّالَب المُسنّن.**
- **Orbelli's p.** **ظاهرةُ أُوْرْبِيلِي.** عندما تتناقص استجابة المستحضر العصبي العضلي للمنبهات بسبب التعب يؤدي تنبيه العصب الودي إلى زيادة شدة تقلص العضلة.
- **paradoxical p. of dystonia (= Hunt's paradoxical p.)** **ظاهرةُ خَلَل التَوَثُّر المُتَنَاقِضَة.**
- **peroneal nerve p. (= Lust's p.)** **ظاهرةُ العَصَبِ المَأْبِضِي.**
- **Pool's p.** **ظاهرةُ بُول.** في حالة التكرز تتقلص عضلات الذراع عند رفعه فوق الرأس مع بسط الساعد مما يمدد الضفيرة العضدية ويشاهد ذلك في التكرز التالي للعمليات الجراحية.
- **psi p.** **ظاهرةُ بَسِي.** ظاهرة نفسية. شعور أو تأثير يتولد من دون أي عامل أو منبه فيزيائي.
- **radial p.** **ظاهرةُ الكَعْبُرِي.** الثني للخلف اللاإرادي للمعصم الذي يحدث عند ثني الأصابع نحو الراحة.
- **rebound p.** **ظاهرةُ الإِنْتِدَاد.** ظاهرة فقدان التنسيق بين مجموعات العضلات المتضادة في الأطراف في حالة الاضطرابات العيخية ومن الممكن إظهارها بالطلب من المريض بسط ذراعيه أفقياً فعند طرق الفاحص لذراع الشخص السليم بشدة فإنها ترتد إلى موضعها رأساً أما في حالة ذراع المريض المصاب فإنها تتأرجح عند طرقها لعدة مرات حول موضعها قبل أن تستقر فيه. كما يمكن إظهار ذلك بوضع مرفق ساعد المريض على المنضدة ويحاول ثنيها ضد مقاومة الفاحص للثني. فإذا ما أوقف الأخير مقاومته لذلك يرتد ساعد المريض لصدره بشدة أما ساعد الشخص السليم فلا ينثني إلا قليلاً ليعود إلى وضعه الأصلي.
- **release p.** **ظاهرةُ التَحْرِير.** تحرر المراكز السفلية عند إزالة المراكز العلوية المثبطة لها.
- **Schüller's p.** **ظاهرةُ شُولَر.** في حالة الشلل الشقي (الفالج) يتمكن المريض من السير إلى الجهة المشلولة أسهل من سيره إلى الجهة المصابة.
- **Sherrington's p.** **ظاهرةُ شِيرِينْغْتُون.**

ظاهرة تقلص عضلات الأطراف السفلية عند تنبيه عصب حركي متنكس.

- Sinkler's p. **ظَاهِرَةُ سِنْكَلِرْ**. يؤدي الثني الشديد لإبهام القدم في الطرف المصاب بالشلل التشنجي إلى ثني الركبة والورك.

- Souque's p. **ظَاهِرَةُ سُوْكَزْ**. ظاهرة تشاهد في الشلل الشقي غير التام وهي بسط الأصابع وانفصالها لا إرادياً عند رفع الذراع، وتسمى أيضاً ظاهرة الأصابع.

- staircase p. (= treppe) **ظَاهِرَةُ السُّلَم**. ظاهرة الزيادة التدريجية في درجة التقلص العضلي بعد تنبيهها المتتالي السريع.

- Strümpell p. **ظَاهِرَةُ شْتْرُومْبِلْ**. الثني الخلفي وبسط القدم عند ثني الساق الممدودة بوجه المقاومة التي يضعها الفاحص ضدها.

- toe p. (= Babinski's reflex) **ظَاهِرَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ**. منعكس بابنسكي.

- tongue p. **ظَاهِرَةُ اللِّسَانِ**. تقلص اللسان وظهور حفر عميقة فيه عنه النفخ عليه ويشاهد في حالات التكرز.

- Trousseau's p. **ظَاهِرَةُ تْرُوسُو**. التقلص التشنجي للعضلات عند الضغط على الأعصاب التي تغذيها.

- Wedensky's p. **ظَاهِرَةُ وِيدَنْسْكِي**. عند وضع سلسلة من المنبهات السريعة على العصب تتقلص العضلة بسرعة استجابة للمنبه الأول ومن ثم تتوقف عن الاستجابة ولكن لو وضعت المنبهات بسرعة أبطأ لاستجابت العضلة لها كلها وباستمرار.

النَمَطُ الظَّاهِرِيُّ. التكوين الفيزيائي **phenotype** والكيميائي الحيوي والفيزيولوجي للشخص والذي يتعين وراثياً وبيئياً.

phenoxybenzamine hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الْفِينُوكْسِي بَنْزَامِينْ. دواء محصر للمفعول الأدريناليني القلبي ألفا ويستعمل كمضاد لارتفاع ضغط الدم.

phensuximide **فِنْسُكْسِيمِيد**. دواء يستعمل في علاج الصرع الصغير ويعطى عن طريق الفم.

phenylketonuria (PKU) **بَيْلَةُ الْفَنِيل**

كيتون. داء وراثي ينتج عن اختلال استقلاب الفينيل كيتون ويتصف بالتخلف العقلي وفرط الحركة والصرع بالإضافة إلى أعراض عامة أخرى.

phenylramidol hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الْفِينِيرَامِيدُول. دواء مسكن ومرح للعضلات الهيكلية.

phenytoin **فِينِيْتُون**. دواء مضاد للاختلاج يستعمل في معالجة كل أنواع الصرع ما عدا الصرع الصغير وكذلك كمضاد لاختلال نظم القلب.

phetharbital **فَيْتَارْبِيْتَال**. باريبوتورات غير منوم يستعمل في معالجة الاختلاج.

phlebalgia **أَلَمٌ وَرِيدِي**. ألم يتولد عن دوال على سطح العصب أو في داخله.

phlebanesthesia (= phlebonarcosis) **تَخْدِيرٌ وَرِيدِي**. تخدير يولد بالحقن داخل الوريد.

phobia **رُهَابٌ**. خوف شديد ودائم ومن دون سبب من شيء معين أو من فعالية أو حالة معينة وقد يدرك المصاب نفسه أن خوفه مبالغ فيه وغير منطقي. وعندما يكون الرهاب سبباً للضائقة أو يتعارض مع فعاليات الشخص الاجتماعية فإنه يعتبر نوعاً من الاختلال العقلي. ويصنف الرهاب إلى رهاب الساح والرهابات الاجتماعية والرهابات البسيطة.

simple p. **رُهَابٌ بَسِيطٌ**. اختلال رهابي لا يشمل رهاب الأفراد أو الوجود في المحلات العامة (رهاب الساح) أو الخوف من الإحراج في المواقف الاجتماعية (الرهاب الاجتماعي) وأنواع الرهاب البسيط الشائعة هي رهاب الحيوانات خصوصاً الكلاب والأفاعي والحشرات والفئران أو رهاب الانغلاق أو رهاب المرتفعات.

social p. **رُهَابٌ أَجْتِمَاعِي**. الرهاب الذي يشمل تجنب المجتمعات لأن المصاب يخاف من التعرض للمواقف المحرجة كالإذلال أو الإهانة كما يشمل الخوف من التحدث في الاجتماعات أو التمثيل فيها أو الأكل في المحلات العامة أو استعمال المرافق الصحية العامة.

phobic **رُهَابِي**. ذو طبيعة رهابية أو منسوب للرهاب.

phobophobia **رُهَابُ الرُهَابِ**. تخوف الشخص من الإصابة بالرهاب.

phonasthenia وَهْنُ الصَّوْتِ. ضعف الصوت أو صعوبته بسبب التعب.

phonation تَصَوُّيْت. إخراج الأصوات.

phonophobia رُهَابُ الْأَصْوَاتِ. الخوف الشاذ من سماع الأصوات أو من الكلام بصوت عالٍ.

photalgia أَلَمٌ ضَوْوِيٌّ. ألم العين عند تعرضها للضوء.

photaugiaphobia رُهَابُ الْوَهِيَج. الخوف الشديد من وهيج الضوء.

photodynia (= photalgia) أَلَمٌ ضَوْوِيٌّ.

photoperceptive مُدْرِكٌ لِلضَّوْءِ. يتمكن من إدراك الضوء.

photophobia رُهَابُ الضَّوْءِ. عدم تحمل العين الشاذ للضوء.

photoreception اسْتِقْبَالُ الضَّوْءِ. عملية التحسس للموجات الضوئية التي تتراوح أطوال موجاتها بين 370 و 760 نانومتراً وهي طيف الضوء المرئي.

photoreceptor مُسْتَقْبِلَةٌ ضَوْوِيَّةٌ. عضو انتهائي عصبي أو مستقبل حساسة للضوء.

phrenalgia أَلَمُ الْحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

phrenemphraxis (= phrenicotripsy) هَرَسُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phrenetic (= 1. maniacal 2. maniac) 1. هَوَسِيٌّ 2. مَهْوُوسٌ.

phrenic 1. حِجَابِيٌّ 2. عَقْلِيٌّ. 1. نسبة للحجاب الحاجز 2. نسبة للعقل.

phrenicectomy (= phreniconeurectomy) قَطْعُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phreniclasia (= phreniclasia) هَرَسُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ. هرس العصب الحجابي بملقاط.

phrenicoexairesis قَلْعُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phrenicoexeresis قَلْعُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phreniconeurectomy قَطْعُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ. قَطْعُ كُلِّ أَوْ جُزْءٍ مِنَ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phrenicotomy قَطْعُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ.

phrenicotripsy هَرَسُ الْعَصَبِ الْحِجَابِيِّ. عملية هرس العصب الحجابي.

phrenodynia أَلَمُ الْحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

phrenology فِرَاسَةُ الدِّمَاغِ. علم دراسة أخلاق الشخص وقابلياته العقلية من خلال دراسة شكل جمجمته.

phrenoplegia شَلْلُ الْحِجَابِ. شلل الحجاب الحاجز.

phronema الْقَشْرَةُ الْعَقْلِيَّةُ؛ الْمَذَاهِنُ. قسم قشرة الدماغ الذي تحتله المراكز الفكرية والارتباطية للمخ.

physocephaly نُفَاحُ الرَّأْسِ. تورم نفخي بالرأس.

physostigmine فِيرُوسْتِغْمِين. قلواني كوليني الفعل له نشاط مضاد للكولينستراز ويستعمل موضعياً لتضييق حدقة العين ولإنقاص ضغط داخل العين في الزرق كما يستعمل داخل الجسم للتأثيرات التي تحدثها الجرعات المفرطة من الأدوية المضادة للفعل الكوليني.

p. salicylate سَالِيسِيلَاتُ الْفِيرُوسْتِغْمِين. ملح ساليسيلات الفيزوستغمين وله نفس تأثير الفيزوستغمين.

p. sulfate سَلْفَاتُ الْفِيرُوسْتِغْمِين. ملح سلفات الفيزوستغمين وله تأثير الفيزوستغمين نفسه.

pia 1. لَيْنٌ؛ رَخْوٌ؛ رَقِيقٌ 2. الْأُمُّ الْحَنُونُ.

p. mater الْأُمُّ الْحَنُونُ. انظر pia mater.

pia- arachnitis (= leptomeningitis) إِلْتِهَابُ الْحَنُونِ وَالْعَنْكَبُوتِيَّةِ.

pia- arachnoid (= leptomeninges) الْحَنُونُ الْعَنْكَبُوتِيَّةُ. الأم الحنون والعنكبوتية وتعتبران معاً كوحدة وظيفية واحدة.

pia- glia الْحَنُونُ الدِّبْقِيَّةُ. غشاء يتكون من اندماج الأم الحنون والدبقية الهامشية ويكونان إحدى طبقات الحنون العنكبوتية.

pial حَنُونٌ. نسبة إلى الأم الحنون.

pia mater الأمُ الحَنُونُ. الغشاء الداخلي للأغشية الثلاثة (السحايا) التي تغطي الدماغ والنخاع والذي يغلفهما جيداً ويمتد إلى أعماق شقوقهما وأتلامهما ويتكون من ألياف شبكية ومرنة وكلاجينية.

p. m. encephali الأمُ الحَنُونُ الدُمَاعِيَّة. الأمُ الحنون التي تغطي الدماغ وهي طبقة رقيقة على قشرة المخ واسمك من تلك التي تغطي جذع الدماغ وتتشعب أوعية الدماغ الدموية في داخلها والتي تدخل الدماغ لمسافة قصيرة مغطاة بطبقة من الحنون الدماغية.

p. m. spinalis الأمُ الحَنُونُ النُخَاعِيَّة. الأمُ الحنون التي تغطي النخاع الشوكي وتتكون من ألياف كولاجينية وهي تكون الرباط المسنن والألياف الشبكية التي تغلف النخاع وتكون مختلف الحواجز وأغلفة الجذور العصبية.

piamatral (= pial) حَنُونِي.

piarachnitis (= pia-arachnitis) الِتهَابُ الحَنُونِ والعَنَكَبُوتِيَّة.

piarachnoid (= pia-arachnoid) الحَنُونِ العَنَكَبُوتِيَّة.

pica وَحَمٌ؛ قَطَا؛ شَذُوذُ الشَّهِيَّة. أكل المواد غير المغذية الإجباري كالطين والأصباغ والثلج والجبس والشعر ونشاء الغسيل وهي ممارسة شاذة عند بعض الحوامل أو في المرضى المعوزين للزنك أو للحديد.

picrotoxin بِكَرُوتُوكْسِين. مادة منبهة لكل أقسام الجهاز العصبي المركزي لأنها تحصر الدفوعات العصبية المثبطة قبل التشابكية. وقد استعملت كمادة منبهة مركزية وتنفسية في علاج تسمم الجهاز العصبي المركزي بالمواد المخرجة خصوصاً مواد الباربيتورات التي تدخل عن طريق الوريد.

piesesthesia حِسُّ الضَّغْط. حس منبهات الضغط.

piesimeter مِقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْط. مقياس حس الضغط في الجلد.

piezesthesia (= piesesthesia) حِسُّ الضَّغْط.

piezometer 1. مِقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْط. 2. مِقْيَاسُ الضَّغْطِ الحَجَاجِي. 1. مقياس حس الضغط. 2. مقياس الضغط داخل الحجاج.

pilocarpine بِيلُوكَرْبين. قلواني محاكي الكولين له تأثيرات مسكارينية الفعل فهو يضيق حدقة العين عند استعماله موضعياً مع ارتفاع عابر ثم انخفاض دائم للضغط داخل العين ويستعمل في علاج الزرق.

p. hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيد البِيلُوكَرْبين. له نفس خواص البيلوكربين.

p. nitrate نَيْتْرَاتُ البِيلُوكَرْبين. له نفس خواص البيلوكربين.

pilomotor مُقَفَّةُ الشَّعْرِ. العضلات الصغيرة التي يؤدي تقلصها إلى انتصاب الشعر وإلى «جلد الوز».

pineal صَنْوَبَرِي. نسبة إلى الجسم الصنوبري أو صنوبري الشكل.

pinelectomy إِسْتِئْصَالُ الصَّنُوبَرِيَّة؛ استئصال الجسم الصنوبري.

pinealism الحَالَةُ الصَّنُوبَرِيَّة. حالة اختلال إفرازات الجسم الصنوبري.

pinealoblastoma وَرَمٌ أرومي صَنْوَبَرِي. ورم صنوبري ولكن خلاياه الصنوبرية غير متميزة جيداً.

pinealocytoma, pinealoma وَرَمٌ صَنْوَبَرِي. ورم الصنوبرية.

pinealopathy إِغْتِلَالُ الصَّنُوبَرِيَّة. أي مرض يصيب الغدة الصنوبرية.

pineoblastoma وَرَمٌ أرومي صَنْوَبَرِي.

pineocytoma وَرَمٌ صَنْوَبَرِي.

piperacetazine بِيْرَاسِيْتَازِين. دواء مضاد للذهان يستعمل في علاج الأنواع المتعددة من الفصام في البالغين ويدخل عن طريق الفم.

piperidolate hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيد البِيرِيدُوليت. دواء مضاد للفعل الكولينيني يقلل من حركة العضلات الملساء وخصوصاً تلك التي في الجهاز المعدي المعوي

ويستعمل كدواء مضاد للتشنج في هذا الجهاز ويعطى عن طريق الفم.

piperocaine hydrochloride

هيدروكلوريد البيروكاين. دواء يستعمل كبنج موضعي أو نخاعي أو ذنب.

piperoxan hydrochloride

هيدروكلوريد البيروكسان. مادة محصرة لادرينالين الفأ، ويستعمل قبل العمليات وأثناءها لمقاومة تأثير الأدرينالين الذي يفرز أثناء العملية.

pipoxalan hydrochloride

الببوكسالان. دواء يستعمل كمرخ للعضلات.

pipradrol hydrochloride

هيدروكلوريد البيرادزول. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب ويستعمل عن طريق الفم.

pirandamine hydrochloride

هيدروكلوريد البيرندامين. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب.

pituicyte

خلية نخامية. أي من الخلايا المغزلية الشكل والسائدة في النخامية العصبية والمنتشرة بين الألياف العصبية والتي تعتبر خلايا دقيقة عصبية متخصصة.

pituitarism

الحالة النخامية. اضطراب وظائف الغدة النخامية.

pituitarium (= pituitary)

النخامية 1. نخامي. 2. الغدة النخامية 2. منسوب للغدة النخامية.

- anterior p.

النخامية الأمامية. الفص الأمامي للغدة النخامية وهو النخامية الغدية أو مستحضر من هذا الفص للغدة.

- pharyngeal p.

النخامية البلعومية. مجموعة صغيرة متبقية من النسيج الغدي للنخامية الغدية توجد في السمحاق المخاطي لسقف البلعوم الأنفي وتتطور من كيس رائكة في الجنين.

- posterior p.

النخامية الخلفية. الفص الخلفي للغدة النخامية وهي النخامية العصبية كما أنه يستحضر من هذا الفص بعد تجفيفه ويستعمل كمضاد للتبول في البوالة التقه أو لتنبية العضلات الملساء خصوصاً في الرحم عند نزفه.

pituitectomy (= hypophysectomy)

استئصال النخامية.

placebo

غفل. علاج بدواء تمثيلي كاذب ليس له أية فعالية دوائية لمرض الشخص أو لشكواه يعطى لمجرد أغراض نفسية فيزيولوجية.

plagiocephaly

رأس وأرب؛ دنخ. رأس ملتف وغير متناظر يتولد عن عدم انتظام انسداد الدروز القحفية.

plantar

أخفصي. نسبة للأخمص.

plaque

لويحة. (ج. لويحات). أية لطفة أو منطقة مسطحة.

- attachment p's.

لويحات الارتكان. مناطق صغيرة كثيفة في غمد الليف العضلي تركز عليها الخيوط العضلية.

- fibromyelinic p's.

لويحات ليفية ميبينية. مناطق في القشرة المخيخية المصابة بالنخر التصليبي الشراييني غير الكامل تظهر فيها لويحات من الألياف العصبية المغمدة المفرطة النمو.

- Lichtheim p's.

لويحات ليختايم. مناطق تنكس في المادة البيضاء للمخ تشاهد في فقر الدم الوبيل.

- Redlich- Fisher miliary p's.

ريدليخ - فيشر الدخنية. مناطق متتخنة غامقة اللون في الشبكة الدقيقة للمخ تشاهد في ذنانات الشيوخة.

- senile p's.

لويحات الشيخوخة. آفات مجهرية مكونة من شدة مقطعة من نهايات المحاور والتفصينات العصبية تشاهد في قشرة المخ في الشيوخ في داء الزهايمر.

platybasia (= basilar impression)

تفلطح القاعدة؛ تسطح القاعدة. تشوه خلقي في العظم القذالي والنهائية العلوية للفقرار الرقبي الذي يدفع قاعدة القذالي للأعلى ويعطيها شكل الصفيحة.

platycephalic

عريض الرأس. ذو رأس عريض يكون فيه معامل العرض للطول أقل من 70.

platycrania

تسطيح القحف. تسطح القحف صناعياً.

pleocytosis

كثرة خلايا السائل الدماغي النخاعي. وجود عدد من الخلايا في السائل الدماغي النخاعي أكثر من العدد السوي.

pleonexia هَوَسُ التَّمَلُّكِ: الجَشَعُ. الطمع
والرغبة المفرطة في التملك والحصول على الثروة.

pleurodynia وَجَعُ الجَنْبَةِ. ألم انتبائي
في العضلات الوربية بسبب الروماتزم العضلي أو
تهيج سطح الجنبَةِ.

plexal ضَفِيرِيّ. نسبة للضفيرة.

plexalgia أَلَمٌ ضَفِيرِيّ. ألم يسبب آفة
ضفيرة.

plexectomy إِسْتِنْصَالُ الضَّفِيرَةِ. قطع
الضفيرة وإزالة جزء منها أو كلها.

plexitis إْتِهَابُ الضَّفِيرَةِ. التهاب إحدى
الضفائر العصبية.

plexopathy إِغْتِلَالُ الضَّفِيرَةِ. اعتلال
إحدى الضفائر وخصوصاً العصبية منها.

- lumbar p. إِغْتِلَالُ الضَّفِيرَةِ القَطْنِيَّةِ. اعتلال
عصبي للضفيرة القطنية.

plexus ضَفِيرَةٌ. (ج: ضَفَائِرُ). شبكة من
الأعصاب أو الأوعية اللمفية أو الأوردة.

- annular p. الضَّفِيرَةُ الحَلَقِيَّةُ. ضفيرة من
الألياف العصبية تحيط بحافة القرنية.

**- anserine p. (p. parotidus nervi
facialis)** الضفيرة الوربية: الضَّفِيرَةُ النَّكَيَّةُ
لِلْعَصَبِ الوَجْهِيِّ.

- p. aorticus abdominalis الضَّفِيرَةُ الأَبْهَرِيَّةُ
البَطْنِيَّةُ. ضفيرة مفردة غير مزدوجة تتكون من حزم
الياف عصبية رابطة تتصل من الضفائر البطنية
المساريقية العلوية وتنزل مع الأبرر حيث تستلم
فروعاً من الأعصاب المساريقية القطنية لتصبح
الضفيرة الخثلية العلوية تحت انشعاب الشريان الأبرر
وتتوزع فروعها متجاورة مع فروع الشريان المذكور.

**- p. aorticus thoracalis (= p. aorticus
thoracicus)** الضَّفِيرَةُ الأَبْهَرِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ.

ضفيرة توجد حول الأبرر الصدري تتكون من الياف
من الجذعين الوديين والعصبين المبهمين وتتفرع منها
فروع صغيرة ترافق فروع الأبرر وهي متواصلة عند
جهتها السفلية مع الضفائر البطنية والأبهرية البطنية.

- p. arteriae cerebri anterioris الضَّفِيرَةُ

الشَّرِيَانِيَّةُ المُخَيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. ضفيرة رقيقة من
الأعصاب الودية تحيط بالشريان المخي الأمامي.

- p. arteriae cerebri mediae الضَّفِيرَةُ
الشَّرِيَانِيَّةُ المُخَيَّةُ المُتَوَسِّطَةُ. ضفيرة رقيقة من
الأعصاب الودية تحيط بالشريان المخي المتوسط.

- p. arteriae chorioideae الضَّفِيرَةُ الشَّرِيَانِيَّةُ
المَشِيمِيَّةُ. ضفائر دقيقة ترافق الشرايين المشيمية.

- Auerbach's p. (= p. myentericus)
الضَّفِيرَةُ المُعْصَلِيَّةُ المعَوِيَّةُ.

- p. auricularis posterior الضَّفِيرَةُ الأُذِينِيَّةُ
الخَلْفِيَّةُ. ضفيرة أعصاب ودية توجد على الشريان
الأذيني الخلفي.

- autonomic p's. (= p's. autonomici)
الضَفَائِرُ المُسْتَقْلِيَّةُ. شبكة واسعة من الياف وأجسام
الخلايا العصبية التي تصاحب الجهاز العصبي
المستقل وتوجد بصورة خاصة في البطن والصدر
والحوض وتحوي أليافاً ودية ولا ودية وحشوية واردة.

- basilar p. (= p. basilaris) الضَّفِيرَةُ القَاعِيَّةُ.
ضفيرة وريدية توجد في الأم الجافية وتقع على القسم
القاعدي من العظم القذالي والقسم الخلفي من العظم
الوتدي وتمتد من الجيب الكهفي حتى الثقب العظمي
كما أنها تتصل بجميع جيوب الجافية.

- brachial p. (= p. brachialis) الضَّفِيرَةُ
العَضْدِيَّةُ. ضفيرة تتأصل من الفروع البطنية
للأعصاب النخاعية الرقبية الأربعة الأخيرة ومن معظم
الفرع البطني للعصب الصدري الأول وهي تقع جزئياً
في الرقبة وجزئياً في الإبط وتتكون من الفروع
والجذوع البطنية - القسم فوق الترقوي والمجاور
للشريان تحت الترقوة والذي يتفرع إلى الأعصاب
الكتفي الظهرية والصدري الطويل وتحت الترقوي
والفوق الكتفي. ويتكون القسم تحت الترقوي من
الفروع التي تقع خلف الترقوة تقريباً ومن الحبال
والفروع التي توجد في الإبط بجوار الشريان الإبطي
ويتفرع إلى الأعصاب الصدريين الإنسي والوحشي
والجلدي العضدي الإنسي والجلدي الساعدي الإنسي
والناصف والزندي والكعبري وتحت الكتفي والصدري
الظهري والإبطي.

- cardiac p., deep الضَّفِيرَةُ القَلْبِيَّةُ العميقة.

قسم الضفيرة القلبية الذي يقع بين القوس الأبهرى وانشعاب الرغامى.

- cardiac p., superficial (= anterior cardiac p.) الضفيرة القلبية السطحية.


قسم الضفيرة القلبية الذي يقع تحت قوس الأبهر وإلى اليمين من الرباط الشرياني.

- p. cardiacus (= cardiac p.) الضفيرة القلبية. الضفيرة حول قاعدة القلب وبصورة خاصة في تامور القلب وهي مكونة من الفروع القلبية للعصب المبهم والجذعين والعقد الودية وتحوي أليافاً حشوية واردة وتتفرع إلى فروع للقوس الأبهر وللأذنين الأيسر والأيمن والشريانين التاجيين الأيمن والأيسر.

- p. cardiacus profundus (= deep cardiac p.) الضفيرة القلبية العميقة.

- p. cardiacus superficialis (= superficial cardiac p.) الضفيرة القلبية السطحية.

- p. caroticus communis الضفيرة السباتية الأصلية. ضفيرة عصبية على الشريان السباتي الأصلي تتكون من فروع من الضفيرتين السباتيتين الظاهرة والباطنة ومن العقد الودية الرقبية.



plexus, brachial

الضفيرة العصبية وطلع النخاع الرقبية والصدرية المناظرة لها.

أ - الجزء فوق الترقوة: (1) الجذع العلوي (2) الجذع المتوسط (3) الأقسام الخلفية

ب - الجزء تحت الترقوة: (4) العصب الكعبري (5) العصب العضلي الجذلي (6) العصب الناصف (المتوسط) (7) العصب الزندي (8) الأقسام الأمامية (9) الجذع السفلي (10) العصب الصدري الأول (11) العصب الرقبى الثامن (12) العصب الرقبى السابع (13) الأربطة المسننة (14) العصب الرقبى السادس (15) عصب شوكي (16) العصب الرقبى الخامس (17) العقدة الشوكية (18) الجذر الأمامي (19) الجذر الخلفي.

- **p. caroticus externus** **الضَفِيرَةُ السَّبَاتِيَّةُ الظَّاهِرَةُ**. ضفيرة عصبية تقع حول الشريان السباتي الظاهر تتكون من الأعصاب السباتية الظاهرة من العقد الرقبية العلوية وتغذي اليافاً ودية ترافق فروع الشريان السباتي الظاهر.

- **p. caroticus internus** **الضَفِيرَةُ السَّبَاتِيَّةُ الْبَاطِنَةُ**. ضفيرة عصبية تقع حول الشريان السباتي الباطن تتكون من العصب السباتي الباطن وهي تغذي أعصاباً ودية إلى فروع الشريان السباتي الباطن وإلى الضفيرة الطبلية وإلى أعصاب الجيب الكهفي وبصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى العقد القحفية اللاودية لتمر خلالها.

- **p. cavernosus** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ**. ضفيرة من ألياف عصبية ودية توجد في الجيب الكهفي للام الجافية.

- **p. cavernosus clitoridis** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ الْبَطْرِيَّةُ**. ضفيرة ألياف عصبية في جذر البظر تتأصل من الضفيرة المثانية وتغذي الجسم الكهفي للبظر.

- **p. cavernosus penis** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ الْقَضِيبِيَّةُ**. ضفيرة عصبية في جذر القضيب تتأصل من الضفيرة المثانية وتغذي الجسم الكهفي للقضيب.

- **celiac p. (= p. celiacus = p. coeliacus)** **الضَفِيرَةُ الْبَطْنِيَّةُ**.

- **cervical p., posterior** **الضَفِيرَةُ الرَّقْبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ**. ضفيرة عصبية في المنطقة الرقبية الخلفية تتكون من الفروع الظهرية للأعصاب النخاعية الرقبية. الثلاث أو الأربع الأولى.

- **p. cervicalis** **الضَفِيرَةُ الرَّقْبِيَّةُ**. ضفيرة عصبية تتكون من الفروع البطنية للأعصاب الرقبية الأربعة العلوية ومرتبطة على شكل سلسلة عرى غير منتظمة وتعطي فروعاً سطحية (الأعصاب القذالي الصغير والأذني الكبير والرقبي المستعرض والفوق الترقوي) وفروعاً عميقة (الأعصاب الحجاجي والحجاجي الإضافي والعروة الرقبية وأعصاباً عضلية أخرى).

- **cervicobrachialis p.** **الضَفِيرَةُ الرَّقْبِيَّةُ الْعَضْدِيَّةُ**. الضفيران الرقبية والعضدية معاً.

- **choroid p.** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ**. لقات من الاوعية الدموية للام الحنون تغطيها طبقة رقيقة من خلايا البطانة العصبية فتولد بروزات عنقودية في

البطينات الثالث والرابع والجانبى للدماغ وهي تفرز السائل الدماغي النخاعي.

- **p. choroideus ventriculi lateralis**

الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. وهي لقات وعائية مع طيات من الام الحنون في القسم المركزي للبطين الجانبى وسقف قرنه الصدغي وهي تولد السائل الدماغي النخاعي.

- **p. choroideus ventriculi quarti** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ**. لقات وعائية مع طيات من

الام الحنون في سقف القسم الخلفى من البطين الرابع تمتد إلى الردب الوحشي وخلالها وتولد السائل الدماغي النخاعي.

- **p. choroideus ventriculi terti** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الثَّالِثِ**. ضفيرة وعائية مع طيات

من الام الحنون في سقف البطين الثالث تساهم في توليد السائل الدماغي النخاعي.

- **ciliary ganglionic p.** **الضَفِيرَةُ الْعَقْدِيَّةُ الْهَذْبِيَّةُ**. ضفيرة مستقلة تتكون من العصبين

الهدبيين القصير والطويل وتقع على العضلة الهدبية وتغذي العضلتين الموسعة والمضيقة للحدقة.

- **coccygeal p. (= p. coccygeus)** **الضَفِيرَةُ الْغُصَصِيَّةُ**. ضفيرة صغيرة تتكون من الفروع

البطنية للأعصاب العصبية والعجزى الخامس وتوصيلة من العصب العجزى الرابع وتعطي العصب الشرجى العصبى.

- **p. coeliacus** **الضَفِيرَةُ الْبَطْنِيَّةُ**. قسم

الضفيرة امام الفقرية الواقعة على امام وجوانب الابهر عند منابت الجذعين البطنيين والشريانين المساريقي والكليوي وهي تحوي العقدتين البطنيتين المزدوجتين والعقد المساريقية العلوية وكتلة من العقد غير المسماة وترسل فروعاً تمتد مع الشرايين المجاورة وتسمى أيضاً الضفيرة الشمسية.


- **colic p., left** **الضَفِيرَةُ الْقَوْلُونِيَّةُ الْيُسْرَى**.

قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان القولوني الأيسر.

- **colic p., middle** **الضَفِيرَةُ الْقَوْلُونِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ**. قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي

يرافق الشريان القولوني الوسطى.

- **colic p. right** **الضفيرة القولونية اليمنى.**
قسم الضفيرة المسارية العلوية الذي يرافق الشريان القولوني الايمن.
- **p. coronarius cordis anterior** **الضفيرة التاجية القلبية الأمامية.** ضفيرة من اعصاب ودية امام القلب ومتعلقة بصورة رئيسية مع فروع الشريان التاجي الامامي.
- **p. coronarius cordis posterior** **الضفيرة التاجية القلبية الخلفية.** ضفيرة اعصاب ودية خلف القلب ومتعلقة بصورة رئيسية مع فروع الشريان التاجي الايمن.
- **crural p. (= p. femoralis)** **الضفيرة الفخذية.**
- **cystic p.** **الضفيرة الكيسية.** ضفيرة عصبية بالقرب من المرارة ومتعلقة بالشريان الكيسي.
- **deferential p. (= p. deferentialis)** **الضفيرة الأسهرية.** القسم الثانوي من الضفيرة الختلية السفلية الذي يغذي اليافاً عصبية للقناة الاسهرية.
- **p. dentalis inferior** **الضفيرة السننية السفلية.** ضفيرة من الياف عصبية من العصب السنخي السفلي تقع حول جذور الاسنان السفلية.
- **p. dentalis superior** **الضفيرة السننية العلوية.** ضفيرة من الياف عصبية من الاعصاب السنخية العلوية تقع حول جذور الاسنان العلوية.
- **enteric p. (= p. entericus)** **الضفيرة المعوية.** ضفيرة من الياف عصبية مستقلة داخل جدار الانبوب الهضمي ومكونة من الضفائر تحت المخاطية والعضلية المعوية وتحت المصلية وتحوي أليافاً حشوية وأليافاً ودية بعد العقدية ولا ودية قبل العقدية وبعد العقدية وأجسام خلايا لا ودية بعد العقدية.
- **epigastric p. (= p. celiacus)** **الضفيرة الشرسوفية.** الضفيرة البطنية.
- **esophageal p. (= p. oesophageus)** **الضفيرة المريئية.**
- **Exner's p. (= molecular p.)** **ضفيرة إكسنر.** طبقة ألياف مماسة لقشرة المخ في طبقة الجزيئية.
- **facial p. (= p. of facial artery)** **الضفيرة الوجهية.** ضفيرة عصبية على سطح الشريان الوجهي.
- **femoral p. (= p. femoralis)** **الضفيرة الفخذية.** ضفيرة عصبية ترافق الشريان الفخذي تشتق من الضفيرة الأبهريّة عن طريق الضفائر الوركية العامة والخارجية.
- **gastric p's. (= p. gastrici)** **الضفائر المعديّة.** قسم ثانوي من الجزء البطنى من الضفائر امام الفقرية ترافق الشريان المعدي وفروعه وتغذي أليافاً عصبية للمعدة.
- **p. gastricus anterior (= rami gastrici anteriores nervi vagi)** **الضفائر المعديّة الأمامية.** الضفائر المعديّة الامامية للعصب المبهم.
- **p. gastricus inferior** **الضفيرة المعديّة السفلية.** ضفيرة من الالياف العصبية على الحنية المعديّة الكبرى.
- **p. gastricus posterior (= rami gastrici posteriores nervi vagi)** **الضفائر المعديّة الخلفية.** الضفائر المعديّة الخلفية للعصب المبهم.
- **p. gastricus superior** **الضفيرة المعديّة العلوية.** ضفيرة من الالياف العصبية على الحنية المعديّة الصغرى.
- **gastroepiglottic p., left** **الضفيرة المعديّة الثربئية اليسرى.** ضفيرة عصبية بالقرب من الحنية المعديّة الكبرى.
- **hepatic p. (= p. hepaticus)** **الضفيرة الكبديّة.** قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الكبدي حتى الكبد.
- **p. hypogastricus inferior** **الضفيرة الختلية السفلية.** ضفيرة عصبية تتكون على جهتي السطح الامامي للقسم السفلي من العجز باتحاد الاعصاب الختلية والحشوية الحوضية وتجهز فروعاً للأعضاء الحوضية.
- **p. hypogastricus superior** **الضفيرة الختلية العلوية.** الاستمرارية السفلية للضفيرة الأبهريّة وتقع امام القسم العلوي من العجز تحت انشعاب الأبرر مباشرة وتستلم أليافاً من الاعصاب الحشوية القطنية السفلية وتنقسم إلى العصبين الختلي الايمن والختلي




plexus, esophageal

منظر أمامي لجوف الصدر يبين الضفيرة المريئية والعصبين المبهم الأيمن والأيسر والجذع الودي: (1) الشريان السباتي الأصلي (2) العصب المبهم (العصب القحفي العاشر) (3) العقدة الودية الرقبية المتوسطة (4) العضلة الأخمعية الأمامية (5) العروة تحت الترقوة (6) الشريان تحت الترقوة (7) العقدة الودية الصدرية الثانية (8) للعصب المبهم (9) العصب الحنجري الراجع الأيمن (10) الأبرص الصاعد (11) الفروع العصبية للعصب المبهم (12) القصبة الأولية اليمنى (13) الجذع الودي (14) المريء (15) العقد الصدرية الودية (16) العصب الحشوي الكبير (17) العصب الحشوي الصغير (18) الحجاب (19) البواب (20) الإثنا عشري (21) الأبرص البطني (22) العصب تحت العضلي 12 (23) المعدة (24) للضفيرة المعدية (من العصب المبهم) (25) الجزء البطني للمريء (26) فروع عصبية موصلة (بين الجذع الودي والأعصاب الوربية) (27) الضفيرة المريئية للعصبين المبهمين (الأيمن والأيسر) (28) الأبرص الصدري (29) الأعصاب الوربية (30) القصبة الرئيسية اليسرى (31) الفروع العصبية للعصب المبهم (32) العصب الحنجري الراجع (الأيمن) (33) للضفيرة القلبية الأبهريّة (34) العصب المبهم (35) العروة تحت الترقوة (36) الشريان تحت الترقوة (37) للعصب الحنجري الراجع (الأيسر) (38) العضلة الأخمعية الأمامية (39) الرغامى (40) للعقدة الرقبية الصدرية.

- ileocolic p. الضفيرة المعوية القولونية.
قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان المعوي القولوني.
- iliac p. (= p. iliacus) الضفيرة الحرقفية.
ضفيرة تتأصل بصورة رئيسية من الضفيرة الأبهريّة وترافق الشرايين الحرقفية الأصلية.
- infraorbital p. الضفيرة تحت الحجاجية.
ضفيرة عصبية تقع بالعمق من العضلة رافعة الجفن العلوي وتتكون من الفروع الشفوية العلوية للعصب تحت الحجاج وفروع من العصب الوجهي.
- intermesenteric p., lumboaortic (= p. aorticus abdominalis) الضفيرة القطنية الأبهريّة بين المساريقية: الضفيرة الأبهريّة البطنية.
الضفيرة بين المساريقية، قسم الضفيرة الأبهريّة الذي يقع بين أصل الشريانين المساريقيين العلوي والسفلي.
- p. intermesentericus الضفيرة بين المساريقية.
قسم الضفيرة الأبهريّة الذي يقع بين أصل الشريانين المساريقيين العلوي والسفلي.
- intramuscular p. الضفيرة داخل العضل.
ضفيرة خلايا عصبية مستقلة داخلية واللياف عصبية توجد في جدران الأمعاء والمثانة بصورة تامة وتساهم أو تتحكم في المنعكسات والفعاليات الموضعية لهذه الأعضاء.
- ischiadic p. (= p. sacralis) الضفيرة الأسكية: الضفيرة العجزية.
الضفيرة الحنجريّة. ضفيرة عصبية على السطح الخارجي للعضلة المضيق السفلية للبلعوم وهي فرع جانبي للضفيرة البلعومية وتتكون من اللياف من الأعصاب الودية والحنجري الظاهر.
- lingual p. (= p. lingualis) الضفيرة اللسانية.
ضفيرة عصبية ترافق الشريان اللساني.
- p. lumbalis الضفيرة القطنية. ضفيرة تتكون من الفروع البطنية للأعصاب القطنية 2-5 (وأحياناً فروع من العصب القطني الأول) وتوجد عند العضلة القطنية الكبيرة. ويتصل الفرع السفلي من العصب القطني الرابع مع العصب القطني الخامس ليكونا الجذع القطني العجزي والذي يكون جزءاً من الضفيرة العجزية. أما فروع العصب القطني الأول فهي العصبين الحرقم الأربي والحرقفي الخليلي. أما فروع الضفيرة القطنية الأصلية فهي الأعصاب التناسلي

- والفخذي والجلدي الفخذي الوحشي والسدادي والفخذي.
- p. lumbaris (= p. lumbalis) الضفيرة القطنية.
- lumbosacral p. (= p. lumbosacralis) الضفيرة القطنية العجزية. الضفيران القطنية والعجزية وتعتبران كضفيرة واحدة لاتصالهما المباشر.
- p. mammarius internus الضفيرة الثديية الباطنة. ضفيرة ترافق الشريان الصدري الباطن وفروعه.
- p. maxillaris externus (= p. of facial artery) الضفيرة الفكّية العلوية الظاهرة.
- p. maxillaris internus الضفيرة الفكّية العلوية الباطنة. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الفكّي العلوي الباطن.
- Meissner's p. (= p. submucosus) الضفيرة تحت المخاطية.
- p. meningeus الضفيرة السحائية. ضفيرة عصبية ترافق الشريان السحائي المتوسط.
- p. mesentericus inferior الضفيرة المساريقية السفلية. قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشريان المساريقي السفلي.
- p. mesentericus superior الضفيرة المساريقية العلوية. قسم من الضفيرة البطنية يرافق الشريان المساريقي العلوي.
- myenteric p. (= p. myentericus) الضفيرة العضلية المعوية. قسم الضفيرة المعوية الذي يوجد في داخل الغلالة العضلية.
- nasopalatine p. الضفيرة الأنفية الحنكية. ضفيرة عصبية بالقرب من الثقب القاطعية.
- nerve p. ضفيرة عصبية. ضفيرة مكونة من اللياف عصبية متشابكة.
- p. nervorum spinalium ضفيرة عصبية نخاعية. ضفيرة تتكون من تشابك اللياف عصبين نخاعيين أو أكثر مثل الضفيرتين العضدية والقطنية العجزية.
- nervous p. (= nerve p.) ضفيرة عصبية.



الأعصاب والأوعية الدموية لجدار البطن الخلفى والصفيرة القطنية: (1) الشريان الحجابي السفلي (2) العصب الحشوي الكبير
 (3) الوريد الأجوف السفلي (4) الوريد والشريان الكلويان (5) الوريد والشريان الخصويان (6) العصب تحت الضلعي (الصدري)
 (7) العصب الحرقفي الخلفي (8) العصب التناسلي الفخذي (9) العصب الحرقفي الأربي (10) العضلة القطنية الكبيرة (11)
 العصب الفخذي (12) الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي (13) القناة الأسهرية (14) الجزء الحوضي للحالب (15) الوريد
 والشريان العجزيان المتوسطان (16) المستقيم (17) الوريد والشريان الشرسوفيان السفليان (18) الوريد والشريان الحرقفيان
 (19) الوريد والشريان المنعطفان الحرقفيان (20) الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي (21) العصب الفخذي الجلدي
 الوحشي (22) العضلة البطنية المستعرضة (23) العصب الحرقفي الأربي (24) فروع العصب الفخذي (للمعضلة الحرقفية) (25)
 الشريان الحرقفي القطني (26) للعصب السداي (27) الوريد والشريان الحرقفيان القطنيان (28) الجذع القطني العجزي
 الشريان القطني الرابع (30) الوريد والشريان الحرقفيان القطنيان (31) الشريان المساريقي السفلي (32) الأبرير البطنية (33)
 الجذع الودي (34) العصب تحت الضلعي (العصب الصدري 12) (35) العضلة القطنية المربعة (36) الوريد القطني الصاعد
 الأيسر (37) الجذع البطنية (38) الشريان المساريقي العلوي (39) فرجة المريء.

- **occipital p. (= p. occipitalis)** **الضَفِيرَةُ الْقَذَالِيَّةُ**. ضفيرة عصبية ترافق الشريان القذالي.
- **p. oesophageus** **الضَفِيرَةُ الْمَرِيئِيَّةُ**. ضفيرة عصبية تحيط بالمريء وتتكون من فروع من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر والجذعين الوديين كما تحوي أيضاً أعصاباً حشوية واردة من المريء وهي تنقسم إلى قسمين أمامي وخلفي.
- **ophthalmic p. (= p. ophthalmicus)** **الضَفِيرَةُ الْعَيْنِيَّةُ**. ضفيرة عصبية ترافق الشريان العيني.
- **ovarian p. (= p. ovaricus)** **الضَفِيرَةُ الْمَبِيضِيَّةُ**. قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشرايين المبيضية.
- **pancreatic p. (= p. pancreaticus)** **الضَفِيرَةُ الْبَنَكْرِيَّاسِيَّةُ**. قسم ثانوي من الضفيرة البنطية يرافق الشرايين البنكرياسية.
- **parotid p. of facial nerve (= p. parotideus nervi faialis)** **الضَفِيرَةُ الْفَكِّيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ**. ضفيرة عصبية تتكون من تشابك الفروع الانتهازية من فروع العصب الوجهي الصدغي والوجني والشدقي والفكي السفلي الهامشي وفروعه الرقبية التي تبدأ عند الغدة النكفية.
- **pelvic p. (= p. hypogastricus inferior)** **الضَفِيرَةُ الْخَثَلِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. الضفيرة الحوضية.
- **periarterial p. (= p. periarterialis)** **الضَفِيرَةُ حَوْلَ الشَّرْيَانِيَّةِ**. شبكة من اليااف عصبية ذاتية وحسية توجد في الغلالة البرانية للشريان وتتبع مساره بغرض الوصول إلى إحدى البنيات أو الأعضاء لتغذيتها كما يغذي بعضها الشريان نفسه.
- **p. pharyngeus ascendens** **الضَفِيرَةُ الْبَلْعُومِيَّةُ الصَّاعِدَةُ**. ضفيرة عصبية ترافق الشريان البلعومي الصاعد.
- **p. pharyngeus nervi vagi** **الضَفِيرَةُ الْبَلْعُومِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ**. ضفيرة تتكون بصورة رئيسية من فروع من العصبين المبهمين ولكنها تحوي أيضاً أليافاً من العصبين اللسانيين البلعوميين ومن الجذوع الودية وهي تغذي أعصاباً حركية وحسية عامة ومستقلية لبعضلات البلعوم والحُفَاف ومخاطبتهما ما عدا العضلة الموترة للحفَاف (شراع الحنك).

- **phrenic p. (= p. phrenicus)** **الضَفِيرَةُ الْحِجَابِيَّةُ**. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الحجابي السفلي إلى الحجاب الحاجز والغدتين الكظريتين.
- **popliteal p. (= p. popliteus)** **الضَفِيرَةُ الْمَابِضِيَّةُ**. ضفيرة ألياف عصبية ترافق الشريان المابضي.
- **prevertebral p's.** **الضَفَائِرُ أَمَامَ الْفَقْرِيَّةِ**. ضفائر أعصاب مستقلة تقع في الصدر والبطن والحوض أمام العمود الفقاري وتتكون من ألياف حشوية واردة ومن اليااف لودية قبل العقدية ومن اليااف ودية قبل العقدية وبعد العقدية وعقد تحوي خلايا عصبية عقدية ودية تغطي أليافاً بعد عقدية. وأكبر هذه الضفائر هي القلبية والرئوية والمريئية والبطنية والمسارقية والخثلية وكلها متعلقة بالأبهر وتغذي أليافها الموجودة في البطن والحوض الأحشاء المجاورة لها بانقسامها إلى فروع ترافق فروع الشريان الأبهر وتسمى باسم هذه الفروع وأحياناً بأسماء الأعضاء التي تغذيها.
- **p. prostaticus** **الضَفِيرَةُ الْبَرُوسْتَاتِيَّةُ**. قسم ثانوي من الضفيرة الخثلية يغذي أليافاً عصبية للبروستاتة والأنسجة المجاورة لها.
- **p. pulmonalis** **الضَفِيرَةُ الرُّئَوِيَّةُ**. ضفيرة عصبية تتكون من عدة جذوع من العصب المبهم وتتصل بها عند جذر الرئة فروع من الجذع الودي والضفيرة القلبية وعادة ما تنقسم هذه الضفيرة إلى قسمين أمامي وخلفي تتفرع منهما اليااف ترافق الأوعية الدموية والقصبات إلى الرئتين.
- **p. pulmonalis anterior** **الضَفِيرَةُ الرُّئَوِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ**. القسم الصغير من الضفيرة الرئوية أمام جذر الرئة والذي يرتبط مع الضفيرة الرئوية الخلفية.
- **p. pulmonalis posterior** **الضَفِيرَةُ الرُّئَوِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ**. القسم الكبير من الضفيرة الرئوية خلف جذر الرئة والذي يرتبط مع الضفيرة الرئوية الأمامية.
- **pyloric p.** **الضَفِيرَةُ الْبَوَائِيَّةُ**. الضفيرة العصبية التي تغذي منطقة البواب.
- **p. of Raschkow** **ضَفِيرَةُ رَاشْكَو**. ضفيرة ألياف عصبية رقيقة تحت الأرومة السنية في الحليمة السنية أثناء تطور العاج.
- **p. rectales inferiores** **الضَفَائِرُ الْمُسْتَقِيمَةُ السُّفْلِيَّةُ**. ضفائر ترافق الشريان المستقيمي السفلي

- وتشتق بصورة رئيسية من العصب المستقيمي السفلي.
- **p. rectales medii** الضفائير المُستقيميّة الوسطيّة. أقسام ثانوية من الضفيرة الخثلية السفلية بالقرب من المستقيم الذي تغذيه باللياف عصبية.
 - **p. rectalis superior** الضفيرة المُستقيميّة العلويّة. ضفيرة ترافق الشريان المستقيمي العلوي إلى المستقيم وتشتق من الضفيرتين المساريقيّة السفلية والخثلية السفلية.
 - **Remak's p. (= p. submucosus)** الضفيرة تحت المخاطيّة. قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الكلوي.
 - **p. renalis** الضفيرة العُجْزِيّة. ضفيرة تتأصل من الفروع البطنية للعصبين النخاعيين القطنيين الأخيرين اللذين يكونان الجذع القطني العجزي ومن الأعصاب العجزيّة الأربعة. ولهذه الضفيرة التي تقع أمام العضلة الكثيرة الشكل اثنا عشر فرعاً خمسة منها تغذي بنيات حوضية (الأعصاب الكثيرة الشكل لرافعة الشرج والعصعص ولمضيقة الشرج والعصب الفرجي) وسبعة فروع تغذي الآلية والأطراف السفلية (الأعصاب الألوي العلوي والألوي السفلي والفخذي الجلدي الخلفي والجلدي الناقب والعصب الوركى والعصبين المغذيين للعضلتين الرباعية الرؤوس الفخذية والمسدة الباطنة).
 - **solar p. (= p. celiacus)** الضفيرة الشمسية؛ الضفيرة البطنيّة.
 - **spermatic p. (= p. testicularis)** الضفيرة المنوية؛ الضفيرة الخُصْويّة.
 - **splenic p. (= p. splenicus)** الضفيرة الطحاليّة. قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الطحالي.
 - **stroma p.** الضفيرة السَدَوِيّة. ليفات عصبية سطحية وعميقة في المادة المخصوصة للقنينة.
 - **subclavian p. (= p. subclavius)** الضفيرة تحت الترقويّة. ضفيرة عصبية ودية على الشريان تحت الترقوي تنبع من العقدة الرقبية الصدرية وتساهم باللياف إلى العصب العجائي وإلى فروع الشريان تحت الترقوي تمر لتتواصل إلى الشريان الأبطي.
 - **p. submucosus (= submucous p.)** الضفيرة تحت المخاطيّة. قسم الضفيرة المعوية الذي يوجد في تحت المخاطيّة.
 - **subsartorial p.** الضفيرة تحت الخياطيّة. ضفيرة عصبية للعضلة الخياطية تتكون من الاتصالات بين فروع العصب الفخذي الجلدي الإنسي والعصبين الصافن والسداداي.
 - **subserosal p. (= p. subserosus)** الضفيرة تحت المصليّة. قسم الضفيرة المعوية التي تقع تحت السطح المصلي للغلالة المصليّة.
 - **subtrapezius p.** الضفيرة تحت شبه المنحرفة. ضفيرة صغيرة تقع تحت العضلة شبه المنحرفة تتكون من اتصالات بين فروع العصب الإضافي والأعصاب الرقبية.
 - **suprarenal p. (= p. suprarenalis)** الضفيرة الكُظْريّة. قسم ثانوي من الضفيرة البطنية بجوار الغدة الكظرية التي يغذيها باللياف عصبية.
 - **p. sympathici (= p. autonomici)** الضفيرة الوُدِيّة. الضفيرة المستقلة.
 - **p. temporalis superficialis** الضفيرة الصُدْغِيّة السطحيّة. ضفيرة ألياف عصبية ترافق الشريان الصدغي السطحي.
 - **testicular p. (= p. testicularis)** الضفيرة الخُصْويّة. قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشرايين الخصوية.
 - **p. thyroideus inferior** الضفيرة الدرقيّة السفليّة. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الدرقي السفلي إلى الحنجرة والبلعوم ومنطقة الدرقيّة.
 - **p. thyroideus superior** الضفيرة الدرقيّة العلويّة. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الدرقي العلوي إلى الحنجرة والبلعوم ومنطقة الدرقيّة.
 - **tonsillar p.** الضفيرة اللوزيّة. ضفيرة حول اللوزة تتكون من الاتصال بين العصبين الحنكيين الوسطي والخلفي وبين الفروع اللوزية للعصب اللساني البلعومي وتجهز أليافاً إلى اللوزة والحنك الرخو ومنطقة الحلق.
 - **tympanic p. (= p. tympanicus)** الضفيرة الطبلية. ضفيرة عصبية على طنف الأذن الوسطى تتكون من العصبين الطبلي والسباتي الطبلي وتعطي

العصب الصخري الصغير وفرع العصب الصخري الكبير والياض حسية للغشاء المخاطي للتجويف الطبلي والقناة السمعية والخلايا الخشائية الهوائية.

- **ureteric p.** الضفيرة الحالبية. ضفيرة تغذي الحالب - مشتقة من الضفيرتين الكلوية والخلتية.
- **uterine p.** الضفيرة الرحمية. قسم من الضفيرة الرحمية المهبلية التي تعطي الياض إلى عنق الرحم وإلى قسمه السفلي.

- **uterovaginal p. (= p. uterovaginalis)** الضفيرة الرحمية المهبلية. قسم ثانوي من الضفيرة الخلتية السفلية يغذي الياض عصبية للرحم والأنسجة الناعطة للدمليز.

- **vaginal p.** الضفيرة المهبلية. قسم الضفيرة الرحمية المهبلية الذي يعطي الياض عصبية لجدار المهبل.

- **vertebral p. (= p. vertebralis)** الضفيرة الفقارية. ضفيرة عصبية ترافق العصب الفقاري وتتكون من الياض من العقد الفقارية والرقبية الصدرية وتحمل الياض ودية إلى الحفرة القحفية الخلفية خلال الاعصاب القحفية.

- **vesical p. (= p. vesicalis)** الضفيرة المثانة. قسم ثانوي من الضفيرة الخلتية السفلية يغذي الياض ودية إلى المثانة وإلى الحالب والقناة الاسهرية والحوصلة المنوية.

- **Vidian p. (= nervus canalis pterygoidei)** ضفيرة فيديان. عصب القناة الجناحية.

- **visceral p's. (= p. viscerales = p. autonomic)** الضفائر الحشوية. الضفائر المستقلة.

- **p. viscerales et vasculares** الضفائر الحشوية والوعائية. ضفائر عصبية محيطية تغذي الاحشاء والوعية بالياض عصبية.

- **plica** ثنية. (ج: ثنيات). مصطلح عام لطية أو حرف كطية في الصفاق أو في اي غشاء آخر.

- 1. فتق رئوي 2. قيلة هوائية. **pneumatocoele**
- 1. بروز فتقي للنسيج الرئوي خلال شق خلقي في الصدر 2. كيسة في الرئة ممتلئة بالهواء كالتني

تتولد في التهاب الرئة بالمكورات العنقودية 3. ورم أو كيسة تحوي غازات خصوصاً تلك التي تتولد في الصفن.

- **p. cranii (= extracranial p.)** قيلة هوائية. أورام غازية تتولد تحت فروة الرأس بعد كسور القحف التي تتصل بالجيوب مجاورة الأنفية.

- **Intracranial p. (= pneumocephalus)** قيلة هوائية قحفية.

pneumatocephalus (= pneumocephalus) إسترواح الرأس؛ قيلة غازية قحفية.

pneumatorrhachis قيلة غازية فقارية. وجود الهواء أو بعض الغازات في القناة الفقرية.

pneumoencephalography (= pneumoen- cephalography) تصوير الدماغ الغازي؛ تصوير الدماغ المحقون بالغاز.

pneumoangiogram صورة الأوعية الغازية. صورة شعاعية هوائية للدماغ وأوعيته الدماغ تؤخذ بصورة مشتركة.

pneumoangiography تصوير الأوعية الغازي. التصوير الشعاعي للأوعية الدموية للرئة.

pneumocephalus إسترواح القحف. وجود الهواء في داخل تجويف القحف.

pneumocrania (= pneumocephalus) إسترواح القحف.

pneumoencephalogram صورة الدماغ الغازية. الصورة التي يحصل عليها بالتصوير الغازي للدماغ.

pneumoencephalography تصوير الدماغ المحقون بالغاز؛ تصوير الدماغ الغازي. التصوير الشعاعي للبنات الدماغية التي تحوي سائله بعد سحب السائل الدماغية الشوكي بصورة متقطعة بطريقة البزل النخاعي وتعويضه بالهواء أو الاكسجين أو الهليوم.

pneumoencephalomyelogram صورة الدماغ والنخاع الغازية. الصورة التي يحصل عليها بالتصوير الغازي للدماغ والنخاع.

pneumoencephalomyelography

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ الغَازِي. التصوير الشعاعي للدماغ والنخاع بعد بزل السائل الدماغي النخاعي وتعويضه بالهواء أو الأكسجين أو الهليوم.

pneumoencephalos

إِسْتِرَوَاحُ القَحْف. وجود الهواء أو الغاز داخل تجويف القحف.

pneumography

تَصْوِيرٌ غَازِي. تصوير أحد أقسام الجسم بعد حقن أحد الغازات فيه.

- cerebral p.

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِي. تصوير الدماغ بعد حقن أحد الغازات لدخله.

pneumomyelography

تَصْوِيرُ النُّخَاعِ الغَازِي. التصوير الشعاعي للنخاع الشوكي بعد سحب السائل الدماغي النخاعي منه وحقن أحد الغازات إلى القناة النخاعية.

pneumoventriculi

إِسْتِرَوَاحُ البُطِينَات. وجود الهواء في بطينات الدماغ.

pneumoventriculography

تَصْوِيرُ البُطِينَاتِ الغَازِي. تصوير بطينات الدماغ بعد حقن الهواء أو أحد الغازات إلى داخلها.

podalgia

أَلَمُ القَدَم. ألم في القدم بسبب الروماتزم أو النقرس مثلاً.

poikilothermic

مُتَغَيِّرُ الحَرَارَةِ. حيوان تتغير درجة حرارة جسمه بتغير درجة حرارة محيطه.

poikilothermy

تَغْيِيرُ الحَرَارَةِ. تغير درجة حرارة جسم الحيوان بتغير درجة حرارة المحيط مع قدرته على التكيف لذلك.

poikilothymia (= cyclothymia)

تَغْيِيرُ المَزَاج؛ دَوْرِيَّةُ المَزَاج. حالة نفسية تتصف باختلافات المزاج الشادة.

poliencephalitis (= polioencephalitis)

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ.

poliencephalomyelitis (= polioencephalomyelitis)

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.

polio (= poliomyelitis)

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ.

polioclastic

مُخَرَّبُ السِّنْجَابِيَّة. مدمر المادة السنجابية للجهاز العصبي ويستعمل المصطلح للتعبير عن الفيروسات المخربة للمادة السنجابية والمولدة لالتهاب سنجابية النخاع أو التهاب الدماغ الوبائي أو داء الكلب.

poliodystrophia (= poliodystrophy)

حَثَلُ السِّنْجَابِيَّة.

- p. cerebri

حَثَلُ سِنْجَابِيَّةِ الدِّمَاغِ. مرض نادر يصيب الأطفال الصغار ويتصف بتتكس عصيونات قشرة الدماغ ومواقع أخرى منه ويترافق مع تردد نفسي مترق واضطرابات حركية والموت المبكر.

poliodystrophy

حَثَلُ السِّنْجَابِيَّة. ضمور المادة السنجابية للدماغ.

polioencephalitis

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ. التهاب المادة السنجابية للدماغ.

- p. acuta infantum

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ الطِّفْلِيِّ الحَاد. التهاب حاد لسنجابية الدماغ في الأطفال دون سن السادسة يتصف بالحمى والقيء والاختلاج وعادة ما ينتهي بالشلل الدائم للأطراف التي تصاب أيضاً بالاختلاجات.

- acute bulbar p. (= acute bulbar

paralysis) التهاب سنجابية الدماغ البصلي الحاد؛ شَلْلٌ بَصْلِيٌّ حَاد.

- acute superior hemorrhagic p.

التهاب سنجابية الدماغ النزفي العلوي الحاد؛ إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِيٌّ. انظر Wernicke's encephalopathy.

- inferior p. (= bulbar paralysis)

التهاب سنجابية الدماغ السفلي؛ شَلْلٌ بَصْلِيٌّ

- posterior p.

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ الخَلْفِي. التهاب المادة السنجابية للقسم الخلفي من البطين الرابع.

- superior hemorrhagic p. (= Wernicke's

encephalopathy) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِيٌّ.

polioencephalomyelitis

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والسَّحَايَا. التهاب يصيب سنجابية الدماغ والنخاع والسحايا التي تحيط بهما.

polioencephalomyelitis **التَّهَابُ**

سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ. التهاب يصيب المادة السنجابية للنخاع والدماغ.

polioencephalopathy **اِغْتِلَالُ سِنْجَابِيَّةِ**

الدِّمَاغِ. أي مرض يصيب سنجابية الدماغ.

polioencephalotropic **مَوْجَهٌ لِسِنْجَابِيَّةِ**

الدِّمَاغِ؛ **الْيَفُ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ.** ما له ألفة خاصة بسنجابية الدماغ.

poliomyelencephalitis

التَّهَابُ (= polioencephalomyelitis)

سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ. التهاب سنجابيتي الدماغ والنخاع.

poliomyeliticidal **مُبيدُ فيروسي التَّهَابِ**

سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاعِ. أي عامل أو مادة تبيد الفيروس المسبب لالتهاب سنجابية النخاع.

poliomyelitis (= infantile parafysis)

شللُ الأطفال؛ **التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ.** داء فيروسي حاد يحدث بصورة فردية أو وبائية ويتصف بالحمى والتهاب الحلق والصداع والقيء وغالباً مع تيبس الرقبة والظهر وهذه أعراض الالتهاب الصغير، أما في حالة التهاب سنجابية النخاع الكبير فإنه يشمل إصابة الجهاز العصبي المركزي مع تيبس الرقبة وكثرة خلايا السائل الدماغي الشوكي وأحياناً مع الشلل وقد يتلو ذلك ضمور مجموعات من العضلات الذي يؤدي إلى تقلصها الدائم وتشوهها.

- acute anterior p. (= poliomyelitis)

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الأمامي الحاد؛ شلل الأطفال.

- acute lateral p. (= spinal paralytic p.)

التهاب سنجابية الدماغ الوحشي الحاد؛ **التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الشَّلَلِي.**

- anterior p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الأمامية.

- ascending p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الصَّاعِد. التهاب سنجابية النخاع الذي يؤدي إلى الشلل الذي يبدأ أولاً في الساق ثم يصعد تدريجياً باتجاه الرأس.

- bulbar p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ البَصَلَةِ. نوع شديد من التهاب السنجابية الذي يمتد إلى النخاع

المستطيل (البصلة) والذي يتصف بخلل وظائف البلع والتنفس والدوران.

- cerebral p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ. التهاب السنجابية الذي يمتد إلى سنجابية الدماغ وخصوصاً جذع الدماغ وقشرة المخ الحركية.

- endemic p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الْمُتَوَطَّن. حالات فردية من التهاب سنجابية النخاع أو مجموعات صغيرة خاصة أثناء فصول السنة الحارة في العديد من البلدان في العالم.

- epidemic p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الْوَبَائِي. التهاب سنجابية الدماغ الذي يظهر بصورة مرض وبائي.

- post-inoculation p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ التَّالِي لِلْقَاحِ. التهاب سنجابية النخاع الذي يظهر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التلقيح ببعض أنواع اللقاح.

- post-tonsillectomy p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ التَّالِي لِاسْتِئْصَالِ اللُّوزَتَيْنِ. التهاب السنجابية الذي يظهر بعد فترة قصيرة من استئصال اللوزتين.

- postvaccinal p. (= post-inoculation p.)

التَّهَابُ السِنْجَابِيَّةُ التَّالِي لِلْقَاحِ.

- spinal paralytic p.

التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الشَّلَلِي. النوع الشائع من التهاب سنجابية النخاع الامامية الذي يظهر فيه الشلل الرخو عادة لأحد الأطراف أو لأكثر من ذلك.

poliomyeloencephalitis

التَّهَاب (= polioencephalomyelitis)

سنجابية النخاع والدماغ.

poliomyelopathy **اِغْتِلَالُ سِنْجَابِيَّةِ**

النُّخَاعِ. أي مرض يصيب سنجابية النخاع.

polioneuromere **قُسَمٌ عَصَبِيٌّ سِنْجَابِيٌّ؛**

قُسَمٌ سِنْجَابِيٌّ نَخَاعِيٌّ. أحد القسمات الابتدائية للمادة السنجابية للنخاع الشوكي.

poliovirus **الْفَيروسَةُ السِنْجَابِيَّةُ.**

الفيروس المولد لالتهاب السنجابية.

polus (= pole) **قُطْبُ.**

(ج: أَقْطَابُ). أي من نهائي المحور أو العضو.

- p. anterior bulbi oculi القُطْبُ الأَمَامِي
لِلْمُعَقَّة. مركز المنحنى الأمامي لمقلة العين.

- p. frontalis hemispherii cerebri القُطْبُ
الأَمَامِي لِنِصْفِ كُرَّةِ المُخ. الجزء الأكثر بروزاً من
النهاية الأمامية لنصف كرة المخ.

- p. occipitalis hemispherii cerebri القُطْبُ
القَذَالِي لِنِصْفِ كُرَّةِ المُخ. الجزء الأكثر بروزاً للنهاية
الخلفية للفص القذالي لنصف كرة المخ.

- p. posterior bulbi oculi القُطْبُ الخَلْفِي لِلْمُعَقَّة.
مركز المنحنى الخلفي لمقلة العين.

- p. temporalis hemispherii cerebri القُطْبُ
الصُدْغِي لِنِصْفِ كُرَّةِ المُخ. النهاية الأمامية البارزة
للفص الصدغي للدماغ.

polyalgnesia تَعَدُّدُ التَّأَلُم. شعور المريض
بعده وخزات في وقت واحد عند وخزه لمرة واحدة
فقط.

polydipsia العُطَاش. العطاش الشديد
العزم كالذي يحصل في الداء السكري أو البوالة
التفحة.

polydysspondylism تَشَوُّهُ الْفِقْرَات
الْمُتَعَدَّد. تشوه عدة فقرات مترافق مع القزامة
ونقص الذكاء وتشوه السرج التركي.

polyesthesia تَعَدُّدُ التَّحَسُّس. حس
المريض بعدة إحساسات في عدة مواضع من
جسمه لمنبه واحد ينبه موضعاً واحداً منه.

polyesthetic مُتَعَدِّدُ الْإِحْسَاسَات. ما ينبه
عدة حواس أو يولد عدة إحساسات.

polygyria كَثْرَةُ التَّلَافِيف. وجود تلافيف
دماغية أكثر من العدد السوي.

polymicrogyria كَثْرَةُ التَّلَافِيف الصَّغِيرَةِ.
تشوه في الدماغ يتصف بتكون الكثير من التلافيف
الصغيرة فيه.

polymyalgia أَلَمُ العَضَلَات. ألم عضلي
يصيب عدة عضلات مرة واحدة.

- p. arteritica (= p. rheumatica) أَلَمُ
العَضَلَاتِ الشَّرِيَّانِي. ألم العضلات الروماتزمي.

- p. rheumatica أَلَمُ العَضَلَاتِ الرُّوماتَزْمِي.

الدانية والعضلات مع ارتفاع سرعة ثقل الكريات
الحمر وعادة ما يترافق مع التهاب الشريان الصدغي
وغالباً ما يتحدد المرض ذاتياً.

polymyoclonus رَمْعُ العَضَلَات. رعاش
عضلي دقيق.

polymyopathy إِغْتِلَالُ العَضَلَات. اعتلال
عدة عضلات في وقت واحد.

polymyositis إِلْتِهَابُ العَضَلَات. داء
التهابي مترق مزمن يصيب العضلات الهيكلية في
الأطفال والبالغين ويتصف بضعف متناظر في
أحزمة الأطراف والرقبة والبلعوم ويترافق عادة مع
الآلم أو الإيلام وقد يسبق أو يتلو مظاهر شبيهة
بتصلب الجلد أو التهاب المفاصل أو الذئبة الحمامية
الجهازية أو متلازمة جوغرن. كما أنه يترافق أحياناً
مع الخباثة أو مع آفات جلدية مميزة أخرى.

- trichinous p. (= trichinosis) التهاب
العضلات بالشعريينات: داء الشَّعْرِيَّات.

polyneurial مُتَعَدِّدُ التَّغْصِيب. ما يغذى
بعدد من الأعصاب.

polyneuralgia أَلَمُ الْأَعْصَاب. آلام عصبية
لعدة أعصاب.

polyneuritis إِلْتِهَابُ الْأَعْصَاب. التهاب
العديد من الأعصاب في وقت واحد أو التهاب
الأعصاب المتعدد أو المنتشر.

- acute febrile p. إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الحُمُوي
الحَاد. شلل العصبون الحركي الصاعد السريع
المترقى المجهول السببيات وعادة ما يتلو الالتهاب
المعوي أو التنفسي، وهو يبدأ بمذل القدم الذي يتلو
شلل رخو وضعف الساقين ثم يترقى إلى الذراعين
والجذع والوجه مع حمى بسيطة وشلل بصلي وفقدان
أو قلة المنعكسات الوترية وزيادة بروتين السائل
الدماغي النخاعي من دون زيادة خلاياه.

- acute idiopathic p. (= acute febrile p.)
إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الحَادِ المَجهُولِ السبب. التهاب
الأعصاب الحموي الحاد.

- acute infective p. (= acute febrile p.)
إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ العدواني الحَاد. التهاب الأعصاب

- acute postinfectious p. (acute febrile)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَادِ. التهاب الأعصاب العدواني الحاد.

- anemic p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ بِفَقْر الدَّم. التهاب الأعصاب الذي يشاهد في التنكس المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي الذي يحدث في فقر الدم الوبيل.

- p. cerebri meningiformis

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْمُخَيَّةِ الشَّيْبَةِ بِالتهَابِ السَّخَايَا. أعراض تهيج الأعصاب القوقعية والدهليزية والوجهية وثلاثي التوائم التي تحدث في الدور الأولي للزهرري.

- endemic p. (= p. endemica = beri beri)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْمُتَوَطَّن. بري بري.

- Guillain-Barré p. (= acute febrile p.)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحُمُويِّ الْحَادِ.

- postinfectious p. (= acute febrile p.)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَادِ.

- p. potatorum (= alcoholic neuropathy)

إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ كُحُولِيٍّ.

polyneuromyositis

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ وَالْعَضَلَات. التهاب العضلات والأعصاب المحيطية مع فقدان المنعكسات والإحساسات مع المذل.

polyneuropathy

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ. داء يصيب عدة أعصاب في وقت واحد وقد يكون مرضاً جهازياً سمياً أو استقلابياً أو غير معروف السبب وقد يكون داء مزيلاً لنخاعين الألياف العصبية.

- acromegalic p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ المرافق لضخامة النهايات. التهاب الأعصاب غير المصحوب بالأعراض أو المصحوب بها أو الأعراض الذي يرافق ضخامة النهايات والتي يمكن أن تسبب انحباس الأعصاب مثل اعتلال الأعصاب الانحباسي لذنب الفرس أو للعصب الناصف الذي يسبب متلازمة النفق الرسغي.

- acute febrile p. (= Guillain-Barré syndrome)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحُمُويِّ الْحَادِ. متلازمة غيان باريه، وهي داء شلل العصبون الحركي الصاعد المتروقي السريع المجهول السبب والذي يتلو غالباً عدوى الجهاز التنفسي أو المعوي، وهو يبدأ بمذل القدمين ويتلو ذلك شلل الساقين الرخو وضعفهما

والذي يصعد تدريجياً إلى الذراعين والجذع والوجه مع حمى بسيطة ومن ثم شلل بصلي وفقدان أو ضعف المنعكسات الوترية وزيادة بروتين السائل الدماغي النخاعي مع عدم الزيادة المناسبة لكريات الدم البيضاء فيه.

- acute idiopathic p. (= Guillain-Barré syndrome)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحَادِ المجهول السبب.

- acute infective p. (= Guillain-Barré syndrome)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ العدواني الْحَادِ.

- acute postinfectious p. (= guillain-Barré syndrome)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَادِ.

- alcoholic p. (= alcoholic neuropathy)

إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ كُحُولِيٍّ.

- amyloid p. (= amyloid neuropathy)

إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ نَشَوَانِيٍّ. اعتلال عصبي يتصف بترسب النشاء (الداء النشواني) في الأعصاب المحيطية.

- anemic p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ بِفَقْر الدَّم. اعتلال الأعصاب الذي يشاهد في التنكس المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي في فقر الدم الخبيث.

- buckthorn p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ النَّبَقِيٍّ. اعتلال الأعصاب الذي يتولد أحياناً عن أكل النبق المسهل الذي يحوي مادة الكينون السام.

- carcinomatous p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ السرطاني. اعتلال الأعصاب الذي يترافق مع الإصابات السرطانية وقد ينتج عن ارتشاح الأعصاب الطرفية بالسرطان وغالباً ما يكون بصورة اعتلال عصبي حسي حركي ويترافق مع اعتلال عضلي.

- cranial p. (= cranial polyneunitis)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّحْضِيَّةِ.

- diabetic p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ السُّكْرِيِّ. اعتلال الأعصاب الذي يصيب مرضى السكري، وهناك أربعة أنواع منه أحدها استقلابي السبب يصيب المرضى الأحداث ومتوسطي العمر وهو اعتلال حسي حركي. ويصيب النوع الثاني مرضى السكر المسنين ويتصف بالآلم وفقدان الحس وانعدام المنعكسات خصوصاً في الأطراف السفلية الذي يتولد عن إقفارها وقد يشابه التابس الظهري حيث لا تستجيب الحذقتان للضوء.

وفي النوع الثالث يحدث اعتلال في اعصاب محيطية متفرقة (خصوصاً في العصب محرك العين وفي العصب الفخذي) ويحدث ذلك بسبب الإقفار كما يحصل في الضمور العضلي. أما النوع الرابع فهو اعتلال الاعصاب المستقلة السكري كما يحصل في الضفائر العصبية المستقلة الباطنة.

- erythredema p.

وَجَعُ النِّهَائِيَاتِ.

انظر acrodynia.

- familial recurrent p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْعَائِلِيّ. نوع انتكاسي غير شائع من اعتلال الاعصاب المزمل للميالين الذي يصيب أكثر من عضو واحد في العائلة.

- Isoniazid p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْإيزُونِيَاذِيدِيّ. اعتلال عصبي حسي حركي يصيب المحاور وينتج عن نقص البيريدينوكسين (فيتامين B₆) في مرضى السل الذين يعالجون بالايزوتيازيد.

- lead p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرِّصَاصِيّ. اعتلال الاعصاب الذي يتولد في التسمم المزمن بالرصاص وقد يكون اعتلالاً حسيّاً حركياً متناظراً في الجهتين وغالباً ما يكون متوضعاً مع ضعف موضعي وقليل من فقدان الحس مع تدلي الإصبع أو الرسغ.

- paraneoplastic p. (= carcinomatous p.)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ السَّرَطَنِيّ

- recurrent p. (= relapsing p.)

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّاجِعِ.

- relapsing p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّاجِعِ. نوع من اعتلال الاعصاب دون الحاد المزمل للميالين الذي تحدث فيها الهدآت والنكسات بصورة تلقائية. وقد تحدث النكسة أثناء الحمل وغالباً ما ترافقها ضخامة الاعصاب الطرفية.

- uremic p.

إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ اليُورِيمِيّ. اعتلال اعصاب حسي حركي محوري يحدث في المرضى المصابين بفشل كلوي مزمن وقد يتحسن بعد دialis الكلية أو بعد غرس كلية للمريض.

polyneuroradiculitis

إِثْهَابُ الْجُذُورِ

وَالْأَعْصَابِ. إتهاب العقد النضاعية الشوكية والجذور العصبية والاعصاب المحيطية.

polyphagia (= balimia)

نَهَمٌ. فرط الأكل.

polyphobia

رُهَابٌ مُتَعَدِّدٌ. الخوف

من عدة أشياء أو لعدة أسباب.

polyplegia

شَلْلٌ مُتَعَدِّدٌ. شلل عدة أقسام أو عدة أعضاء من الجسم.

polyradiculitis

إِثْهَابُ الْجُذُورِ. التهاب عدة جذور عصبية.

polyradiculoneuritis

إِثْهَابُ الْجُذُورِ

وَالْأَعْصَابِ وَالنَّخَاعِ. التهاب الاعصاب المحيطية وجذورها والنخاع الشوكي.

polyradiculoneuropathy (= Guillain-

Barré syndrome) إِغْتِلَالُ الْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ وَالنَّخَاعِ.

polysensitivity

تَعَدُّدُ التَّحَسُّسِ. التحسس للعديد من المنبهات المتباينة.

polysensory

مُتَعَدِّدُ التَّحَسُّسِ. المقدرة

على الاستجابة إلى أكثر من نوع واحد من المنبهات، ويقال ذلك عن عصبونات قشرة المخ أو ما تحتها.

polysynaptic

عَدِيدُ التَّشَابِكَاتِ. سبيل

عصبي عديد التشابكات وهو عديد العصبونات أيضاً.

ponograph

مِخْطَاطُ الْأَلَمِ. جهاز لقياس وتسجيل شدة التحسس للألم.

pons

1. جِسْرٌ. 2. الجِسْرُ. 1. أي جزء

من نسيج أو مجموعة أنسجة تربط قسمين من أقسام أحد الأعضاء. 2. قسم الجهاز العصبي المركزي الذي يقع بين النخاع المستطيل والدماغ الواسطي وفي الجهة البطنية للمخيخ ويتكون من الجزئين الظهري والبطني.

- p. cerebelli (= pons)

الجِسْرُ.

- p. hepatis

جِسْرُ الكُبدِ. بروز ليفي يظهر أحياناً يعبر شق الكبد الطولاني.

- p. Tarini (= substantia perforata

posterior) جِسْرُ تَارِينِي؛ الْمَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ الْخَلْفِيَّةُ.

pons- oblongata

الجِسْرُ وَالْبَصَلَةُ.

الجِسْرُ وَالنَّخَاعِ الْمُسْتَطِيلِ (البصلة).

pontibrachium (= pedunculus

cerebellaris medius) السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ.

pontile (= pontine) جَسْرِيّ. متعلق أو منسوب للجسر.

pontobulbar جَسْرِيّ بَصَلِّيّ. منسوب إلى الجسر ومنطقة النخاع المستطيل التي تقع في ظهره أو بما يؤثر فيهما أو أنهما تسيطران على وظائفه.

pontobulbia (= syringobulbia) تَكَهَفُ البَصَلَةِ والجَسْرِ.

pontocerebellar جَسْرِيّ مُخَيَخِيّ. منسوب للجسر والمخيخ.

pontomedullary جَسْرِيّ بَصَلِّيّ. منسوب للجسر والبصلة (النخاع المستطيل).

pontomesencephalic جَسْرِيّ دِمَاقِيّ مَتَوَسِّطِيّ. منسوب للجسر والدماغ المتوسط.

pontopeduncular جَسْرِيّ سَوِيْقِيّ. منسوب إلى الجسر والسويقتين المخيخيتين أو يؤثر بهما أو يتصل بهما.

porencephalia تَكَهَفُ الدَّمَاعِ؛ مَسَامِيَّةُ الدَّمَاعِ. 1. وجود أكياس أو كهوف في قشرة الدماغ تتصل بمسام مع الحيز العنكبوتي. 2. وجود كهوف في الدماغ تولدت خلال الحياة الجنينية أو الطفولة المبكرة قد تتصل بالحيز العنكبوتي بثقوب أو قد لا تتصل به وقد تتولد هذه الكهوف إما بسبب مرضي أو بسبب خلل التطور الجنيني للدماغ.

porencephalitis تَكَهَفُ الدَّمَاعِ الالتهابي؛ مَسَامِيَّةُ الدَّمَاعِ الإِلْتِهَابِيَّةِ. تنقب الدماغ وتكهف الذي يرافق التهاباته.

porencephaly (= porencephalia) تَكَهَفُ الدَّمَاعِ؛ مَسَامِيَّةُ الدَّمَاعِ.

porlomania هَوَسُ التَّرْخَالِ. الرغبة في السفر التي لا تقاوم.

porosis تَكَهَفُ. تكون الكهوف.

- cerebral p. تَكَهَفُ الدَّمَاعِ. حالة تكون الكهوف داخل الدماغ.

portio قِسم. (ج: أَقْسام). جزء من عضو أو بنية.

- p. dura paris septimi (= nervus facialis) العَصَبُ الوَجْهِيّ.

- p. intermedia nervi acustici (= nervus intermedius) العَصَبُ المتوسِّط.

- p. major nervi trigemini (= radix sensoria nervi trigemini) القسم الكبير من العصب الثلاثي التوائم؛ الجَذَرُ الجَسْرِيّ للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

- p. minor nervi trigemini (= radix motoria nervi trigemini) القسم الصغير من العصب الثلاثي التوائم؛ الجَذَرُ الحَرَكَيّ للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

- p. mollis paris septimi (= nervus vestibulo-cochlearis) العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ القَوَاقِيّ.

position وَضْع؛ وَضْعِيَّة. 1. وضعة الجسم أو الموقف الذي يتخذه المريض الأكثر راحة له. 2. وضعة الجنين في رحم الأم عند الحمل. 3. الوضعة التي يوضع بها المريض عند إجراء أي فحص له أو أية عملية جراحية.

positrocephalogram صُورَةُ الدَّمَاعِ البُوزْتَرُونِيّ. تصوير يؤخذ بإشعاع البوزترونات (الالكترونات الموجبة) من نظائر الزرنيخ التي تحقق في لتعيين مواضع الأورام الدماغية.

positron بُوزْتَرُون. إلكترون حر موجب الشحنة الكهربائية.

postbulbar خَلْفَ البَصَلَةِ. خلف أو تحت النخاع المستطيل (البصلة).

postcentral خَلْفَ المَرْكَزِيّ. ما يقع خلف المركز مثل التلفيف خلف المركزي.

postcentralis الشَّقُّ خَلْفَ المَرْكَزِيّ. الشق خلف المركزي للمخ.

postcisterna (= cisterna cerebellomedullaris) الصِّهْرِيخُ المَخَيخِيّ الخَاضِعِيّ البَصَلِيّ.

postganglionic بَعْدَ العُقْدَةِ؛ خَلْفَ العُقْدَةِ. ما يقع بعد العقدة أو خلفها وخاصة الألياف العصبية المستقلة بعد العقدة.

posthypophysis النُخَامِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. القسم الخلفي من النخامية.

postural وَضْعِيّ. نسبة إلى وضعية الجسم.
posture وَضْعَة. وضع الجسم.

potential 1. كَامِن 2. الْجُهْد. 1. يوجد في حالة استعداد للعمل أو تمكنه من ذلك ولكنه غير فعال في الوقت الحاضر 2. العمل اللازم لوحدة الشحنة الكهربائية كي تحرك جسماً مشحوناً من نقطة الأساس في الساحة الكهربائية إلى نقطة أخرى فيها ويقاس فرق الجهد بين نقطتين بالعمل اللازم لتحريك وحدة شحنة موجبة من نقطة لأخرى.

- action p. جُهْد الْفِعْل. الفعالية الكهربائية التي تتولد في العضلة أو في الليف العصبي أثناء فعاليتها. ومن الممكن إثارة هذه الفعالية بالتنبيه الكهربائي أو الكيميائي أو الآلي أو الحراري وما شاكل ذلك.

- after p. الْجُهْد التَّلَوِّي. الفترة التي تتلو الجهد المسماري ذات الطورين السالب والموجب.

- after p., negative الْجُهْد التَّلَوِّي السَّالِب. الفترة التي تتلو الجهد المسماري تنبأطاً خلالها عودة جهد الغشاء الهيج إلى مستوى جهد الراحة.

- after p., positive الْجُهْد التَّلَوِّي الْمُوجِب. الفترة التي تتلو نهاية الجهد التلوي السالب.

- bioelectric p. الْجُهْد الْكَهْرَبَائِي الْحَيَوِيّ. الجهد الكهربائي الذي يصاحب كل الفعاليات الكيميائية الحيوية كالذي يظهر في المخطط الكهربائي للقلب أو للدماغ أو للعضل.

- demarcation p. جُهْد التَّحْدِيد. فرق الجهد الكهربائي بين نقطة سليمة على طول العضلة أو العصب ونهايتهما المخربة أو المقطوعة.

- evoked cortical p's. الْجُهْد الْقَشْرِيّ الْمُسْتَثَارَة. التفريغ الكهربائي الذي يشاهد في قشرة المخ عند تنبيه أعضاء الحس أو إحدى النقاط على السبل العصبية الصاعدة إليها.

- excitatory postsynaptic p. الْجُهْد الْإِسْتِثَارِيّ بَعْدَ التَّشَابُكِ. النقص العابر في استقطاب غشاء العصبون بعد التشابكي الذي تولده رشقة من الدفقات العصبية في السبل الاستثاري الوارد ويؤدي تراكم هذه الجهود إلى تفريغ العصبون وتوليد النبضة العصبية.

- generator p. (= receptor p.) جُهْد الْمُؤَلَّد. إزالة الاستقطاب الذي يولد في

المستقبل العصبية عند استجابتها للتنبيه بأحد المنبهات النوعية الخاصة بها.

- inhibitory postsynaptic p. الْجُهْد التَّنْبِيْطِيّ بَعْدَ التَّشَابُكِ. الزيادة العابرة في استقطاب غشاء العصبون بعد التشابكي عند تعرضه لرشقة من النبضات العصبية التي تردده من السبل التنبيطي الوارد والتي تؤدي إلى التقليل من هيجية العصبون.

- membrane p. جُهْد الْغِشَاء. الجهد الكهربائي الذي يوجد على جهتي غشاء الخلية أو عبره.

- Nernst p. جُهْد نَرْنِسْت. الفولتية التي يولدها الانحدار التركيبي لإحدى الشوارد (الأيونات) عبر الغشاء التي تتمكن من النفوذ خلال مساماته بينما لا تتمكن الشوارد متعاكسة الشحنات من النفوذ خلالها.

- receptor p. (= generator p.) جُهْد الْمُسْتَقْبَلَة.

- resting p. جُهْد الرَّاحَة. فرق الجهد عبر غشاء الخلية في حالة الراحة وهو الفرق بين الجهد في داخل الخلية وخارجها.

- spike p. جُهْد السَّفَاة. التغيير الأولي الكبير في جهد غشاء الخلية الهيج عند استثارته بأحد المنبهات.

potentiometer مَقْيَاسُ الْجُهْد. آلة لقياس الجهد الكهربائي أو الفولتية بصورة دقيقة.


preanesthesia مُقَدِّمَةُ التَّخْدِير. تنبيج خفيف أو تخدير يولد بإعطاء بعض الأدوية قبل إعطاء المَبْنَج العميق.

1. مُقَدِّمُ التَّخْدِير 2. قَبْلُ التَّخْدِير. 1. دواء يستعمل كمقدمة للتخدير 2. يحدث قبل التخدير.


precognition عَرَاة: إِسْتِبَاقُ الْحَوَادِثْ؛ إِذْرَاكٌ مُسَبِّق. إدراك خارج الحس للحوادث المقبلة.

precoma مُقَدِّمَاتُ الْغَيْبِيَّة؛ طَلِيعَةُ السُّبَات. حالة عصبية نفسية تسبق السبات كما يحصل في اعتلال الدماغ.

preconscious خَارِجُ الْوَعْي. قسم الفكر الذي هو خارج حدود الوعي المباشر ولكنه من الممكن تذكره ببذل بعض الجهد.



1



2

posture

يعاني العمود الفقري عند رفع ثقل عن الأرض بعض الإجهاد ويكون ذلك شديداً عند انحنائه (كما يظهر في الشكل 2) أكثر مما هو عندما يكون مستقيماً (كما هو في 1). ويظهر ذلك جلياً عند النظر في توزيع الضغط على الفقرات. ففي حالة العمود المستقيم يتوزع الضغط بطريقة متجانسة على سطوح الفقرات. أما في حالة العمود المنحني فيتكون ضغط شديد على مقدمة الفقرات بينما يحصل جذب عكسي على جهتها الخلفية مما يسبب أحياناً تخریباً فيها.

precordialgia ألم بَرَكِي؛ ألم البَرَك. ألم في الصدر في المنطقة أمام القلبية.

prefrontal مُقَدَّمُ الجَبْهِي. يقع في القسم الامامي من الفص الجبهي أو من المنطقة الجبهية.

preganglionic قَبْلُ العُقْدَةِ. يقع أمام أو قبل العقدة ويوصف بهذا الليف العصبي الودي قبل العقدي.

pregenital قَبْلُ التَّنَاسُلِي. المراحل الأولى في التطور النفسي الجنسي (الفموي والشرجي) قبل أن تسيطر الأعضاء التناسلية على السلوك الجنسي للطفل.

prehypophyseal نُخَامِيٌّ أَمَامِيٌّ. منسوب إلى الفص الامامي للغدة النخامية.

prehypophysis النُخَامِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. الفص الامامي للغدة النخامية.

preictal مُقَدِّمَةُ السَّكَّةِ. ما يحدث قبل السكّة أو الهجمة، مثلاً قبل نوبة الصرع الحاد.

prenarcosis مُقَدِّمَةُ التَّخْدِيرِ. التخدير الذي يولد بإعطاء بعض المخدرات قبل البدء بالتخدير العام أو الموضعي.

preperception إدْرَاكٌ مُسَبِّقٌ. التكهن المسبق بالأمور.

presbycusis (= presbycusis) صَمَمٌ شَيْخُوخِيٌّ. صمم إدراكي مترقٍ يصيب الاذنين عند الشيخوخة.

presbyophrenia (= Wernike's dementia) خَرَفٌ شَيْخُوخِيٌّ. خرف شيخوخي يتصف بالنسابة والتخريف والتخليط والتوهان.

pressoreceptive حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ. حساس للمنبهات المولدة عن الفعاليات الحركية الوعائية مثل ضغط الدم.

pressoreceptor مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْطِ. مستقبلية عصبية -ساسة للضغط المولد عن الفعاليات الحركية الوعائية.

pressosensitive (= pressoreceptive) حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ.

presynaptic قَبْلُ التَّشَابُكِ. ما يقع قبل العبور التشابكي.

pretectal أَمَامُ السَّقْفِ. يقع أمام سقف الدماغ المتوسط.

priapism قُسُوح. انتصاب القضيب الشاذ والمستمر من دون أن تصاحبه رغبة جنسية ويصاحبه ألم شديد وإيلام ويشاهد في أمراض وإصابات النخاع الشوكي وقد يتولد عن حصاة المثانة أو إصابات القضيب نفسه.

principle 1. مَبْدَأٌ. 2. جَوْهَرٌ. 1. قانون أو أسلوب سلوكي 2. المادة الأساسية التي يعتمد عليها فعل الدواء.

- pleasure-pain p. مَبْدَأُ البَهْجَةِ والأَلَمِ. في نظريات التحليل النفسي هي النزعة الولادية لاجتناب الألم والبحث عن البهجة وذلك بالتقليل من التوتر بطريقة مباشرة أو بطريقة إشباع الرغبات.

- reality p. مَبْدَأُ الوَاقِعِيَّةِ. في نظرية التحليل النفسي هي الوظائف الغريزية التي تطور متطلبات مبدأ البهجة لإشباع رغبات الحياة الواقعية.

procaine بَرُوكَايْن. مادة كيميائية تستعمل كمبْنَجٌ موضعي.

procaine hydrochloride هِيْدُرُوكْلُورِيْد البرُوكَايْن. دواء يستعمل كمبْنَجٍ حول الجافية أو محصر للأعصاب المحيطية ومبْنَجٍ نخاعي شوكي.

process 1. نَاتِيءٌ. 2. حَدَثٌ. 3. اسْتِطَالَةٌ. 4. طَرِيقَةٌ. 1. بارزة من عظم أو من بنية أو عضو 2. عملية أو سلسلة عمليات نوعية تؤدي إلى تحقيق نتيجة معينة.

- dendritic p. النَاتِيءُ التَغْصُنِي. الفرع المتفرع من العصبون.

- floccular p. (= flocculus) النُدْفَةُ.

proctalgia أَلَمُ المُسْتَقِيمِ. ألم عصبي في الشرج والقسم السفلي من المستقيم.

- p. fugax أَلَمُ المُسْتَقِيمِ العَارِضِ. ألم عارض شديد في المستقيم يوقظ المريض أحياناً من نومه وقد يكون ناتجاً عن تشنج العضلة رافعة الشرج والعضلات المعصصية.

proctodynia وَجَعُ الشَّرَج. ألم في الشرج أو في المنطقة المحيطة به.

proencephalon (= prosencephalon) الدِّمَاغُ المُقَدَّم.

progeria شَيْخَاح. متلازمة وراثية غير مؤكدة تتصف بالشيخوخة المبكرة والشديدة والموت من مرض الشريان التاجي وعادة ما تحدث قبل سن العاشرة.

progression تَقَدُّم. الحركة أو السير إلى الأمام.

- backward p. التَّوَجُّعُ لِلخَلْف. السير للخلف. حركة تشاهد في بعض الأمراض العصبية.

- cross- legged p. تَقَدُّمٌ مُتَصَالِبُ السَّاقَيْنِ. سير إلى الأمام تدور فيه أصابع القدم للداخل وتقدم القدم أمام القدم المعاكسة.

- metadromic p. تَقَدُّمٌ هَزَوَلِيّ. أحد عقابيل التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بعدم مقدرة المريض على السير ولكنه لا يجد صعوبة في الجري إلى الأمام.

progressive مُتَرَقِّقٌ؛ تَقَدُّمِيّ. 1. يزداد تدريجياً في الشدة أو الاتساع كأن يتطور من السيء إلى الأسوأ 2. يتقدم إلى الأمام.

projection 1. إِزْتِسَامٌ 2. إسقاط. 1. عملية رسم الانطباعات التي تتولد من تنبيه أعضاء الحس على المواد أو الأشياء التي تولدها بحيث يتمكن الشخص من تعيين مواضعها بدقة. 2. الارتباطات بين قشرة المخ والأعضاء الأخرى من الجهاز العصبي أو أعضاء الحس.

- eccentric p. (= referred sensation) إرتسام لا مراكز؛ حسٌ محوّل؛ حسٌ رجيح. **- erroneous p.** إزْتِسَامٌ وَضْعِيّ مُغْلُوط. سوء تعيين موضع الأجسام بسبب ضعف أو شلل عضلات العين.

- thalamocortical p. (= thalamocortical fibres) الإسقاطُ المِهَادِيّ القِشْرِيّ.

prolepsis تكبير الانتياب. عودة الانتياب وتكرره قبل موعده المتوقع.

proleptic مُبَكِّرُ الانتياب. نوبة مرضية معاودة قبل موعدها المتوقع.

promazine hydrochloride هيدزوكلووريد البرومازين. دواء يستعمل كمضاد للذهان ومضاد للقيء ومسكن وكمعزز للبنج ومن الممكن إدخاله عن طريق الفم أو بداخل العضل أو الوريد.

promethazine hydrochloride هيدزوكلووريد البروميثازين. دواء يستعمل كمضاد للهستامين ومسكن ومضاد للقيء ويستعمل عن طريق الفم أو بداخل العضل أو الوريد.

prominentia شَامِخَةٌ. (ج: شَوَامِخ). ناتئ أو تبارز صغير من أحد الأعضاء أو البنيات.

pronation الكبّ؛ الانبطاح. عملية الانكباب أو الاستلقاء بوضع الكب ويطلق عادة على وضع اليد بوضعية الكب مع وضع الوجه للأسفل أو بتدوير الراحة إلى الخلف أو الأسفل وذلك بالتدوير الإنسي للساعد.

propantheline bromide بَرُومِيد البرُوبَانْتِيلِين. مادة مضادة للفعل الكولينى وتنبط فرط حركية الجهاز المعدي المعوي وتستعمل في علاج القرحة الهضمية.

propiomazine hydrochloride هيدزوكلووريد البرُوبيومَازِين. دواء مسكن مضاد للقيء.

propoxycaine hydrochloride هيدزوكلووريد البرُوبوكسيكائِين. دواء يستعمل كمسكن للألم.

proprioception الحِسُّ العَمِيق. الحس الذي يتولد من الأنسجة العميقة من داخل العضل أو أوتارها مثلاً.

proprioceptive مُسْتَقْبِلُ حِسِّيٍّ عَمِيق. يستقبل الحس العميق.

proprioceptor مُسْتَقْبِلَةُ الحِسِّ العَمِيق. نهاية عصبية حسية توفر المعلومات الخاصة عن حركات الجسم ووضعاته وهي توجد بصورة رئيسية في العضلات والأوتار والتهيه.

propriospinal نُخَاعِيَّةٌ عَمِيقَةٌ. وصف للسبل العصبية الصاعدة والنازلة في النخاع الشوكي التي تربط قسيماته العديدة ببعضها البعض.

proptosis (= exophthalmos) جُحُوظ.

propulsion 1. إندفاع 2. حَبَب. 1. الميل لل سقوط على الوجه عند السير 2. السير السريع.

proroxan hydrochloride هيدروكلوريد البروروكسان. دواء مضاد للفعل الأدريناليني.

prosencephalon الدماغُ المُقَدَّم. قسم الدماغ الذي يتطور من الحويصلة الامامية من الحويصلات البدائية الثلاث للأنبوب العصبي الجنيني والذي ينقسم بعد ذلك إلى الدماغ الانتهائي والدماغ البيني.

prosocele (= prosocoele) تَجْوِيف الدماغُ المُقَدَّم.

prosocoele تَجْوِيفُ الدماغِ المُقَدَّم. التجويف الامامي للدماغ وهو التجويف البطني للدماغ المقدم.

prosopagnosia عَمَةُ الوُجُوه. نوع من العمه البصري يتصف بعدم مقدرة المريض على التعرف على أوجه معارفه وحتى على وجهه نفسه في المرأة والذي يتسبب عن إصابة الفصين القذاليين السفليين الإنسيين على طول الوجهين الإنسيين البطينين للفصين الصدغيين.

prosopalgia (= trigeminal neuralgia) الألمُ العَصَبِيُّ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم.

prosophenosia (= prosopagnosia) عَمَةُ الوُجُوه.

prosopodiplegia 1. شَلْلُ الوَجْهِ والطَّرْف 2. شَلْلُ وجْهي مزدوج. 1. شلل الوجه وأحد الأطراف السفلية. 2. شلل جهتي الوجه.

prosopodysmorphia ضُمُورُ الوَجْهِ الشَّقِي. ضمور أحد نصفي الوجه.

prosoponeuralgia ألمٌ عَصَبِيٌّ وَجْهِي. ألم أعصاب الوجه.

prosopoplegia (= facial paralysis) شَلْلُ الوَجْهِ.

prosopoplegic مَشْلُولُ الوَجْهِ. مصاب بشلل الوجه.

prosopospasm تَشَنُّجُ الوَجْهِ. تشنج عضلات الوجه.

prostaglandin بروتوستغلندين. واحد من المجموعة الكبيرة من المركبات المشتقة من الحموض الدهنية ذات العشرين كربوناً، ولكل واحد من هذه المجموعة وظائف وتأثيرات عديدة ومتباينة.

protospasm التَشَنُّجُ الأوَّلِي. تشنج يبدأ في منطقة محدودة ثم يمتد إلى النواحي الأخرى من الجسم وهو التشنج الأولي البسيط في الصرع الجاكسوني.

protriptyline hydrochloride هيدروكلوريد البروتريبيلين. دواء مضاد لكآبة ويستعمل عن طريق الفم.

proximoataxia رَنَحٌ ذَانِي. رنح يصيب القسم الداني لأحد الأطراف مثل الساعد أو الذراع أو الفخذ أو الساق.

proximoceptor (= contiguous receptor) مُسْتَقْبَلَةٌ تَلَامُسِيَّة. مُسْتَقْبَلَةٌ حسية تستوجب تلامسها مع العامل أو المادة المنبهة لها لتولد الاستجابة مثل مستقبلات حسّ الذوق.

psalterium (= commissura fornicis) صَوَارُ القُبُور.

pselaphesia (= tactile sense) جِسُّ اللَّفْس. اللمس.

psellism (= stuttering) تَأْتَأَةٌ.

pseudaphia خَطْلُ اللَّفْس. خلل في حسّ اللمس.

pseudesthesia جِسٌّ كَاذِب. حس وهمي يتولد من دون وجود أي منبه خارجي أو حس لا يتناسب مع المنبه المولد له.

pseudoaphasia (= functional aphasia) حُبْسَةٌ وَظِيفِيَّة.

pseudoapoplexy سَكَّةٌ كَاذِبَةٌ. حالة تشبه السكتة ولكن من دون نزف دماغي.

pseudobulbar بَصْلِيٌّ كَاذِب. شبيه بالبصلي ظاهرياً ولكن في الحقيقة من دون إصابة بصلية.

pseudocoele (= cavitas septi pellucidi) جَوْفُ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ.

pseudocephaloele قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ كَاذِبَةٌ. فُتْقُ دِمَاعِيٍّ غَيْرِ خَلْقِي وَلَكِنَّهُ نَاتِجٌ عَنْ مَرَضٍ أَوْ كَسْرٍ فِي الْقَحْفِ.

pseudochorea رَقَصٌ كَاذِبٌ. حالة عدم تناسق عام كامل مع أعراض تشابه أعراض الرقص.

pseudochromesthesia حِسٌّ لَوْنِيٌّ كَاذِبٌ. نوع من الحس المشترك تولد فيه بعض الأصوات حساً ببعض الألوان.

pseudoclaudication عَرَجٌ كَاذِبٌ. عرج متقطع ينتج عن انضغاط ذنب الفرس.

pseudoclonus رَمَعٌ كَاذِبٌ. استجابة رمعية قصيرة الأمد.

pseudocoele (= pseudocoele) جَوْفٌ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ.

pseudodementia خَرَفٌ كَاذِبٌ. 1. اضطراب يشبه الخرف ولكنه ليس بسبب مرض دماغي عضوي ومن الممكن معالجته وشفائه 2. خمول شديد وعدم الاهتمام بالمحيط وحوادثه عند عدم وجود أي مرض عقلي.

- hysterical p. خَرَفٌ هِسْتِيرِيٌّ كَاذِبٌ. حالة تتصف بشلل الذاكرة مع عدم المقدرة على الإجابة حتى عن الأسئلة البسيطة مع حالة تشابه الحالة النفسية وسلوك شاذ ونوبات هياج أو ذهول.

pseudoesthesia (= pseudesthesia) حِسٌّ كَاذِبٌ.

pseudoganglion عُقْدَةٌ كَاذِبَةٌ. تنخن في العصب يشبه العقدة.

pseudogeusesthesia ذَوْقٌ كَاذِبٌ. حس ذوق كاذب يترافق مع إحساسات أخرى.

pseudogeusia مَذَاقٌ كَاذِبٌ؛ ذَوْقٌ مَغْلُوطٌ. حس ذوق لا يتناسب مع ذوق المادة المنبهة له أو حس ذوق يحدث من دون وجود أي منه له.

pseudohallucination هَلُوسَةٌ كَاذِبَةٌ. هلوس يتولد عن فعل الذاكرة والخيال ويشعر الشخص المصاب به بأنه غير حقيقي.

pseudohydrocephalus مَوَّةُ الرَّأْسِ الكاذب. ضخامة الرأس المفرطة والسوية ولكنها تظهر كأنها شاذة بسبب صغر حجم الوجه والجسم بالنسبة لحجم الرأس.

pseudohypertrophy ضَخَامَةٌ كَاذِبَةٌ. زيادة الحجم من دون الضخامة المفرطة.

- muscular p. ضَخَامَةٌ عَضَلِيَّةٌ كَاذِبَةٌ. زيادة حجم العضلات ليس بسبب ضخامتها ولكن بسبب ارتشاح العضلة بأنسجة أخرى.

pseudomyotonia تَأَثَّرٌ عَضَلِيٌّ كَاذِبٌ. التقلص والانقباض البطيئان اللذان يحدثان بالتناوب في قصور الدرقية.

pseudonarcotic مُخَدِّرٌ كَاذِبٌ. مادة مسكنة ولكنها ليست مخدرة.

pseudonarcotism تَخَدُّرٌ كَاذِبٌ. حالة هستيرية تشبه حالة التخدر.

pseudoneuritis الْتِهَابٌ الْأَعْصَابِ الْكَاذِبِ. حالة تبيغ الحليمة البصرية تحدث كعيب خلقي.

pseudoneuroma وَرَمٌ عَصَبِيٌّ كَاذِبٌ. تورم على العصب يشبه الورم العصبي ولكنه ليس بالورم العصبي.

pseudonystagmus (= end position nystagmus) رَاوَاةُ الْوَضْعِ الْآخِرِ.

pseudopapilledema وَدْمَةُ الْخَلْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ الْكَاذِبَةِ. ارتفاع القرص البصري الشاذ.

pseudoparalysis شَلْلٌ كَاذِبٌ. فقدان القوة العضلية الظاهري من دون شلل حقيقي فيها ويتصف بضعف التنسيق في حركاتها أو تحديد الحركات بسبب ألمها.

- p. agitans (= paralysis agitans) شَلْلٌ رَعَشِيٌّ كَاذِبٌ؛ شلل رعشي.

- arthritic general p. شَلْلٌ غَامٌ كَاذِبٌ بالتهاب المفاصل. حالة تشبه الشلل العام تنتج عن عسيدة داخل القحف في شخص مصاب بالنقرس أو بالتهاب المفاصل العام.

- congenital atonic p. (= amyotonia congenita) شَلْلٌ وَهْنِيٌّ خَلْقِيٌّ كَاذِبٌ؛ وَهْنِيٌّ عَضَلِيٌّ خَلْقِيٌّ.

شَلْلٌ زَهْرِي Parrot's p. (= syphilitic p.) -
كَاذِب. شلل كاذب لأحد الأطراف أو لعدة أطراف في
الأطفال ينتج عن التهاب العظم والغضروف الإفرنجي
للمعاشات.

pseudoparaplegia شَلْلٌ سَفْلِيٌّ كَاذِب.
شلل سفلي زائف كالذي يحصل في حالات
التمارض أو الهستيريا.

pseudoparesis خَزَلٌ كَاذِب. حالة
هستيرية أو حالة لا عضوية أخرى تشبه الخزل.

pseudophotoesthesia حِسٌّ ضَوْئِيٌّ
كَاذِب. حس ضوئي يتولد عن استلام منبهات غير
ضوئية.

pseudoplegia شَلْلٌ كَاذِب. شلل هستيري
أو أي شلل كاذب آخر.

pseudopoliomyelitis التهابٌ سَنَجَائِيَّة
الدِّمَاغ الكاذب. داء شبيه بالتهاب سنجابية الدماغ
ينتج عن الفيروس المعوي غير فيروس السنجابية.

pseudopolymelia حِسُّ الِتِهَائِيَّاتِ الكاذب.
حس وهمي يحس في عدة أجزاء انتهائية في الجسم
مثل الأنف والحلمة وحشفة القضيبي والأصابع
والأباض.

pseudopsia إِبْصَارٌ كَاذِب. هلوسة أو انخداع
بصري.

pseudopsychosis (= Ganser's
syndrome) دُهَانٌ كَاذِب.

pseudotabes تَابِسٌ كَاذِب. أي اعتلال
عصبي يتصف بأعراض تشبه أعراض التابس
الظهري من دون أن يكون ناتجاً عن الزهري.

pseudotetanus تَكَرَّرٌ كَاذِب. تقلص
عضلي مستمر شبيه بالكزاز ولكنه غير ناجم عن
الإصابة بجراثيمه.

pseudotrimus ضَرْزَرٌ كَاذِب. اضطراب
حركي في الفم له أعراض تشابه أعراض الضرز.

pseudotumor وَرَمٌ كَاذِب. تضخم شبيه
بالورم.

- p. cerebri وَرَمٌ دِمَاعِيٌّ كَاذِب. حالة تولدما
وذمة الدماغ بأسباب مرضية مختلفة وتتصف بارتفاع

ضغط داخل القحف مع الصداع والقيء وذمة القرص
البصري ولكن من دون أية علامات عصبية سوى شلل
العصب القحفي السادس أحياناً.

psoriasis التهابُ القَطْنِيَّة. التهاب إحدى
العضلات القطنية أو غمدها.

psychalgia (= psychalgia) أَلَمٌ نَفْسِيٌّ
المنشأ.

psychalgia أَلَمٌ نَفْسِيٌّ المنشأ. 1. صداع
يُحَسُّ به وكأنه ناتج عن أسباب عاطفية ويمكنه أن
يكون مصاحباً لأفكار غريبة غير محتملة أو
لوسواس أو لهوس. 2. ألم نفسي المنشأ ناتج عن
أسباب هستيرية ويُحَسُّ به كأنه ألم جسدي.

psychoanalysis (= psychoanalysis)
تَحْلِيلٌ نَفْسِيٌّ.

psychanopsia (= psychic blindness)
عَمَى نَفْسِيٌّ المنشأ.

psychasthenia وَهَنٌ نَفْسِيٌّ. مصطلح
يستعمل للدلالة على كل العصابات النفسية غير
الهستيرية التي تشمل ما يسمى اليوم بالرهاب
وعصاب القلق.

psychataxia رَنَجٌ نَفْسِيٌّ. حالة اضطراب
عقلي تنصف بالتخليط وعدم المقدرة على التركيز.

psyche النَّفْس. قدرة الإنسان على التفكير
والتحكم والشعور العاطفي وقد تشمل هذه الحياة
النفسية عمليات واعية أو لا شعورية.

psychedelic 1. دُهَانِيٌّ الْأَعْرَاض
2. دُهَانِيٌّ التَّأثير. 1. منسوب إلى أو لما يتصف
بالاهلاس البصرية والإدراك الشديد وأحياناً
السلوك الشبيه بالذهان. 2. عقار يولد أعراضاً
شبيهة بكل ذلك.

psychiatric نَفْسِيٌّ. منسوب للطب
النفسي أو يقع في حقل هذا الاختصاص.

psychiatrics (= psychiatry) الطَّبِي.

psychiatrist الطَّبِيبُ النَّفْسِيٌّ. الطبيب
الاختصاصي في الطب النفسي.

psychiatry الطَّبِيبُ النَّفْسِيٌّ. فرع الطب
الذي يعنى بدراسة ومعالجة الأمراض النفسية
وطرق الوقاية منها.

- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْبَيُولُوجِيّ.** - **biological p.**
 فرع الطب النفسي الذي يؤكد على الاسباب الكيميائية الحياتية والعصبية والدوائية عند معالجة الامراض النفسية.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْمُجْتَمَعِيّ.** - **community p.**
 فرع الطب النفسي الذي يعنى بالتحري عن حالات الامراض النفسية ومعالجتها والوقاية منها في منطقة جغرافية أو حضارية معينة مع التأكيد على تأثير العوامل المحيطة عليها.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْمُقَارِن.** - **cross- cultural p. (= comparative p.)**
 الطب النفسي المُقَارِن. الدراسة المقارنة للأمراض النفسية والصحة العقلية بين مختلف المجتمعات والقوميات والحضارات.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الثَّقَافِيّ.** - **cultural p.**
 الطب النفسي الاجتماعي الذي يعنى بالمرضى النفسيين وعلاقتهم بمحيطهم الثقافي.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الوَصْفِيّ.** - **descriptive p.**
 النفسي الذي يعتمد على الاعراض والوصاف السلوكية الظاهرة أكثر من الاعتماد على العوامل النفسية الديناميكية الكامنة.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الدِّينَامِيكِيّ.** - **dynamic p.**
 النفسي الذي يعتمد على الآليات غير الواعية والتناقضات والفعاليات العاطفية الأخرى أكثر من العوامل السلوكية الظاهرة.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْوُجُودِيّ.** - **existential p.**
 النفسي الذي يعتمد على الفلسفة الوجودية التي ترثي بأن الشخص يتحمل مسؤولية وجوده.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الشَّرْعِيّ.** - **forensic p.**
 النفسي الذي يعنى بالنواحي القانونية للاضطرابات النفسية.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْمِهْنِيّ.** - **industrial p. (= occupational p.)**
 الطب النفسي المهنيّ.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْمِهْنِيّ.** - **occupational p.**
 الطب النفسي الذي يعنى بتشخيص ومعالجة الامراض العقلية في الاوساط الصناعية والوقاية منها وعودة المرضى المهنيين إلى أعمالهم ودراسة أسباب تغييرهم عن العمل واحتمال إصابتهم بالاعراض وسلوكهم الشخصي وتعبهم المهني وتكيفهم للعمل وتقاعدهم منه والظواهر الأخرى المتعلقة بعملهم.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْعَضَوِيّ.** - **organic p.**
 العلم الذي يعنى بالنواحي النفسية في الامراض الدماغية العضوية.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ التَّقْوِيْمِيّ الْجَزْئِيّ.** - **orthomolecular p.**
 النظرية التي تنص على أن الامراض النفسية تنتج عن اضطرابات المحيط الجزيئي للدماغ ومن الممكن شفاؤها بإعادة التراكيز المثلّي للمواد التي توجد عادة في الجسم كالفيتامينات والأملاح.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْوَقَائِيّ.** - **preventive p.**
 مصطلح عام يستعمل للدلالة على تخفيف الامراض النفسية ومكافحتها والإقلال من الإعاقة التي تولدها للمرضى.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْاجْتِمَاعِيّ.** - **social p.**
 النفسي الذي يعنى بالحقائق والوقائع الثقافية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك المرضى والتي تطيل امد المرض وتعمقه او تولد اختلالاته وتؤثر على معالجته.
- الطِبُّ النَّفْسِيُّ الْمُقَارِن.** - **transcultural p. (= cross- cultural p.)**
 نفسيّ: نَفْسَانِيّ. نسبة إلى النفس
 أو العقل
 مؤثّر نفسيّ. ما يؤثر في النفس أو في السلوك مثل الدواء المؤثر النفسي.
 مؤثّر نفسيّ: مُنَقِّش نفسيّ. ما يؤدي إلى تأثير مهيج للنفس.
 التَحْلِيلُ النَّفْسِيّ. طرق إظهار التجارب العاطفية السابقة للمريض وأدوارها في التأثير على حياته العقلية الحاضرة بغرض اكتشاف التناقضات والآليات التي تؤدي إلى الحالات المرضية العقلية لديه والتعرف على بعض الدلائل التي تساعد في علاجه النفسي وتستخدم في هذا التحليل العلاقات الحرة بين التجارب وتذكر الأحلام ودلالاتها وظواهر المقاومة لها والتحول عنها وما شاكل ذلك.
 المُخَلِّلُ النَّفْسِيّ. الاختصاصي
 سَمْعِيّ نفسيّ. متعلق بالإدراك الواعي والذكي للأصوات.

psychocatharsis (= catharsis) تَفْرِيعٌ
فِكْرِيٌّ؛ تَفْرِيعٌ نَفْسِيٌّ.

psychochemistry الْكِيمِيَاءُ النَّفْسِيَّةُ.
العلم الذي يعنى بدراسة العلاقات بين الكيمياء
والفعاليات النفسية.

psychochrome اللَّوْنُ النَّفْسِيٌّ. الرابطة
الفكرية الشخصية بين بعض الإحساسات الجسمية
وبعض الألوان.

psychochromesthesia حَسُّ اللَّوْنِ
النَّفْسِيُّ. الحالة التي تولد فيها المنبهات السمعية
والمنبهات غير البصرية إحساسات بالألوان أو
إحساسات مرتبطة باللون.

psychocortical قَشْرِيٌّ عَقْلِيٌّ. منسوب
إلى العقل وقشرة الدماغ كموضع للفعاليات
النفسية.

psychocutaneous جِلْدِيٌّ نَفْسِيٌّ. منسوب
إلى العلاقة بين العوامل الفكرية أو العاطفية
والاضطرابات الجلدية.

psychodelic (= psychedelic) ذُهَانِيٌّ
التَّأثير؛ ذُهَانِيٌّ الأعراض.

psychodiagnosis تَشْخِصٌ نَفْسِيٌّ.
استعمال الطرق القياسية النفسية في تشخيص
الاضطرابات النفسية.

psychodimeter مِقْيَاسٌ نَفْسِيٌّ. آلة
تستعمل لقياس سرعة الفعاليات العقلية.

psychodometry الْقِيَاسُ النَّفْسِيُّ. قياس
سرعة الفعاليات الفكرية.

psychodrama تَمَثُّيلٌ نَفْسِيٌّ. أسلوب
معالجة نفسانية يشجع فيه المرضى على تمثيل
تناقضاتهم العاطفية والنفسية بصورة مؤثرة.

psychodynamics الدِّينَامِيكَا النَّفْسِيَّةُ.
تفاعلات العوامل كالقلق والتناقضات والآليات التي
تولد التعبير عن الفعاليات النفسية.

psychodysleptic مُخَمِّدٌ نَفْسِيٌّ. ما يولد
حالة شبيهة بالأحلام أو التوهم.

psychogenesis التَّنَامِي النَّفْسِيٌّ.

1. التَّنَامِي والتطور النفسي 2. تكون الأعراض
المرضية بعوامل نفسية وليس بعوامل عضوية.

psychogeriatrics الطَّبُّ النَّفْسِيُّ الشَّيْخُوخِيَّ.
معالجة المشاكل النفسية عند الشيخوخ.

psychogogic مُهَيِّجٌ نَفْسِيٌّ. ما يثير ويشدد
التوترات النفسية أو ينبهها.

1. مخطط الشخصية 2. مَخَطُّطٌ
نَفْسِيٌّ. 1. مخطط الخلال النفسية والصفات
الشخصية للفرد 2. حس بصري يترافق مع الأفكار
الذهنية كحس رؤية شكل الأرقام عند التفكير بها.

psychograph حَظٌّ بَيَانِيٌّ نَفْسِيٌّ. 1. مخطط
يرسم الخلال النفسية والصفات الشخصية
للشخص بشكل خط بياني 2. وصف مكتوب
للوظائف النفسية للشخص.

psychokinesia (= psychokinesis)
حَرَكَيةٌ نَفْسِيَّةٌ المنشأ.

psychokinesis حَرَكَيةٌ نَفْسِيَّةٌ. 1. التأثير
المتوقع للأفعال الإرادية على المواد الفيزيائية، أو
التأثير الفكري على المادة من دون استعمال أية
قوة فيزيائية 2. عمل انفجاري بسبب عدم تثبيط
الغرائز الابتدائية.

psycholagny التَلَذُّذُ الْجِنْسِيُّ النَّفْسِيُّ؛ شَبَقٌ
نَفْسِيٌّ. الشعور باللذة الجنسية بمجرد تصور أو
تخيل العملية الجنسية.

psycholepsy نَوْبَةٌ نَفْسِيَّةٌ. هبوط مفاجيء
وشديد للمزاج يدوم عادة لفترة قصيرة.

psycholinguistics اللُّغَوِيَّاتُ النَّفْسِيَّةُ.
دراسة العوامل النفسية التي تؤثر على تطوير
واستعمال اللغة.

psychologic (= psychological) نَفْسِيٌّ.
متعلق بعلم النفس.

psychologist اِخْتِصَاصِيٌّ عِلْمِ النَّفْسِ.

psychology عِلْمُ النَّفْسِ. العلم الذي
يعنى بالعقل والعمليات النفسية خاصة ما يتعلق
منها بسلوك البشر والحيوانات.

عِلْمُ النَّفْسِ الْمَرَضِيِّ. - abnormal p.
دراسة الاضطرابات النفسية والاختلالات السلوكية.

- **analytic p. (= analytical p.)** عِلْمُ النَّفْسِ التَّحْلِيلِيّ. علم النفس الذي يعتمد على دراسة المفاهيم والمعتقدات اللاشعورية.

- **animal p.** عِلْمُ نَفْسِ الْحَيَوَانَات. دراسة سلوك الحيوانات.

- **behavioristic p. (= behaviorism)** عِلْمُ النَّفْسِ السُّلُوكِيّ.

- **child p.** عِلْمُ نَفْسِ الْأَطْفَال. دراسة تطور عقل الطفل.

- **clinical p.** عِلْمُ النَّفْسِ السَّرِيرِيّ. استعمال المعلومات والطرق النفسية في معالجة الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو سلوكية أو نمائية.

- **cognitive p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِدْرَاكِيّ. فرع علم النفس الذي يعني بدراسة طرق استلام العقل للأفكار والانطباعات وكيفية تحليلها وتفهمها.

- **community p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْتِمَاعِيّ. تطبيق المعلومات والاسس النفسية في دراسة الصحة النفسية للأفراد ضمن مجتمعاتهم.

- **criminal p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْرَامِيّ. دراسة عقليات ودوافع المجرمين وسلوكهم الاجتماعي.

- **depth p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْعَمَقِيّ. دراسة العمليات النفسية العميقة.

- **developmental p.** عِلْمُ النَّفْسِ النِّمَاطِيّ. دراسة التغيرات السلوكية التي تحصل للشخص خلال عمره الطويل.

- **environmental p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْبَيْئِيّ. دراسة التأثيرات الفيزيائية والاجتماعية في المحيط الاجتماعي على سلوك الفرد.

- **experimental p.** عِلْمُ النَّفْسِ التَّجْرِبِيّ. دراسة العمليات العقلية باستعمال الطرق المختبرية المحكمة.

- **gestalt p. (= gestaltism)** علم النفس الغشتاليني؛ التَّكْوِينِيَّةُ الْإِدْرَاكِيَّةُ.

- **Individual p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْفَرْدِيّ. المبدأ النفسي الذي ينص على أن الشعور بالنقص هو مصدر معظم المشاكل النفسية والمشاكل بين الأفراد.

- **physiologic p. (= physiological p.)** عِلْمُ النَّفْسِ الْفِيْزِيُولُوجِيّ. فرع علم النفس الذي يدرس العلاقة بين العمليات الفيزيولوجية والسلوك.

- **social p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْتِمَاعِيّ. علم النفس الذي يركز على العلاقات الاجتماعية والطريقة التي يؤثر فيها سلوك الآخرين على سلوك الفرد نفسه.

psychometer مَقْيَاسُ نَفْسِيّ. جهاز يستعمل لقياس العمليات النفسية.

psychometrics (= psychometry) الْقِيَاسُ النَّفْسِيّ.

psychometry الْقِيَاسُ النَّفْسِيّ. قياس الفعاليات الفكرية والعمليات السلوكية والنفسية.

psychomotor نَفْسِيّ حَرَكَيّ. نسبة للتأثيرات الحركية التي تتولد من التفاعلات الدماغية أو النفسانية.

psychoneural نَفْسِيّ عَصَبِيّ. نسبة إلى العملية العصبية التي تبدأ بالتنبيه الحسي والتي قد تؤدي إلى خزنه أو إلى تمييزه أو إلى نتاج أو استجابة من نوع ما لهذا التنبيه.

psychoneurosis عَصَابٌ ذُهَانِيّ. عصابات تشمل الهستيريا والوسواس والرهاب وتتولد نتيجة تجارب أثناء الطفولة.

psychonomy الْقَوَانِينُ النَّفْسِيَّة. علم يعني بقوانين الفعاليات النفسية.

psychopath مُعْتَلُّ النَّفْس. شخص مصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

psychopathology السيكوباتولوجيا. 1. مرضيات الاضطرابات العقلية التي تعنى بدراسة أسباب وأعراض الأمراض العقلية 2. سلوك أو فعالية عقلية مرضية.

psychopathy سيكوباتيا؛ إغْتِلَالٌ نَفْسِيّ. اعتلال النفس سواء ترافق ذلك مع انحطاط الذكاء لدون المستوى السوي أم لا.

psychopharmacology الدَوَائِيَّاتُ النَّفْسَانِيَّة؛ الفارماكولوجيا النفسية. 1. دراسة تأثير الأدوية على الوظائف النفسية والحالات النفسية 2. استعمال الأدوية لتحويل الوظائف النفسية ومعالجة انحرافاتها.

psychophysics الْفِيْزِيَاءُ النَّفْسِيَّة. العلم الذي يعني بدراسة العلاقات الكمية بين صفات

وأنماط المتنبهات الفيزيائية والإحساسات المولدة بها.

psychophysiology فيزيولوجيا النفس. علم وظائف النفس.

psychoplegia شلل نفسي. نوبة خرف حادة.

psychosedation تهدئة نفسية. عملية تزيل عن المريض الخوف والتوجس وذلك باستعمال دواء مركز نفسي.

psychosedative مهدئ نفسي. عامل يزيل التوجس بتأثيره على المراكز دون القشرية في الدماغ ولا يولد إلا القليل من التأثير على الوظائف الحسية أو الحركية لتأثيره الضعيف على القشرة المخية.

psychosensory حسي نفسي. متعلق بالادراك الواعي للدفعات الحسية التي تصل الدماغ.

psychoses ذهانات. جمع ذهان.

psychosexual جنسي نفسي. متعلق بالناحية النفسية للجنس.

psychosis ذهان. (ج: ذهانات). اضطراب عقلي يتصف بخلل كبير في إدراك الواقع والذي يتصف بالتوهم والأهلاس والكلام غير المترابط والسلوك غير المتناسق أو المضطرب من دون وعي المريض بعدم الترابط أو الانسجام في سلوكه. ويستعمل المصطلح للدلالة على عدم مقدرة المريض على القيام بأمور الحياة بصورة طبيعية.

- affective p. ذهان عاطفي. اضطراب المزاج.

- alcoholic p's. ذهانات كحولية. ذهانات تترافق مع استعمال الكحول وتشمل الهذيان الارتعاشي ومتلازمة كورساكوف والهلاس الكحولي والزور الكحولي.

- brief reactive p. ذهان تفاعلي قصير. فترة من أعراض نفسانية تشمل عدم الترابط وضعف التمييز والتوهم والأهلاس والسلوك اللامنسجم، وتظهر كل هذه الأعراض بصورة مفاجئة نتيجة مشاكل أو أعراض حياتية مزعجة وتدوم لمدة حوالي شهر واحد.

- circular p. ذهان دوري. اضطراب هوسي اكتئابي متناوب.

- depressive p. ذهان اكتئابي. اكتئاب شديد.

- drug p. ذهان دوائي. ذهان يتولد عن استعمال أحد الأدوية.

- functional p. ذهان وظيفي. ذهان لا يتولد عن آفة عضوية أو عن خلل وظيفي معين واضح لأحد أقسام الدماغ.

- hysterical p. ذهان هستيري. ذهان قصير الامد يحدث عند المرضى المصابين باضطرابات الشخصية.

- involutional p. (= involutional melancholia) ذهان أوبي.

- Korsakoff's p. (= Korsakoff's syndrome) متلازمة كورساكوف.

- manic p. ذهان هوسي. اضطراب دوري هوسي.

- manic-depressive p. (= bipolar p.) ذهان هوسي اكتئابي. ذهان دوري.

- organic p. ذهان عضوي. ذهان يتولد عن آفة عضوية نفسانية.

- postpartum p. ذهان تالي للوضع. نوبة اضطراب نفسي تحدث بعد الوضع.

- prison p. ذهان السجن. ذهان تحفز ظهوره لدى المريض ظروف السجن القاسية.

- schizoaffective p. (= schizoaffective disorder) ذهان فصامي عاطفي.

- senile p. ذهان شيخوخي. خوف شيخوخي مع اكتئاب أو توهم زوراني أو هلاس.

- symbiotic p. (= symbiotic infantile p.)

ذهاني تعائشي. حالة تشاهد في الأطفال بين سن الثانية حتى الرابعة من العمر تتصف بعلاقة شاذة مع الأم كالقلق الشديد من الانفصال عنها والخوف الشديد ومقاطعة الكلام النافع والانطواء على الذات.

- toxic p. ذهان سسمي. ذهان يتولد عن تناول مادة سامة كالكحول أو الأفيون أو عن وجود الذيفان في الجسم.

- unipolar p. (= major depression) ذهان أحادي القطب. اكتئاب كبير.

psychosocial نفسي اجتماعي. متعلق بالنفس وبالمجتمع.

psychosomatic نَفْسِيٌّ جِسْمِيٌّ. متعلق بالعلاقة بين الجسد والنفس أو وجود أعراض جسدية ناتجة عن أسباب نفسية أو عاطفية أو عقلية.

psychosomimetic (= psychotomimetic) مُحاكي الذَّهَانِ.

psychostimulant مُنْجِبُ نَفْسَانِيٍّ. 1. عامل يولد زيادة عابرة في الفعالية النفسية الحركية 2. دوار يولد مثل هذه الزيادة كالامفيتامين أو الكافئين.

psychosurgery الجِرَاحَةُ النَّفْسِيَّةُ. جراحة دماغية تجري لمعالجة الاضطرابات العقلية.

psychotechnics التِقْنِيَّاتُ النَّفْسِيَّةُ. استعمال الطرق النفسية في دراسة المشاكل الاجتماعية وما شاكل.

psychotherapeutics (= psychotherapy) المَعَالِجَةُ النَّفْسِيَّةُ.

psychotherapy المَعَالِجَةُ النَّفْسِيَّةُ. معالجة الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية باستعمال التقنيات النفسية كالتشجيع والإيحاء والإغراء والتثقيف والتطمين والتبصر لتشجيع تنمية الشخصية وإصلاح النمط الحياتي غير المنسجم مع المحيط لدى المريض.

- brief p. مُعَالِجَةُ نَفْسِيَّةٍ قَصِيْرَةٍ. معالجة نفسية نشطة وفعالة تدوم لعشر إلى عشرين جلسة لمعالجة مشكلة نفسية خاصة أو عرض سلوكي معين.

- existential p. مُعَالِجَةُ نَفْسِيَّةٍ وَجُودِيَّةٍ. معالجة نفسية تعتمد على الفلسفة الوجودية التي تؤكد على التفاعلات الانية وتجارب الإحساسات الذاتية بصرف النظر عن التفكير المنطقي.

- personologic p. مُعَالِجَةُ نَفْسِيَّةٍ شَخْصِيَّةٍ. معالجة تركز على شخصية المريض بصرف النظر عن الأعراض السريرية التي تظهر عليه.

- supportive p. مُعَالِجَةُ نَفْسِيَّةٍ دَاعِمَةٍ. طريقة علاجية تشجع دفاعات المريض لتثبيت العوامل النفسية المقلقة لتجنب التناقضات العاطفية.

psychotic ذُهَانِيٌّ. منسوب للذهان أو يتصف به أو ينتج عنه أو مصاب به.

psychotogenic مُوَلِّدُ الذَّهَانِ. دواء أو عامل يولد الذهان.

psychotomimetic مُحاكي الذَّهَانِ. يتصف أو يولد أعراضاً تشبه الذهان كالهلوس البصري أو انحراف الإدراك والسلوك الشبيه بالانفصام.

psychotropic مُؤَثِّرُ نَفْسِيٍّ. عامل أو دواء يؤثر على العقل ويمكنه تغيير الفعاليات النفسية.

psychoalgia أَلَمُ البَرْدِ؛ أَلَمُ بَرُودِيٍّ. الحس المؤلم للبرد.

psychoesthesia حِسُّ البَرْدِ. حالة يحس بها الشخص جزءاً من جسمه بارداً رغم سخونته.

puberty البُلُوغُ. الفترة التي تبدأ فيها الصفات الجنسية الثانوية بالظهور وعندها يتمكن الفرد من التناسل الجنسي.

- precocious p. البُلُوغُ المُبَكِّرُ. النضوج الجنسي المبكر الغامض أو المرضي والذي تظهر فيه الصفات الخاصة بالجنس مبكراً أو تتنامى فيه صفات الجنس المعاكس.

pulvinar الوَسَادَةُ. الكتلة الوسادية الشكل البارزة التي تكون الجزء الإنسي من النهاية الخلفية للمهاد والتي تغطي جزئياً الأكيمة الرأسية وعضدها وتكون مفصولة في الأسفل عن الجسم الركيبي بعضد الأكيمة الرأسية، وهي تستلم أليافاً من النوى المهادية الأخرى وترسل إسقاطات عديدة إلى قشرة المخ.

- p. thalami (= nuclei posteriores thalami) نَوَى المِهَادِ الخَلْفِيَّةِ.

1. يَزَلُّ 2. ثَقْبٌ؛ وَخَزٌ. ثقب بنية بارزة أو الثقب المكونة عن ذلك.

- Bernard's p. وَخَزٌ بَرْنَارْد. وخز نقطة معينة في قاع البطين الرابع تجريبياً يؤدي إلى توليد السكرى لدى الحيوان.

- cisternal p. يَزَلُّ الصُّهْرِيْجِ. ثقب الصهريج المخيخي البصلي خلال الرباط القذالي الفقهي لغرض سحب السائل الدماغي النخاعي.

- cranial p. (= cisternal p.) يَزَلُّ القِخْفِ.

- Intracisternal p. (= cisternal p.) يَزَلُّ الصُّهْرِيْجِ.

putamen البطامة؛ قَشْرَةُ العَدَسِيَّة. قشرة النواة العدسية وهي القسم الأكبر والاعمق لوناً والوحشي من النواة العدسية وتفصلها عن الكرة الشاحبة الوحشية الصفيحة النخاعية الوحشية.

pygalgia ألم الألية. ألم في الاليتين.

pyknoepilepsy (= absence epilepsy) الصَّرَعُ الغيبوبي.

pyramid هَرَمٌ. مصطلح يستعمل للدلالة على هرم البصلة (النخاع المستطيل).

- **p. of cerebellum (= pyramis vermis)** هَرَمُ الدُّوْدَةِ.

- **p. of medulla oblongata (= pyramis medullae oblongatae)** هَرَمُ البَصْلَةِ. هرم النخاع المستطيل.

pyramidotomy قَطْعُ الهَرَم. قطع السبيل الهرمي.

pyramis هَرَمٌ. مصطلح عام لوصف البنيات الشبيهة بالهرم.

- **p. cerebelli (= p. vermis)** هَرَمُ الدُّوْدَةِ.

- **p. medullae oblongatae** هَرَمُ البَصْلَةِ. هرم النخاع المستطيل وهو إحدى الكتلتين المدورتين الموجودتين على جهتي الشق الناصف الامامي للبصلة والمكون من الالياف الحركية (السبيل الهرمي) النازلة من قشرة المخ إلى البصلة والنخاع الشوكي.

- **p. vermis** هَرَمُ الدُّوْدَةِ. قسم دودة المخ بين حلبة الدودة ولهاتها.

pyrolagnia شَبَقُ النار؛ التَلَذُّذُ الجِنْسِيُّ بالنيران. التلذذ الجنسي بمشاهدة النيران أو بإشعالها.

pyromania هَوَسُ النيران. الرغبة الملحة في إشعال النيران.

- **erotic p. (= pyrolagnia)** شَبَقُ النار؛ التَلَذُّذُ الجنسي بالنيران.

pyrophobia رُهابُ النار. الخوف الشاذ من النار.

pyrrocaine بِيَرُوكَاين. دواء يستعمل كمخدر موضعي.

- **p. hydrochloride** هِيْدُرُوكْلُورِيْدُ البِيَرُوكَاين. دواء يستعمل كمبتج موضعي في طب الاسنان وذلك بحصر أعصاب الاسنان الحسية.

Q

quadriplegia (= tetraplegia) شَلْلٌ رُبَاعِيٌّ.

شلل الأطراف الأربعة.

quotient حَاصِلٌ. رقم يحصل عليه نتيجة القسمة.

- achievement q. حاصل الإنجاز. مدى انجاز الطفل وتقدمه في تعلمه نسبة إلى قابلياته العامة.

- intelligence q. حَاصِلُ الذِّكَاة. مقياس الذكاء الذي يحصل عليه بـقسمة عمر المريض العقلي (الذي يحصل عليه باختبار بينيت) على عمره الزمني وضرب الناتج بعنة.

- spinal q. (= Ayala's q.) الحَاصِلُ النُّخَاعِي؛

حاصل أياالا. حاصل ضغط السائل الدماغي النخاعي الذي يحصل عليه بـقسمة ضغطه بعد إزالة 10 مليلترات منه على ضغطه الذي نحصل عليه قبل إزالة هذه الكمية منه وضرب الناتج بالرقم عشرة. والحاصل الطبيعي هو حوالي 5.5-5.6. فإذا كان الحاصل أقل من 5 فإن ذلك يدل على مستودع صغير للسائل كما يحصل في الانسداد تحت العنكبوتي أما إذا كان فوق الـ 7 فإنه يدل على مستودع متوسع للسائل كما يشاهد في التهاب السحايا المصلي أو في مَوَه الرأس.

R

racephedrine hydrochloride

هيدروكلوريد الرِسْفِدْرِين. مادة كيميائية تستعمل كمادة محاكية للودي.

rachial (= rachidial) سِيَسَائِيّ. متعلق بالسياساء أو العمود الفقري.

rachialgia أَلَمٌ سِيَسَائِيّ. أَلَمٌ فِي الْعَمُودِ الْفَقْرِيّ.

rachianalgesia (= spinal anesthesia) تَخْدِيرٌ نُخَاعِيّ.

rachicentesis (= lumbar puncture) بَزْلٌ قَطَنِيّ.

rachidial سِيَسَائِيّ. متعلق بالسياساء أو بالعمود الفقري.

rachidian (= rachidial) سِيَسَائِيّ.

rachigraph مِرْسَامُ السِّيَسَاء. آلة لرسم شكل السياساء والظهر.

rachilysis إِفْتِكَاكٌ سِيَسَائِيّ. طريقة آلية لمعالجة العمود الفقري الرقبى بالسحب والضغط.

rachiocampsis إِنْجِنَاءُ السِّيَسَاء. انحناء العمود الفقري.

rachiocentesis (= lumbar puncture) بَزْلٌ قَطَنِيّ.

rachiochysis مَوَّةُ السِّيَسَاء. انصباب مائي بداخل القناة الفقرية.

rachiocyphosis (= kyphosis) حُدَاب.

rachiodynia وَجَعٌ سِيَسَائِيّ. أَلَمٌ فِي الْعَمُودِ الْفَقْرِيّ.

rachiochyphosis (= kyphosis) حُدَاب.

rachimeter مِقْيَاسُ السِّيَسَاء. آلة لقياس انحناءات العمود الفقري.

rachiomylitis إِلْتِهَابُ النُّخَاع. التهاب النخاع الشوكي.

rachiorpathy إِعْتِلَالٌ سِيَسَائِيّ. أي داء يصيب العمود الفقري.

rachioscoliosis جَنْفُ السِّيَسَاء. الانحناء الجانبي للعمود الفقري.

rachiotome مِبْضَعُ السِّيَسَاء. آلة لبضع الفقرات.

rachiotomy بَضْعُ السِّيَسَاء؛ بَضْعُ الْفَقَار. بضع السياساء أو إحدى فقراته.

rachiresistance مَقَاوِمَةٌ لِلتَّخْدِيرِ النُّخَاعِيّ. حالة تتصف بعدم توليد أي تأثير للتخدير النخاعي.

rachiresistant مَقَاوِمٌ لِلتَّخْدِيرِ النُّخَاعِيّ. شخص يتصف بالمقاومة للتخدير النخاعي.

rachis (= vertebral column) السِّيَسَاء؛ الْعَمُودُ الْفَقَارِيّ.

rachisagra نَوْبَةٌ سِيَسَائِيَّة. ألم في العمود الفقري أو نقرس العمود الفقري.

rachischisis إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاء. شق خلقي في العمود الفقري.

- r. partialis (= merorachischisis) إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاءِ الْجُزْئِيّ.

- r. posterior (= spina bifida) انشقاق السيساء الخلفي؛ السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ.

- r. totalis (= holorachschisis) إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاءِ الْكَامِل.

rachisensibility حَسَاسِيَّةٌ لِلتَّخْدِيرِ النِّخَاعِي. حالة الحساسية المفرطة الشاذة للتخدير النخاعي.

rachisensibile حَسَّاسٌ لِلتَّخْدِيرِ النِّخَاعِي. شخص ذو حساسية للتخدير النخاعي مفرطة شاذة.

rachitic رَخْدِيّ. متعلق بالرخد أو منسوب إليه.

rachitis 1. رَخْدٌ 2. إِتِهَابُ السِّنِّيَاءِ.

1. داء الرخد 2. مرض التهابي للعمود الفقاري.

radiatio شُعْ. بنية متشعبة، ويستعمل اللفظ في التشریح للدلالة على مجموعة من الألياف العصبية التي تربط أقسام الدماغ المختلفة.

الشُعْ السَّمْعِيّ. سبيل الألياف عصبية - r. acustica يبدأ من النواة الركبية الإنسية ويمر إلى الجهة الوحشية في القسم تحت العدسي من المحفظة الداخلية لينتهي في التلافيف الصدغية المستعرضة للفص الصدغي للمخ وهو سبيل للاتصالات المتبادلة ويكون السويق الذنبي للمهاد.

شُعْ الْجِسْمِ الثَّقَنِيّ. ألياف - r. corporis callosi الجسم الثَّقَنِيّ التي تنتشر إلى كل أقسام الدماغ الحديث.

شُعْ الْجِسْمِ الْمُخَطَّط. - r. corporis striati ألياف تمتد من المهاد والوطاء إلى الجسم المخطط.

الشُعْ البَصَرِيّ. سبيل ليفي عصبي - r. optica يبدأ من الجسم الركبي الوحشي ويمر إلى الجهة الوحشية خلال الجزء خلف العدسي للمحفظة الباطنة وثم يسقط للجهة الخلفية لينتهي في الباحة المخططة على السطح الإنسي للفص القذالي وعلى جهتي الثلم المهمازي. ويجهز هذا الشع ارتباطات متبادلة ويكون جزءاً من السويق الذنبي للمهاد ويسمى أيضاً السبيل الركبي المهمازي والشع المهادي القذالي.

الشُعْ الهرميّ. إسقاط الألياف - r. pyramidalis عصبية من قشرة المخ إلى السبيل الهرمي.

radiationes thalamicae anteriores الشُعَاتُ المِهادِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. الألياف المهادية القشرية للساق الخلفية للمحفظة الداخلية والتي تربط النوى الأمامية والإنسية مع قشرة الفص الجبهي.

radiationes thalamicae centrales الشُعَاتُ المِهادِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ. الألياف المهادية القشرية

للساق الخلفية للمحفظة الداخلية التي تحمل الدفعات الحسية العامة من النوى المهادية البطنية إلى التلفيف خلف المركزي وتسمى أيضاً الشُعَاتُ المهادية العلوية.

radiationes thalamicae posteriores

الشُعَاتُ المِهادِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. الألياف المهادية القشرية للقسم خلف العدسي الشكل للمحفظة الداخلية والتي تربط قشرات الفصوص القذالية والجدارية مع القسم الذنبي من المهاد.

2,1. شُعْ 3. إشعاع. radiation تباعد

من مركز مشترك 2. بنية مكونة من عناصر متباعدة مثل سبل الألياف العصبية في الدماغ 3. طاقة تنتقل بموجات خلال حيز أو خلال أحد الأوساط الناقلة كالإشعاع الكهربائي المغناطيسي.

الشُعْ - acoustic r. (= radiatio acustica) السَّمْعِيّ.

الشُعْ السَّمْعِيّ. - auditory r. (= acoustic r.)

الشُعْ - occipitalthalamic r. (= optic r.) القذالي المهادي: الشُعْ البَصَرِيّ.

الشُعْ البَصَرِيّ. - optic r. (= radiatio optica)

الشُعْ السَّقِيفِيّ. ألياف تتشعب - tegmental r. وحشياً من النواة الحمراء.

الشُعْ المِهادِيّ. سبل الألياف عصبية - thalamic r. تربط المهاد بصورة متبادلة مع قشرة المخ عن طريق المحفظة الداخلية.

الشُعْ - thalamotemporal r. (= acoustic r.) المِهادِيّ الصَّدْغِيّ: الشُعْ السَّمْعِيّ.

radiculalgia أَلَمُ الجَذَر. ألم يتولد عن مرض جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

radicectomy قَطْعُ الجَذَر. قطع جذر أو جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

radiculitis إِتِهَابُ الجَذَر. التهاب جذر أحد الأعصاب النخاعية الشوكية خاصة في الجزء الذي يقع بين النخاع الشوكي والقناة بين الفقرتين.

radiculoganglionitis إِتِهَابُ الجُذُورِ والْعُقَد. التهاب الجذر الخلفي لأعصاب النخاع الشوكي وعقدها.

radiculomedullary جَذَرِيّ نَخَاعِيّ. ما يتعلق بالجذور العصبية والنخاع الشوكي وما يصيب الجذور العصبية والنخاع الشوكي.

radiculomeningomyelitis التهاب
الجذور والسحايا والنخاع. التهاب الجذور
العصبية والنخاع الشوكي والسحايا.

radiculomyelopathy اعتلال الجذور
والنفق الفقري. اعتلال الجذور العصبية والنفق
الفقري.

**radiculoneuritis (= acute febrile
polyneuritis)** التهاب الجذور والأعصاب.
اعتلال الأعصاب الحموي الحاد.

radiculoneuropathy اعتلال الجذور
والأعصاب. اعتلال الجذور العصبية والأعصاب.

radiculopathy اعتلال الجذور العصبية.
مرض الجذور العصبية.

- spondylotic caudal r. اعتلال الجذور
العصبية الفقرية الدنيئة. انضغاط ذنب الفرس
بسبب عبوره على قناة شوكية صغيرة خلقياً والناتج
عن قسط فقاري والذي يؤدي إلى عرج أو اضطرابات
عصبية في الأطراف السفلية.

radiectomy استئصال الجذر. بتر أحد
الجذور العصبية.

radioencephalogram مخطط الدماغ
الإشعاعي. مخطط يظهر مرور النظير المشع الذي
يحقن خلال الاوعية الدماغية كما يظهرها العداد
الومضاني الخارجي.

radioencephalography تخطيط الدماغ
الإشعاعي؛ التخطيط الأسنكي للدماغ. تسجيل
تغيرات الجهود الكهربائية للدماغ من دون توصيل
جهاز التسجيل بالمريض مباشرة أو تنتقل
الإشارات بصورة موجات شعاعية من المريض
للجهاز.

radiomuscular كُفبري عضلي. عصب
يمر من العصب الكعبري إلى العضلة.

radioneuritis التهاب عصبي إشعاعي.
التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التعرض إلى أشعة
رونتجن أو أية طاقة شعاعية أخرى.

radiophobia رهَاب الإشعاع. الخوف
الشديد أو القلق من آثار التخريب الذي تولده
الأشعة السينية أو الراديوم.

radioulnar كُفبري زندي. نسبة للكعبرة
والزند.

radisectomy قطع الجذر. قطع أو بتر الجذر
العصبي.

radix (= root) جذر. الجزء السفلي من البنية
أو الجزء الذي تثبت بواسطته إحدى البنيات كجذور
الشعر أو الأظافر أو الأسنان أو الأعصاب.

- r. anterior nervorum spinalium الجذر
الأمامي للعصب النخاعي.

**- r. brevis ganglii ciliaris (= r. oculo-
motoria ganglii ciliaris)** الجذر القصير
للغدة الهدبية.

**- r. cochlearis nervi acustici (= r.
inferior nervi vestibulocochlearis)** الجذر
القوقعي للعصب السمعي.

- radices cranialis nervi accessorii
الجذور القحفية للعصب الإضافي. جذور تتصل من
النواة الملتبسة وتبرز من جانب النخاع المستطيل
بالأسفل من جذور العصب المبهم ثم تتحد مع الجذور
الشوكية في الثقبة الوداجية وتكون أليافها الفرع
الباطن الذي يتحد مع العصب المبهم وتوزع إلى
شراع الحنك (الحفاف) ومضيقات البلعوم والحنجرة.
كما أنها تسمى الجزء المبهم من العصب الإضافي.

- r. dorsalis nervorum spinalium الجذر
الظهري للعصب النخاعي. القسم الحسي من
العصب الشوكي النخاعي والذي يتصل بالنخاع
الشوكي مركزياً ثم يتحد محيطياً مع القسم البطني
(الحركي) ليكونا العصب النخاعي الذي يمر خلال
الثقبة بين الفقرتين ويحمل كل جذر ظهري عقدة
نخاعية شوكية وينقل الدفعات العصبية من المحيط إلى
الجهاز العصبي المركزي. يسمى أيضاً الجذر الخلفي
أو الحسي للعصب النخاعي.

- r. facialis (= nervus canalis pterygoidei)
الجذر الوجهي. عصب القناة الجناحية.

- r. inferior ansae cervicalis الجذر السفلي
للغزوة الرقبية. حزمة من الألياف تربط العروة
الرقبية مع فروع العصبين الرقبين الثاني والثالث.

- r. inferior nervi vestibulocohlearis
الجذر السفلي للعصب الدهليزي القوقعي.

الاستمرارية المركزية للجزء القوقعي للعصب الثامن من العقدة الحلزونية الذي يمر على الجهة الظهرية للسويقة المخيخية السفلية ليدخل الدماغ. يسمى أيضاً الجذر القوقعي للعصب السمعي.

- r. lateralis nervi mediani الجَذْرُ الْوَحْشِيُّ
لِلْعَصَبِ الْوَاصِفِ. الألياف العصبية التي يساهم بها الحبل الوحشي للضفيرة العضدية في تكوين العصب الناصف.

- r. lateralis tractus optici الجَذْرُ الْوَحْشِيُّ
لِلسَّبِيلِ الْبَصَرِيِّ. الألياف عصبية من السبيل البصري تدخل إلى الجسم الركيبي الوحشي.

- r. longa ganglii ciliaris (= r. nasociliaris ganglii ciliaris) الجَذْرُ الطَوِيلُ
لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ. الجذر الأنفي الهدبي للعقدة الهدبية.

- r. medialis nervi mediani الجَذْرُ الْإِنْسِيُّ
لِلْعَصَبِ الْوَاصِفِ. الألياف التي يساهم بها العمود الإنسي للضفيرة العضدية لتكوين العصب الناصف.

- r. medialis tractus optici الجَذْرُ الْإِنْسِيُّ
لِلسَّبِيلِ الْبَصَرِيِّ. الألياف من السبيل البصري تدخل إلى الأكمة العلوية والمنطقة أمام السقيفة.

- r. mesencephalica nervi trigemini الجَذْرُ الْوَحْشِيُّ
(= tractus mesencephalicus nervi trigemini) الجَذْرُ الدِّمَاغِي الْمَتَوَسِّطِي لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ.

- r. motoria nervi trigemini الجَذْرُ الْحَرَكِيُّ
لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. أصغر الجذرين اللذين يتصل بواسطتهما العصب الثلاثي التوائم بالجسر، وهو يحوي أليافاً مستقبلية حسية عميقة وأليافاً حركية وهو يمر تحت عقدة ثلاثي التوائم ليتصل بالعصب الفك السفلي. كما أنه يسمى القسم الأصفر للعصب الثلاثي التوائم.

- r. motoria nervorum spinalium (= r. ventralis nervorum spinalium) الجَذْرُ الْحَرَكِيُّ
لِلْعَصَبِ الثَّخَاعِيِّ.

- r. nasociliaris ganglii ciliaris الجَذْرُ الْأَنْفِيُّ
الْهَدَبِيِّ لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ. ألياف حسية من القرنية والقرحية والجسم الهدبي والمشمية تمر خلال العقدة الهدبية إلى العصب الأنفي الهدبي. وهي تسمى أيضاً الجذر الطويل أو الحسي للعقدة الهدبية.

- r. nervi facialis جَذْرُ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ.

يتكون من الألياف تمر من نواة العصب الوجهي إلى الأكمة الوجهية ومنها إلى الوجه البطني للجزء السفلي من الجسر.

- r. oculomotoria ganglii ciliaris جَذْرُ مُحَرِّكِ
الْعَيْنِ لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ. مجموعة قصيرة من الألياف تمر من الفرع السفلي للعصب محرك العين إلى القسم السفلي الخلفي من العقدة الهدبية. وهو يحوي أليافاً لا ودية قبل عقدية للعضلتين مضيقية الحدقة والهدبية وهو يسمى أيضاً الجذر القصير للعقدة الهدبية.

- r. parasympathetica ganglii ciliaris الجَذْرُ
(= r. oculomotoria ganglii ciliaris) الْوَدَوِيُّ لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ.

- r. sensoria nervi trigemini الجَذْرُ الْحِسِّيُّ
لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. أكبر الجذرين اللذين يتصل بواسطتهما العصب الثلاثي التوائم بالجسر وهو يحوي أليافاً حسية ويتوسع إلى عقدة مسطحة كبيرة (عقدة ثلاثي التوائم) التي تعطي الأعصاب العيني والفكي السفلي والفكي العلوي.

- r. sensoria nervorum spinalium (= r. dorsalis nervorum spinalium) الجَذْرُ الْحِسِّيُّ
لِلْعَصَبِ الثَّخَاعِيِّ: الجذر الظهراني للعصب الثخاعي.

- radices spinales nervi accessorii الجُذُورُ
الثَّخَاعِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ. الألياف تتصل من المادة السنجابية للثخاع الشوكي وتبرز من جانبه حتى المستوى بين العصبين العنقيين الثالث والرابع وتكون جذعاً يصعد في القناة الفقرية ويمر خلال الثقبة العظمى ويتحد مع القسم القحفي للعصب في الثقبة الوداجية. وتكون هذه الألياف الفرع الظاهر الذي يغذي العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

- r. superior ansae cervicalis الجَذْرُ الْعُلَوِيُّ
لِلْعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّةِ. ألياف من العصب الرقبي الأول أو الثاني تهبط مرافقة للعصب تحت اللساني وتربطه مع العروة الرقبية وتغذي العضلة تحت اللامية وتسمى أيضاً الفرع الهابط للعصب تحت اللساني.

- r. superior nervi vestibulocochlearis الجَذْرُ الْعُلَوِيُّ
(= r. vestibularis nervi vestibulocochlearis) لِلْعَصَبِ الْدِهْلِيْزِيِّ الْقُوقَعِيِّ.

الجَذَرُ الْوُدِّي r. sympathica ganglii ciliaris
لِلْعُقْدَةِ الْهَدْيِيَّةِ. الياف بعد عقدية من العقدة الرقبية العلوية مشتقة من الضفيرة السباتية الباطنة تمر إلى العقدة الهدبية لتتوزع كاعصاب هدية قصيرة إلى العضلة موسعة الحدقة والعضلة الحاجبية والعضلات الجفنية والاوغية الدموية للعين.

r. sympathica ganglii submaxillaris
(= ramus sympathicus ad ganglion submandibularis) **الجَذَرُ الْوُدِّي لِلْعُقْدَةِ تَحْتَ الْفَكِّةِ الْعُلْوِيَّةِ.**

r. ventralis nervorum spinalium **الجَذَرُ الْبَيْطَنِيُّ لِلْعَصَبِ الْنَخَاعِيِّ.** القسم الحركي من العصب النخاعي يتصل مركزياً بالنخاع الشوكي ويتصل طرفياً مع نظيره الجذر الظهري (الحسي) ليكونا العصب الذي يبرز من الثقب بين الفقرتين. وهو يحوي أليافاً حركية إلى العضلات الهيكلية وأليافاً ذاتية قبل عقدية في المستويات الصدرية والقطنية والعجزية. ويسمى أيضاً الجذر الامامي او الحركي للعصب النخاعي.

r. vestibularis nervi vestibulocochlearis **الجَذَرُ الدَّهْلِيْزِيُّ لِلْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ الْقَوَقَعِيِّ.** الاستمرارية المركزية للعصب الدهليزي من العقدة الدهليزية ويدخل الدماغ مباشرة على الجهة الوحشية للعصب المتوسط وامام السويقة المخيخية السفلية. ويسمى أيضاً الجذر العلوي للعصب الدهليزي القوقعي.

rage استِسْطَاظَة؛ غَيْظٌ. حالة غضب شديد.

- sham r. استِسْطَاظَة كاذبة؛ غَيْظٌ كاذِبٌ. حالة سلوكية تتصف بالغضب الشديد تظهر في الحيوانات منزوعي قشرة المخ شبيهة بالخوف الشديد مع الغضب وقد تظهر حالة شبيهة بذلك عند الإنسان في حالة نقص سكر الدم المولّد بالانسولين أو التسمم بأحادي أكسيد الكربون.

ramicotomy (= ramisection) قَطْعُ الْفُرُوعِ.

ramisection قَطْعُ الْفُرُوعِ. عملية قطع الفروع الاتصالية للجهاز العصبي الودي بعضها أو كلها.

ramisectomy (= ramisection) قَطْعُ الْفُرُوعِ.

ramitis الْتِهَابُ الْفُرْعِ. التهاب أحد الفروع.

ramus فَرْعٌ. (ج. فُرُوعٌ). مصطلح عام لبنية صغيرة تتفرع من أخرى كبيرة.

- rami alveolares superiores anteriores nervi infraorbitalis **الْفُرُوعُ السِّنْخِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَجَاجِيِّ.** فروع من العصب تحت الحاجبي تغذي الاسنان القواطع والانياب في الفك العلوي وتساعد في ذلك فروع من الضفيرة السنية العلوية كما أنها تغذي قاع الأنف. وهي أعصاب حسية عامة.

- r. alveolaris superior medius nervi infraorbitalis **الْفُرْعُ السِّنْخِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَجَاجِيِّ.** فرع من العصب تحت الحاجبي يغذي الاسنان الضاحكة للفك العلوي عن طريق الضفيرة السنية العلوية، وهو عصب حسي عام.

- rami alveolares superiores posteriores nervi maxillaris **الْفُرُوعُ السِّنْخِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلْوِيِّ.** فروع عصبية تغذي جيب الفك العلوي والرجة واللثة والاسنان الضاحكة والرجى في الفك العلوي وتكون جزءاً من الضفيرة السنية العلوية وهي أعصاب حسية عامة.

- r. anastomoticus (= r. communicans) فَرْعٌ تَفَاعُغَرِيٌّ؛ فَرْعٌ اتِّصَالِيٌّ. فرع يوصل أحد الاعصاب بعصب آخر.

- r. anterior ascendens fissurae cerebri lateralis (sylvii) (= r. ascendens sulci lateralis cerebri) الْفُرْعُ الْأَمَامِي الصَّاعِدُ لِلشَّقِّ الْمَخِي الْوَحْشِيِّ (السِّلْفِيِّ).

- r. anterior horizontalis fissurae cerebri lateralis (= r. anterior sulci lateralis cerebri) الْفُرْعُ الْأَمَامِي الْأَفْقِي لِلشَّقِّ الْمَخِي الْوَحْشِيِّ.

- r. anterior nervi auricularis magni الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْأُذْنِيِّ الْكَبِيرِ. عصب يتوزع إلى جلد الوجه فوق الغدة النكفية وهو عصب حسي عام.

- rami anteriores nervorum cervicalium (= rami ventrales nervorum cervicalium) الْفُرُوعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ.

- r. anterior nervi coccygel (= r. ventralis nervi coccygel) الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ

لِلْعَصَبِ الْغُصَصِيِّ.

- r. anterior nervi cutanei anterbrachii
الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْجَنْدِيِّ (medialis)
الإنسيّ للسَّاعِد. عصب يغذي جلد الجهتين الامامية
والإنسية للساعد وهو عصب حسي عام.
- r. anterior nervi laryngei inferioris
الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ.
- rami anteriores nervorum lumbalium
(= rami ventrales nervorum lumbalium)
الْفُرْعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْقَطْنِيَّةِ.
- r. anterior nervi obturatorii
الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ السِّدَائِيِّ. عصب يغذي العضلات الرشيقة
والمقربتين الطويلة والقصيرة والعانية ويعطي أحياناً
فرعاً للجهة الإنسية من الفخذ والساق وهو عصب
حركي وحسي عام.
- rami anteriores nervorum sacralium
(= rami ventrales nervorum sacralium)
الْفُرْعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْعَجَزِيَّةِ.
- r. anterior nervorum spinalium (= r.
ventralis nervorum spinalium) الْفُرْعُ
الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ النَّخَاعِيِّ.
- rami anteriores nervorum thoracalium
(= rami ventrales nervorum
thoracorum) الْفُرْعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ
الصَّدْرِيَّةِ.
- r. anterior ramorum cutaneorum
lateralium (pectoralium et abdominal-
lum) nervorum intercostalium الْفُرْعُ الْأَمَامِيُّ
لِلْفُرْعِ الْجِلْدِيَّةِ الْوَحْشِيَّةِ لِلْعَصَبِ الْوَرَبِيِّ (بَيْنَ
الأضلاع).
- r. anterior sulci lateralis cerebri الْفُرْعُ
الْأَمَامِيُّ لِلتَّلَمِ الْوَحْشِيِّ الْمُخِّي. تلم يسير إلى الامام
لمسافة قصيرة إلى التلفيف الجبهي السفلي ويسمى
أيضاً الفرع الأمامي للتشق المخي الوحشي.
- r. ascendens sulci lateralis cerebri الْفُرْعُ
الصَّاعِدُ لِلتَّلَمِ الْوَحْشِيِّ الْمُخِّي. تلم يجري إلى
الأعلى لمسافة قصيرة حتى التلفيف الجبهي السفلي.
- r. auricularis nervi vagi الْفُرْعُ الْأُذُنِي
لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فرع ينبع من العقدة العلوية للعصب
المبهم ويغذي السطح القحفي للآذن وقاع الصماخ

السمعي الظاهر والمنطقة المجاورة من غشاء الطبل
وهو عصب حسي عام.

- rami bronchiales anteriores nervi vagi
الْفُرْعُ الْقَصْبِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.
- rami bronchiales nervi vagi الْفُرْعُ
الْقَصْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع العصب المبهم التي
تغذي القصبات والأوعية الدموية الرئوية بصورة
مباشرة عن طريق القسمين الامامي والخلفي للضفيرة
الرئوية وهي اعصاب ودية وحشوية واردة.
- rami buccales nervi facialis الْفُرْعُ
الشفويَّة لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ. فروع تغذي العضلات
الرجنية ورافعة الشفة العلوية والمبوقة والفم الدويرية
وهي اعصاب حركية وحسية عامة.
- rami calcanei laterales nervi suralis
الْفُرْعُ الْعَقْبِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرُّبْلِيِّ. فروع
تغذي جلد خلف الساق والجهة الوحشية للقدم والعقب
وهي اعصاب حسية عامة.
- rami calcanei mediales nervi tibialis
الْفُرْعُ الْعَقْبِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ. فروع
تغذي الجهة الإنسية للعقب والقسم الخلفي من
الايخص وهي اعصاب حسية عامة.
- rami capsulae internae الْفُرْعُ الْمَحْفَظَةُ
الدَّاخِلِيَّةُ. فروع صغيرة من الشريان المشيمائي
الامامي تغذي المحفظة الداخلية.
- rami cardiaci cervicales inferiores
nervi recurrentis (= rami cardiaci
cervicales inferiores nervi vagi) الْفُرْعُ
الْقَلْبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّاجِعِ.
- rami cardiaci cervicales inferioris
nervi vagi الْفُرْعُ الْقَلْبِيَّةُ الرَّقْبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ
لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع (تسمى أحياناً الرقبية
الصدرية) تنبع من العصبين المبهمين ومن العصب
الحنجري الراجع في مدخل الصدر وتتحد مع الاعصاب
الرقبية الصدرية الودية القلبية ويمر العصب الموحد
منهما إلى الضفيرة القلبية وهي اعصاب لا ودية
وحشوية واردة. وتسمى أيضاً الفروع القلبية السفلية
للعصب الحنجري الراجع.
- rami cardiaci cervicales superiores
nervi vagi الْفُرْعُ الْقَلْبِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَصَبِ
الْمُبْهَمِ. فروع مختلفة تنبع من العصب المبهم في

المنطقة الرقبية وعادة ما تتصل بالأعصاب الودية الرقبية ومن ثم تنزل هذه الأعصاب المتحدة أمام أو خلف قوس الأبر إلى الضفيرة القلبية وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

- rami cardiacii inferiores nervi

recurrentis (= rami cardiacii cervicales inferiores nervi vagi) الفروع القلبية السفلية للعصب الراجع.

- rami cardiacii thoracici nervi vagi الفُزْعُ القَلْبِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع تنبع في الصدر من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر والعصب الحنجري الراجع الأيسر وتسير مباشرة إلى الجدران الخلفية للرازيين وإلى الضفائر التاجية والرئوية الأمامية.

- rami celiacii nervi vagi (= rami coeliacii nervi vagi) الفُزْعُ البَطْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.

- rami coeliacii nervi vagi الفُزْعُ البَطْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع تنبع من الجذعين المبهمين الأمامي والخلفي وتتحد مع الضفيرة البطنية وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

- r. colli nervi facialis الفُزْعُ الرَقْبِيُّ لِلْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. فرع عصبي يقع تحت العضلة الجذلية للعنق التي يغذيها باللياف حركية.

- r. communicans الفُزْعُ مُوَصَّل. 1. فرع عصبي يوصل عصبين 2. فرع يوصل شرياني.

- r. communicans albus الفُزْعُ المُوَصَّل الأبيض. ألياف عصبية بيضاء مغمدة قبل عقدية تجري من العقد الودية إلى الجذور البطنية والظهرية للأعصاب النخاعية.

- r. communicans cochlearis الفُزْعُ المُوَصَّل القَوَاقِعِي. فرع من العصب الدهليزي يتحد مع العصب القوقعي.

- r. communicans fibularis nervi الفُزْعُ الشَطْوِي fibularis communis المُوَصَّل لِلْعَصَبِ الشَطْوِيِّ الْأَصْلِيِّ. فرع صغير ينبع من العصب الشطوي الأصلي إما مع العصب الجذلي الربلي الوحشي أو بصورة منفصلة، ثم يتصل مع العصب الجذلي الربلي الإنسي ليكونا العصب الربلي.

- r. communicans ganglii ciliaris cum nervo nasocillari الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ

الْهَدَبِيَّةِ مَعَ الْعَصَبِ الْأَنْفِيِّ الْهَدَبِيِّ. فرع أو فروع تحمل اليافاً عصبية حسية من القرنية والقزحية والجسم الهدبي والمشيماء ويمر خلال العقدة الهدبية إلى العصب الأنفي الهدبي. ويسمى أيضاً الجذر الحسي للعقدة الهدابوية.

- r. communicans ganglii otici cum chorda tympani الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ الْأُذُنِيَّةِ مَعَ جُذْع الطَّبَل. فرع عصبي صغير يربط العقدة الأذنية مع عصب حبل الطبل.

- r. communicans ganglii otici cum nervo auriculotemporalis الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ الْأُذُنِيَّةِ مَعَ الْعَصَبِ الْأُذُنِيِّ الصَّدْغِيِّ. فرع يحمل اليافاً لا ودية بعد عقدية من العقدة الأذنية إلى العصب الأذني الصدغي لتتوزع إلى الغدة النكفية.

- r. communicans ganglii otici cum nervo pterygoideo mediali الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ الْأُذُنِيَّةِ مَعَ الْعَصَبِ الْجَنَاحِيِّ الْإِنْسِيِّ. فرع من العصب الجناحي الإنسي يتصل مع العقدة الأذنية.

- r. communicans ganglii otici cum ramo meningeo nervi mandibularis الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ الْأُذُنِيَّةِ مَعَ الْفُزْعِ السَّحَائِيِّ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ. فرع يحمل اليافاً مستقلة متوجهة للسحايا من العقدة الأذنية إلى الفرع السحائي من العصب الفكي السفلي.

- rami communicantes ganglii submandibularis cum nervo linguale الفُزْعُ المُوَصَّل لِلْعُقْدَةِ تَحْتَ الْفَكِّيَّةِ السُّفْلِيَّةِ مَعَ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ. فروع عصبية تربط العصب اللساني مع العقدة تحت الفككية السفلية التي تتعلق بواسطتها من العصب وهي تنقل اليافاً قبل عقدية مشتقة من حبل الطبل وتتشابك مع ألياف بعد عقدية في العقدة تحت الفككية السفلية وتسمى أيضاً الجذور الحركية للعقدة تحت الفككية السفلية.

- r. communicans griseus الفُزْعُ المُوَصَّل السِّنْجَابِي. أي من الألياف العصبية غير المغمدة وبعد العقدية التي تسير من العقد الودية كالألياف الحشوية الصادرة التي تغذي الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الملساء.

- r. communicans griseus ganglii sympathetici الفُزْعُ السِّنْجَابِي المُوَصَّل

للعقدة الودية. أحد الفرعين العصبيين الموصلين بين العقدة الودية والعصب الشوكي وهو ينقل الدفعات بعد العقدة إلى العصب الشوكي ثانية وثم ليوصل إلى الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الملساء.

- rami communicantes nervi

auriculotemporalis cum nervo faciali

الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِي الصَّدْغِي مَعَ الْعَصَبِ الْوَجْهِي. فروع تحوي أليافاً حسية من العصب الأذني الصدغي تتصل بالعصب الوجهي في داخل الغدة النكفية لتنتشر مع فروعها الأخرى.

- r. communicans nervi facialis cum

nervo glossopharyngeo الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ

لِلْعَصَبِ الْوَجْهِي مَعَ اللِّسَانِي الْبَلْعُومِي. فرع يربط العصب اللساني البلعومي مع العصب الوجهي بعد خروج الأخير من الثقبة الإبرية الخشائية.

- r. communicans nervi facialis cum

plexus tympanicus الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ

الْوَجْهِي مَعَ الضَّفِيرَةِ الطَّبْلِيَّة. فرع يربط العصب الوجهي مع الضفيرة الطبلية للعصب اللساني البلعومي.

- r. communicans nervi glossopharyngei

cum ramo auricularis nervi vagi الْفَرْعُ

الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِي الْبَلْعُومِي مَعَ الْفَرْعِ الْأَذْنِي لِلْعَصَبِ الْمُبْهَم.

- r. communicans nervi intermedii cum

nervo vagi الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ الْمُتَوَسِّطِ

مَعَ الْعَصَبِ الْمُبْهَم.

- r. communicans nervi intermedii

cum plexus tympanicus الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ

لِلْعَصَبِ الْمُتَوَسِّطِ مَعَ الضَّفِيرَةِ الطَّبْلِيَّة.

- r. communicans nervi lacrimalis cum

nervo zygomatico الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ

الذَّمْعِي مَعَ الْعَصَبِ الْوَجْهِي. فرع يحمل أليافاً لا ودية بعد عقدة يتأصل في العقدة الجناحية الحنكية ويتجه نحو الغدة الدمعية.

- r. communicans nervi laryngei inferi-

oris cum ramo laryngeo interno الْفَرْعُ

الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ مَعَ الْفَرْعِ الْحَنْجَرِيِّ الْغَائِرِ. فرع صغير يربط العصب الحنجري

السفلي مع الفرع الباطن للعصب الحنجري العلوي خلف أو في العضلة الحلقية الطرجهالية.

- r. communicans nervi laryngei

superioris cum nervo laryngeo inferiore

الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ الْعُلِيِّ مَعَ الْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ. فرع صغير يربط الفرع الباطن للعصب الحنجري العلوي مع العصب الحنجري السفلي خلف أو في العضلة الحلقية الطرجهالية.

- r. communicans nervi lingualis cum

chorda tympani الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ

اللِّسَانِي مَعَ الْحَبْلِ الطَّبْلِيِّ. الحبل الطبلي عند اتصاله بالعصب اللساني في الحفرة تحت الصدغية بالجهة الانسية من العضلة الجناحية الوحشية وهو عصب لا ودي وحسي خاص.

- rami communicantes nervi lingualis

cum nervo hypoglosso الْفُرُوعُ الْمُوَصَّلَةُ

لِلْعَصَبِ اللِّسَانِي مَعَ الْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِي. فروع انتهائية ضفيرية الشكل تربط العصب اللساني مع العصب تحت اللساني مباشرة أمام العضلة تحت اللسانية.

- r. communicans nervi mediani cum

nervo ulnari الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ

مَعَ الْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فرع صغير يعبر العضلة المثبتة للأصابع العميقة يربط العصب الناصف بالعصب الزندي.

- rami communicantes nervorum

spinalium الْفُرُوعُ الْمُوَصَّلَةُ لِلْأَعْصَابِ

النَّخَاعِيَّة. فروع تربط الأعصاب النخاعية الشوكية مع العقد الودية حيث يستلم كل عصب نخاعي فرعاً موصلاً سنجابياً كما تستلم الأعصاب الصدرية والقلبية بالإضافة لذلك فروعاً موصلة بيضاء.

- r. communicans nervi vagi cum nervo

glossopharyngeo الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ

الْمُبْهَم مَعَ الْعَصَبِ اللِّسَانِي الْبَلْعُومِي. فرع صغير يربط الفرع الأذني للعصب المبهم مع العصب اللساني البلعومي.

- r. communicans peroneus nervi

peronei communis (= r. communicans

fibularis nervi fibularis communis)

الْفَرْعُ الْمُوَصَّلُ لِلْعَصَبِ الشَّظْوِيِّ الْأَصْلِيِّ.

- r. communicans ulnaris nervi radialis

الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ الزَّنْدِي لِلْعَصَبِ الْكُفْبَرِيِّ. فرع صغير في اليد يربط العصب الاصبعي الظهري الإنسي من الفرع السطحي للعصب الكعبري مع العصب الاصبعي الظهري الوحشي المجاور من الفرع الظهري للعصب الزندي.

- rami cutanei anteriores nervi

الْفُرُوعُ الْجِلْدِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ femorales الْفَخْذِيِّ. ألياف عصبية تغذي الجلد على الوجهين الأمامية والإنسية للفخذ والرضفة وتساهم في تكوين الضفيرتين الرضفية وتحت الخياطية وهي الألياف حسية عامة.

- r. cutaneus anterior nervi

iliohypogastrici الْفَرْعُ الْجِلْدِيُّ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْحَرْقَقِيِّ الْخَلْطِيِّ. فرع يسير إلى الأمام بين العضلتين المائلتين الظاهرة والباطنة ويغذي الجلد فوق العانة وهو عصب حسي عام.

- r. cutaneus anterior (pectoralis/ abdominalis) rami ventralis nervi thoracici

الْفَرْعُ الْجِلْدِيُّ الْأَمَامِيُّ (الصدرِيّ والبطنيّ) لِلْفُرُوعِ الْبَطْنِيَّةِ لِلْأَعْصابِ الصَّدْرِيَّةِ. فرع يساعد في تغذية جلد المناطق الأمامية الإنسية للبطن والصدر بالاشتراك مع الفروع الثديية الإنسية التي تتفرع في منطقة الثدي وهي أعصاب حسية عامة.

- r. cutaneus lateralis nervi

iliohypogastrici الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ الْجِلْدِيُّ لِلْعَصَبِ الْحَرْقَقِيِّ الْخَلْطِيِّ. فرع يتوزع على جانب الالية وهو عصب حسي عام.

- r. cutaneus lateralis (pectoralis/ abdominalis) nervorum intercostalium

الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ الْجِلْدِيُّ (الصدرِيّ والبطنيّ) لِلْعَصَبِ الْوَرَبِيِّ.

- r. cutaneus lateralis (pectoralis/ abdominalis) ramorum ventralium nervorum thoraciorum

الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ الْجِلْدِيُّ (الصدرِيّ والبطنيّ) لِلْفَرْعِ الْبَطْنِيِّ لِلْعَصَبِ الصَّدْرِيِّ. تنقسم الفروع الوحشية الوربية إلى قسمين أمامي وخلفي ليغذيا الجلد على جهتي الجسم الوحشية والخلفية وهي فروع حسية عامة.

- r. cutaneus lateralis ramorum

dorsalium nervorum thoraciorum

الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ الْجِلْدِيُّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصابِ الصَّدْرِيَّةِ. الفرع الوحشي من القسمين الانتهايين للفرع الظهري من كل من الأعصاب الصدرية والذي يغذي العضلة الرافعة للذراع ثم العضلات الصدرية الطويلة والقطنية الضلعية الصدرية. أما الفروع السفلية من هذه الأعصاب فإنها تنقب العضلة العريضة الظهرية وتغذي جلد الظهر.

- r. cutaneus medialis ramorum

dorsalium nervorum thoraciorum

الْفَرْعُ الْإِنْسِيُّ الْجِلْدِيُّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصابِ الصَّدْرِيَّةِ. الفرع الإنسي للقسمين الانتهايين من الفرع الظهري الصدري. وتغذي الفروع العلوية من هذه الأعصاب جلد الظهر أما الفروع السفلية فإنها تغذي العضلة الناصبة للفقرار كما تغذي المجموعتان السحقا والأوتار والمفاصل المجاورة.

الْفَرْعُ الْجِلْدِيُّ r. cutaneus nervi obturatorii لِلْعَصَبِ السِّدَائِيِّ. فرع ينبع من الفرع الأمامي للعصب السدادي مكوناً جزءاً من الضفيرة تحت الخياطية ويغذي جلد الناحية الإنسية للفخذ والساق وهو عصب حسي عام.

- r. cutaneus palmaris nervi ulnaris

الْفَرْعُ الرَّاجِعِيُّ (= r. palmaris nervi ulnaris) لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.

- rami dentales inferiores plexus

الْفُرُوعُ السِّنِّيَّةُ السُّفْلِيَّةُ dentalis inferioris لِلْضَفِيرَةِ السِّنِّيَّةِ السُّفْلِيَّةِ. فروع تغذي الأسنان السفلية بأعصاب حسية عامة.

- rami dentales superiores plexus

الْفُرُوعُ السِّنِّيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ dentalis superioris لِلْضَفِيرَةِ السِّنِّيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ. فروع تغذي الأسنان العلوية بأعصاب حسية عامة.

- r. descendens nervi hypoglossi (= radix superior ansae cervicalis)

الْفَرْعُ النَّازِلُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِ. الجذر العلوي للعروة الرقبية.

فَرْعُ ذَاتِ digastricus nervi facialis الْبَطْنَيْنِ لِلْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. فرع يغذي البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين بألياف حركية ويسمى عصب ذات البطنين.

- r. dorsalis manus nervi ulnaris (= r.

dorsalis nervi ulnaris) الْفَرْعُ الظَّهْرِيُّ الْيَدَوِيُّ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.

- rami dorsales nervorum cervicalium

الْفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ. الفروع الظهرية للأعصاب الرقبية الثمانية.

- r. dorsalis nervi coccygei

الْفَرْعُ الظَّهْرِيُّ لِلْعَصَبِ الْغُضُفِيِّ. الفرع الظهري للعصب النخاعي الأخير الذي يساعد في تغذية الجلد الذي يغطي العنصر باللياف حسية عامة.

- rami dorsales nervorum lumballium

الْفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْقَطَنِيَّةِ. الفروع الظهرية للأعصاب القطنية الخمسة.

- rami dorsales nervorum sacralium

الْفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْعُجْزِيَّةِ. الفروع العصبية الظهرية للأعصاب العجزية الخمسة.

- r. dorsalis nervorum spinalium

الْفَرْعُ الظَّهْرِيُّ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ. أصغر الفرعين الرئيسيين التي يتفرع لهما العصب النخاعي الشوكي عند مجرد ظهوره من الثقب بين الفقرتين وتغذي الفروع الظهرية الجلد والعضلات والمفاصل وعظام المنطقتين الخلفيتين للرقبة والظهر وينقسم عادة كل فرع ظهري إلى قسم إنسي وآخر وحشي.

- rami dorsales nervorum thoraciorum

الْفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ. الفروع العصبية الظهرية للأعصاب الصدرية الإثنى عشر.

- r. dorsalis nervi ulnaris

الْفَرْعُ الظَّهْرِيُّ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فرع جلدي كبير يتأصل من العصب الزندي ويمر إلى الجزء الأسفل من الساعد إلى الجهة الإنسية من ظهر اليد حيث ينقسم إلى ثلاثة وأحياناً إلى أربعة أعصاب ظهرية أصبعية ويسمى أيضاً الفرع الظهري اليدوي للعصب الزندي وهو عصب حسي.

- r. externus nervi accessorii

الْفَرْعُ الظَّاهِرُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ. فرع العصب الإضافي القحفي الحادي عشر الذي ينبع من الجذور النخاعية للعصب ويرسل فروعاً عضلية لتغذية العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

- r. externus nervi laryngei superioris

الْفَرْعُ الظَّاهِرُ لِلْعَصَبِ الْحَنَجَرِيِّ الْعُلَوِيِّ. أصغر الفرعين اللذين ينقسم لهما العصب الحنجري العلوي والذي ينزل تحت غطاء العضلة القصية الدرقية ويغذي العضلتين الحلقية الدرقية ومضيقة البلعوم السفلية وهو عصب حركي.

- rami fauciales nervi lingualis (= rami isthmi faucium nervi lingualis)

الْفُرُوعُ الْحَلْقِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ.

- r. femoralis nervi genitofemoralis

الْفَخْذِيُّ لِلْعَصَبِ التَّنَاسُلِيِّ الْفَخْذِيِّ. فرع يتكون من انقسام العصب التناسلي الفخذي فوق الرباط الإربي ثم يدخل الغمد الفخذي ويدور إلى الامام ليفذي جلد المثالث الفخذي وهو عصب حسي عام.

- r. frontalis nervi frontalis

الْفَرْعُ الْجَبْهِيُّ لِلْعَصَبِ الْجَبْهِيِّ.

- rami ganglionares nervi lingualis

الْفَقْدِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ. اليااف عصبية تربط العصب اللساني بالعقدة تحت اللسانية.

- rami ganglionares nervi maxillaris

الْفُرُوعُ الْعُقْدِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلَوِيِّ. اليااف عصبية تربط العصب الفكي العلوي بالعقدة الجناحية الحنكية.

- r. ganglionis trigemini

الْفَرْعُ الْعُقْدِيُّ لِلثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. فرع صغير من الجزء الكهفي من الشريان السباتي الباطن يغذي العقدة ثلاثية التوائم.

- rami gastrici anteriores nervi vagi

الْفُرُوعُ الْمَعِدِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع تنبع من الجذع الأمامي للعصب المبهم بالقرب من النهاية الفؤادية للمعدة وتغذي الوجه الأمامي للحنية المعدية الصغرى والسطح الأمامي للمعدة حتى البواب تقريباً، وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

- rami gastrici nervi vagi

الْفُرُوعُ الْمَعِدِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.

- rami gastrici posteriores nervi vagi

الْفُرُوعُ الْمَعِدِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع تنبع من الجذع الخلفي للمبهم بالقرب من النهاية الفؤادية وتغذي الفومة الفؤادية وقاع المعدة وأثناحية الخلفية للحنية المعدية الصغرى والوجه الخلفي للمعدة حتى غار البواب وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

- r. genitalis nervi genitofemoralis

الْتَّنَاسُلِيُّ لِلْعَصَبِ التَّنَاسُلِيِّ الْفَخْذِيِّ. فرع ينبع من العصب التناسلي الفخذي فوق الرباط الأربي ثم يدخل القناة الأربية خلال الحلقة العميقة ويغذي العضلة المشمّرة ثم يستمر ليفذي جلد الصفن أو الشفر الكبير

ومناطق الفخذ المجاورة له وهو عصب حركي وحسي عام.

- rami gingivales inferiores plexus

الْفُرُوعُ اللُّوَيَّةُ السُّفْلِيَّةُ dentalis inferioris
لِلضَفِيرَةِ السَّنِّيَّةِ السُّفْلِيَّةِ. فروع تنبع من الضفيرة السننية العلوية وتغذي لثة الفك الأسفل بأعصاب حسية عامة.

- rami glandulares ganglii

الْفُرُوعُ الغُدِّيَّةُ لِلْعُقْدَةِ submandibularis
تحت **الفَكِّيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. فروع قصيرة تجري من العقدة تحت الفك السفلي لتغذي الغدة تحت الفك السفلي وهي تحمل أليافاً لا ودية بعد عقدية (الأليافاً إفرازية) من هذه العقدة والأليافاً ودية بعد عقدية من العقدة الرقبية العلوية.

- rami hepatici nervi vagi

الْفُرُوعُ الكَبِدِيَّةُ لِلْعَصَبِ المَبْهَمِ. فروع (وأحياناً فرع واحد) تنبع من الجذع الأمامي للمبهم تسير إلى الضفيرة الكبدية وتساعد في تغذية الكبد والمرارة والبنكرياس والبواب والإثنا عشري، وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

- rami inferiores nervi cutanei colli

(= rami inferiores nervi transversi colli)
الْفُرُوعُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الجِلْدِيِّ الرَّقْبِيِّ.

- r. inferior nervi oculomotorii

الْفَرْعُ السُّفْلِيُّ لِلْعَصَبِ المُحَرِّكِ للعينين. فرع العصب المحرك للعين الذي يغذي العضلات المستقيمة السفلية والإنسية والمائلة السفلية للعين ويغذي من خلال الجذر الحركي للعقدة الهدبية الذي يمر إلى الأعصاب الهدبية القصيرة العضلات مضيقفة الحدقة والهدبية وهو عصب حركي ولا ودي.

- rami inferiores nervi transversi colli

الْفُرُوعُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّقْبِيِّ المُسْتَعْرِضِ. أوطأ الفروع العصبية التي تنبع من العصب الرقبى المستعرض قرب الحافة الأمامية للعضلة القصية الترقوية الخشائية ويغذي الجلد والأنسجة تحت الجلدية في المنطقة الرقبية الأمامية بأعصاب حسية عامة.

- r. infrapatellaris nervi sapheni

الْفَرْعُ تحت الرضفة للعصب الصافن. فرع عصبي يجري إلى الجهة السفلية الوحشية من العصب الصافن إلى الضفيرة الرضفية وهو عصب حسي عام.

الْفُرُوعُ بَيْنَ الْعُقَدِ - rami Interganglionares
فروع عصبية تربط عقد الجذع الودي.

الْفَرْعُ الغَائِرُ r. internus nervi accessorii
لِلْعَصَبِ الإِضَافِيِّ. الفرع العصبي الذي يستمر من الجذور القحفية للعصب الإضافي حاملاً أليافاً حركية تنتشر عن طريق فروع العصب المبهم إلى شراع الحنك (الحقاف) ومضيقات البلعوم والحنجرة.

- r. Internus nervi laryngel superioris

الْفَرْعُ الغَائِرُ لِلْعَصَبِ الحَنَجَرِيِّ العُلْوِيِّ. أكبر الفرعين من العصب الحنجري العلوي الذي يغذي الغشاء المخاطي للفلكة (لسان المزمار) وقاعدة اللسان والحنجرة وهو عصب حسي عام.

- rami isthmi faucium nervi lingualis

الْفُرُوعُ البَرَزَخِيَّةُ الخَلْقِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ. فروع من العصب اللساني إلى برزخ الحلق لتغذيه بأعصاب حسية عامة. وهي تسمى أيضاً الفروع الحلقية للعصب اللساني.

- rami labiales inferiores nervi mentalis

الفروع الشفوية السفلية للعصب الذقني. فروع من العصب الذقني تغذي الشفة السفلية بأعصاب حسية عامة.

- rami labiales superiores nervi

الْفُرُوعُ الشفوية العلوية للعصب infraorbitalis
تحت **الحَاجَاجِيِّ**. فروع من العصب تحت الحاجاجي تنتشر إلى الأغشية المخاطية للقم ولجلد الشفة العليا وتغذيها بأعصاب حسية عامة.

- rami laryngopharyngeal ganglii

الْفُرُوعُ الحَنَجَرِيَّةُ cervicalis superioris
الْبَلْعُومِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الرَّقْبِيَّةِ العُلْوِيَّةِ. فروع من العقدة الرقبية العلوية إلى الحنجرة وجدار البلعوم وتغذيها بالألياف ودية.

- r. lateralis nervi supraorbitalis

الْفَرْعُ الوَحْشِيُّ لِلْعَصَبِ فَوْقَ الحَاجَاجِيِّ. فرع يغذي الجيب الجبهي والجفن العلوي وجلد الجبهة وأنسجتها تحت الجلدية والجهة الوحشية للفرقة حتى منطقة الصدغ وهو فرع حسي عام.

- r. lateralis ramorum dorsallum

الْفَرْعُ الوَحْشِيُّ لِلْفُرْعِ nervorum cervicalium الظَّهْرِيِّ لِلْأَعْصَابِ الرَّقْبِيَّةِ. الفرع الوحشي الذي ينبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب الرقبية الثمان ويغذي العضلات المجاورة.

- r. lateralis ramorum dorsalium nervorum lumbalium الفرع الوحشي للفرع الظهري

للأعصاب القطنية. الفرع الذي يجري نحو الجهة السفلية الوحشية من الفرع الظهري من كل من الأعصاب القطنية ليغذي العضلات المجاورة وتكون الفروع العليا من هذه المجموعة عند نهاياتها الأعصاب الأولية التي تغذي جلد الالية.

- r. lateralis ramorum dorsalium nervorum sacralium الفرع الوحشي للفرع الظهري للأعصاب العجزية. الفرع الوحشي الذي ينبع من الفرع الظهري من كل من الأعصاب العجزية العلوية الثلاث.

الفرع الوحشي للفرع الخلفي للأعصاب الرقبية.

- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum cervicalium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum cervicalium) الفرع الوحشي للفرع الخلفي للأعصاب الرقبية.

- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum lumbalium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum lumbalium) الفرع الوحشي للفرع الخلفي للأعصاب القطنية.

- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum sacralium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum sacralium) الفرع الوحشي للفرع الخلفي للأعصاب العجزية.

- rami ilenales plexus coeliaci الفرع الطحالي للضفيرة البطنية.

- r. lingualis nervi facialis الفرع اللساني للعصب الوجهي. فرع عصبى غير ثابت للعصب الوجهي ينبع أحياناً مع الفرع الإبري اللامي ويساعد في تغذية العضلتين الإبرية اللسانية واللسانية الحنكية باللياف حركية.

- rami linguales nervi glossopharyngei الفرع اللسانية للعصب اللساني البلعومي. فروع من العصب اللساني البلعومي تغذي الثلث الخلفي من اللسان باللياف حسية عامة وخاصة.

- rami linguales nervi hypoglossi الفرع اللسانية للعصب تحت اللساني. فروع من

العصب تحت اللساني تغذي العضلات الظاهرة والباطنة للسان باللياف عصبية حركية.

- rami linguales nervi lingualis الفرع اللسانية للعصب اللساني. فروع تغذي الثلثين الامامين للسان وبأحات الفم المجاورة واللثة باللياف حسية عامة وخاصة.

- rami mammarii laterales rami cutanei lateralis nervorum intercostalium الفرع الثديية الوحشية للفرع الجذبية الوحشية للعصب الوربي.

- rami mammarii laterales rami cutanei lateralis nervorum thoracicorum الفرع الثديية الوحشية للفرع الجذبية الوحشية للعصب الصدري (الوربي). وهي أعصاب حسية عامة.

- r. marginalis mandibulae nervi facialis الفرع الهامشي الفكي السفلي للعصب الوجهي. فرع من العصب الوجهي يجري إلى الامام من الغدة النكفية على طول حافة الفك السفلي وبالعمق من العضلتين الجذبية للعنق ومخفضة زاوية الفم ويغذيها والعضلات الضحكية وخافضة الشفة السفلية والذقنية باللياف عصبية حركية.

- r. medialis nervis supraorbitalis الفرع الإنسي للعصب فوق الحاجبي. فرع يغذي الجيب الجبهي والجفن العلوي والجلد والأنسجة تحت الجلدية للجبهة وفروة الرأس حتى العظم الجداري من الخلف باللياف حسية عامة.

- r. medialis ramorum dorsalium nervorum cervicalium الفرع الإنسي للفرع الظهري للأعصاب الرقبية. فرع ينبع من الفرع الظهري من كل من الأعصاب الرقبية الثمانية ويغذي العضلات والسماح والمفاصل والاربطة ثم ينتهي بفروع جلدية ما عدا الأعصاب الاول والسادس والسابع والثامن.

- r. medialis ramorum dorsalium nervorum lumbalium الفرع الإنسي للفرع الظهري للأعصاب القطنية. فروع تنبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب القطنية الخمسة وتغذي بصورة رئيسية العضلات ولكنها تساعد أيضاً في تغذية الاربطة والسماح والمفاصل.

- r. medialis ramorum dorsalium nervorum sacralium **الْفَرْعُ الْإِنْسِيَّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْعَجْزِيَّةِ**. فرع ينبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب العجزية العلوية الثلاث.

- r. medialis ramorum posteriorum nervorum cervicalium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum cervicalium) **الْفَرْعُ الْإِنْسِيَّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ**.

- r. medialis ramorum posteriorum nervorum lumbalium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum lumbalium) **الْفَرْعُ الْإِنْسِيَّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْقَطَنِيَّةِ**.

- r. medialis ramorum posteriorum nervorum sacralium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum sacralium) **الْفَرْعُ الْإِنْسِيَّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْعَجْزِيَّةِ**.

- r. membranae tympani nervi auriculotemporalis **الْفَرْعُ الْغَشَائِيَّ الطَّبَنِيَّ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِيَّ الصَّدْعِيَّ**. فرع من عصب الصماخ الظاهر من فرع العصب الأذني الصدغي يغذي غشاء الطبل باللياف عصبية حسية عامة.

- r. meningeus medius nervi maxillaris **الْفَرْعُ السِّحَائِيَّ الْوَسْطِيَّ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلَوِيِّ**. فرع ينبع من العصب الفكي العلوي في الحفرة القحفية الوسطية ويرافق الشريان السحائي الوسطي ليفذي الأم الجافية بأعصاب حسية عامة. ويسمى أيضاً العصب السحائي.

- r. meningeus nervi mandibularis **الْفَرْعُ السِّحَائِيَّ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ**. فرع يتفرع عن جذع العصب الفكي السفلي ثم يعود ليدخل القحف خلال الثقبية الشوكية مرافقاً الشريان السحائي المتوسط ليفذي الجافية ويساعد في تغذية الغشاء المخاطي للخلايا الهرائية الخشائية. ويسمى أيضاً العصب الشوكي.

- r. meningeus nervi ophthalmici (= r. tentori nervi ophthalmici) **الْفَرْعُ السِّحَائِيَّ لِلْعَصَبِ الْعَيْنِيِّ**.

- r. meningeus nervorum spinalium **الْفَرْعُ السِّحَائِيَّ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ**. الفرع الصغير من كل من الأعصاب النخاعية الذي يعود ليدخل الثقبية بين الفقرتين ليفذي الأم الجافية والعمود الفقاري والأربطة المتعلقة به.

- r. meningeus nervi vagi **الْفَرْعُ السِّحَائِيَّ لِلْعَصَبِ الْفُجَيْهِمِ**. فرع ينبع في الثقبية الوداجية من عقدة العصب المبهم العليا ويغذي الأم الجافية في الحفرة القحفية الخلفية.

- rami mentales nervi mentalis **الْفُرُوعُ الدَّقْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الدَّقْنِيِّ**. فروع تغذي جلد الذقن باللياف حسية عامة.

- rami musculares **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ**. فروع الأعصاب المحيطة التي تغذي العضلات وليس لها اسم مميز خاص بها.

- rami musculares nervi accessorii **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ**. فروع الفرع الظاهر للعصب الإضافي التي تغذي العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

- rami musculares nervi axillaris **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِبْطِيِّ**. فروع تغذي العضلتين الدالية والمدورة الكبيرة باللياف عصبية حركية.

- rami musculares nervi femoralis **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ**. فروع تغذي عضلات الفخذ الأمامية باللياف عصبية حركية.

- rami musculares nervi fibularis **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الشَّظْوِيِّ PROFUNDI** العميق. اللياف تغذي العضلات الظنبوبية الأمامية وبأسطة أصابع القدم الطويلة وبأسطة إبهام القدم الطويلة والشظوية الثالثة باللياف حركية.

- rami musculares nervi fibularis **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الشَّظْوِيِّ SUPERFICIALIS** السطحي. اللياف تغذي العضلتين الشظوية الطويلة والشظوية القصيرة باللياف عصبية حركية.

- rami musculares nervi iliohypogastrici **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْخَرْقَفِيِّ الْخَلْتِيِّ**. اللياف غالباً ما تكون حسية ما عدا فروع صغيرة للعظام الهرمية.

- rami musculares nervi ilioinguinalis **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْخَرْقَفِيِّ الْأَزْمِيِّ**. اللياف عصبية غالباً ما تكون حسية عامة.

- rami musculares nervorum
intercostalium الفُروغُ العَضَلِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ
intercostalium الِوَرَبِيَّةُ. الياف عضلية حركية.
- rami musculares nervi ischiadici الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوَرِكِيِّ.
- rami musculares nervi mediani الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. فروع تغذي معظم
العضلات المثنية في الواجهة الامامية للمساعد ومعظم
العضلات القصيرة للابهام بالياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi musculocutanei الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ العَضَلِيِّ الجُلْدِيِّ. فروع
تغذي العضلات الغرابوية العضدية وذات الراسين
والعضدية وهي فروع حركية وحسية عامة.
- rami musculares nervi obturatorii الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ السِّدَّادِيِّ. فروع تنبع من
الفرعين الامامي والخلفي للعصب السدادي وتغذي
العضلات المسدة الظاهرة والرشيقة والمقربة وأحياناً
العضلة العانية ايضاً. وهي الياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi peronei
profundi (= rami musculares nervi
fibularis profundi) الفُروغُ العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ
 الشظويِّ العميقِ.
- rami musculares nervi peronei
superficialis (= rami musculares nervi
fibularis superficialis) الفُروغُ العَضَلِيَّةُ
 للعَصَبِ الشَّظْوِيِّ السَّطْحِيِّ.
- rami musculares nervi radialis الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْكُفْبَرِيِّ. فروع تغذي العضلات
ثلاثية الرؤوس والمرفقية والعضدية الكعبرية وبأسطة
الرسغ الكعبرية كما أنها تجهز فرعاً للعضلة العضدية
يحتمل أن يكون حسيّاً. وهي فروع حركية وحسية.
- rami musculares nervi tibialis الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الظُّنْبُوِيِّ. فروع تغذي عضلات
ظهر الساق بالياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi ulnaris الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الزُّنْدِيِّ. فروع تغذي العضلة مثنية
الرسغ الزندية والنصف الزندي من العضلة مثنية
الاصابع العميقة بالياف عصبية حركية.
- rami musculares plexus lumbalis الفُروغُ
 العَضَلِيَّةُ لِلصَّفِيرَةِ القَطَنِيَّةِ.
- r. musculi stylopharyngei nervi
glossopharyngei الفُروغُ العَضَلِيَّ الْإِبْرِيَّ
 الْبَلْعُومِيِّ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ. فرع يغذي
العضلة الإبرية البلعومية بالياف عصبية حركية.
- rami nasales anteriores nervi
ethmoidalis anterioris (= rami nasales
nervi ethmoidalis anterioris) الفُروغُ
 الْأَنْفِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَائِيِّ الْأَمَامِيِّ.
- r. nasalis externus nervi ethmoidalis
anterioris الفُروغُ الْأَنْفِيُّ الظَّاهِرُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَائِيِّ
 الْأَمَامِيِّ. فرع استمراري أو انتهائي للعصب الغربالي
الامامي يغذي جلد القسم الظهري من الانف بالياف
عصبية حسية عامة.
- rami nasales externi nervi infraorbitalis الفُروغُ
 الْأَنْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَاجِجِيِّ. فروع تغذي
جلد القسم الجانبي من الانف بالياف
حسية عامة.
- rami nasales interni nervi ethmoidalis
anterioris الفُروغُ الْأَنْفِيَّةُ الْبَاطِنَةُ لِلْعَصَبِ
 الْغُرْبَائِيِّ الْبَاطِنِ. يغذي الفرعان الإنسي والوحشي
منها حاجز الانف والغشاء المخاطي للجدار الوحشي
لتجويف الانف بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales laterales nervi
ethmoidalis anterioris الفُروغُ الْأَنْفِيَّةُ
 الْوَحْشِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَائِيِّ الْأَمَامِيِّ. فروع تنبع من
الفروع الانفية الباطنة للعصب الغربالي الامامي وتغذي
الغشاء المخاطي للجدار الوحشي لتجويف الانف
بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales mediales nervi
ethmoidalis anterioris الفُروغُ الْأَنْفِيَّةُ
 الْإِنْسِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَائِيِّ الْأَمَامِيِّ. فروع تنبع من
الفروع الانفية الباطنة للعصب الغربالي الامامي وتغذي
حاجز الانف بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales nervi ethmoidalis
anterioris الفُروغُ الْأَنْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَائِيِّ
 الْأَمَامِيِّ. الفرعان الانفيان الباطن والظاهر للعصب
الغربالي الامامي وفروعهما.

**- rami nasales posteriores inferiores
(laterales) ganglii pterygopalatini
(sphenopalatini)**

الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ (الْوَحْشِيَّةُ) لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع من العصب الحنكي الكبير تغذي الصماخين الأنفيين الوسطي والسفلي والقرين السفلي باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami nasales posteriores inferiores
nervi palatini** الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ
للعَصَبِ الْحَنَكِي.

**- rami nasales posteriores superiores
(laterales) ganglii pterygopalatini
(sphenopalatini)** الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ
الْعُلْوِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع تغذي القرنين العلوي والسفلي والجيوب الغربالية الخلفية باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami nasales posteriores mediales
ganglii pterygopalatini** الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ
الْحَنَكِيَّةِ. فروع من العصب الأنفي الحنكي تغذي حاجز الأنف باللياف عصبية حسية عامة.

**- r. nasociliaris ganglii ciliaris (= radix
nasociliaris ganglii ciliaris)** الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْهَدَبِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ.

- rami nuclei rubris فُرُوعُ النُّوَاةِ الْحُمْرَاءِ. فروع من الشريان المشيماني تغذي النواة الحمراء.

**- r. occipitalis nervi auricularis
posterioris** الفُرُوعُ الْقَذَالِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِي
الْخَلْفِي. فرع يغذي البطن القذالية للعضلة القذالية الجبهية بأعصاب حركية.

**- rami oesophagei nervi laryngei
recurrentis** الفُرُوعُ الْمَرِيئِيَّةُ لِلْعَصَبِ
الْحَنَجَرِيِّ الرَّاجِعِ. فروع تساعد في تغذية المريء، وهي ألياف عصبية حشوية واردة وحسية عامة.

**- rami orbitales ganglii pterygopalatini
(sphenopalatini)** الفُرُوعُ الْحَاجِيَّةُ
لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع تمر من العقدة الجناحية الحنكية خلال الشق الحجابي السفلي لتغذي سمحاق الحجاج والجيبين الغربالي والوندي، وهي أعصاب حسية عامة ولا ودية.

- r. palmaris nervi mediani الفُرُوعُ الرَّاحِي
لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. فرع ينبع من العصب الناصف في القسم السفلي من الساعد ويغذي جلد القسم الوحشي من اليد باللياف عصبية حسية عامة.

- r. palmaris nervi ulnaris الفُرُوعُ الرَّاحِي
لِلْعَصَبِ الزُّنْدِيِّ. فرع ينبع من العصب الزندي ويغذي البنيات الجلدية للقسم الإنسي من اليد باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami palpebrales inferiores nervi
infraorbitalis** الفُرُوعُ الْجَفْنِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ
تَحْتَ الْحَاجِي. فروع تغذي جلد الجفن السفلي وملتحمته باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami palpebrales nervi
infratrochlearis** الفُرُوعُ الْجَفْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ
تَحْتَ الْبُكْرِيِّ. فروع عصبية تساعد في تغذية الأجفان باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami parotidei nervi
auriculotemporalis** الفُرُوعُ النَّكَفِيَّةُ لِلْعَصَبِ
الْأَذْنِي الصُّدْعِيِّ. فروع تحمل أليافاً لا ودية بعد عقدية من العقدة الأذنية إلى الغدة النكفية.

- r. pericardiacus nervi phrenici الفُرُوعُ
التَّامُورِيَّ لِلْعَصَبِ الْحَاجِي. فرع ينبع من العصب الحجابي أو من الحجابي الإضافي ويغذي التامور باللياف عصبية حسية عامة.

**- rami perineales nervi cutanei femoris
posterioris** الفُرُوعُ الشَّظْوِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ
الْجَلْدِيِّ الْخَلْفِيِّ. فروع تنبع من العصب الفخذي الجلدي الخلفي عند الحافة السفلية للعضلة الألوية الكبيرة وتغذي جلد الأعضاء التناسلية الظاهرة باللياف عصبية حسية عامة.

- r. pharyngeus ganglii pterygopalatini الفُرُوعُ الْبَلْعُومِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فرع عصبى يجري من القسم الخلفي من العقدة الجناحية الحنكية خلال القناة البلعومية مع الفرع البلعومي للشريان الفكي العلوي إلى الفشاء المخاطي للقسم الأنفي من البلعوم الخلفي حتى القناة السمعية.

- rami pharyngei nervi glossopharyngei الفُرُوعُ الْبَلْعُومِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللَّسَّانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ. فروع تغذي الفشاء المخاطي للبلعوم باللياف عصبية حسية عامة.

- **rami pharyngei nervi vagi** الفُرُوع البلعومية للعَصَبِ المُبْهَم. فروع تغذي عضلات البلعوم وغشائه المخاطي وهو عصب حركي وحسي عام.
- **rami phrenicoabdominales nervi phrenici** الفُرُوع الحجابية البطنية للعَصَبِ الحجابي. فروع من العصبين الحجابي والحجابي الإضافي تغذي الحجاب الحاجز وتشارك في الضفيرة البطنية وهي الياف حسية عامة وحركية.
- **r. posterior fissurae cerebri lateralis (Sylvii)** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلشَّقِ المُخَيِّ الوُخْشِيِّ.
- **r. posterior nervi auricularis magni** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الأذني الكبير. فرع يتكون من انقسام العصب الأذني الكبير وهو يغذي الجلد فوق الناتئ الخشائي ويظهر الأذن الخارجية بالياف حسية عامة.
- **rami posteriores nervorum cervicium (= rami dorsales nervorum cervicalium)** الفُرُوع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَابِ الرَقَبِيَّة.
- **r. posterior nervi coccygei (= r. dorsalis nervi coccygei)** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ العُصْفِيِّ.
- **r. posterior nervi cutanei antebrachii medialis** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ السَّاعِدِيِّ الجِلْدِيِّ الإنْسِيِّ. فرع يغذي جلد الناحيتين الظهرية الإنسية من الساعد بالياف حسية عامة ويسمى أيضاً الفرع الزندي للعصب الساعدي الجلدي الإنسي.
- **r. posterior nervi laryngei inferioris** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الحَنَجرِيِّ السُّفْلِيِّ.
- **rami posteriores nervorum lumbalium (= rami dorsales nervorum lumbalium)** الفُرُوع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَابِ اللَّطَنِيَّة.
- **r. posterior nervi obturatorii** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ السِّدَّادِيِّ. فرع ينزل ليغذي مفصل الركبة كما يعطي فروعاً عضلية للعضلات المسدة الظاهرة والمقربة الكبيرة وأحياناً المقربة الصغيرة وهي الياف حركية وحسية عامة.
- **rami posteriores nervorum sacralium (= rami dorsales nervorum sacralium)** الفُرُوع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَابِ العَجْزِيَّة.
- **r. posterior nervorum spinalium (= r. dorsalis nervorum spinalium)** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ.
- **rami posteriores nervorum thoracicarum (= rami dorsales nervorum thoracicarum)** الفُرُوع الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَابِ الصَّدْرِيَّة.
- **r. posterior ramorum cutaneorum lateralis (abdominalium et pectoralis) nervorum intercostalium** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلْفُرُوعِ الجَنْدِيَّةِ الوُخْشِيَّةِ (البطنية والصدرية) لِلْعَصَابِ الوُزْبِيَّة.
- **r. posterior sulci lateralis cerebri** الفُرُع الخَلْفِيَّةُ لِلتَلَمُّ المُخَيِّ الوُخْشِيِّ. قسم التلم المخي الوحشي الذي يجري بصورة مائلة إلى الخلف بين الفصين الصدغي والجداري. ويسمى أيضاً الشق الخلفي المخي الوحشي (السيلفي).
- **r. profundus nervi plantaris lateralis** الفُرُع العميق للعَصَبِ الأُخْمَصِيِّ الوُخْشِيِّ. فرع يرافق الشريان الأُخْمَصِي الوحشي وعلى جهته الإنسية وعلى القوس الأُخْمَصِي ويغذي العضلات بين العظام والخرطاطينيات الثانية والثالثة والرابعة والمقربة لإبهام القدم وبعض المفاصل أحياناً بالياف حسية عامة.
- **r. profundus nervi radialis** الفُرُع العميق للعَصَبِ الكَعْبَرِيِّ. فرع ينبع من العصب الكبير ويدور على الجهة الوحشية حول الكعبرة إلى ظهر الساعد ليغذي العضلات الباسطة وباسطة الأصابع وباسطة الخنصر والباسطة الزندية للرسغ وغالباً الباسطة الكعبرية للزند أيضاً. ويغذي استمراره العصب بين العظمي الخلفي عضلات القسم القاصي من الساعد والمفاصل الرسغية وبين الرسغية وهو ليف عصبي حركي.
- **r. profundus nervi ulnaris** الفُرُع العميق للعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. الفرع العميق الذي يرافق الفرع الراحي العميق للشريان الزندي ويدور حول العظم الكلابي ويتبع القوس الراحي العميق تحت أوتار المثنية ويغذي مفصل الرسغ والعضلات بين العظام والخرطاطينيتين الثالثة والرابعة والمقربة لإبهام اليد وعادة الرأس العميق للعضلة الصغيرة المثنية للإبهام. وهو فرع حركي وحسي عام.

- rami pulmonales plexus cardiaci

(= rami pulmonales systematis

automatici) الفُروغُ الرئويَّة لِلضَّفِيرَةِ القَلْبِيَّةِ.

- rami pulmonales systematis auto-

nomici الفُروغُ الرئويَّة لِلجَّهَازِ المِستَقْلِي.

فروع من الجذعين الوديين والضفيرة القلبية والتي ترافق الاوعية الدموية والقصيبات خلال الضفائر الرئوية إلى الرئة، وهي فروع عصبية ودية وحشوية واردة.

- r. renalis nervi splanchnici minoris

الفُروغُ الكُلَوِيَّ لِلعَصَبِ الحَشَوِيِّ الصَّغِيرِ. فرع من

العصب الحشوي الصغير إلى العقدة الابهرية الكلوية مكون من ألياف ودية قبل عقدية وحشوية واردة.

- rami renales nervi vagi

الفُروغُ الكُلَوِيَّة لِلعَصَبِ المُعْبَهِمِ. فروع تمر من جذع العصب المبهم خلال الضفيرة البطنية إلى الكلية. وهي ألياف لا ودية وحشوية واردة.

- rami renales plexus coeliaci (= rami

renales nervi vagi) الفُروغُ الكُلَوِيَّة لِلضَّفِيرَةِ البَطنِيَّةِ.

- r. sinus carotici nervi glossopharyngei

فُروغُ الجَنَبِ السَّبَاتِيَّ لِلعَصَبِ السَّنَانِيَّ البُلْغُومِيَّ. فرع يغذي المستقبلات الضغطية والكيميائية للجيب والجسم السباتيين بألياف عصبية حشوية واردة.

- r. stylohyoideus nervi facialis

الفُروغُ الإِبْرِيَّ السَّامِيَّ لِلعَصَبِ الوَجْهِيَّ. فرع ينبع من العصب الوجهي تحت قاعدة القحف مباشرة ليغذي العضلة الإبرية اللامية بألياف عصبية حركية.

- r. stylopharyngeus nervi glossopharyngei (= r. muscoli stylopharyngei)

الفُروغُ الإِبْرِيَّ لِلعَصَبِ السَّنَانِيَّ البُلْغُومِيَّ. الفُروغُ الكُلَوِيَّة لِلعُقْدَةِ تَحْتَ الفَكِيَّة العُلْوِيَّة: الفروع الغدية للعقدة تحت الفكية العلوية.

- rami submaxillares ganglii

submaxillaris (= rami glandulares ganglii submandibularis) الفُروغُ تَحْتَ الفَكِيَّة العُلْوِيَّة لِلعُقْدَةِ تَحْتَ الفَكِيَّة العُلْوِيَّة: الفروع الغدية للعقدة تحت الفكية العلوية.

- rami substantiae nigrae

فُروغُ المَادَّةِ السُّودَاءِ. فروع صغيرة من الشريان المشيمائي الامامي تغذي المادة السوداء.

- r. superficialis nervi plantaris lateralis

الفُروغُ السَطْحِيَّ لِلعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الوَحْشِيِّ. فرع ينبع من العصب الأخمصي الوحشي عند الحافة الوحشية للعضلة المربعة الأخمصية يمر إلى الامام وينقسم إلى القسم الوحشي الذي يغذي جلد الجهة الوحشية للأخمص وأصبع القدم الصغير ومفاصله والعضلة الصغيرة المثنية لإصبع القدم الصغير، وإلى القسم الإنسي الذي يكون العصب الأخمصي العام لأصابع القدم الذي يعطي عصبين أصبعيين أخمصيين إلى إصبعي القدم الرابع والخامس، وهو فرع عصب حسي عام.

- r. superficialis nervi radialis

الفُروغُ السَطْحِيَّ لِلعَصَبِ الكُعْبُرِيِّ. استمرارية العصب الكعبري الذي يرافق الشريان الكعبري في الساعد ويدور نحو جهته الظهرية ليغذي الجهة الوحشية لظهر اليد وينقسم إلى الأعصاب الإصبعية الظهرية التي تغذي الواجهة الظهرية والاسطح المجاورة للإبهام والسبابة والوسطى وأحياناً الوجه الكعبري للبصر، وهو عصب حسي عام.

- r. superficialis nervi ulnaris

الفُروغُ السَطْحِيَّ لِلعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فرع العصب الزندي في اليد الذي يغذي العضلة الراحية القصيرة وينقسم إلى عصب راحي إصبعي أصلي للجهة الإنسية من الخنصر وإلى عصب راحي إصبعي عام يعطي بحصبين أصليين ليغذي الجهتين المتجاورتين من الخنصر والبصر ويعطي أحياناً أعصاباً راحية إصبعية لتغذية الجهتين المتجاورتين للأصبعين الوسطى والبصر، وهو عصب حركي وحسي عام.

- rami superiores nervi colli (= rami

superiores nervi transversi colli) الفُروغُ العُلْوِيَّة لِلأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ.

- r. superior nervi oculomotorii

الفُروغُ العُلْوِيَّ لِلعَصَبِ مُحَرِّكِ العَيْنِ. الفرع العلوي والأصغر من فرعي العصب محرك العين الذي يغذي العضلة المستقيمة العلوية وينتهي ليغذي رافعة الجفن العلوي وهو فرع حركي.

- rami superiores nervi transversi colli

الفُروغُ العُلْوِيَّة لِلعَصَبِ الرَّقَبِيِّ المُسْتَقْرَضِ. الفروع العلوية من الفروع التي تنبع من العصب الرقبى المستعرض بالقرب من الحافة الامامية للعضلة القصية الترقوية الخشائية وتغذي جلد المنطقة الرقبية الامامية وانسجتها تحت الجلدية بأعصاب حسية عامة.

- r. sympathicus ad ganglii ciliaris
الْفَرْعُ (= radix sympathic ganglii ciliaris) الْوُدِّي لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ.

- r. sympathicus ad ganglion submandibularis
الْفَرْعُ الْوُدِّي إِلَى الْعُقْدَةِ تَحْتَ الْفَكِّةِ. فرع يحمل اليافاً ودية بعد عقدية من العقدة الرقبية العلوية مشتقة من ضفيرة على الشريان الوجهي إلى العقدة تحت الفكية لتتوزع للغدة اللعابية تحت الفكية.

- rami temporales nervi facialis الْفُرُوعُ الصُّدْغِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ. الفروع الانتهازية للعصب الوجهي التي تغذي العضلتين الانتيبتين العلوية والسفلية والبطن الجبهي للعضلة القذالية الجبهية والعضلتين الدويرية العينية والمضغنة بالياف حركية.

- rami temporales superficiales nervi الْفُرُوعُ الصُّدْغِيَّةُ auriculotemporalis السُّطْحِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِي الصُّدْغِيِّ. فروع تنتشر إلى المنطقة الصدغية من جلد فروة الرأس وهي الياف عصبية حسية عامة.

- r. tentorii nervi ophthalmici الْفَرْعُ الْخَيْمِيُّ لِلْعَصَبِ الْعَيْنِيِّ. فرع ينبع من العصب العيني بالقرب من منشئه بالقرب من عقدة ثلاثي التوائم ويدور للخلف ليغذي الام الجافية للخيمة المخيخية ومنجل المخ وهو فرع عصبي حسي عام.

- r. thyreohyoideus nervi hypoglossi (= r. thyreohyoideus ansae cervicalis)
الْفَرْعُ الدَّرَقِيُّ الْأَمِيُّ لِلْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيِّ.

- r. thyreohyoideus ansae cervicalis الْفَرْعُ الدَّرَقِيُّ لِلْعُرْوَةِ الرَّقْبِيَّةِ. فرع من الجذر العلوي للعروة الرقبية يغذي العضلة الدرقية اللامية بأعصاب حركية.

- rami tonsillares nervi glossopharyngei الْفُرُوعُ الْلُوزِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبُلْعُومِيِّ. فروع تغذي الغشاء المخاطي الذي يغطي اللوزة الحنكية والمنطقة المجاورة من الحفّاف (شراع الحنك).

- rami tracheales nervi laryngei الْفُرُوعُ الرَّغَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْحَنَجَرِيِّ recurrentis الرَّاجِعِ. فروع تنتشر للغشاء المخاطي للرغامى، وهي الياف حسية عامة.

- r. tubarius plexus tympanici الْفَرْعُ الْتُفِيرِيُّ لِلضَّفِيرَةِ الطَّبْلِيَّةِ. فرع من الضفيرة الطبلية إلى الأنبوب السمعي وهو فرع حسي عام.

- r. ulnaris nervi cutanei antebrachii medialis (= r. posterior nervi cutanei antebrachii medialis) الْفَرْعُ الرَّثْبِيُّ لِلْعَصَبِ الْجَدِّيِّ السَّاعِدِيِّ الْإِنْسَانِيِّ.

- rami ventrales nervorum cervicalium الْفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرَّقْبِيَّةِ. الفروع الأربعة الرقبية العلوية التي تكون الضفيرة الرقبية والفروع الأربعة الرقبية السفلية التي تكون الضفيرة العضدية، وتسمى أيضاً الفروع الامامية للأعصاب الرقبية.

- r. ventralis nervi cocceygei الْفَرْعُ الْبَطْنِيُّ لِلْعَصَبِ الْمُصْغَصِيِّ. الفرع البطني للجذر النخاعي الشوكي الأخير والذي يبرز من الفرجة العجزية ويساعد في تكوين الضفيرة العصبية.

- rami ventrales nervorum lumbalium الْفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْقُطْنِيَّةِ. الفروع البطنية للأعصاب القطنية الخمسة وتتكون الفروع الأربعة العلوية من الضفيرة القطنية ويشارك الخامس وجزء من الرابع في تكوين الضفيرة العجزية.

- rami ventrales nervorum sacralium الْفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْعَجْزِيَّةِ. تبرز الفروع الأربعة العلوية من العجز خلال الثقوب العجزية الامامية وتساعد في تكوين الضفيرة العجزية أما الفرع الخامس فإنه يبرز خلال الفرجة العجزية ويشارك باتصال مع الفرع الرابع في تكوين الضفيرة العصبية.

- r. ventralis nervorum spinalium الْفَرْعُ الْبَطْنِيُّ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ. الفرع الأكبر من الفرعين الذي ينقسم لهما العصب النخاعي الشوكي مباشرة بعد ظهوره من الثقبة بين الفقرتين وتغذي الفروع البطنية القسمين البطني والوحشي من الجذع وكل أقسام الأطراف.

- rami ventrales nervorum thoracicorum الْفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ. وهي الفروع الأحد عشر الأولى من الأعصاب الصدرية النخاعية الشوكية الوربية وتعطي الفروع الثلاثة الأولى فروعاً للضفيرة العضدية وجدار الصدر وتغذي الفروع الرابعة والخامسة والسادسة جدار الصدر فقط

وتنتشر الفروع السابع حتى الحادي عشر إلى الجدار الصدري البطني. أما القسم الامامي الاولي للعصب الصدري فهو تحت الاضلاع أكثر مما هو بينها ويختلف في مساوره وعلاقته عن الفروع الأخرى ويسمى العصب تحت الاضلاع.

- **r. volaris manus nervi ulnaris (= r. palmaris nervi ulnaris)** **الْفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ**

- **r. volaris nervi cutanei antebrachii medialis (= r. anterior nervi cutanei antebrachii medialis)** **الْفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ الْجِلْدِيِّ السَّاعِدِيِّ الْإِنْسِيِّ**

- **rami zygomatici nervi facialis** **الْفُرُوعُ الْوُجُنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ**. فروع تعبر العظم الوجني وتغذي العضلة الدويرية العينية باللياف عصبية حركية.

- **r. zygomaticofacialis nervi zygomatici** **الْفَرْعُ الْوُجُنِي الْوُجْهِي لِلْعَصَبِ الْوُجْنِيِّ**. فرع يعبر من الجدار الوحشي للحجاج ويتقب العظم الوجني ليغذي الجلد الذي يغطيه باللياف حسية عامة.

- **r. zygomaticotemporalis nervi zygomatici** **الْفَرْعُ الْوُجُنِي الصَّدْغِي لِلْعَصَبِ الْوُجْنِيِّ**. فرع يمر من الجدار الوحشي للحجاج ويتقب العظم الوجني ليغذي جلد المنطقة الصدغية الامامية باللياف عصبية حسية عامة.

raphe **رَفَاءَ**. (ج: أَرْفِيَّةٌ). مصطلح عام لخط التّحام نصفي البنيات المتناظرة.

- **r. corporis callosi** **رَفَاءَ الْجِسْمِ الثَّقَفِيِّ**.

- **r. medullae oblongatae** **رَفَاءَ الْبَصَلَةِ**. الخط الناصف لالتحام نصفي النخاع المستطيل (البصلة) الجانبيين والذي يستمر حتى القسم الظهري من الجسر.

- **r. pontis** **رَفَاءَ الْجِسْرِ**. الخط الناصف لالتحام نصفي الجسر الجانبيين وهو امتداد لرفاء النخاع المستطيل إلى ظهر الجسر.

1. رَدُّ الْفِعْلِ 2. اسْتِجَابَةٌ 3. تَفَاعُلٌ. **reaction**
1. فعل مضاد أو معاكس 2. استجابة للمنبهات، وفي علم النفس هي الحالة العقلية أو النفسية التي تتولد استجابة لظرف أو لتنبيه أو لحالة معينة 3. الظاهرة التي تتولد بتفاعل العوامل الكيميائية أو

الحالة التي تتحول فيها مادة كيميائية إلى مادة أو مواد أخرى.

- **acute situational r. (= acute stress r.)** **اسْتِجَابَةٌ كَرْبِيَّةٌ حَادَّةٌ**.

- **acute stress r.** **اسْتِجَابَةٌ كَرْبِيَّةٌ حَادَّةٌ**. استجابة عاطفية عابرة حادة لحالة نفسية كربية شديدة.

- **alarm r.** **اسْتِجَابَةُ النَّذِيرِ**. التأثيرات الفيزيولوجية التي تنتقل عن طريق الجهاز الودي العصبي وتحرز الأدرينالين من الغدة الكظرية استجابة لحالة كرب حاد أو خوف أو غيظ وتتنصف بارتفاع ضغط الدم وزيادة النتاج القلبي وزيادة جريان الدم للعضلات الهيكلية ونقصه للأحشاء وزيادة تحلل الجلوكوز وارتفاع سكر الدم.

- **anxiety r. (= anxiety neurosis)** **عُصَابُ الْقَلْقِ**.

- **associative r.** **اسْتِجَابَةٌ تَرَابُطِيَّةٌ**. تفاعل تتوقف فيه الاستجابة حتى تربط الفكرة المنبهة بفكرة أخرى مترابطة أو متداخلة معها.

- **axon r. (= axonal r.)** **سلسلة تَفَاعُلٍ مَخَوَارِي**. سلسلة التغييرات التي تحدث في الخلية العصبية (كالانحلال الكروماتيني وانزياح النواة) عند قطع محاورها.

- **consensual r.** **اسْتِجَابَةٌ إِتْفَاقِيَّةٌ**. 1. منعكس متصالب 2. فعل لا إرادي يصاحب الفعل الإرادي

- **r. of degeneration** **اسْتِجَابَةُ التَّنَكُّسِ**.

استجابة العضلات متنكسة الأعصاب للتنبيه الكهربائي ويتكون من فقدان استجابة العضلة للتنبيه الفارادي وفقدان العصب للتنبيهين الفارادي والغلطاني بينما تزداد استثارية العضلة للتنبيه الغلطاني.

- **fight- or-flight r. (= alarm r.)** **اسْتِجَابَةُ الْعِرَاكِ أَوْ الْفَرَارِ**.


- **gross stress r. (= post- traumatic stress disorder)** **اسْتِجَابَةُ الْكَرْبِ الشَّدِيدِ**؛ اضطراب كربي تالي للُرْضَح.

- **lengthening r.** **اسْتِجَابَةُ التَّطَوُّيلِ**. تطويل العضلة الباسطة الذي يؤدي إلى ثني الذراع ويسمى منعكس المطواة الممسكة.

- **myasthenic r.** **اسْتِجَابَةُ الْوَهْنِ الْعَضَلِيِّ**. ضعف الاستجابة العضلية التدريجي للتنبيه الكهربائي المتكرر.


- **myotonic r.** **اسْتِجَابَةُ تَوْتَرِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ**. عدم

- ارتخاء العضلة مباشرة بعد توقف التقلص الإرادي أو التقلص الذي يولده التنبيه الكهربائي.
- **neurotonic r.** **إِسْتِجَابَةٌ تَوَثِّرِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.** استمرار التقلص العضلي بعد توقف المنبه المولد له.
- **pain r.** **إِسْتِجَابَةٌ أَلَمٌ.** توسع الحدقة عند الشعور بالألم.
- **startle r.** **إِسْتِجَابَةٌ الْإِجْفَالِ.** الظواهر النفسية الفيزيولوجية التي تشمل الاستجابات الحركية اللاإرادية والاستجابات الودية التي تظهر عند الشخص عند تنبيهه بمنبه غير متوقع كسماعه صوتاً حاداً عالياً بصورة مفاجئة.
- **sympathetic stress r. (= alarm r.)** **استجابة الكرب الودي؛ إِسْتِجَابَةُ النَذِيرِ.**
- **vestibular pupillary r.** **الاستجابة الدهليزية.** توسع الحدقتين عند تنبيه القناة السمعية الظاهرة.
- reaction- formation** **تَكْوِينُ الْإِسْتِجَابَةِ.** آلية دفاعية لاشعورية يتخذ فيها الشخص موقفاً معاكساً لرغباته ودوافعه.
- rebound** **إِرْتِدَادٌ.** استجابة معكوسة تتولد عند سحب المنبه.
- **REM r.** **إِرْتِدَادُ الْحَرَكَاتِ الْعَيْنِيَّةِ السَّرِيعَةِ.** زيادة نوم الحركات العينية السريعة لدى الشخص عند نومه بعد أن حرم منه لفترة طويلة.
- recall** **تَذَكُّرٌ؛ تَذَكُّرٌ.** عملية تذكر الحوادث الماضية وجلبها لمستوى الوعي.
- receptor** **مُسْتَقْبَلَةٌ.** (ج: مُسْتَقْبَلَاتٌ). 1. بنية جزيئية داخل الخلية أو على سطحها تختص بـ (أ) ارتباط انتقائي مع مادة معينة، (ب) التأثير الفيزيولوجي المعين الذي يرافق هذا الارتباط مثل مستقبلات سطح الخلايا للهرمونات اليبستدية وللناقلات العصبية والمستضدات وللشذافات المتممة وللغلوبيينات المناعية وكذلك المستقبلات الهيولية للهرمونات الستيرويدية 2. نهاية عصبية حسية تستجيب للمنبهات المختلفة.
- **adrenergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِينِيِّ.** مواقع على الأعضاء المنفذة تغذيها ألياف عصبية بعد عقدة أدرينالينية الفعل من الجهاز العصبي الودي تصنف إلى مستقبلات ألفا ومستقبلات بيتا حسب نوع استجابتها للنورأبينيفرين أو للابينيفرين على التوالي ولبعض المحصرات الخاصة للعوامل المنبهة.
- **alpha- adrenergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِينِيِّ أَلْفَا.** مستقبلات تستجيب للنورأبينيفرين (نورأدرينالين) ولعوامل محصرة مثل الفينوكسي بنزامين والفينتول أمين.
- **beta- adrenergic r.** **مُسْتَقْبَلَةُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِينِيِّ بِيْتَا.** مستقبلات تستجيب للابينيفرين ولعوامل محصرة مثل بروبرانولول وهناك نوعان منها بيتا 1 وبيتا 2.
- **cholinergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْكُولِينِيِّ.** مستقبلات سطحية خلوية ترتبط مع الناقل العصبي أسيتيل كولين وتنقل فعله إلى الخلايا بعد الاتصالية التي تشمل الخلايا المنفذة المستقلة اللاودية والخلايا الودية واللاودية المستقلة العقدية والعضلات المخططة وبعض عصبونات الجهاز العصبي المركزي.
- **contact r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ تَلَامُسِيَّةٌ.** عضو حسي يستجيب للمنبهات من المواد والاجسام التي تلامس سطح الجسم مباشرة.
- **contiguous r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ تَجَاوُرِيَّةٌ.** مستقبلات تتحسس عندما تكون بتلامس مباشر مع المنبه مثل مستقبلات اللمس والذوق.
- **distance r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ بُعْدِيَّةٌ.** مستقبلات تتحسس للمنبهات الصادرة من مصادر بعيدة عن الجسم كمنبهات البصر والسمع والشم.
- **gustatory r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ ذُوقِيَّةٌ.** مستقبلات حس الذوق وهي البراعم الذوقية.
- **muscarinic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ مُسْكَارِينِيَّةٌ.** مستقبلات الفعل الكولينيني التي تتنبه بالقلواني مسكارين وتحصر بالأتروبيين وهي توجد على الخلايا الذاتية المنفذة وعلى العصبونات المركزية في المهاد وفي قشرة الدماغ.
- **nicotinic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ نِيْكُوتِينِيَّةٌ.** مستقبلات الفعل الكولينيني التي تنبهه أولاً ثم تحصر بالجرعات الكبيرة من النيكوتين أو بالتوبوكورارين وتوجد على الخلايا العقدية المستقلة والعضلات المخططة وعلى العصبونات المركزية للنخاع الشوكي.
- **pressure r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ ضَغْطٌ.** مستقبلات تنبه بالضغط أو اللمس الشديد.



receptor

بعض المستقبلات العصبية الحسية العامة: (1) جسيمة باسيني وتُظهر فيها صفائحها المترابطة حول الليف العصبي وهي شديدة الحساسية للضغط إذ يكفي حرفها 0.2-0.5 ميكرومتر حتى تولد الدفقات العصبية (2) البصلة الانتهازية لكرأوزة وتظهر فيها بروز بعض نهايات فروعها العصبية خلال محفظتها وهي حساسة للمس وتوجد في الجلد وفي الأغشية المخاطية (3) جسيمة مايسنر الحساسة للمس وتظهر فيها صفائحها المطبقة والتي تنتشر بينها النهايات العصبية (4) النهايات العصبية الحرة الحساسة للحس والضغط والألم وتنتشر في مناطق عديدة من الجسم.



receptor

مقاطع في الجلد يبين بعض انواع المستقبلات الحسية: (1) جسيمات باسيني وهي نهايات عصبية للمس (2) نهايات عصبية حرة لحس الألم.

- visual r. مستقبلية بصرية. إحدى مستقبلات العصيات والمخاريط في شبكية العين.

رَدْب. (ج: رُدُوب). recess (= recessus)

رَدْب. حيز صغير فارغ أو فجوة أو تجويف.

- r. anterior fossae interpeduncularis الرَدْبُ الأَمَامِي لِلْحَفْرَةِ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ. قسم الحفرة بين السويقتين الذي يمر تحت الجسمين الحليين.

- r. chiasmatis (= r. opticus) الرَدْبُ التَّصَالِبِيُّ.

- r. cochlearis vestibuli الرَدْبُ القَوَاقِي لِلدِّهْلِيزِ. باحة صغيرة منخفضة على الجدار الإنسي لدهلِيز الأذن يمر من فتحة فيها عصب أنبوب القوقعة.

- r. infundibuli الرَدْبُ القَمْعِيُّ. وحدة قمعية الشكل في القسم الأمامي من قاع البطين الثالث للدماغ في داخل قمع النخامية.

- r. lateralis fossae rhomboidei (= r. lateralis ventriculi quarti) الرَدْبُ الوَحْشِيُّ لِلْحَفْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ.

- r. lateralis ventriculi quarti الرَدْبُ الوَحْشِيُّ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. استطالة ضيقة ومنحنية لتجويف البطين الرابع للدماغ تمتد وحشياً على السطح الظهري على السويقة المخيخية السفلية وتحوي استطالة وحشية للصفيرة المشيمائية وتسهل مرور السائل الدماغي النخاعي إلى الحيز تحت العنكبوتية.

- r. opticus الرَدْبُ البَصَرِيُّ. ومدة في قاع البطين الثالث للدماغ تقع بين التصالبة إلى الخلف والصفحة الانتهاية إلى الأمام.

- r. pinealis الرَدْبُ الصَّنَوْبَرِيُّ. امتداد للبطين الثالث إلى سويقة الجسم الصنوبري.

- r. posterior fossae interpeduncularis الرَدْبُ الخَلْفِيُّ لِلْحَفْرَةِ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ. جزء الحفرة بين السويقتين الذي يقع جزئياً تحت حافة الجسر الأمامية.

- r. suprapinealis الرَدْبُ فَوْقَ الصَّنَوْبَرِيِّ. الامتداد الخلفي للبطين الثالث للدماغ فوق وحول الجسم الصنوبري.

- r. triangularis الرَدْبُ المثلث. رَدْبٌ مثلث صغير على الجدار الأمامي للبطين الثالث للدماغ وتقع

قاعدته تحت الصوار الأمامي وتتكون جوانبه من تقارب عمودي قبو المخ.

أَلَمُ المُسْتَقِيمِ. rectalgia (= proctalgia)

رَجْعَةٌ. عودة الأعراض recurrence بعد هدأتها.

رَاجِع. 1. يجري إلى الخلف أو إلى مصدره. 2. العودة بعد فاصلة زمنية أو حيزية.

مُنْعَكَس. (ج: مُنْعَكَسَات). فعل أو حركة reflex أو صور منعكسة من جسم أو مجموع فعاليات أية حركة لا إرادية.

- abdominal r's. المُنْعَكَسَاتُ البَطْنِيَّة. تقلص العضلات البطنية عند تخديش جدار البطن.

- abdominocardiac r. المُنْعَكْسُ البَطْنِيُّ القَلْبِيُّ. أي منعكس قلبي يتولد عن تنبيه الأعصاب الودية البطنية.

- accommodation r. مُنْعَكْسُ التَّكْيِيفِ. التغييرات المنسقة التي تتم عند تكيف العين للنظر القريب وهي تضيق الحدقة وتقارب العينين وزيادة تحدب عدسيتها.

- Achilles tendon r. (= jerk, triceps surae) مُنْعَكْسُ العُرْقُوبِ.

- acoustic r. مُنْعَكْسُ السَّمْعِ. تقلص العضلة الركابية عند التنبيه بصوت عالٍ.

- acquired r. (= conditioned r.) مُنْعَكْسٌ مُكْتَسَبٌ؛ مُنْعَكْسٌ شَرْطِيٌّ.

- adductor r. (of thigh) مُنْعَكْسُ الْمُقَرَّبَةِ. عند نقر وتر العضلة المقربة الكبيرة عندما يكون الفخذ في حالة التباعده تقلص العضلات المقربة.

- allied r's. المنعكسات المتحالفة؛ المُنْعَكَسَاتُ المُتَّحِدة. منعكسات يستعمل فيها منبهان يردان إلى نفس السبيل المشترك أو تولد تأثيرات على عضلتين متآزرتين.

- anal r. مُنْعَكْسُ الشَّرْجِ. تقلص مصرة الشرج عند تهيج جلده أو الجلد المحيط به.

- ankle r. (= jerk, triceps surae) مُنْعَكْسُ العُرْقُوبِ. منعكس الكاحل.

- antagonistic r's. مُنْعَكَسَاتُ مُضَادَّة. حركات منعكسية لا تحدث في العضلة المنبهة نفسها بل في العضلة المضادة لها.

- **Aschner's r. (= oculocardiac r.)** مُنْعَكْسُ أَشْنَر: المنعكس العيني القلبي.

- **attention r. of pupil** مُنْعَكْسُ الْإِنْتِبَاهِ الْحَدَقِي. تغير سعة الحدقة عند تثبيت الانتباه بصورة مفاجئة.

- **attitudinal r's.** الْمُنْعَكْسَاتُ الرِّضْعِيَّة. المنعكسات المتعلقة والمرافقة لوضع الجسم.

- **audio- oculusgic r.** الْمُنْعَكْسُ السَّمْعِيُّ الْمُخَرِّكُ لِلْعَيْنِ. توجيه العينين سوية إلى جهة الصوت عند سماع صوت مفاجيء.

- **auditory r.** مُنْعَكْسُ سَمْعِي. أي من المنعكسات التي ترافق سماع الأصوات وخصوصاً غلق العينين عند سماع صوت مفاجيء.

- **aural r.** مُنْعَكْسُ أُذْنِي. أي منعكس يترافق مع فعاليات جهاز السمع.

- **auricle r.** مُنْعَكْسُ الْأُذُن. حركة الأذن اللاإرادية التي تتولد عند سماع صوت مفاجيء.

- **auriculocervical nerve r. (= Snellen's r.)** مُنْعَكْسُ الْعَصَبِ الْأُذْنِي الرَّقَبِيِّ. احتقان أحد الأذنين عند تنبيه النهاية الدنيا للعصب الأذني الكبير المقطوع.

- **auriculopalpebral r. (= Kehr's r.)** الْمُنْعَكْسُ الْأُذْنِي الْجَفْنِي. غلق العين نتيجة التنبيه للمس أو الحراري لأعمق قسم من الصماخ السمعي الظاهر وغشاء الطبل.

- **autonomic r.** مُنْعَكْسٌ مُسْتَقْلِي. استجابات العضلات الملساء أو الغدد أو النسيج الناقل في القلب والتي تغير الحالة الوظيفية للعضو الذي يغذيه العصب المنبه.

- **axon r.** الْمُنْعَكْسُ الْمُخَوَّارِي. منعكس ينتج عن تنبيه أحد فروع العصب الذي يولد دفعات تسير باتجاه مركز العصبون حتى نقطة تفرعه حيث تنعكس الدفعات إلى الفرع الثاني وإلى العضو المنفذ.

- **Babinski's r.** مُنْعَكْسُ بَابِنْسكي. ثني خلفي لإبهام القدم عند تنبيه أخمص القدم الذي يحدث في آفات السبيل الهرمي والذي يدل على وجود شلل عضوي وبذلك يفرق عن الشلل الهستيري.

- **Babkin's r.** مُنْعَكْسُ بَابِكِن. يؤدي الضغط بابهام الفاحص على راحتي يدي الوليد إلى فتح فمه ولا يحدث ذلك عند الولدان في حالة الوسن أو السبات.

- **Bainbridge r.** مُنْعَكْسُ بَيْنْبْرِيدج. يؤدي ارتفاع

الضغط أو تمدد الأوردة الجسمية الكبيرة أو تمدد الأذين الأيمن المفرط إلى تسرع القلب.

- **Barkman's r.** مُنْعَكْسُ بَارْكْمَان. تقلص العضلة المستقيمة البطنية على نفس الجهة عند تنبيه الجلد تحت الحلمة.

- **basal joint r. (= finger- thumb r.)** مُنْعَكْسُ الْمَفْصَلِ الْقَاعِي. يؤدي

- **behavior r. (= conditioned response)** مُنْعَكْسٌ سَلُوكِي. استجابة شرطية.

- **Bekhterev's r.** مُنْعَكْسٌ بِخْتِيرِف. واحد من المنعكسات الأربع التالية. 1. العميق deep B.r. يؤدي الثني اللافاعل للقدم وأصابعها باتجاه الأخص ثم إطلاقها إلى عودتها لتنتهي بالاتجاه الظهري المعاكس ويترافق ذلك مع حركات انثنائية للركبة والورك. 2. الخثلي hypogastric B.r. تقلص العضلات السفلية للبطن عند تخديش جلد السطح الإنسي للفخذ. 3. الحدقي paradoxical pupillary B.r. توسع الحدقة عند تعرضها للضوء والذي يشاهد أحياناً في التابس الظهري والشلل العام. 4. الانفسي nasal B.r. تؤدي دغدغة الغشاء المخاطي للتجويف الأنفي بريشة أو بقطعة ورق إلى تقلص عضلات نفس الجهة من الوجه ويسمى هذا المنعكس الانفي.

- **Bekhterev- Mendel r. (= Mendel-Bekhterev r.)** مُنْعَكْسٌ بِخْتِيرِف - مَنْدِل.

- **biceps r.** مُنْعَكْسُ ذَاتِ الرَّأْسَيْنِ. تقلص عضلة ذات الرأسين للذراع عند نقر وترها وهو منعكس سوي ولكن تدل زيادته المفرطة على الإصابة بأحد الأمراض مثل زيادة منعكس الركبة.

- **bladder r.** مُنْعَكْسُ الْمَثَانَةِ. أي من المنعكسات العديدة التي تساعد على إفراغ البول من دون جهد وإدانة ذلك من دون وعي ومنها تقلص المثانة عند امتلائها بالبول أو تقلصها عند تنبيه الإحليل بالجريان أو تقلصها عند تمدد القسم الداني من الإحليل أو توسع الإحليل عند جريان السائل فيه أو توسع المثانة الذي يؤدي إلى ارتخاء المصرة الإحليلية الخارجية أو ارتخاء العضلة الإحليلية الدانية الملساء عند تمدد المثانة.

- **blink r. (= corneal r.)** مُنْعَكْسُ الطَّرَف.

- **Brain's r.** مُنْعَكْسٌ بَرِين. امتداد الذراع المثني

- العضلة الدويرية للعين عند توليد صوت حاد مفاجيء بالقرب من الأذن ولا يحدث ذلك عند الصمم التام بسبب مرض تيهي.
- bregmocardiac r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَامِي الْقَلْبِي.** يؤدي الضغط على اليافوخ الهامي إلى بطء القلب.
- Brissaud's r.** **مُنْعَكْسُ بريسو.** تقلص العضلة الموترة للفاقة الفخذية عند دغدغة أخمص القدم.
- bulbo cavernous r.** **الْمُنْعَكْسُ الْبَصْلِيُّ الْكَهْفِيُّ.** يؤدي نقر ظهر القضيب إلى تقلص العضلة البصلية الكهفية.
- bulbo mimic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمُحَاكِي لِلْبَصْلِيِّ.** في حالة السبات الناتج عن السكته يؤدي الضغط على العقلة إلى تقلص عضلات نصف الوجه المعاكس للآفة أما عند السبات الناتج عن التسمم فيحدث المنعكس على جهتي الوجه.
- carotid sinus r.** **مُنْعَكْسُ الْجَنِبِ السَّبَاتِيِّ.** يؤدي الضغط على الشريان السباتي أو في داخله عند مستوى تفرعه إلى بطء سرعة القلب ويتأصل هذا المنعكس من جيب الشريان السباتي الباطن.
- cerebral cortex r. (= Haab's r.)** **مُنْعَكْسُ قَشْرَةِ الْمَخ.** تقلص حدقتي العينين عند جلوس المريض في غرفة مظلمة ومن دون أي تكيف أو تقارب لهما عندما يوجه نظره إلى جسم مضيء موجود في الساحة البصرية.
- Chaddock r.** **مُنْعَكْسُ تَشَادُوك.** يؤدي تنبيه أسفل الكعب الخارجي إلى انبساط إبهام القدم ويحدث ذلك في آفات السبيل الهرمي.
- chain r.** **مُنْعَكْسُ مُسَلْسَل.** سلسلة من المنعكسات ينبه كل واحد منها المنعكس الذي يليه لتوليد فعالية منسقة.
- chin r.** **مُنْعَكْسُ الذَّقْن.** يؤدي نقر الذقن إلى غلق الفم.
- ciliary r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَدْبِيُّ.** حركة الحدقة عند تكيف العين.
- ciliospinal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَدْبِيُّ الْفُخَاعِيُّ.** يؤدي التنبيه المؤلم لجلد الرقبة إلى توسيع الحدقة.
- clasp-knife r. (= lengthening r.)** **مُنْعَكْسُ التَطْوِيل.**
- cochleo-auricular r. (= cochleopal-pebral r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَاقِعِيُّ الدَّوِيرِيُّ.** تقلص
- العضلة الدويرية للعين عند توليد صوت حاد مفاجيء بالقرب من الأذن ولا يحدث ذلك عند الصمم التام بسبب مرض تيهي.
- cochleopupillary r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَاقِعِيُّ.** استجابة القرحة المكونة من تقلص الحدقة الذي يتلوها توسعها عند التنبيه بصوت عالٍ.
- cochleostapedial r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَاقِعِيُّ.** التقلص الانعكاسي للعضلة الركابية عند سماع الضوضاء.
- concealed r.** **مُنْعَكْسٌ مَكْتُومٌ؛ مُنْعَكْسٌ مَخْفِي.** منعكس يتولد عن أحد المنبهات ولكنه يختفي بسبب وجود منعكسات سائدة أقوى منه تتولد عن نفس المنبه.
- conditioned r. (= conditioned response)** **مُنْعَكْسٌ شَرْطِي.** منعكس مكتسب يتولد عن الإشراف بعينه لم يكن يولد مثل هذا المنعكس قبل ذلك.
- conjunctival r..** **الْمُنْعَكْسُ الْمُتَّجِمِي.** غلق العين عند لمس ملتحماتها.
- consensual light r.** **مُنْعَكْسُ الضَّوءِ الْإِتِّفَاقِيِّ.** التنبيه الضوئي لإحدى العينين يؤدي إلى تقلص حدقة العين الثانية.
- convergency r.** **الْمُنْعَكْسُ التَّقَارِبِيُّ.** تقارب المحور البصري وتثبيت العينين على نقطة قريبة عند النظر إليها.
- convulsive r.** **مُنْعَكْسٌ إِخْتِلَاجِي.** منعكس تنقلص فيه عدة عضلات اختلاجياً ومن دون أي تناسق بين تقلصاتهما.
- coordinated r.** **مُنْعَكْسٌ مُنَسَّقٌ.** منعكس تساهم فيه عدة عضلات وتنقلص بطريقة منسقة لتوليد عمل نافع.
- corneal r.** **مُنْعَكْسُ الْقَرْنِيَّةِ.** 1. يؤدي تهيج القرنية إلى إغلاق الجفنين 2. انعكاس الضوء من سطح القرنية.
- corneomandibular r. (= corneo-ptyergoid r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْقَرْنِيُّ الْفَكِّي السُّفْلِيُّ.** حركة الفك السفلي إلى الجهة المعاكسة للعين التي تلمس قرنيتهما مع انفتاح الفم الجزئي.
- corneomental r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَرْنِيُّ الذَّقْنِي.** تجعد عضلات الذقن على جهة العين التي يضغط عليها.

- **cough r.** مُنْعَكْسُ السُّعَالِ. سلسلة الحوادث التي تبدأ من حساسية بطانة السبل الهوائية للرئة وتتوسط البصلة (النخاع المستطيل) فيها نتيجة النبضات العصبية التي تصلها بواسطة العصب المبهم والتي تؤدي إلى السعال وهو إفراغ السبل الهوائية من الأجسام الغريبة.
- **cranial r.** منعكس قحفي؛ مُنْعَكْسُ دِمَاعِي. أي من المنعكسات التي تمر سبلها إلى الدماغ مباشرة.
- **cremastic r.** مُنْعَكْسُ المُشَمَّرَةِ. يؤدي تنبيه جلد الجهتين الأمامية والداخلية للفخذ إلى انسحاب خصية نفس الجانب للأعلى ويدل وجود هذا المنعكس على سلامة شدة العصب القطني الأول في النخاع الشوكي أو جذوره بينما يدل غيابه على تلف شدة العصب القطني الأول أو جذره أو آفة السبل القشري النخاعي الشوكي.
- **crossed r.** المُنْعَكْسُ المُقَصَّالِب. يؤدي تنبيه إحدى جهتي الجسم عادة إلى استجابة مناسبة في الجهة الأخرى خاصة في العين.
- **cutaneous pupillary r.** المُنْعَكْسُ الجِلْدِيّ. توسع حدقة العين عند قرص جلد العنق أو الوجنة.
- **dartos r. (= serotal r.)** مُنْعَكْسُ السِّلْحِيَّة. يؤدي التنبيه المفاجيء لعجان المريض عند وقوفه مع الانفراج الواسع لساقيه إلى تقلص العضلة السلخية الدودي الشكل.
- **dazzle r.** مُنْعَكْسُ الإِنْبَهَار. يؤدي توجيه ضوء ساطع إلى العين إلى غلق الجفنين المباشر الذي يدوم طيلة مدة التنبيه.
- **deep r.** مُنْعَكْسٌ عَمِيق. منعكس يتولد عن النقر الحاد للعضلة أو لوترها الذي يولد تمددها أولاً ومن ثم تقلصها ويسمى أيضاً المنعكس الوتري.
- **defecation r. (= rectal r.)** مُنْعَكْسُ التَّفَوُّط.
- **defence r.** مُنْعَكْسٌ دِفَاعِيّ. حركات تقلصية وتعددية في الطرف المشلول يتولد عن ثني أصابع القدم نحو الأخص.
- **delayed r.** مُنْعَكْسٌ آجِل. منعكس يحدث بعض الوقت بعد التنبيه.
- **depressor r.** مُنْعَكْسٌ خَافِض. منعكس لأحد المنبهات يؤدي إلى خفض فعالية المركز الحركي.
- **direct r.** مُنْعَكْسٌ مُبَاشِر. تقلص في نفس الجهة التي يوضع عليها المنبه.
- **direct light r.** مُنْعَكْسُ الضَّوِّ المُبَاشِر. عند توجيه ضوء لشبكية العين خلال حدقتها تتقلص مضيق الحدقة مباشرة وتضييق فتحتها.
- **doll's eye r.** مُنْعَكْسٌ عَيْنِ الدُّفِيَّة. عند تدوير رأس الوليد الخديج إلى الجهة الوحشية تنسحب العينان بصورة تآزرية إلى الجهة المعاكسة ثم تعود إلى منتصف الشق الجفني، ويجري ذلك للوليد الخديج والمريض المصاب بالقيوبية لفحص سلامة العصب المحرك للعين وحيوية جذع الدماغ.
- **dorsal r.** المُنْعَكْسُ الظَهْرِيّ. تقلص عضلات الظهر استجابة لتنبيه الجلد على طول العضلة الناصبة للفقار.
- **dorsalcuboidal r. (= Mendel Beckhterev r.)** المُنْعَكْسُ الظَهْرِيّ النَرْدِيّ. يؤدي قرع ظهر القدم عادة إلى الانثناء الظهري لأصابع القدم الثاني حتى الخامس ويحدث في بعض الحالات المرضية العصبية العضوية بدلاً من ذلك انثناءها نحو الأخص.
- **elbow r. (= triceps r.)** مُنْعَكْسُ المِرْفَق.
- **embrace r. (= Moro's r.)** مُنْعَكْسُ العِنَاق. تنبيه الوليد المفاجيء مثل قرع المنضدة عند إحدى جهتيه أو بتمديد العنق المفاجيء مثل السماح للرأس بالسقوط نحو الخلف أو سحب الطفل المستلقي من ذراعيه فجأة ثم تركه ليسقط يؤدي كل ذلك إلى انثناء الفخذين والركبتين وتباعد الأصابع وشم أطباقها مع انتشار الذراعين ثم ضمهما في وضع العناق. ويشاهد ذلك في الولدان حتى الشهر الثالث أو الرابع من العمر.
- **emergency light r.** مُنْعَكْسُ الضَّوِّ الطَّارِئ. عند تنبيه الشبكية بضوء شديد تتقلص الحدقة وتغلق الأجفان ويهبط الحاجب.
- **enterogastric r.** المُنْعَكْسُ المِعْوِيّ المَعِدِيّ. تثبيط الحركات المعدية عند دخول مادة مهيجة إلى الإثنا عشر.
- **epigastric r.** المنعكس الشرسوفي. تقلص العضلات البطنية عند تنبيه جلد الشرسوف أو تنبيه الجلد فوق الحيزين الأربيين الخامس والسادس قرب الإبط.
- **Erben's r.** مُنْعَكْسٌ إِرْبِن. ببطء النبض عند ثني

- الراس والجذع بشدة إلى الامام ويعزى ذلك إلى استثارة المبهم.
- **erector spinae r.** **مُنْعَكْسُ نَاصِبَةِ الْفَقَارِ.**
تقلص العضلة الناصبة للفقار عند تنبيه الجلد على حافتها.
- **extensor r.** **مُنْعَكْسُ الْبَسْطِ.** تقلص العضلة المضادة للجاذبية عند تنبيهها المناسب.
- **eylid closure r. (= 1. corneal r. 2. conjunctival r.)** **مُنْعَكْسُ غُلْقِ الْأَجْفَانِ.**
- **facial r. (= bulbomimic r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْوَجْهِي.**
- **faucial r.** **الْمُنْعَكْسُ الْخَلْقِي.** قيء انعكاسي عند تهيج الحلق.
- **femoral r. (= Remak's r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْفَخْذِي.** الانثناء الأخمصي لأصابع القدم الثلاثة الأولى وأحياناً القدم أيضاً عند ضرب سطح القسم العلوي الأمامي للفخذ.
- **finger- thumb r.** **مُنْعَكْسُ الإصْبَعِ وَالْإِبْهَامِ.**
يؤدي ثني المفصل السنعي السلامي لأحد الأصابع إلى انثناء المفصل القاعدي وبسط المفصل النهائي للإبهام.
- **flexion r.** **مُنْعَكْسُ الْفَنِي.** وهو منعكس السحب عند تنبيه العضو بمبته مؤز والذي يؤدي إلى انثناء الذراع وانسحابه.
- **flexion r. of leg** **مُنْعَكْسُ ثَنِي السَّاقِ.** يؤدي قرع وتري العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف إلى ثني الساق.
- **flexor r., paradoxical** **مُنْعَكْسُ الْفَنِي التَّنَاقُضِي.** الانثناء الظهري لإبهام القدم أو لكل الأبخس عند الضغط على عضلات الربلة.
- **fontanel r. (= Grünfelder's r.)** **مُنْعَكْسُ الْيَافُوخِ.** الانثناء الظهري للأبخس الكبير مع انتشار أصابع القدم الأخرى عند الضغط المستمر على زاوية اليافوخ الخلفي الوحشي ويحدث ذلك في مرض الأذن الوسطى عند الأطفال دون سن الخامسة من العمر.
- **front- tap r.** **مُنْعَكْسُ النَقْرِ الْأَمَامِي.** تقلص عضلة الساق المنبسطة عند النقر على جلد الساق.
- **fusion r.** **مُنْعَكْسُ الْإِنْدِغَامِ.** المنعكس الذي يضم صورتين شبكيتين العينين ليولد منهما حساً بصورة واحدة للجسم المنظور.
- **gag r. (= pharyngeal r.)** **مُنْعَكْسُ التَّهَوُّعِ؛ الْمُنْعَكْسُ الْبُلْعُومِي.**

- **gastrocolic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمَعْدِي الْقَوْلُونِي.** زيادة الفعالية التمعجية للأمعاء والقولون بعد دخول الغذاء إلى المعدة الخالية.
- **gastropancreatic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمَعْدِي الْمُنْكَرِيَّاسِي.** زيادة إفراز البنكرياس نتيجة تمدد جسم المعدة وهو منعكس يتم بواسطة العصب المبهم.
- **Geigel's r.** **مُنْعَكْسُ غَيْجِل.** منعكس في الإناث يناظر منعكس المشمرة عند الذكور أي عند ضرب الناحية الداخلية العلوية للقسم العلوي من الفخذ تتقلص الألياف العضلية للحافة العلوية من رباط بوبار (الرباط الأربي).
- **genital r.** **مُنْعَكْسُ تَنَاسُلِي.** أبة هيرجية منعكسية تتولد عن اضطراب الجهاز التناسلي.
- **Gifford's r. (= orbicularis pupillary r.)** **مُنْعَكْسُ غِيْفُورْد؛ الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِي الْحَدَقِي.**
- **gluteal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْأَلْوِي.** يؤدي ضرب جلد الآلية إلى تقلص العضلات الآلوية.
- **Gordon's r. (= paradoxical flexor r.)** **مُنْعَكْسُ غُورْدِن؛ مِنعكس الثني التناقضي.**
- **grasp r. (= grasping r.)** **مُنْعَكْسُ الْغُبْضِ.** منعكس يتكون من حركة قبضية لأصابع اليد أو أباحس القدم استجابة لتنبيهها.
- **Grünfelder's r. (= fontanel r.)** **مُنْعَكْسُ غِرُونْفيلْدِر.** منعكس اليافوخ.
- **gustolacrima r.** **الْمُنْعَكْسُ الدَّقْوِي الدَّمْعِي.** منعكس شاذ حيث يؤدي تناول الطعام بالفم إلى تنبيه إفراز اللعاب والدموع.
- **H-r.** **مُنْعَكْسُ H.** منعكس أحادي التشابك يظهر عند تنبيه أحد الأعصاب وخصوصاً عند تنبيه العصب الظنبوبي بمبته كهربائي.
- **Haab's r. (= cerebral cortex r.)** **مُنْعَكْسُ هَاب.**
- **heel- tap r.** **مُنْعَكْسُ نَقْرِ الْعَقَبِ.** منعكس يحدث في أمراض السبيل الهرمي ويتكون من انتشار أصابع القدم وانثناءها الأخمصي عند نقر عقب المريض.
- **Hering-Breuer r.** **مُنْعَكْسُ هِيرِنْغ - بَرُور.** الآلية العصبية التي تحدد التحركات التنفسية، إذ تمر المنبهات من النهايات الحسية في الرئة ولربما في

- أقسام أخرى إلى العصب المبهم لتحديد الحركات الزفيرية والشهيقية في التنفس الطبيعي.
- **Hirschberg's r.** مُنْعَكْسُ هِرْشْبِيرْغ. يؤدي دغدغة أخمص القدم عند قاعدة إبهامها إلى تقاربها وانثناءها الأخمصي.
- **hypochondrial r.** المُنْعَكْسُ المَرَاقِي. يؤدي الضغط السريع على الحافة السفلية للاضلاع إلى شهيق مفاجئ.
- **hypogastric r.** المنعكس الحثلي. يؤدي تخديش جلد السطح الإنسي للخصد إلى تقلص العضلات السفلية للبطن.
- **ileogastric r.** المُنْعَكْسُ اللِّغَائِي المَعِدِي. تثبيط الحركات المعوية عند تمدد اللغائف.
- **Inborn r. (= unconditioned r.)** مُنْعَكْسٌ خَلْقِي. منعكس لا شرطي.
- **indirect r. (= crossed r.)** مُنْعَكْسٌ لا مباشر؛ منعكس متصالب.
- **Infraspinatus r.** مُنْعَكْسُ العضلة تحت الشوكية. عند طرق نقطة معينة على الكتف على خط ينصف الزاوية المكونة من شوكة العظم وحافته الداخلية تدور الذراع للخارج مع استقامة المرفق.
- **inguinal r. (= Geigel's r.)** المُنْعَكْسُ الأَرْبِي. المنعكس بين الكتفين.
- **Interscapular r.** يؤدي التنبيه الموضع بين الكتفين إلى تقلص العضلات الكتفية.
- **intestinointestinal r.** المُنْعَكْسُ المِعْوِي. عند الزيادة المفرطة لتمدد أحد أقسام الأمعاء أو عند تهيج غشائه المخاطي تثبط فعاليات الأقسام الباقية من الأمعاء حتى زوال التمدد المفرط أو العامل المهيج.
- **Inverted radial r.** المُنْعَكْسُ الكُفْبَرِي المُنْقَلِب. انثناء الأصابع من دون حركة الساعد الذي يتولد عند نقر النهاية السفلية للكعبرة ويدل ذلك على مرض الشدفة العنقية الخامسة للنخاع الشوكي والمترافقة مع تخريب السبيل الهرمي تحت ذلك المستوى.
- **Iris contraction r. (= pupillary r.)** مُنْعَكْسُ تَقْلُصُ القُرَاجِيَّة. منعكس الحدقة.
- **ischemic r.** مُنْعَكْسُ الإِقْفَار. ارتفاع ضغط الدم الشرياني استجابة لإقفار الدماغ.
- **jaw r. (= jaw jerk r.)** مُنْعَكْسُ نَفْضَةِ الفك. انغلاق الفم الذي يتولد عن ضرب الفك السفلي للأسفل عندما يكون معلقاً وفتحاً بصورة لا فاعلة ونادراً ما يشاهد ذلك في الحالة الطبيعية ولكنه يظهر بوضوح في آفات السبيل القشري النخاعي.
- **Joffroy's r.** مُنْعَكْسُ جُوفُرُوي. نقصان العضلات الأولية عند الضغط على الأليتين في الشلل التشنجي.
- **Juster r.** مُنْعَكْسُ جِسْتَر. انبساط الأصابع بدلاً من انثنائها عند تنبيه الراحة.
- **Kehrer's r. (= kisch r. = auriculopal-pebral r.)** مُنْعَكْسُ كِيَر. منعكس الركبة؛ منعكس رباعية الرؤوس.
- **knee jerk r. (= quadriceps jerk)** مُنْعَكْسُ كُوحَر. تقلص العضلات البطنية عند الضغط على الخصية.
- **lacrimal r.** المُنْعَكْسُ الدَّمْعِي. إفراز الدمع عند مس الملتحمة فوق القرنية.
- **Landau r.** مُنْعَكْسُ لَانْدَاو. عند حمل الوليد في الوضع المكبوب يكون الجسم قوساً مع تحدبه للأعلى وعند الضغط الخفيف على الرأس أو بتأثير الجاذبية تنتهي الرقبة والورك وينعكس اتجاه القوس.
- **laryngeal r.** مُنْعَكْسُ البَلْعُوم. يؤدي تهيج الحلق والحنجرة إلى السعال.
- **laughter r.** مُنْعَكْسُ الضَّحْك. الضحك الذي يتولد عن الدغدغة.
- **Liddell & Sherrington r. (= stretch r.)** مُنْعَكْسُ لِيدِل وشِيرِنْغْتُون.
1. مُنْعَكْسُ الضَّوء. 2. مُنْعَكْسُ ضِيَائِي.
1. تضيق الحدقة عند سقوط الضوء على العين
2. صورة مضيئة تنعكس من غشاء الظلم عند فحص الأذن بالمنظار.
3. نقطة دائرية ضوئية ترى منعكسة من الشبكية بمرآة منظار الشبكية.
- **lip r.** مُنْعَكْسُ الشَفَةِ. حركة انعكاسية للشفتين عند الولدان أثناء نومهم تشاهد عند نقر زاوية الفم.
- **Loven r.** مُنْعَكْسُ لُوفِن. توسع الاوعية العام للعضو عند تنبيه عصبه الوارد.
- **lumbar r. (= dorsal r.)** المُنْعَكْسُ القَطْنِي.

- **Lust's r.** مُنْعَكَسُ لِسْت. تبعيد القدم مع انثناءها. الظهري عند نقر العصب الشظوي الأصلي.
- **Magnus & de Kleijn neck r's.** مُنْعَكَسَات. الرقبة لماغنوس ودي كلاين. امتداد الطرفين العلوي والسفلي على نفس الجهة مع زيادة التوتر في جهة الجسم التي يدور الشخص نحوها مع انثناء وفقدان التوتر في الجهة المعاكسة التي يتجه القذال نحوها وهذا هو علامة أساسية في صَغَل فصل المخ.
- **mandibular r. (= jaw r.)** مُنْعَكَسُ الْفَكِّ السُّفْلِيِّ. منعكس كَتَلِي. منعكس يظهر في كل المنطقة التي يتحكم بها الجزء المصاب من النخاع الشوكي.
- **Mayer's r.** مُنْعَكَسُ مَآيِر. مقاومة وتقريب الإبهام مع الثني في المفصل السنعي السلامي وامتداد في المفصل بين السلاميات عند الضغط على إصبع السبابة.
- **McCarthy's r.** مُنْعَكَسُ مَكَارْثِي. تقلص العضلة الدويرية العينية عند نقر العصب فوق الحجابي.
- **McCormac's r.** مُنْعَكَسُ مَآك كُورْمَاك. يؤدي قرع الوتر الرضفي لأحد الساقين إلى تقريب الساق الثانية.
- **Mendel- Bekhterev r.** مُنْعَكَسُ مِندَل بَحْتِيرِف. يسبب عادة طرق ظهر القدم انثناءاً ظهرياً لأصابع القدم الثاني حتى الخامس ولكنه يسبب في بعض الأمراض العضوية انثناء الأصابع نحو الأخص.
- **Morley's peritoneocutaneous r.** مُنْعَكَسُ مُورلي الصِّفَاقِي الجِلْدِي. عند تهيج أي من نهايات الأعصاب الدماغية النخاعية التي تغذي الصفاق أو الأنسجة تحت الصفاقية يتولد ألم يرجع إلى باحة الشدقة الجلدية المناسبة للعصب المنبه.
- **Moro's r., Moro embrace r.** مُنْعَكَسُ مُورُو؛ مُنْعَكَسُ الْعِنَاق. (= embrace r.)
- **motor r.** مُنْعَكَسُ حَرَكَتِي. منعكس يتولد عند التنبيه المحيطي للألية الحركية.
- **muscular r.** مُنْعَكَسُ غَضَلِي. حركة انعكاسية تتولد عند تمديد العضلة.
- **myenteric r.** مُنْعَكَسُ غَضَلِي مِعْوِي. تقلص المعى فوق جزئه المهيج أو الموسع وانبساطه تحت هذا الجزء.
- **myotatic r. (= stretch r.)** مُنْعَكَسُ الْبَسْط. منعكس التمدد.
- **nasal r.** مُنْعَكَسُ أَنْفِي. يؤدي تهيج غشاء تجويف الأنف إلى العطاس وإلى تقلص عضلات نفس الجهة من الوجه.
- **nasolabial** المُنْعَكَسُ الْأَنْفِي الشَّفَوِي. يؤدي لمس ذروة الأنف وتحريكها للأعلى بسرعة وبلطف إلى الانقلاب الخلفي للرأس بصورة مفاجئة مع تمدد الظهر وانقلاب خلفي للذراعين والمنكبين وامتداد وانكباب الساعد وانبساط وتقريب الساقين ويحصل ذلك في الولدان الأصحاء ثم يختفي بعد الشهر الخامس من عمرهم.
- **nasomental r.** المُنْعَكَسُ الْأَنْفِي الذَّقْنِي. تقلص العضلة الذقنية عند القرع على جانب الأنف بالمطرقة.
- **neck righting r.** المُنْعَكَسُ الْمَقُوم لِلرَّقْبَةِ. دوران الجذع بالاتجاه الذي يدور فيه رأس الوليد ويختفي أو يقل هذا المنعكس في الولدان المصابين بالتشنج.
- **nociceptive r's.** مُنْعَكَسَاتُ الْأَلَم. المنعكسات التي تتولد عن المنبهات المؤلمة.
- **nostril r.** مُنْعَكَسُ الْمُنْخَر. نقص حجم فتحة المنخر الذي يتم على نفس جهة الرئة المريضة.
- **obliquus r.** مُنْعَكَسُ الْمَنْحَرَفَةِ. يؤدي تنبيه الجلد تحت الرباط الأربي إلى تقلص جزء من العضلة المائلة الظاهرة.
- **oculocardiac r.** المُنْعَكَسُ الْعَيْنِي الْقَلْبِي. ببطء نظم ضربات القلب عند الضغط على العين أو على الجيب السباتي وعادة ما يبلغ في الحالة السوية من 13-5 ضربة بالدقيقة.
- **oculocephalogyric r.** المُنْعَكَسُ الْعَيْنِي الرَّأْسِي الْحَرَكَتِي. حركة الرأس والعينين والجسم باتجاه موضع الاهتمام البصري.
- **oculopharyngeal r.** المُنْعَكَسُ الْعَيْنِي الْبَلْعُومِي. غلق العينين تلقائياً عند البلع السريع.
- **oculopupillary r. (= trigeminus r.)** المُنْعَكَسُ الْعَيْنِي الْحَذَقِي.
- **oculosensory cell r. (= trigeminus r.)** المُنْعَكَسُ الْعَيْنِي الْخَلَوِي الْجِسْمِي.

- **oculovagal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ الْمُعْهَمِي.**
يؤدي الضغط على العين إلى زيادة سرعة ضربات القلب أو النظم الاذيني البطيئي.
- **opticofacial winking r.** **مُنْعَكْسُ الرَّفِّ الْعَيْنِيِّ الْوُجْهِيِّ.**
غلق الاجفان عند ظهور الاجسام بصورة مفاجئة في الساحة البصرية.
- **orbicularis r. (= orbicularis pupillary r.)** **الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِيُّ.**
- **orbicularis oculi r.** **مُنْعَكْسُ عضلة العين الدويرية.**
التقلص السري للعضلة الدويرية العينية التي تؤدي إلى غلق العين عند طرق الناحية الخارجية للحرف فوق الحاجبي فوق المقطب أو حول حافة الحاجب.
- **orbicularis pupillary r.** **الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِيُّ الْحَدَقِيُّ.**
تقبض الحدقة على جهة واحدة ثم اتساعها عند غلق أو محاولة غلق الجفنين اللذين نحاول أن نحافظ على فتحهما بشدة ونقاوم غلقهما.
- **palatal r. (= palatine r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْحَنَكِيُّ.**
يؤدي تنبيه الحلق إلى البلع.
- **palm-chin r.** **الْمُنْعَكْسُ الرَّاحِي - الدَّقْنِي.**
نفضان الدقن عند تنبيه الراحة أو حكها.
- **palmomental r. (= palm- chin r.)** **الْمُنْعَكْسُ الرَّاحِي الدَّقْنِي.**
- **paradoxical pupillary r.** **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيُّ الْمُتَنَاقِض.**
أي منعكس حدقي شاذ كتوسع الحدقة عند تنبيه الشبكية بالضوء والذي يشاهد أحياناً في الشلل العام والتابس الظهري ويسمى أيضاً منعكس بختريف ومنعكس الحدقة المعكوس.
- **patellar r. (= quadriceps jerk)** **مُنْعَكْسُ الرَّضْفَةِ رُبَاعِيَةِ الرَّؤُوس.**
- **patelloadductor r.** **مُنْعَكْسُ الرَّضْفَةِ الْمُقَرَّب.**
تقارب الفخذ المتصالب عند قرع وتر العضلة رباعية الرؤوس الفخذية مثلاً في منعكس الرضفة.
- **pathologic r.** **مُنْعَكْسٌ مَرَضِي.**
منعكس شاذ ولكنه ناتج عن سبب مرضي ويمكن أن يكون علامة للمرض.
- **pectoral r.** **الْمُنْعَكْسُ الصَّدْرِي.**
عند وضع إصبع الفاحص على وتر العضلة الصدرية بالقرب من عظم العضد وطرق الإصبع بشدة على أن يكون الذراع موضوعاً في وضع بين التقريب والتباعد يتولد تقريب الذراع مع دوران بسيط للداخل.

- **penile r. (= penis r. = bulbocavernous r.)** **مُنْعَكْسُ الْقَضِيب.**
- **perianal r. (= anal r.)** **مُنْعَكْسُ الشَّرَاج.**
- **peritoneointestinal r.** **الْمُنْعَكْسُ الصَّفَافِي الْمَقْوِي.**
تشبیط حركات المعدة والأمعاء نتيجة تهيج خلف الصفاق أو النزف.
- **pharyngeal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْبَلْعُومِي.**
تقلص العضلة المضيق للبلعوم عند مس جداره الخلفي.
- **phasic r.** **مُنْعَكْسٌ طَوْرِي.**
حركة منسقة نشطة تتم استجابة للتنبيه.
- **Philippon's r.** **مُنْعَكْسٌ فِيلِيبْسُون.**
يؤدي تنبيه باسطة ركبة أحد الساقين إلى تشبیط باسطة ركبة الساق الثانية.
- **pilomotor r.** **مُنْعَكْسٌ مُحرَّكةُ الشَّعر.**
توليد جلد وزى عند تنبيه أو خدش الجلد.
- **Piltz r. (= attention r. of pupil)** **مُنْعَكْسُ بيلتز؛ منعكس الانتباه الحدقي.**
- **placing r.** **مُنْعَكْسُ الْوَضْع.**
ثني ساق الوليد الذي يتلوه تمددها عند حمله منتصباً وسحب ظهر قدميه تحت سطح حافة المنضدة ويحصل ذلك في الولدان الأسوياء حتى الأسبوع السادس من عمرهم.
- **plantar r.** **مُنْعَكْسُ اخْمَصِي.**
انثناء أصابع القدم عند تنبيه الأخمص.
- **platysmal r.** **مُنْعَكْسُ عضلة العنق الجلدية.**
تقلص الحدقة عند قرص العضلة الجلدية للعنق.
- **postural r.** **مُنْعَكْسٌ وَضْعِي.**
منعكس يؤدي إلى اتخاذ الجسم لوضع معين.
- **pressor r.** **مُنْعَكْسٌ مُنْشَط.**
منعكس لمنبه يؤدي إلى زيادة فعالية المركز الحركي.
- **proprioceptive r.** **الْمُنْعَكْسُ الْحِسِّي الْعَمِيق.**
منعكس يتولد عن تنبيه يصدر من أحد وظائف أو آليات المنعكس نفسه.
- **psychic r.** **مُنْعَكْسٌ نَفْسِي.**
منعكس يتولد عن ذاكرة مخزونة مثل إقراز اللعاب عند تذكر طعام جيد ولذيذ.
- **psychocardiac r.** **مُنْعَكْسٌ نَفْسِي قَلْبِي.**
تسرع ضربات القلب عند تذكر حالة عاطفية مهيبة.
- **pulmocoronary r.** **مُنْعَكْسٌ رِنُوي قَلْبِي.**

- تضيق الاوعية التاجية الانعكاسي بتوسط الاعصاب المبهمة.
- **pupillary r.** **مُنْعَكْسُ الْحَدَقَةِ.** 1. تقلص الحدقة عند تعرض الشبكية للضوء 2. اي منعكس في القرنية يؤدي إلى تغيير حجم الحدقة استجابة للمنبهات المختلفة مثل تغيير درجة الإضاءة أو نقطة التثبيت أو صوت عالٍ مفاجيء أو تنبيه عاطفي.
- **Puulisepp's r.** **مُنْعَكْسُ بُولْسِيَب.** تقريب إصبع القدم الصغير عند تنبيه القسم الوحشي الخارجي لأخمص القدم وهو يدل على آفة في السبيلين الهرمي وخارج الهرمي.
- **quadriceps r.** **مُنْعَكْسُ رِبَاعِيَةِ الرَّؤُوس.** تقلص العضلة رباعية الرؤوس وانبطاس الساق عند نقر وتر العضلة بين الرضفة والحدبة الظنبوية.
- **quadrupedal extensor r. (= Brain's r.)** **مُنْعَكْسُ بَاسِطِ الْأَرْجُلِ الْأَرْبَعَةِ.**
- **radial r.** **مُنْعَكْسُ الْكُفْرِ.** انثناء الساعد والأصابع الذي يتولد عند نقر النهاية السفلية للكعبرة، ويدل ذلك على فرط الانعكاسية.
- **rectal r.** **مُنْعَكْسُ الْمُسْتَقِيم.** العملية التي يؤدي بها الغائط المتجمع في المستقيم إلى تنبيه عملية التقوط.
- **regional r. (= segmental r.)** **مُنْعَكْسُ تَاجِيٍّ؛ مُنْعَكْسُ مَقْطَعِيٍّ.**
- **Remak's r.** **مُنْعَكْسُ رِيْمَاك.** الانثناء الأخمصي لأصابع القدم الثلاث الأولى وأحياناً القدم أيضاً مع انبطاس الركبة عند طرق السطح الأمامي العلوي للفخذ.
- **renointestinal r.** **مُنْعَكْسُ الْكُلَوِيِّ الْمَعِدِيِّ.** تثبيط الحركات المعوية نتيجة التهيج الكلوي.
- **renorenal r.** **مُنْعَكْسُ الْكُلَوِيِّ الْكُلَوِيِّ.** ألم انعكاسي أو زرام في كلية سليمة في حالات مرض الكلية الثانية.
- **resistance r. (= Babinski's r.)** **مُنْعَكْسُ الْمَقَاوِمَةِ؛ مُنْعَكْسُ بَابِسْكِي**
- **retrobulbar pupillary r.** **مُنْعَكْسُ الْحَدَقَةِ الْخَلْفِي.** خَلْفُ الْعَقَلَةِ. توسع قليل للحدقة المتضيقّة المنبهة بالضوء ولكنها تعود لتتوسع قليلاً بعد ذلك بينما لا زال المنبه الضوئي موجوداً.
- **reversed pupillary r.** **مُنْعَكْسُ الْبَصَرِيِّ الْعَكْسِيِّ.** أي منعكس شاذ يحدث بصورة عكسية للمنعكسات السوية مثل توسع الحدقة عند تنبيهها بالضوء.
- **Riddoch mass r.** **مُنْعَكْسُ رِيْدُوخ الْكُتَلِي.** في حالة إصابة النخاع الشوكي الشديدة يؤدي التنبيه تحت مستوى الآفة إلى إفراغ الأمعاء والمثانة وتغرق الجلد تحت مستوى الإصابة.
- **righting r.** **مُنْعَكْسُ مَقُومٍ.** المقدرة على إعادة الوضع المناسب للجسم عند اختلاله.
- **Roger's r. (= esophagosalarary r.)** **مُنْعَكْسُ رُوَجَرٍ؛ مُنْعَكْسُ الْمَرِيئِيِّ اللَّعَابِيِّ.** إفراز اللعاب عند تهيج المريء.
- **rooting r.** **مُنْعَكْسُ تَجْدِيرِيٍّ؛ مُنْعَكْسُ تَوْجِيهِيٍّ.** يؤدي تنبيه جانب الخد أو إحدى الشفتين السفلية أو العلوية إلى توجيه الوليد فمه ووجهه إلى جهة المنبه.
- **Rossolimo's r.** **مُنْعَكْسُ رُوسُولِيْمُو.** عند نقر الوجه الأخمصي لأصابع القدم فإنها تنتهي لجهة الأخمص عند وجود آفات في السبيل الهرمي.
- **Ruggeri's r.** **مُنْعَكْسُ رُوَجِيرِيٍّ.** تسرع النبض عند اقتراب العينين الشديد نحو جسم قريب جداً منهما ويدل ذلك على هيجية الوُدِي.
- **scapular r. (= interscapular r.)** **مُنْعَكْسُ الْكَتِفِيٍّ.**
- **scapulohumeral r.** **مُنْعَكْسُ الْكَتِفِيِّ الْعَضْدِيٍّ.** تقريب العضد مع دورانه للخارج عند طرق الحافة الداخلية للكتف.
- **Schaffer's r.** **مُنْعَكْسُ شِيْفَرٍ.** انثناء القدم وإصابعها عند قرص الثلث الوسطي من الوتر العقبي ويشاهد ذلك في الشلل النصفي العضدي.
- **scrotal r. (= dartos r.)** **مُنْعَكْسُ الصَّفْنَتِيٍّ.** تقلص دودي الشكل بطيء للعضلة السليخة يتولد عند قرع العجان أو تنبيهه بمنبه بارد.
- **segmental r.** **مُنْعَكْسُ شَدَقِيٍّ.** منعكس تتحكم به شدة واحدة أو منطقة واحدة من النخاع الشوكي.
- **sexual r.** **مُنْعَكْسُ جِنْسِيٍّ.** منعكس الانتصاب والقذف الذي يتولد عند تنبيه الأعضاء التناسلية.
- **simple r.** **مُنْعَكْسٌ بَسِيطٌ.** منعكس يشمل عضلة واحدة فقط.

- skin r. مُنْعَكْسٌ جِلْدِيّ. منعكس يتولد عند تنبيه الجلد.
- skin pupillary r. مُنْعَكْسٌ جِلْدِيّ حَدَقِيّ. توسع الحدقة عند تنبيه جلد الرقبة.
- sole r. (= plantar r.) المُنْعَكْسُ الْأَخْمَصِيّ. المِقْوِيّ. تثبيط الحركات المعوية عند تنبيه الجلد المغطي للبطن.
- somatointestinal r. المُنْعَكْسُ الْجَسَدِيّ. مُنْعَكْسٌ شَخَاعِيّ. أي منعكس يرتبط قوسه مع مركز في الشخاع الشوكي.
- stapedial r. (= acoustic r.) المُنْعَكْسُ الرِّكَابِيّ. منعكس سمعي.
- static r. مُنْعَكْسٌ رُكُودِيّ. تقويم وضع الجسم وتثبيتته الانعكاسي.
- statotonic r's. (= attitudinal r's.) المُنْعَكْسَاتُ الْوَضْعِيَّةُ.
- stepping r. مُنْعَكْسُ الْخَطْوِ. حركات التقدم التي تظهر عند مسك الوليد بوضع قائم ومائل للامام مع لمس أخمصي القدمين لسطح مستوي وهو يظهر في الوليد السوي حتى سن الأسبوع السادس من عمره.
- Stookey's r. مُنْعَكْسٌ سَتُوكِيّ. انثناء الساق عند طرق وترتي العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف عندما تكون الساق نصف مثنية عند الركبة.
- stretch r. مُنْعَكْسُ التَمْدِيدِ. التقلص المنعكسي للعضلة استجابة لشدها أو تمديدتها الطولاني اللافاعل.

بعض أنواع المنعكسات الشخاعية:



منعكس جدار البطن
(تقلص عضلات البطن
عند حك جدارها).



منعكس الثلاثية الرؤوس
(امتداد الساعد عند طرق وتر
العضلة الثلاثية الرؤوس).



منعكس الرضفة
(امتداد الساق عند طرق وتر الرضفة).

reflex.spinal

بعض أنواع المنعكسات الشخاعية: منعكس الثلاثية الرؤوس (امتداد الساعد عند طرق وتر العضلة الثلاثية الرؤوس). منعكس جدار البطن (تقلص عضلات البطن عند حك جدارها). منعكس الرضفة (امتداد الساق عند طرق وتر الرضفة).

- **striimpell's r.** مُنْعَكْسُ شَتْرُوفِيل. حركة الساق مع تقريب القدم الذي يتولد عن قرع الفخذ أو البطن.
- **sucking r.** مُنْعَكْسُ المَص. حركات الفم المصية التي تظهر عند لمس شفة المريض لجسم ما.
- **superficial r.** مُنْعَكْسُ سَطْحِي. أي منعكس سحب يتولد عن التنبيه المؤذي أو اللمسي للجلد أو للقرنية أو للغشاء المخاطي ويشمل ذلك منعكسات القرنية والمشتركة والبلعوم وما شاكل.
- **supinator longus r.** مُنْعَكْسُ البَاسِطَةِ الطَوِيلَةِ. يؤدي نقر النهاية السفلية للكعبرة إلى انثناء الساعد.
- **supraorbital r. (= McCarthy's r.)** المُنْعَكْسُ فوق الحجاجي.
- **suprapatellar r.** المُنْعَكْسُ فوق الرضفي. عند وضع اصبع الفاحص فوق الرضفة وقرعها عندما تكون الساق ممدودة تتحرك الرضفة للخلف.
- **suprapubic** مُنْعَكْسُ فوق العانة. يؤدي ضرب البطن فوق الرباط الأربي إلى انحراف الخط الأبيض نحو الجهة المعنية.
- **supraumbilical r. (= epigastric r.)** المُنْعَكْسُ فوق السُري: المُنْعَكْسُ الشُرْسُوفِي.
- **swallowing r. (= palatal r.)** مُنْعَكْسُ البَلْع: المُنْعَكْسُ الحنكي.
- **tarsopharyngeal r. (= Mendel Bekhterev r.)** المُنْعَكْسُ الرُصْغِي السَّلَامِي.
- **tendon r.** مُنْعَكْسُ وَتَرِي. التقلص اللاإرادي للعضلة بعد شدّها البسيط الذي ينتج عن قرع وترها وهي تشمل منعكسات معظم العضلات الكبيرة.
- **Throckmorton's r.** مُنْعَكْسُ ثروكمورتن. أحد أنواع منعكس بابنسكي يظهر عند قرع المنطقة الرضفية السالامية في ظهر القدم.
- **tibioadductor r.** المُنْعَكْسُ الظَنْبُوبِي المُقَرَّب. يؤدي قرع الجهة الداخلية للظنوب إما إلى تقريب ساق الجهة نفسها أو تقريب متصالب من جهة لآخرى.
- **toe r.** مُنْعَكْسُ إبهام القدم. يؤدي الثني الشديد لإبهام القدم إلى انثناء كل عضلات الطرف السفلي ويشاهد ذلك في الحالات المرضية التي تنصف بفرط الانعكاسية.
- **tonic r.** مُنْعَكْسُ تَوْتَرِي. 1. مرور وقت طويل نسبياً بعد حدوث المنعكس بين تقلص العضلة

- وارتخائها وعودتها إلى وضعها المستقر. 2. المنعكس العضلي الذي يديم تقلصها وهو أساس المنعكسات الوضعية والقوام.
- **tonic neck r.** مُنْعَكْسُ الرَقَبَةِ التَوْتَرِي. منعكس في الوليد يتكون من امتداد الذراعين وأحياناً الساقين أيضاً على الجهة التي يدور نحوها الرأس بشدة مع انثناء الطرف المعاكس على الجهة الأخرى.
- **trained r. (= conditioned r.)** مُنْعَكْسُ مُدْرَب. منعكس شرطي.
- **triceps r. (= elbow jerk)** نغضة المرفق: مُنْعَكْسُ الثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوس. تقلص بطن العضلة ثلاثية الرؤوس مع بسط الذراع البسيط عند قرع وتر العضلة عندما تكون الذراع مثنية ومسنودة تماماً ومرتخية.
- **triceps surae r.** مُنْعَكْسُ الثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوس الرَبْلِيَّة. انثناء أخمصي للقدم يظهر عند قرع العرقوب ويجري ذلك عندما يكون المريض منكباً على الفراش أو الكرسي وقدمه معلقة بصورة حرة على حافته ويسمى أيضاً نغضة الكاحل.
- **trigeminus r. (= oculopupillary r.)** مُنْعَكْسُ الثلاثي التوائم. يؤدي تنبيه قرنية العين أو الاجفان إلى توسع حدقتي العينين ثم تضيقهما.
- **ulnar r.** مُنْعَكْسُ الزَّنْد. يؤدي قرع النائي الإبري للزند إلى انكباب اليد.
- **unconditioned r.** مُنْعَكْسُ لا شَرْطِي.
- **urinary r. (= micturition r.)** مُنْعَكْسُ بُولِي.
- **vagus r.** مُنْعَكْسُ المُبْهَم. الحساسية المفرطة لشاذة للعصب المبهم عند الضغط على سبيله.
- **vascular r.** مُنْعَكْسُ وَعَائِي. ارتفاع ضغط الدم نتيجة تضيق الأوعية.
- **vertebra prominens r.** مُنْعَكْسُ الشَّامِخَةِ القَّارِيَّة. يقلل الضغط على الفقرة الرقبية الأخيرة للحيوان من توتر عضلات أرجله الأربع.
- **vesical r. (= bladder r.)** مُنْعَكْسُ المَثَانَةِ. يؤدي تعدد المثانة المعتدل إلى الرغبة في التبول.
- **vesicointestinal r.** المُنْعَكْسُ المَثَانِي المِعْوِي. يؤدي تهيج المثانة إلى تثبيط حركة الأمعاء.
- **vestibular r's.** المُنْعَكْسَاتُ الدَّهْلِيْزِيَّة. المنعكسات المتعلقة بإدامة وضع العينين والجسم

بالنسبة لتغيرات توجهات الرأس والتي لها طرق عصبية معقدة تسير من العصب الدهليزي إلى النوى الدهليزية ومنها إلى العضلات العينية أو الجسمية المتعلقة بالمنعكس.

- vestibulo-ocular r. **الْمُنْعَكْسُ الدِّهْلِيْزِيّ**
العَيْنِيّ. رَأْيَةُ الْعَيْنَيْنِ أو انحرافهما عند تنبيه الجهاز الدهليزي بالتسريع أو بالإبطاء الزاوي أو برَيِّ الأذن بماء حار أو بارد أو بهواء.

- virile r. **مُنْعَكْسُ الرُّجُولَةِ**. 1. المنعكس البصلي الكهفي 2. منعكس في القضيب الرخو يتولد عند سحب جلد حشفته للأعلى عندما يؤدي ذلك إلى نفضة القضيب المفاجئة للأسفل.

- visceral r. **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ**. منعكس تولده إحدى الحالات بتنبيهها أحد الأحشاء.

- viscerocardiac r. **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ قَلْبِيّ**. تبدل نظم القلب أو تقلصاته الانعكاسية المولد عن تنبيه حشوي.

- visceromotor r. **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ حَرَكِيّ**. تقلص عضلات البطن في المنطقة التي تغطي حشوي مريض.

- viscerosensory r. **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ حِسِّيّ**. استجابة أو منعكس يتولد عند الضغط على أحد الأقسام بسبب مرض أحد أعضائه الباطنية.

- viscerotrophic r. **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ يَمَائِيّ**. تنكس أي من الأنسجة المحيطة نتيجة التهاب أحد الأحشاء.

- von Mering r. **مُنْعَكْسٌ قَوْنٌ مِيرِينْغ**. ارتخاء العضلات البطنية السطحية بعد تناول الطعام.

- Westphal's pupillary r. (= orbicularis pupillary r.) **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيّ الدَّوَيْرِيّ**؛ **مُنْعَكْسٌ وَيْسْتَفَالِ الْحَدَقِيّ**.

- Westphal-Piltz r. (= orbicularis pupillary r.) **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيّ الدَّوَيْرِيّ**؛ **مُنْعَكْسٌ وَيْسْتَفَالِ - بِلْتز**.

- withdrawl r. **منعكس السحب**. منعكس مؤلم ينسحب فيه أحد أقسام الجسم بسرعة بعيداً عن المنبه المؤلم له.

- zygomatic r. **مُنْعَكْسُ الْوُجْنَةِ**. حركة الفك السفلي الوحشية عند الطرق على منطقة عظم الوجنة.

reflexogenic **مَوْلَدُ الْمُنْعَكْسِ**. ما يولد الفعل المنعكسي أو يزيده.

reflexogenous (= reflexogenic) **مَوْلَدُ الْمُنْعَكْسِ**.

reflexograph **مِخْطَاطُ الْمُنْعَكْسَات**. جهاز يرسم المنعكسات بشكل خطوط بيانية.

reflexometer **مِقْيَاسُ الْمُنْعَكْسَات**. جهاز يقيس الشدة اللازمة لتوليد منعكس ممدد للعضل.

regeneration **تَجَدُّد**. التجدد الطبيعي لبنية ما مثلاً للنسيج أو للبنية المفقودة.

regio **نَاحِيَّة**. منطقة ذات حدود واضحة.

- r. frontalis **النَّاحِيَّةُ الْجَبْهِيَّة**. ناحية الرأس التي تغطي عظم الجبهة وهي الجبهة أو الجبين.

- r. hypothalamica anterior **النَّاحِيَّةُ الْوِطَانِيَّةُ الْأَمَامِيَّة**. المنطقة الامامية للوطاء التي تقع بجوار الصفيحة الانتهازية وباعلى التصالبة البصرية وتشتمل على النوى أمام البصرية الوحشية والإنسية وفوق البصرية وجنيب البطين والنواة الوطائية الامامية.

- r. hypothalamica dorsalis **النَّاحِيَّةُ الْوِطَانِيَّةُ الظَّهْرِيَّة**. القسم الظهري من الوطاء الذي يحوي النواة داخل السويق ونوى العروة العنسية والناحية الوطائية الامامية والنوى أمام البصرية الوحشية والإنسية والفوق البصرية وجنيب البطين والنواة الوطائية الامامية.

- r. hypothalamica intermedia **النَّاحِيَّةُ الْوِطَانِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ**. قسم الوطاء الذي يحوي النواتين المقوسة والحديدية والباحة الوطائية الوحشية والنوى الوطائية البطنية الإنسية والظهرية الإنسية والظهرية والنواتين الخلفية حول البطين والقمعية.

- r. hypothalamica posterior **النَّاحِيَّةُ الْوِطَانِيَّةُ الْخَلْفِيَّة**. القسم الخلفي من الوطاء والمكون من النواتين الإنسية والوحشية للجسم الحلمي والنواة الوطائية الخلفية.

- r. occipitalis **النَّاحِيَّةُ الْقَذَالِيَّة**. ناحية الرأس التي تغطي العظم القذالي.

regulation **تَنْظِيم**؛ **نِظَام**. 1. عملية تنظيم أو حالة منظمة بمقاييس معينة 2. في البيولوجيا

هو تلاؤم الكائن الحي مع تغيرات الظروف المحيطة المتغيرة.

reinforcement تعزيز. زيادة الشدة أو القوة، وفي العلوم السلوكية هو توفير منبه ينشط الاستجابات قبيل حدوثها.

- r. of reflex تعزيز المنعكس. زيادة استجابة المنعكس بتشجيع المريض على القيام ببعض التركيز العقلي أو الجسدي عند إحداث المنعكس.

reinnervation إعادة التخصيب. إعادة الوظائف العصبية إلى قسم من الجسم كانت قد أزيلت منه أعصابه وهي يمكن أن تحدث تلقائياً أو بالتطعيم العصبي.

relaxant مُرخِّج (ج: مُرخِّجات). 1. يقلل أو يزيل التوتر. 2. عامل مزيل للتوتر.

- muscular r. مُرخِّج عضلي. عامل نوعي خاص يقلل أو يزيل التوتر العضلي كالذي يعمل على عضلات الأعصاب الحركية متعددة التشابكات مثل المفروباتميت أو عامل يعمل في الاتصال العضلي العصبي مثل الكوراري ومشتقاته.

relaxation 1. إرخاء. إرخاء. 2. تسكين. 1. تقليل الشد. 2. تسكين الألم وتلطيفه.

- Isometric r. إرخاء إسنوي الطول. ارتخاء العضلة من دون قصرها.

REM (= rapid eye movements) الحركات العينية السريعة. انظر sleep.

remission هدأة. خفة أعراض المرض أو نقصها أو الفترة التي يتم فيها كل ذلك.

remittent مُتَرَدِّد. حالة أو مرض ذو فترات هدأة وسورة.

remotivation تنشيط الحوافز. في الأمراض النفسية هي طريقة علاج جماعية تقوم بها هيئة التمريض في مستشفى للأمراض النفسية على تشجيع المرضى المصابين بداء الامتناع على التواصل والاهتمام بمحيطهم. أو تنبيه كفاءة الاتصال بين المرضى واهتماماتهم بمحيطهم.

remyelination عَوْدَةُ تشكل الميالين. عودة الغمد المياليني للعصب أو الأعصاب بعد زواله.

reserpine ريزربين. دواء يستعمل كمسكن ومضاد لارتفاع ضغط الدم.

response استجابة. فعل أو حركة تحدث نتيجة التنبيه بمنبه.

- conditioned r. استجابة شرطية. استجابة يستثيرها منبه شرطي والتي لم يكن بالإمكان توليدها قبل الإشراف.

- unconditioned r. استجابة لا شرطية. استجابة يستثيرها منبه لا شرطي وهي استجابة غريزة وطبيعية وغير متعلمة.

restlessness تَمَلُّل؛ قلق.

retardation تَخَلُّف؛ تَفْوِيق. تنام أو تطور متخلف.

- mental r. تخلف عقلي. اضطراب عقلي يتصف بوظائف عقلية دون معدلاتها السوية ويطرف مع تخلف في السلوك التكيفي للمحيط ويظهر خلال فترة التنامي ويصنف إلى معتدل يكون فيه حاصل الذكاء 70-50 ومتوسط 50-35 وشديد 35-20 وعميق أقل من 20 وهناك بعض حالات التخلف العقلي تصنف كحالات حدية يكون فيها حاصل الذكاء 70-85.

- psychomotor r. تخلف عقلي حركي. بطء الفعاليات العقلية والجسدية ويشاهد في الكآبة.

retention إحتباس.

- r. of urine إحتباس البول. تجمع البول داخل المثانة لعدم التمكن من التبول.

retinoscope منظار الشبكية. جهاز يستعمل لفحص شبكية العين.

retinoscopy تَنْظِيرُ الشبكية. طريقة عملية لتحري وتشخيص وتقييم الأخطار الانكسارية للعين وكذلك لتنظير القرص البصري والشبكية وأوعيتها الدموية.

retrobulbar 1. خَلْفَ البصلة. 2. خَلْفَ الْمُقَلَّة.

retrocollis صَعَرٌ خَلْفِي؛ تَشَنُّجُ الرَقَبَةِ الْمُعْكَفِيَّة. صعر تشنجي ينسحب فيه الرأس إلى الخلف.

retrodeviation إِنْجَرَأَفٌ خَلْفِي. مصطلح عام يشمل الانقلاب الخلفي والانثناء الخلفي والتوضع الخلفي.

retrograde رُجُوعِي. 1. الحركة إلى الخلف أو بعكس اتجاه الجريان الطبيعي. 2. تنكس تدريجي أو تقويضي.

rhabdomyolysis انحلال الربييدات؛ انحلال العضل. تلاشي العضل مع طرح الميوجلوبيين في البول.

- exertional r. انحلال العضل الإجهادي. الانحلال العضلي الذي ينشأ عن الجهد الجسدي الشديد ولمدة طويلة مع أعراض تشابه تلك التي تظهر عند الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الشرياني.

rhabdomyoma ورم عضلي مُحطط. ورم حميد يتكون من العضل المخطط.

rhabdomyosarcoma ساركومة العضل المُحطط. ورم شديد الخباثة يصيب العضلات المخططة.

rheobase قَرَارَةُ التَّيَّار. القيمة العتبية لتيار غير محدد المدة القادر على تنبيه نسيج قابل للتهيج.

rhinalgia, rhinodynia ألم الأنف. ألم أنفي.

rhinencephalon الدِّمَاغُ الشَّمِّي. 1. باحة الدماغ التي تشمل المادة المثقبة الامامية والشريط المائل (لبروكا) والباحة تحت الثقبية والتلفيف حوالي الانتهاءي 2. اصطلاح يطلق على بعض اقسام الدماغ كان يعتقد سابقاً أنها متخصصة بالوظائف الشمية بصورة مطلقة وتشمل الاعصاب الشمية والبصلات الشمية والسبل الشمية وارتباطاتها مع الجهاز الحوفي.

rhinesthesia حسُّ الشَّم. حَسَنَةُ.

rhinolalia نغمة أنفية بسبب آفة أو مرض أنفي أو بسبب تشوه في المجاري الأنفية.

rhinorrhea ثَرٌّ أَنْفِيّ. نجيج مخاطي خفيف من الأنف.

- cerebrospinal r. ثَرٌّ أَنْفِيّ دِمَاعِيّ نُخَاعِيّ. نجيج السائل الدماغي النخاعي من الأنف.

rhizanesthesia تَخْدِيرُ جَذَرِيّ. تخدير موضعي بحقن المخدر الموضعي إلى الحيز العنكبوتي النخاعي.

rhizotomy بَضْعُ الجُذُور. بضع الجذور العصبية في داخل القناة الشوكية.

- anterior r. بَضْعُ الجُذُورِ الأَمَامِيَّة. قطع الجذور الحركية الامامية للنخاع الشوكي.

- dorsal r. (= posterior r.) بَضْعُ الجُذُورِ الخَلْفِيَّة. قطع الجذور العصبية الحسية الخلفية للنخاع الشوكي وتجري لمعالجة الآلام غير المحتملة.

- retrogasserian r. قَطْعُ الجُذُورِ خَلْفَ عُقْدَةِ غَاسِر. قطع جذور العصب الثلاثي التوائم لمعالجة الآلام العصبية لثلاثي التوائم.

rhythm نَظْم. تكرر الفعل أو الوظيفة في أوقات منتظمة.

- alpha r. نَظْمُ ألفا. نظم منتظم لموجات المخطط الكهربائي للدماغ التي تتراوح سرعتها حوالي 10 موجات في الثانية، ويسمى أيضاً نظم برغر.

- Berger r. (= alpha r.) نَظْمُ بِرْغَر.

- beta r. نَظْمُ بِيَّتَا. نظم منتظم لموجات المخطط الكهربائي للدماغ الأصغر من موجات نظم ألفا ولكن لها معدل سرعة 25 موجة بالثانية.

- biological r. نَظْمُ بِيُولُوجِيّ. الانتظام الثابت لتكرر بعض الظواهر البيولوجية بفترات زمنية منتظمة.

- circadian r. نَظْمُ يَوْمَاوِيّ. تكرر بعض الدورات الوظيفية بمعدل يقارب الأربع وعشرين ساعة من بداية إحدى الدورات حتى بداية الدورة التالية من دون أي اعتبار للظلام مثلاً أو أية عوامل متغيرة أخرى.

- delta r. نَظْمُ دِلْتَا. موجات دلتا الكبيرة والبطيئة نسبياً في المخطط الكهربائي للدماغ وتكرر بمعدل 1/2 موجة في الثانية.

- gamma r. نَظْمُ غَامَا. نظم موجات في المخطط الكهربائي للدماغ تتكرر بمعدل 50 موجة في الثانية.

- infradian r. نَظْمٌ تَحْتَ يَوْمِيّ. نظم يتكرر في دورات أطول من 24 ساعة من بداية إحدى الدورات إلى بداية الدورة التالية كبعث الفعاليات البيولوجية دون اعتبار لآية تغييرات في الظروف المحيطة.

- nyctohemeral r. نَظْمٌ لَيْلِيّ نَهَارِيّ. نظم يتكرر ليلاً ونهاراً.

- theta r. نَظْمٌ ثِيَّتَا. موجات تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ وتكرر بمعدل 4-7 موجات في الثانية وتظهر في الأطفال وعند الكبار في حالة الكآبة أو الشدة العاطفية.

- ultradian r. نَظْمٌ فَوْقَ يَوْمِيّ. نظم يتكرر

بدورات أقل من 24 ساعة من بداية إحدى الدورات حتى بداية الدورة التالية.

rib, cervical (= costa cervicalis) **ضِلْع رَقِيبِيَّة**. ضلع إضافي يبدأ من إحدى الفقرات الرقبية وعادة من الفقرة السابعة منها.

rigidity (= rigor) **صَلَل**. تيبس أو عدم المرونة (**rigor**) خصوصاً التيبس المرضي أو الشاذ.

- clasp-knife r. **صَلَل مُنْقَلَب**. زيادة مقاومة الباسطات تظهر عند محاولة شني المفصل بطريقة منفعة ثم تزول بصورة مفاجئة عند زيادة المحاولة.

- cogwheel r. **صَلَل الدُّوَلَابِ المُسَنَّ**. صل صم العضلة الذي يزول بنفضات تدريجية عند وضع الضغط على العضلة.

- cold r. **تَيْبَسٌ إِنْجَمَادِيّ**. صل العضلات الشديد عند التعرض للبرودة الشديدة.

- decerebrate r. **صَلَلُ فَصْلِ المَخ**. الوضع الذي يولد في الحيوان التجريبي عند فصل مخه والذي يتصف بامتداد صملي للأطراف ويحدث ذلك للإنسان في الآفات التي تصيب القسم العلوي من جذع الدماغ وتتصف بنوم المريض في حالة تمدد صملي وأذرع مدورة للداخل عند المنكبين وممددة ومكبوبة عند المرفق وأصابعه منتثية عند المفاصل بين السلاميات وممتدة عند المفاصل السنعية السلامية وسيقان ممتدة عند الورك والركبة مع انثناء الكاحل والاباخر.

- heat r. **تَيْبَسٌ حَرَارِيّ**. صل العضلات عند التعرض للحرارة الشديدة.

- lead pipe r. **صَلَلُ أَنْبُوبِ الرُّصَاصِ**؛ **صَلَل بَارِكِنْسُونِي**. الصل الذي يشاهد في داء باركنسون.

- paratonic r. **صَلَلُ خَلَلِ التَّوَتَر**. زيادة متقطعة في مقاومة العضلات للتمديد اللافعل في المريض المسبوت.

- parkinsonian r. **صَلَلُ بَارِكِنْسُونِي**. زيادة التوتر العضلي في داء باركنسون وإما أن يكون من نوع صل أنبوب الرصاص أو صل الدولاب المسنن. **- spastic r. (= spasticity)** **شَنَاج**. فرط التوتر التشنجي.

rigor 1. رَغْدَة؛ نافض 2. صَلَل.

- r. mortis **صَلَل مَوْتِي**؛ **صَلَل رَمِي**؛ **تَيْبَس رَمِي**. زيادة توتر عضلات جسم الميت.

- r. tremens (= parkinsonism)

البَارِكِنْسُونِيَّة؛ **الصَلَلُ الرِّعَاش**.

risocaine **رِيْزُوكَاثِين**. دواء يستعمل كمخدر موضعي أو مضاد للحك.

risus **تَكْشِيرَة**. ضحكة مع انفرج الشفتين.

- r. sardonius **تَكْشِيرَة سَرْدُونِيَّة**. تكشيرة تظهر على الوجه بسبب تشنج عضلاته.

rod **عَصَا**؛ **نُتُوت**؛ **عُود**. كتلة صغيرة ورقية ومستقيمة من إحدى المواد.

- muscle r. (= myofibril) **لُيْفَة عَضَلِيَّة**.

- retinal r. **عُصِيَّة شَبَكِيَّة**. نيابيت الشبكية التي تقوم بوظيفة الرؤية الليلية أو الظلامية وتكثر على أطراف الشبكية ولا يوجد منها أية عصية في نقيرتها.

root **جَذَر**. القسم أو البنية السفلية التي تتصل بها بواسطتها بنية أخرى بشدة.

- r. of ansa cervicales, inferior (= radix inferior ansa cervicalis) **الجَذَرُ السُّفْلِي لِلْعُرْوَةِ الرَقِيبِيَّة**.

- r. of ansa cervicalis, superior (= radix superior ansa cervicalis) **الجَذَرُ العُلَوي لِلْعُرْوَةِ الرَقِيبِيَّة**.

- cranial r's. of accessory nerve (= radices craniales nervi accessori) **الجُذُورُ الرِّجْفِيَّة لِلْعَصَبِ الإِضَافِي**.

- facial r. (= radix nervi facialis) **جَذَرُ العَصَبِ الوَجْهِي**.

- motor r. of trigeminal nerve (= radix motoria nervi trigemini) **الجَذَرُ الحَرَكَتي لِلْعَصَبِ ثَلَاثِي التَّوَاتِم**.

- r. of spinal nerve (= radix nervi spinalis) **جَذَرُ العَصَبِ النُّخَاعِي**.

1. **مِنْقَارِي 2. أَمَامِي، بَطْنِي 3. عُلَوي**.
1. متعلق بالمنقار أو شبيه به أو يحويه. 2. يقع باتجاه المنقار أو الذروة (فموي أو أنفي) أو يعني علوي (بالنسبة للنخاع الشوكي) أو أمامي أو بطني (بالنسبة لباحات الدماغ ومناطقه).

rostrum مَنقَار. زائدة تشبه المنقار.

- r. corporis callosi مَنقَارُ الجِسْمِ الثَّقَنِي.

النهاية الأمامية السفلية للجسم الثقني.

rubrospinal حَمْرَآوِيٌّ نُخَاعِي. متعلق بالنواة

الحمراء والنخاع الشوكي.

rubrothalamic حَمْرَآوِيٌّ مِهَادِي. متعلق

بالنواة الحمراء والمهاد.

rumination, obsessive إَجْتِرَازٌ وَسَّوَاسِي.

اهتمام الشخص القسري ببعض الأفكار الملازمة له

والمعاودة دون التمكن من التخلص منها.

S

saccade رَمَشٌ؛ تَتَبُّعٌ. سلسلة الحركات السريعة المفاجئة الصغيرة اللاإرادية أو النفقات الدقيقة والمتزامنة في العينين عند تغيير نقطة التثبيت البصري مثل تتبع كلمات السطر المكتوبة عند القراءة.

saccadic رَمَشِيَّةٌ؛ تَتَبُّعِيَّةٌ. حركات تتبعية.
sacralgia أَلَمُ الْعَجْزِ.

sadism السَّادِيَّةُ. شذوذ جنسي يتصف بإشباع الرغبات الجنسية عن طريق إيذاء أو إهانة الشريك الجنسي.

- anal s. السَّادِيَّةُ الشَّرْجِيَّةُ. السادية الموجهة نحو الشرج.

- oral s. السَّادِيَّةُ الفَمَوِيَّةُ. السادية التي تتصف بإشباع الرغبة بالعض والعلك وما شاكل.

sadist السَّادِيٌّ. الشخص المصاب بالسادية.

sadomasochism السَّادِيَّةُ المَارُوْخِيَّةُ. حالة تتصف بالسادية والمازوذية معاً.

sagittal سَهْمِيٌّ. 1. ما يشبه السهم.
2. ما يقع في مستوى الدرز السهمي أو مواز له، ويقال عن مستوى مقطع أمامي خلفي مواز للمستوى الناصف للجسم.

saltation قَفْزٌ. 1. داء الرِّقَص أو الحركات الرقصية التي يتصف بها 2. التوصيل القفزي على طول العصب المغمد 3. الطفرة في الوراثة، وهي التغير المفاجيء في النوع أو بعض خواصه.

saltatory قَفْزِيٌّ.

sand, brain (= acervulus) رَمْلُ الدِّمَاغِ. كتلة المادة الرملية الشكل بالقرب من الجسم

الصنوبري والصفيرة المشيمية وفي أقسام أخرى من الدماغ.

sane عَاقِلٌ. ذو عقل سوي.

sanity سَلَامَةُ الْعَقْلِ. السلامة وخاصة سلامة العقل.

sapphism (= lesbianism) سَحَاقٌ. اشتهاؤ المرأة للمرأة.

sarcoblast الأَرْوْمَةُ العَضَلِيَّةُ. الخلية البدائية التي تنمو لتولد الخلية العضلية.

sarcoglia دَبْقُ عَضَلِيٍّ. المادة التي تكون ناتئ دوير عند مدخل الخيوط العصبية إلى الليف العضلي.

sarcoidosis داء الساركويد. مرض شبكي مزمن ومترق ووراثي حبيبي جهازى غير معروف السبب يصيب تقريباً أي من الأعضاء والأنسجة في الجسم وبضمنها العضلات والعين.

- muscular s. داء الساركويد العَضَلِيُّ. ساركويد يصيب العضلات المخططة بدرنات ساركويدية مع التهاب النسيج الخلالي وتليف وتمزق وضمور الألياف العضلية.

sarcolemma غَمْدُ اللَّيْفِ العَضَلِيِّ. الغشاء البلازمي الرقيق الذي يحيط بكل ليف عضلي مخطط.

sarcoma ساركومة. أحد الأورام التي تتولد من الأنسجة الضامة بالرغم من استعمال المصطلح أحياناً ليضم أوراماً أخرى من أصل ظهاري.

sarcomere قُسَمٌ عَضَلِيٌّ. وحدة الخيط العضلي القلوصة التي تكون وحدات تكررية يفصل الواحدة منها عن الأخرى شريط Z على طول الخيط العضلي.

sarcoplasm الهَيُولِي العَضَلِيَّة. المادة بين خيوط الألياف العضلية المخططة وهي المادة التي تسجى فيها الألياف العضلية.

sarcoplast (= myoblast) أرومة عضلية: سَلَيْفَةُ العَضَلِيَّة. خلية خلائية في العضلة تتمكن من التبدل إلى خلية عضلية.

sarcostosis تَعَظُّمُ العَضَل. تعظم النسيج العضلي.

sarcostyle (= myofibril) إبرة عضلية: لُيْفَةُ عَضَلِيَّة. 1. ليفة عضلية 2. حزمة ليفات عضلية.

sardonic تَكْشِيرَةٌ تَشْنُجِيَّة. تكشيرة تشنجية أو تَكَزْزِيَّة أو تكشيرة لا إرادية.

satiety شَبَع. اكتفاء أو إشباع كإشباع الشهية أو العطش مع تثبيط الرغبة بتناول الطعام أو شرب الماء.

satyriasis شَبَق. الرغبة الجنسية المفرطة الشاذة من دون الإشباع في الذكر.

satyromania (= satyriasis) شَبَق.

scala السِقَالَة. بنية شبيهة بالسلم تستعمل لوصف ممرات القوقعة المختلفة.

scan (= scintiscan) تَقْرِيسَة. عرض بصري للأصدا فوق الصوتية الصورية.

scanning تَقْرِيس. عملية الفحص البصري لمنطقة محدودة أو عدة مناطق محددة وبالتفصيل.

- radioisotope s. تَقْرِيسٌ بِالتَنْظِيرِ المُشْع. توليد صورة ذات بعدين (تقريسة) تمثل إشعاعات عامة تنبعث من نظير مشع ومركزة في نسيج معين من الجسم كالدماع أو الغدة الدرقية.

scanography تَصْوِيرٌ تَقْرِيسِي. طريقة تصوير شعاعي باستعمال أنبوب ذي شق ضيق في أسفله يمرر خطأ واحداً أو صفيحة واحدة من أشعة أكس ويتحرك أنبوب الأشعة على الجسم بحيث تمر كل إشعاعات الحزمة المركزية خلال الجسم ويتم تصويرها بنفس الزاوية.

scaphocephaly الرُّأْسُ الزُّوْرَقِيّ؛ تَزَوْرُقُ الرُّأْس. حالة تتصف بجمجمة شاذة طويلة وضيقة

نتيجة الفلق المبكر للدرز السهمي مع مراكز تعظم شديدة في خط الدرز وعادة ما تترافق مع التهاب وضمور الحليمات البصرية وبخلخلف عقلي.

scaphohydrocephaly مَوْءُ الرُّأْسِ الزُّوْرَقِيّ. موه الرأس الذي يتصف بشكل زورقي.

scapulalgia أَلَمُ الكَتِف. ألم في منطقة الكتف.

scapulodynia وَجَعُ المَنْكَب. ألم في منطقة المنكب.

scar نَدْبَة. انظر cicatrix.

scelalgia أَلَمُ السَّاق. ألم في الساق.

schizoaffactive فُصَامِيٌّ عَاطِفِيٌّ؛ مُنْفَصِّمُ العواطف. مريض تبدو لديه صفات الفصام مع اضطرابات المزاج (هوس واكتئاب).

schizocephalia إِنْشِقَاقُ الرُّأْس. عيب تنموي يتصف بوجود شق طولي في الرأس.

schizogyria إِنْشِقَاقُ التَّلَافِيف. حالة تتصف بتشقق تلافيف الدماغ وظهور شقوق إسفينية الشكل على سطحه.

schizokinesis إِنْفِصَامُ الإِسْتِجَابَات. الحالة التي تزول فيها الاستجابة الشرطية وتستمر الاستجابات المرافقة غير النوعية على الظهور عند التنبيه.

schizophasia كَلَامٌ فُصَامِيٌّ. الكلام غير المنسق الذي يتفوه به المصاب بالفصام.

schizophrenia فُصَام. اضطراب عقلي أو مجموعة اضطرابات نفسية تشمل معظم الاضطرابات النفسانية الرئيسية ويتصف باختلالات فكرية (فقدان الارتباطات أو ضعفها وتوهيمات وإهلاس) واختلال المزاج (عواطف بليدة وغير مناسبة) واختلال الحس بالذات وعلاقتها بمحيطها الخارجي (فقدان حدود الأنا والتفكير اللامترابط واللاواقعي وانكماش تهرابي) واختلالات سلوكية (فعاليات غريبة وشاذة وغير متجانسة أو انعدام الفعاليات بتاتا).

- acute s. فُصَامٌ حَاد. بداية حادة لأعراض فصامية، ولما كان الوصف للفصام بأنه مرض مزمن فلا بد من إيجاد اسم بديل له مثل اضطراب فصامي الشكل.

- **ambulatory s.** فُصَامٌ سَيْرِيّ. فصام معتدل معاوض بصورة كافية تؤهل المريض المحافظة على نفسه من دون إدخاله المستشفى.

- **borderline s. (= latent s.)** فُصَامٌ حَدِّيّ؛ فُصَامٌ كَامِن.

- **catatonic s.** فُصَامٌ جَامُودِيّ. نوع من الفصام يتصف باضطرابات نفسية حركية شديدة، كالذهول الجامودي (النقص الكبير في القدرة على الاستجابة للمحيط وللفعاليات التلقائية) أو الصمات والمعاندة الجامودية (مقاومة كل أنواع الإرشادات أو محاولات التحريك) والصمل الجامودي (المحافظة على وضعة صملة) أو الإشارة الجامودية (مستثار ولا يمكن السيطرة عليه مع فعاليات حركية غير مستهدفة) أو الوضعة الجامودية (وضع المريض بوضعة ثابتة غريبة) وهناك صفات مرافقة مثل سلوك نمطي ثابت والتصنع. ويسمى أيضاً الجامود.

- **childhood s.** فُصَامٌ طُفُولِيّ. فصام يبدأ قبل سن 10 لبلوغ ويتصف بالسلوك الانهزامي التهرابي وعدم تكوين شخصية ذاتية مستقلة عن الأم وعدم النضوج التطوري الواضح وهو نوع كان يشمل سابقاً كل أنواع الذهان.

- **disorganized s.** فُصَامٌ غَيْرُ مُنَسَّقٍ. نمط من الفصام يتصف بعدم الترابط القاضح وقلة التداعي أو سلوك غير منسق وعاطفة ضحلة أو غير مناسبة أبداً ولكنه لا يصل لدرجة النمط الجامودي وتشمل خواصه المرافقة التهرّب من العلاقات الاجتماعية والتكشيرة والتصنع والحملقة المرآتية والضحك غير المناسب والعديد من التصرفات الغريبة والشاذة.

- **hebephrenic s. (= disorganised s.)**

الفُصَامُ الْفَنْدِيّ. فصام غير منسق.

- **latent s.** فُصَامٌ كَامِن. نمط من الفصام يتصف بأعراضه الواضحة من دون تاريخ نوبات فصامية ذهانية وهو يشمل حالات تسمى الحالات الحدية والشبكة وقبل الذهانية والبادرية والعصابية الكاذبة والفصامية الاعتلالية النفسانية الكاذبة.

- **nuclear s. (= process s.)** فُصَامٌ نَوَوِيّ.

- **paranoid s.** فُصَامٌ زَوْرَانِيّ. نوع من الفصام يتصف بانشغال المريض بتوهم منظم واحد أو أكثر أو بهلاس سمعي مُعاود والتعلق بموضوع واحد.

- **paraphrenic** فُصَامٌ اِزْوَارِيّ. فصام زوراني يتصف بتوهم العظمة المنظم.

- **prepsychotic s. (= latent s.)** فُصَامٌ قَبْلَ الذّهَانِيّ.

- **process s.** فُصَامٌ أَهْدَانِيّ. صنف ثانوي من الفصام (مثل الخرف المبسر) والذي يفترض بأن له أصل داخلي المنشأ مع إنذار ضعيف بالمقارنة بالحالات الأخرى التي تسمى الفصام التفاعلي والتي تنتج عن أسباب مؤهبة أو عوامل محيطية مؤثرة ولها عادة إنذار حسن.

- **pseudoneurotic s.** فُصَامٌ عُصَابِيّ كَاذِب. مصطلح يطلق على المرضى الذين تنطبق عليهم أوصاف الاضطراب العصابي ولكن لديهم شذوذ فكري وعاطفي شبيه بذلك الذي يوجد في الفصام فهناك القلق العام (قلق منتشر عام) وعصاب عام (مع أعراض العديد من المتلازمات العصبية).

- **pseudopsychopathic s.** فُصَامٌ اِغْتِلَالِ النَّفْسَانِيّ الْكَاذِب. مصطلح يطلق على المرضى الذين لهم أعراض لا اجتماعية واضطرابات الشخصية ولكن من دون شذوذ فكري أو عاطفي شبيه بذلك الذي يحصل في الفصام.

- **reactive s.** فُصَامٌ تَفَاعُلِيّ. نوع ثانوي من الفصام يفترض بأنه ينتج عن عوامل محيطية مؤهبة وله إنذار أحسن من الفصام الإحداثي.

- **residual s.** فُصَامٌ مُعَالِيّ. نمط من الفصام يتصف بتاريخ نوبة أو نوبات منه مع أعراض ذهانية واضحة وقلة الأعراض الحالية مع الاحتفاظ ببعض الأعراض الفصامية الأخرى كضعف العاطفة أو العاطفة غير المناسبة والتهرّب الاجتماعي والسلوك غريب الأطوار والتفكير اللامنطقي وضعف الارتباطات الاجتماعية.

- **simple s.** الفُصَامُ الْبَسِيط. فصام من دون خواص أو أعراض ذهانية واضحة.

- **undifferentiated s.** الفُصَامُ الْاُمْتَمَازِيّ. نوع من الفصام يتصف بوجود أعراض ذهانية واضحة ولكن لا يمكن تصنيفه كفصام جامودي أو زوراني أو غير منسق.

1. فُصَامِيّ 2. مَفْصُوم. schizophrenic

1. منسوب أو متصف بالفصام 2. مريض مصاب بالفصام.

شَبِيهُ الفُصَام. ما يشابه schizophreniform الفصام.

schizotonia انفصامُ القَوَتر. عدم تناسق
توتر عضلات الجسم وانفصامه. فمثلاً عندما تكون
العضلات المثنية للذراع مفرطة التوتر تكون
العضلات الباسطة للساق مفرطة التوتر.

schwannitis (= schwannosis) ضَخَامَةُ
غُفْرِ شِفَان.

schwannoglioma (= schwannoma)
وَرَمٌ شِفَانِي. ورم يتصل من خلايا شِفَان للغمد
النخاعيني للعصبونات، وهو يشمل الورم الليفي العصبي
وورم غمد الليف العصبي.

schwannosis ضَخَامَةُ شِفَانِيَّة. ضخامة
غمد شِفَان.

sciatic إسْكِيّ؛ وَرْكِي. 1. متعلق بالورك
2. متعلق بالعصب الوركي أو يقع بالقرب منه أو
بالقرب من الوريد الوركي.

sciatica النَسَى؛ عِزْقُ النَسَا. متلازمة تنصف
بالآلم الذي ينتشر من الظهر إلى الالية وعلى طول
الجهة الخلفية أو الوحشية للطرف السفلي وينتج
غالباً عن انزلاق القرص بين الفقرتين، كما يستعمل
المصطلح للدلالة على أي ألم يحدث على طول
مجرى العصب الوركي.

scintiscan (= scintigram) تغريسة
ومضانِيَّة. تمثيل ثنائي الأبعاد لأشعة غاما تنبعث
من نظير مشع يظهر مختلف تراكيزه في أحد
أنسجة الجسم أو أعضائه كالدماع مثلاً أو الكلية أو
الغدة الوردية.

sclerosis تَصَلُّب؛ صَلَاب. تصلب أو جسوء
خاصة ذلك الذي يتولد عن الالتهاب وفي أمراض
الأنسجة الخلالية ويستعمل بصورة خاصة في
تصلبات الجهاز العصبي الناتجة عن فرط تنسج
أنسجته الضامة أو تصلب أوعيته الدموية.

- amyotrophic lateral s. تَصَلُّبٌ وَخْشِيّ
ضُمُورِي. مرض يتصف بتنكس شديد ومرتوئ
للعصبونات التي تعطي الياف السبيل القشري النخاعي
والخلايا الحركية لجذع الدماغ والنخاع الشوكي
ويؤدي إلى عيوب في العصبونات الحركية العلوية
والسفلية وعادة ما يؤدي إلى الموت خلال سنتين أو
ثلاث.

- annular s. تَصَلُّبٌ خَلْقِي. تصلب في النخاع
الشوكي يولد شريطاً حوله.

- anterolateral s. تَصَلُّبٌ أَمَامِي وَخْشِيّ.
تصلب العمودين البطني والوحشي للنخاع الشوكي
الذي يؤدي إلى شلل سفلي تشنجي.

- arterial s. (= arteriocapillary s.
= arteriosclerosis) تَصَلُّبُ الشَّرَائِين.

- arterioral s. (= arteriolosclerosis) تصلب
الشَّرَائِنَات.

- combined s. تَصَلُّبٌ مُشْتَرَك. تنكس مشترك
دون الحاد للنخاع الشوكي.

- diffuse s. تَصَلُّبٌ مُنْتَشِر. نوع من التصلب
يصيب مساحات كبيرة من الدماغ والنخاع الشوكي.

- disseminated s. (= multiple s.) تَصَلُّبٌ
مُنْتَشِر؛ تَصَلُّبٌ مُتَعَدَّد.

- Erb's s. (= lateral spinal s.) تَصَلُّبٌ نُخَاعِي
جَانِبِي.

- focal s. (= multiple s.) تَصَلُّبٌ بُؤْرِي؛
تَصَلُّبٌ مُتَعَدَّد.

- insular s. (= multiple s.) تَصَلُّبٌ جُزْرِي؛
تَصَلُّبٌ مُتَعَدَّد.

- lateral s. تَصَلُّبٌ وَخْشِيّ. تنكس الأعمدة الوحشية
للنخاع الشوكي ويمكن أن يكون إصابة أولية تولد
شللاً سفلياً تشنجياً مع صمل عضلات الأطراف وزيادة
المنعكسات الوترية من دون اضطرابات حسية أو
تغذوية ويسمى ذلك أيضاً تصلب إيرب. كما من الممكن
أن يكون هذا التصلب ثانوياً لالتهاب العضل الذي يولد
شللاً سفلياً تشنجياً مع اضطرابات حسية واضطرابات
أخرى ويسمى هذا أيضاً الشلل النخاعي التشنجي.

- lobar s. تَصَلُّبٌ فَصِيّ. وجود تلافيف ضيقة
مصابة بالندبات في ساحة كبيرة من أحد فصوص
سطح القشرة المخية، وغالباً ما تشاهد في الشلل
المخي.

- Marie's s. (= hereditary cerebellar
ataxia) رَنْحٌ مُخَيَخِي وَرَثِي؛ تَصَلُّبٌ مَارِي.

- multiple s. تَصَلُّبٌ مُتَعَدَّد. مرض يتصف
بوجود لطخات منزوعة النخاعين منتشرة في المادة
البيضاء للجهاز العصبي المركزي وقد تنتشر أحياناً
إلى مادته السنجابية أيضاً. وأما الأعراض النمطية
لآفات المادة البيضاء فهي الضعف وعدم التناسق
والمذل واختلالات النطق واضطرابات البصر وقد

يطول سير المرض مع النكسات والهدأت لفترة عدة سنوات.

- **posterior s. (= posterior spinal s. = tabes dorsalis)** التَّابِسُ الظَّهْرِيّ.

- **posterolateral s. (= subacute combined degeneration of spinal cord)** التَّصَلُّبُ الظَّهْرِيّ الجَانِبِيّ. التنكس المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي.

scoliosis جَنْفٌ. انحراف جانبي واضح للخط العمودي المستقيم للعمود الفقاري.



scoliosis

وضعة الانحناء الجانبي (الجنف) للجذع في حالة تدلي القرص الفقاري القطني لغرض التقليل من الألم.

- **myopathic s. (= paralytic s.)** جَنْفُ الاعتلال العضلي؛ جَنْفٌ شَلَلِيّ.

- **paralytic s.** جَنْفٌ شَلَلِيّ. انحناء جانبي للعمود الفقري بسبب شلل العضلات.

scopolamine (= hyoscyne)

سَكُوْبُولَامِين. قلواني مضاد للفعل الكولينولي وله تأثير على الجهاز العصبي المركزي شبيه بتأثير الأتروبين.

scopophilia (= 1.voyeurism

2. exhibitionism) 1. شَبَقُ النظر

2. الاستعراضية؛ التَّلَذُّذُ الجِنْسِيّ بالمراقبة. 1. التلذذ الجنسي بمشاهدة الأعضاء التناسلية للآخرين 2. الاستعراء والتلذذ بالتمري ومشاهدة الآخرين له عارياً.

scopophobia رَهَابُ التَّعَرُّض. الخوف الشاذ من التعرض ومشاهدة الآخرين له عارياً.

scotodinia نَوَامٌ عُتْمِيّ. دَوَامٌ مع عتامة البصر والصداع.

scotoma عُتْمَةٌ. (ج عُتْمَات).

- **mental s.** عُتْمَةٌ نفسية. في علم النفس نقطة شكلية عمياء في الشعور النفسي العام للشخص وعدم معرفته لمشاكله العقلية والنفسية مع قلة البصيرة.

scotophilia الوَلْعُ بِاللَّيْلِ. حب الليل وتفضيله على النهار.

scotophobia رَهَابُ الظَّلَام. الخوف الشديد من الظلام.

1. قطع 2. تَقْطِيعَةٌ. 1. عملية القطع لعضو ممتلئ أو فتح عضو أجوف 2. مقطع، مصطلح عام للدلالة على مقطع أو جزء ثانوي من العضو.

- **sectiones cerebelli** تَقَاطِيعُ المَخِيخ. الأقسام التشريحية الباطنة المختلفة للمخيخ.

- **sectiones corporum quadrigemnorum** تَقَاطِيعُ الجِسْمِ الرُّبَاعِيّ.

الأقسام التشريحية للأجسام الرباعية.

- **sectiones hypothalami** تَقَاطِيعُ الوِطَاء. التقاسيم التشريحية الداخلية للوطاء.

- **sectiones medullae oblongatae** تَقَاطِيعُ البَصَلَةِ. تقاطيع النخاع المستطيل.

- sectiones medullae spinalis **تَقَاطِيعُ**
النُّخَاعِ. تقاطيع النخاع الشوكي
- sectiones mesencephali **تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ**
الْمُتَوَسِّطِ.
- sectiones pedunculi cerebri (= sectiones mesencephali) **تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ**
الْمُتَوَسِّطِ.
- sectiones pontis **تَقَاطِيعُ الجِسْرِ.**
- sectiones telencephali **تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ**
الْإِنْتِهَائِيِّ.
- sectiones thalamencephali **تَقَاطِيعُ**
الدِّمَاغِ الْمِهَادِيِّ.
- sectiones thalami et metathalami **تَقَاطِيعُ الْمِهَادِ وَالْمِهَادِ التَّالِي.**
- sedation **تَهْدِئَةٌ:** تركين. عملية توليد حالة
مركئة أو عملية تهدئة وتسكين.
- sedative **مُهْدِئ:** مُرَكِّن. 1. تهدئة
الفعالية والإثارة. 2. عامل يهدئ الإثارة.
- cerebral s. **مُهْدِئ دِمَاجِي:** مركَّن دِمَاجِي.
مهدئ يؤثر بصورة رئيسية على الدماغ.
- general s. **مُهْدِئ عَام:** مركَّن دِمَاجِي.
مهدئ يهدئ كل الأعضاء والوظائف.
- nerve trunk s. **مُهْدِئ الجَذَعِ العَصْبِيِّ:** مركَّن
الجذع العصبي. مهدئ يعمل على جذع العصب.
- nervous s. **مُهْدِئ عَصْبِي:** مركَّن عصبي.
مهدئ يعمل على الجهاز العصبي ومن خلاله وتنتمي
لهذه المجموعة المركبات الدماغية والجذعية العصبية
والنخاعية الشوكية.
- spinal s. **مُهْدِئ نُخَاعِي:** مركَّن نُخَاعِي. أي دواء
يهدئ الفعالية الوظيفية السوية أو الشاذة للنخاع
الشوكي.
- sedentary **قَعِيد:** قَعْدَةٌ. 1. التعمُّد على الجلوس
كعادة غير فعالة. 2. نسبة إلى وضعة القعود.
- segment **قِطْعَةٌ:** (ج: قِطَعُ). شُدْفَةٌ.
(ج: شُدَفُ). جزء من جسم أو بنية كبيرة معزولة
عنه طبيعياً أو اعتبارياً بحدود فاصلة.
- Interannular s. **شُدْفَةٌ بَيْنَ الخَلَقَتَيْنِ.** جزء
الليف العصبي بين عقدتي رانفيير متجاورتين.
- medullary s. **شُدْفَةٌ مِيَالِينِيَّة.** قسم من

- الغمد المياليني للليف العصبي والذي يقع بين تلمتي
لنترمان.
- neural s. (= neuromere) **قُسَمٌ عَصْبِيَّة.**
- Ranvier's s's. **شُدَفُ رَانْفِيَّيْهِ.** جزء المادة
الميالينية للليف العصبي الذي يقع بين عقد رانفيير.
- Schmidt-Lanterman s. (= medullary s.) **شُدْفَةٌ مِيَالِينِيَّة.**
- s's. of spinal cord (= segmenta
medullae spinalis) **شُدَفُ النُّخَاعِ الشوكِي.**
- segmentum (= segment) **قِطْعَةٌ.**
(ج: قِطَعُ). شُدْفَةٌ. (ج: شُدَفُ).
- segmenta medullae spinalis **قِطَعُ النُّخَاعِ.**
قطع النخاع الشوكي التي يتصل بكل منها زوج من
الجذور الظهرية وزوج من الجذور البطنية من الأعصاب
النخاعية الشوكية ويعطى النخاع الشوكي 33 زوجاً من
الأعصاب النخاعية العنقية 1-8 والصدريّة 1-12
والقطنية 1-5 والعجزية 1-5 والعصصية 1-3.
- seizure **نُوبَةٌ.** 1. هجمة مفاجئة للمرض
أو عودته. 2. هجمة صرع.
- absence s. **نُوبَةٌ غِيَاب:** نوبة صرعية
غيبوبية. نوبة صرع تتصف بانقطاع وقتي لتيار
التفكير والفعالية وتترافق مع فعالية وتدية موجية
للمخطط الكهربائي للدماغ بمعدل 3.5 موجة في
الثانية. وتسمى أيضاً الصرع الصغير.
- audlogenic s. **نُوبَةٌ سَمْعِيَّةُ الْمُنْشَأ.** نوبة صرع
تتولد عن التهييج الصوتي.
- cerebral s. **نُوبَةٌ دِمَاجِيَّة.** هجمة صرع.
- febrile s. **نُوبَةٌ حُمُومِيَّة.** اختلاجات تترافق مع
ارتفاع عالٍ لدرجة حرارة الولدان والأطفال.
- jack knife s. (= infantile massive
spasm) **تَشَنُّجُ المَوْسِ الكَبَاس:** تَشَنُّجُ طِفْلِي
كُتْلَوِي. نوبات رمع عضلي شديد تظهر في الشهور
الثمانية عشر الأولى للعمر تترافق مع تدهور دماغي
عام وتتصف بتشنجات انثنائية شديدة في الراس
والرقبة والجذع مع انبساط الذراعين والساقين.
- photogenic s. **نُوبَةٌ ضَوْئِيَّةُ الْمُنْشَأ.** نوبة
صرعية تبدأ بالتهييج الضوئي.
- psychomotor s. (= psychomotor
epilepsy) **نُوبَةٌ نَفْسِيَّةُ حَرَكَيَّة.** صرع نفسياني
حركي.

صَرْعُ (= uncinat epilepsy) - **uncinate s.** الشخصية. شرع الفص الصدغي الذي تسببه آفة في المنطقة الشخصية ولذلك يترافق مع اهلاس ذوقية وشمية.

وَعْيُ الذات. 1. وعي **self consciousness** الفرد لهويته ولوجوده 2. المبالغة بالحس بالذات والحساسية المفرطة والإحراج للاستجابات السلبية المحتملة من الآخرين لمظهر الشخص أو لسلوكه.

self-suggestion (= autosuggestion) إِيحَاءُ ذاتي.

السُرْجُ التُّرْكِي. حفرة مستعرضة **sella turcica** تعبر الخط الوسطي على السطح الظهري لجسم العظم الوددي والتي تحوي النخامية.

شَيْخُوخة؛ تَشْيُخ. **senescence**

شَيْخُوخِي. متعلق بالشيخوخة **senile** أو يتصف بها.

شَيْخُوخة مبكرة. الشيخوخة المبكرة. **senilism**

شَيْخُوخة. تقدم العمر والتردي **senility** الفكري والجسدي المترافق مع تقدم العمر.

هَرَم؛ شَيْخُوخة. **senium**

حِس؛ إَحْسَاس. (ج: إَحْسَاسِيس) **sensation** انطباع تنقله الأعصاب الواردة إلى الجهاز الحسي.

إَحْسَاسٌ مَفْصِلِي. الإحساس **- articular s.** الذي يتولد عن احتكاك سطوح المفاصل عند حركتها.

حِسُ التَّمَنُّطُق. **- cincture s. (= zonesthesia)**

الإحساس المشترك؛ الإحساس **- common s.** العمومي. الحس الشامل الذي يتولد عن تجمع مختلف إحساسات الجسم في وقت واحد.

حِسٌ مُرَافِق. إحساس **- concomitant s.** ثانوي يتولد من دون أي تنبيه خاص به ولكنه يرافق الإحساس الأولي.

حِسٌ جِلْدِي **- cutaneous s. (= dermal s.)**

إَحْسَاسٌ أَجَل. إحساس لا يدرك **- delayed s.** إلا بعد مرور بعض الوقت بعد التنبيه.

حِسٌ جِلْدِي. إحساس **- dermal s.** يتولد عن تنبيه مستقبلات موجودة في الجلد.

حِسٌ شُرْشُوفِي. إحساس غريب **- epigastric s.**

ضعيف مقلق في المعدة وهو حس حشوي غير معروف السبب.

حِسٌ خَارِجِي. التأثير الذي تولده **- external s.** الأشياء والحوادث الخارجية على العقل والذي ينتقل إليه عن طريق الحواس.

حِسٌ عَامٌ. إحساس يحس في سائر أنحاء الجسم. **- general s.**

حِسُ التَّمَنُّطُق. **- girdle s. (= zonesthesia)**

الاحساسيس الإدراكية. احساسيس **- gnostic s's.** تنتقل عن طريق الحواس الأحداث تطوراً كحس اللمس الرقيق والتحسس الدقيق للعضلات والمفاصل وامتزاز الاوتار، وتسمى أيضاً الاحساسيس الجديدة.

حِسٌ دَاخِلِي. إحساس يدركه الشخص **- internal s.** نفسه ولا يتعلق بأي موضوع من خارج الجسم.

حِسٌ مَفْصِلِي. **- joint s. (= articular s.)**

حِسٌ ضَوْئِي. احساسيس تتولد عند ورود موجات إشعاعية ذات أطوال 400-760 ملي ميكرون تدخل العين السليمة.

حِسٌ سَلْبِي. الحالة التي تتولد عندما **- negative s.** يكون المنبه دون الحد العتوي.

الاحساسيس الجديدة؛ احساسيس إدراكية. **- new s's. (= gnostic s's)**

حِسٌ خَارِجِي. **- objective s. (= external s.)**

حِسٌ الإِهْتِزَاز. **- palmethetic s. (= pallesthesia)**

الحِسُ الأوَّلِي. الإحساس الذي يتولد كنتيجة مباشرة لإدراك المنبه. **- primary s.**

حِسٌ رَجِيع. إحساس يحس في منطقة غير النقطة المنبهة وأحياناً بعيدة عنها كثيراً وهو حس محوّل.

حِسٌ اِنْعِكَاسِي. **- reflex s. (= referred s.)**

حِسٌ جِلْدِي. **- skin s. (= dermal s.)**


حِسُ الشَّد. إحساس الشدة أو إحساس بالشد. **- strain s.**

حِسٌ شَخْصِي. إحساس داخلي. **- subjective s. (= internal s.)**

حِسٌ رَجِيع. **- transferred s. (= referred s.)**

- **vascular s.** حِسٌّ وَعَائِيّ. إحساس يحس به عند تغيير التوتر الوعائي مثل حمرة الخجل.
- **s. of warmth** حِسٌّ الدَّفء. الإحساس المريح الذي يحسه الشخص عندما لا يكون الجو بارداً جداً ولا حاراً جداً وهو الإحساس الذي يحس عند توجيه حرارة معتدلة للجسم بالتوصيل أو بالأشعاع.
- sense** حَاسَّة. (ج: وَاَس). مَلَكَة يدرك بها الإنسان حالات وخواص الاجسام المحسوسة. فالجوع والعطش والالام والفتور هي انواع من الحواس، كما يتمكن الإنسان من الحس بالتوازن والشم وحواس أخرى يمكن تمييزها.
- **chemical s.** حَاسَّة كِيمِيَاءِيَّة. حس عام يولد استجابات اجتنابية في المخلوقات المائبة وللمهيجات المختلفة في الإنسان كالبصل والثوم والامونيا والغازات السامة.
- **color s.** حَاسَّة الالْوَان. الملكة التي يتمكن بها الإنسان من إدراك الالوان المختلفة والتمييز بينها.
- **equilibrium s. (= static s.)** حَاسَّة التَوَازُن. حَاسَّة الشَّكْل. مقدرة العين على التعرف على أن الاجسام مجسمة.
- **Internal s.** حَاسَّة دَاخِلِيَّة. أي من الاحاسيس التي تنبه عادة من داخل الجسم.
- **kinesthetic s. (= muscle s.)** حَاسَّة عَضَلِيَّة. الحاسة القتيبة: (**static s. (= labyrinthine s.)**) حِسُّ الثَبَات.
- **muscle s. (= muscular s.)** الحاسة العَضَلِيَّة. الملكة التي يحس بها الإنسان حركة عضلاته.
- **pain s.** حَاسَّة الالَم. الحس الذي يدرك به الإنسان الالم.
- **posture s.** حَاسَّة الوَضْعَة. نوع من الحس العضلي الذي ندرك بواسطته موضع أو وضعة الجسم أو أقسامه.
- **pressure s.** حَاسَّة الضَّغْط. الملكة التي يحس بها الشخص الضغط الموضع على سطح جسمه.
- **proprioceptive s.** حَاسَّة الإدراك المخصوص.
- **seventh sense (= visceral s.)** الحَاسَّة السَّابِعَة. الحس الحشوي.
- **sixth sense (= cenesthesia)** الحَاسَّة

- السَّابِسة. الحس المشترك وهو الحس العام بالوعي بالجسم كله.
- **space s.** حَاسَّة فُضَائِيَّة. مجموعة من الحواس (خاصة حاستي البصر واللمس) التي توفر المعلومات عن المواضع النسبية للأجسام وعلاقاتها في الفضاء.
- **special s.** حَاسَّة خَاصَّة. أي من الحواس الخمس البصر والسمع والشم والذوق والتوازن.
- **static s. (= equilibrium s.)** حَاسَّة التَوَازُن؛ حَاسَّة الثَبَات. الحس الذي يمكن الإنسان من المحافظة على وضعه القائم.
- **stereognostic s.** حَاسَّة مَعْرِفَةِ الأشْكَال. الحس الذي ندرك به الشكل والصلابة.
- **temperature s.** حَاسَّة الحَرَارَة. الحس الذي يتمكن فيه الشخص من معرفة الفروق بين درجات الحرارة.
- **time s.** حَاسَّة الوَقْت. المقدرة على معرفة الفترات والفواصل الزمنية خصوصاً في الموسيقى والاصوات.
- **tone s.** حَاسَّة النَغَم. المقدرة على التفريق بين الانغام.
- **visceral s. (= splanchnesthesia)** حَاسَّة حَشَوِيَّة. الاحاسيس الداخلية والشخصية التي تتولد من الاحشاء، وهي تشكل احاسيس الالم والضغط والامتلاء وحركة الاحشاء.
- sensibility** الحَسَّاسِيَّة؛ حِسٌّ؛ التَحَسُّس. المقدرة على الحس أو الشعور أو الإدراك.
- **bone s. (= pallesthesia)** الإحساس العظمي؛ تحسُّس الإهْتِرَاز.
- common s. (= cenesthesia)** الإحساس العام؛ الإحساس المُشْتَرَك.
- **cortical s.** الإحساس القشري. التحسس الذي تتحكم به قشرة الدماغ والذي يعنى بمعرفة الانطباعات الحسية وتمييزها.
- **deep s.** الإحساس العميق. التحسس للضغط والحركات حتى بعد تخدير سطح الجسم تخديراً كاملاً.
- **electromuscular s.** الإحساس الكَهْرَبَائِيّ. حس العضلات للتنبيه الكهربائي.



sense, special

العين إحدى الحواس الخاصة: (1) وتر العضلة المستقيمة الوحشية (2) الجزء الهدي من الشبكية (3) الجسم الهدي والعضلة الهدية (4) جنب الصلبة الوريدي (قناة شليم) (5) الرباط المعلق للعدسة (6) القزحية (7) العدسة (8) القرنية (9) الغرفة الأمامية (10) الغرفة الخلفية (11) زاوية الغرفة الأمامية (12) الملتحمة (13) الحاشية المشرشرة (14) وتر العضلة المستقيمة الإنسية (15) الجسم الزجاجي (16) القناة الزجاجانية (17) الصفيحة المصفوية للصلبة (18) العصب البصري (19) الشريان والوريد المركزيان للشبكية (20) الحيز بين الفمدين (21) غمد العصب البصري (22) النقرة المركزية (23) لفافة العقلة (محفظة ثننون) (24) الصلبة (25) الحيز فوق المشيمية (26) المشيمية (27) القسم البصري من الشبكية.

- **epicritic s.** الإحساس بالتمييز العميق. التحسس للتمييز الرقيق والذي يوفر الوسيلة للتمييز الدقيق لحسي الحرارة واللمس وهو حس يوجد في الجلد فقط.

- **joint s. (= arthresthesia)** الإحساس بالمفاصل.
- **mesoblastic s. (= deep s.)** الإحساس العميق.
- **pallesthetic s. (= palmethetic s. = pallesthesia)** الإحساس بالإهتراز.

- **proprioceptive s.** إحساس الإدراك المخصوص. الحس المهمل كثيراً وغير الواعي الذي يوفر لنا المعلومات عن وضع وحالة العضلات والمفاصل والأطراف وأقسام الجسم الأخرى.

- **protopathic s.** الإحساس البدائي. التحسس لتنبيهات الألم والحرارة الضعيف وغير دقيق التوضيح ويوجد مثل هذا الحس في الجلد والاحشاء ويعمل كعامل دفاعي ضد التغييرات المرضية في الأنسجة.

- **recurrent s.** إحساس راجع. حس في القسم الرأسي من جذر العصب عند تنبيه قسمه الطرفي المقطوع.

- **somesthetic s. (= proprioceptive s.)** إحساس الإدراك المخصوص: الإحساس العميق.

- **splanchnesthetic s.** إحساس حشوي. الوعي أو التحسس الذي يعتمد على المستقبلات الحشوية.

- **vibratory s. (= pallesthesia)** الإحساس بالإهتراز.

sensibilization تحسيس. 1. عملية زيادة التحسس. 2. تحسيس.

sensible 1. حساس. 2. محسوس. 1. قادر على الحس. 2. محسوس بالحواس.

sensiferous ناقِل للحس. ما يولد النبضات الحسية.

sensigenous مؤلّد الحس. ما يولد النبضات الحسية.

sensimeter مقياس الحس. جهاز لقياس درجات الإحساس في باحات الجسم المخدرة أو مفرطة الحس.

sensitive حساس. قادر على استلام المنبهات والاستجابة لها، وعادة ما يستعمل الدلالة على فرط الحساسية الشاذ للمنبهات أو الاستجابة لها بسرعة حادة.

sensitivity حساسية. حالة أو صفة التحسس وتستعمل عادة للدلالة على الاستجابة الشاذة للمنبهات أو الاستجابة لها بسرعة حادة.

- **proportional s.** الحساسية النسبية. العلامة الجبرية بين شدة الاستجابة وشدة المنبه المولد لها.

sensorimobility حركية حسية. قدرة الإنسان أو الحيوان على الحركة استجابة للمنبهات الحسية.

sensoriglandular غدية حسية. توليد فعالية غدية نتيجة تنبيه العصب الحسي.

sensorimetabolism إستقلاب حسّي. توليد فعالية استقلابية نتيجة تنبيه العصب الحسي.

sensorimotor حسّي حركي. حسي وحركي في ذات الوقت.

sensorimascular عضلي حسّي. ما يولد فعلاً منعكسياً عضلياً استجابة لتنبيه حسي.

sensorineural عصبي حسّي. ما يتعلق بعصب حسي.

sensorium مركز حسّي؛ محسّ. (ج: محاسّ). 1. مركز عصبي حسي 2. مركز الإحساس الذي يوجد في الدماغ.

sensorivascular حسّي وعائي. ما يولد تغييرات وعائية عند تنبيه الأعصاب الحسية.

sensory حسّي. متعلق بالحس.

septum حاجز. (ج: حواجز). جدار فاصل أو حاجز وعند استعماله بمفرده يدل أحياناً على الحاجز الشفاف أو باحة الحاجز.

- **s. cervicale intermedium** الحاجز الرقبّي المتوسط. حاجز الدبق والام الجافية الذي يفور إلى الثلم الظهري المتوسط للحبل الظهري للقسمين الرقبّي والطني العلوي للنخاع الشوكي وهو يفصل الحزمتين الدقيقة والاسفينية عن بعضها.

الْحَاجِزُ الشَّفَافُ - s. lucidum (= s. pellucidum)

الْحَاجِزُ الشَّفَافُ - pellucid s. (= s. pellucidum)

الْحَاجِزُ الشَّفَافُ. حاجز شثاني s. pellucidum
الغشاء ومثلث الشكل يفصل القرنين الأماميين
للبطنيين الجانبيين للدماغ ويقع في المستوى الناصف
ويحده الجسم الثفني وجسم القبو وأعمده.

الحاجز الجسري: s. pontis (= raphe pontis)
رَفَاءُ الجِسْرِ.

الْحَاجِزُ أَمَامَ الصُّوَارِ. s. precommissurale
حاجز يقع أمام الصوار الأمامي للمخ ويناسب جزئياً
التلفيف المجاور للانتهائي الذي يتكون من المجموعات
النورية الظهرية والبطنية والوحشية والذنبية.

الْحَاجِزُ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّةِ. subarachnoidal s.
غمد ليفي ناقص يقع في المستوى الناصف ويربط
العنكبوتية بالحنون على طول التلم الناصف الخلفي
للأقسام العنقية والصدورية العلوية للنخاع الشوكي.

الْحَاجِزُ s. verum (= s. precommissurale)
أَمَامَ الصُّوَارِ.

سِيرُوتُونِين. مادة تتولد في serotonin
العديد من العصبونات المركزية والمحيطية وتوجد
بتركيز عالٍ في العديد من أنسجة الجسم وهي مادة
مضيقية للأوعية ومثبطة للإفراز المعدي ومنبهة
للعضلات الملساء وتعمل كناقلة عصبية مركزية
وهي سلف مادة الميلاطونين.

سِيرُوتُونِينِي الفِعْلُ. serotoninergic
1. ما يحوي أو ما ينشط بالسيروتونين كعصبونات
نواة الرقاء في جذع الدماغ 2. منسوب إلى
العصبونات التي تفرز السيروتونين والتي بدورها
تحفز تحرير هرمونات النخامي.

1. نَزْعَة 2. طَاقَمُ مجموعة. 1. استعداد set
للاستجابة بطريقة مسبقة التنظيم أو التصميم إذ
يكون الكائن مهياً للاستجابة بأسلوب معين عند
استلامه إشارة خاصة لهذه العملية من محيطه 2.
مجموعة متناسقة ومتكاملة.

نَزْعَة. الاستعداد للاستجابة - mental s.

بطريقة معينة نتيجة تعليمات سبق استلامها أو توقعات
الشخص نتيجة خبراته السابقة.

1. الجِنْسَانِيَّةُ 2. اشتهاة الجنس. sexuality
1. الصفة المميزة الخاصة للذكورة أو الأنوثة.
2. ميلان الشخص للعلاقات والفعاليات الجنسية.

غُفْدُ (ج: أَغْفَاد). بنية sheath
أنبوبية تغلف أو تحيط بأحد الأعضاء أو جزء منه.

الغُفْدُ العَنَكَبُوتِي. الغشاء s. arachnoid
الرقيق بين الغمدين الحنون والجافي اللذين يحيطان
بالعصب البصري.

غُفْدُ الجَافِيَّةِ. الغلاف الخارجي للعصب dural s.
البصري فوق الغمد العنكبوتي.

الغُفْدُ medullary s. (= myelin s.)
النَّخَاعِيْنِي.

الغُفْدُ المِيَالِينِي. الغمد الذي يحيط myelin s.
بمحوار الخلايا العصبية المغمدة والمكون من طبقات
متراكزة من الميلين ويكونه في الياف الجهاز العصبي
المحيطي الغشاء البلازمي لخلايا شغان وتكون في
الجهاز العصبي المركزي الخلايا الدبقية القليلة
التغضن ويتقطع على مسافات على طول المحاور
بهوات تسمى عقد رانفير وهو غلاف عازل كهربائي
للاعصاب ويزيد من سرعة انتقال النبضات خلالها.

غُفْدُ شَفَان: s. of Schwann (= neurilemma)
غمد الليف العصبي.

قَسْعَرِيْرَة: رَعْدَة. ارتعاش بسيط مثل shiver
الذي يحدث عند التعرض للبرد.

صَدْمَة. (ج: صَدَمَات). 1. فقدان التوازن shock
العقلي المفاجيء 2. حالة تتولد عن اضطرابات
دموية ديناميكية واستقلابية وتتصف بعجز جهاز
الدوران من إدامة تجهيز الأعضاء الحيوية من
الجسم بالدم وتتصف بالتوهان العقلي.

صَدْمَة التَّخْدِير. حالة شبيهة - anesthesia s.
بالصدمة تنتج عن فرط جرعة المخدر.

صَدْمَة عَصْبِيَّة المَنَشَأ. صدمة neurogenic s.
تنشأ عن توسع وعائي عصبي المنشأ والتي يمكن أن
تتولد عن رضع أو نزف دماغي أو إصابة النخاع
الشوكي أو تخدير نخاعي أو عام عميق أو خمود
الجهاز العصبي المركزي.

- **spinal s.** صَدْمَةٌ نُخَاعِيَّةٌ. فقدان المنعكسات النخاعية الشوكية بعد رضخ النخاع الشوكي والذي يؤثر على العضلات التي تغذيها شُدَّه تحت مستوى الإصابة.

sickness دَاءٌ؛ مَرَضٌ؛ سَقَامٌ. حالة أو عارضة انحراف عن الحالة الصحية السوية.

- **aerial s. (= air s.)** دَاءُ الطَيْرَانِ. داء يتولد عن تغير الضغط المحيط بالجسم وعن الحركات التي تؤثر على الشخص في الطائرة ويتصف بالغثيان والإعجاب والتعرق البارد.

- **aviation s. (= air s.)** دَاءُ الطَيْرَانِ.

- **falling s. (= epilepsy)** داء السَّقُوطِ؛ الصَّرَعُ.

- **talking s.** داء هذري؛ دَاءُ الْفَرْثَةِ. التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بالتهيج الشديد والنقصان العضلي وكثرة الكلام.

sign عَلَامَةٌ. دلالة على وجود شيء ما أو دليل موضوعي واضح عن المرض يمكن أن يجدها الطبيب الفاحص بالنظر أو الفحص المباشر، وهي غير الأعراض التي يشعر بها المريض.

- **Abadie's s.** 1. علامة أَبَادِي. 2. تشنج العرقوب للضغط ويشاهد في التابس الظهري 3. تشنج رافعة الجفن العلوي كعلامة لداء غريفز.

- **Babinski's s's.** 1. فقدان أو 2. علامات بَابِنْسكي. 3. ضعف منعكس العرقوب في عرق النسا وهذه علامة تفرقه عن عرق النسا الهستيرى 4. تشنج العضلة الجذبية العنقية في الشلل النصفي (الفالج) ويكون ذلك أكثر شدة في الجهة السليمة منه في الجهة المشلولة كما يشاهد ذلك عند الصغير أو النعخ أو ما شاكل. 5. يطلب من المريض الاستلقاء على الأرض مع ذراعيه متصالبتين على صدره ويتم محاولة أن يجلس من تلك الوضعية فينبثق الفخذ في الجهة المشلولة على الورك ويرتفع العقب عن الأرض أما في الجهة السليمة فلا يتحرك الطرف وتعود هذه الظاهرة عندما يعاود المريض وضع الاستلقاء ويشاهد ذلك في الفالج العضوي ولا يشاهد في الفالج الهستيرى 6. عند وضع الساعد المشلول في وضع البسط يدور إلى وضع الكعب ويشاهد ذلك في الشلل العضوي ويسمى ذلك علامة الكعب.

- **Babinski's toe s. (= Babinski's reflex)**

عَلَامَةٌ إصبع القدم البَابِنْسْكِيَّةُ؛ مَنَعَكْسُ بَابِنْسكي.

- **Barre's pyramidal s.** عَلَامَةُ بَارِيه الهرمِيَّة. يستلقي المريض ووجهه للأسفل وتثنى الساقان عند الركبتين فلا يتمكن أن يحافظ عليها في هذا الوضع إذا كان مصاباً بداء السبيل الهرمي.

- **Bekhterev's s.** عَلَامَةُ بَخْتِيرِف. 1. خدر في الحيز المابضي في التابس الظهري 2 منعكس بختيريف.

- **Biernacki's s.** عَلَامَةُ بِيَرْنَاكي. خدر في العصب الزندي في الخزل العام والتابس الظهري.

- **Binda's s.** عَلَامَةُ بِنْدَا. حركة المنكب المفاجيء عند تحريك الرأس بصورة لا فاعلة نحو الجهة الأخرى وهي علامة مبكرة لالتهاب السحايا السلي.

- **Bonnet's s.** عَلَامَةُ بُونِيه. ألم عند تقريب الفخذ وهي علامة عرق النسا.

- **Bragard's s.** عَلَامَةُ بَرَاغَارْد. مع بسط الساق ووضعها بوضع التيبس يثنى الطرف السفلي عند الورك إلى أن يشعر المريض بالألم ثم يثنى القدم نحو الظهر فتدل زيادة الألم عند ذلك على وجود مرض في الجذور العصبية.

- **Brudzinski's s.** عَلَامَةُ بَرُودِينسكي. 1. يؤدي ثني الرقبة في التهاب السحايا إلى ثني الورك والركبة 2 عند ثني أحد الأطراف السفلية بصورة لا فاعلة في التهاب السحايا تشاهد حركة مشابهة في الطرف المقابل.

- **cardinal s's.** العَلَامَاتُ الرَّئِيسِيَّةُ. علامات الالتهاب الرئيسية وهي الألم والاحمرار والحرارة والورم وقصور الوظيفة.

- **Charcot's s.** عَلَامَةُ شَارْكُوت. 1. ارتفاع الحاجب في الشلل المحيطي للعصب الوجهي وانخفاضه في التقصص الوجهي 2. العرج المتقطع في تصلب شرايين الساق والقدم.

- **Chvostek's s.** عَلَامَةُ شَفُوسْتِك. تشنج عضلات الوجه عند نقر العصب الوجهي في منطقة الغدة النكفية ويشاهد ذلك في التكرز.

- **Claude's hyperkinesis s.** عَلَامَةُ كَلَاُود

- مُفَرِّطَةُ الْحَرَكَةِ. الحركات الانعكاسية للعضلات الخزلاء التي تظهر عند التنبيه بالمنبهات المؤلمة.
- Erb's s. عَلَامَةُ إِرْب. 1. زيادة الاستثنائية الكهربائية للأعصاب الحركية في التكرز 2. الأصمية عند الطرق على قبضة القص في داء ضخامة النهايات.
- Escherich's s. عَلَامَةُ إِيْشِيرِيْش. يؤدي طرق السطح الداخلي للشفاه أو اللسان في التكرز إلى تقلصهما وتقلص العضلة الماضغة.
- facial s. (= Chvostek's s.) الْعَلَامَةُ الْوَجْهِيَّة. عَلَامَةُ فَاجِرْسْزْتاين's crossed sciatic s. فَيرْسْتَيْنْ لِلْوَرَكِي الْمَضَالِب. من الممكن في عرق النسا ثني الورك عند ثني الساق ولكن لا يمكن ذلك عند تمديد الساق كما يؤدي ثني الفخذ عند تمديد الساق في الطرف السليم إلى زيادة ألم عرق النسا في الجهة المصابة.
- fan s. عَلَامَةُ الْمِرْوَحَةِ. انفراج أصابع القدم وتباعدها. عند ضرب أخمص القدم وهو جزء من منعكس بابنسكي.
- Frankel's s. عَلَامَةُ فَرَانْكِل. زيادة مدى وسعة حركات مفصل الورك اللافاعلة تدل على نقص توتر العضلات المحيطة به في التابس الظهري.
- Froment's paper s. عَلَامَةُ فَرُومَه الْوَرَقِيَّة. انثناء السلامى القصوي للإبهام عند مسك صفحة ورقية بين الإبهام والسبابة ويشاهد ذلك في إصابات عصب الزند.
- Guiland's s. عَلَامَةُ غِيلَان. انثناء حاد للورك والركبة عند قرص العضلة رباعية الرؤوس على الجهة المقابلة وهي علامة على التهيج السحائي.
- Hahn's s. عَلَامَةُ هَان. دوران الرأس المستمر من طرف لآخر في المرض المخيخي عند الأطفال.
- Helbing's s. عَلَامَةُ هِلْبِنْغ. تقوس العرقوب للاتجاه الإنسي عند مشاهدته من الخلف وذلك في حالة القدم الرخاء.
- Hirschberg's s. (= adductor reflex of foot) عَلَامَةُ هِيرْشْبِرْغ: المنعكس التقاربي للقدم. تقارب وانعكاس وانثناء أخمصي جزئي للقدم عند تنبيه حافتها الداخلية (من دون الأخمص) من إبهام القدم حتى العقب، ويسمى أيضاً المنعكس التقاربي للقدم.
- Hoffmann's s. عَلَامَةُ هُوفْمَان. 1. زيادة الاستثنائية الآلية للأعصاب الحسية في التكرز وعادة ما يفحص العصب الزندي لذلك 2. يؤدي القرص المفاجيء لأظافر السبابة والوسطى والبنصر إلى انثناء السلامية الانتهازية للإبهام والسلاميتين الثانية والثالثة لأحد الأصابع الأخرى.
- Holmes's s. (= rebound phenomenon) عَلَامَةُ هُولْمَز. ظاهرة الارتداد.
- Hoover's s. عَلَامَةُ هُوْفِر. في الحالة الطبيعية أو في الشلل الحقيقي إذا طلب من المريض المستلقي أن يضبط بإحدى ساقيه على السرير تشاهد حركة رفع الساق الثانية ولا تشاهد هذه الظاهرة في الهستيريا أو عند المتمازجين.
- Hoyne's s. عَلَامَةُ هُوَيْن. علامة تظهر في التهاب سنجابية النخاع الشللي أو اللاشللي فعندما يكون المريض في وضع الاستلقاء يسقط رأسه إلى الخلف عند رفع منكبيه.
- Huntington's s. عَلَامَةُ هُنْتِنْغْتُون. 1. يوضع المريض بوضع الاستلقاء مع تدلي ساقيه على حافة المنضدة ويطلب منه السعال فإذا أدى ذلك إلى ثني الفخذ وانبساط ساق الطرف المشلول فإن ذلك يدل على أن الشلل ناتج عن آفة العصبون الحركي العلوي.
- Kashida's s. عَلَامَةُ كَشِيدَا. تشنج العضلات وفرط الحس للذات يتولدان عند التنبيه بالحرارة أو البرودة في حالة التكرز.
- Kernig's s. عَلَامَةُ كَرْنِيْغ. يتمكن المريض في وضع الاستلقاء من بسط ساقه كاملاً بكل سهولة أما عند الجلوس أو الاستلقاء مع ثني الفخذ على البطن فلا يمكنه بسط ساقه بصورة كاملة وهذه علامة التهاب السحايا.
- Kerr's s. عَلَامَةُ كِر. تغير بنيات الجلد تحت المستوى الجسدي في آفات النخاع الشوكي.
- Kleist's s. عَلَامَةُ كَلَايسْت. تنثني أصابع المريض عندما يرفعها الفاحص برفق بأصابعه نحو أصابع الفاحص مما يدل على الإصابات الجبهية والمهادية.
- Klippel-Feil s. عَلَامَةُ كَلِيْبِلْ فَايْل. ثني وتقريب إبهام المريض عند بسط أصابعه المثنية بسرعة بواسطة الفاحص وهي علامة تدل على مرض السبيل الهرمي.

- المستلقي كل محاولات رفع جذعه لوضع الجلوس إلى أن تنثني ساقاه بصورة لا فاعلة ويشاهد ذلك في التهاب سنجابية النخاع الوبائي.
- **Myerson's s.** علامة مايرسون. تشنج الأضلاع عند طرق العضلة الجبهية علامة داء باركنسون.
- **Negro's s. (= cogwheel phenomenon)** علامة نيفزو. ظاهرة الدولاب المسنن.
- **Neri's s.** علامة نيري. 1. إحدى علامات الفالج العضوي وتتكون من انثناء ركبة الطرف المصاب تلقائياً عند رفع الساق بطريقة لفاعلة وذلك عندما يكون المريض مستلقياً على ظهره 2. يولد انثناء الجذع إلى الامام عندما يكون الشخص واقفاً انثناء ركبة الجبهة المصابة في الإصابات القطنية العجزية والوركية العجزية.
- **objective s. (= physical s.)** علامة موضوعية. علامة يمكن سماعها أو حسها من قبل الطبيب.
- **Oppenheim's s.** علامة أوبنهايم. انثناء إبهام القدم للجهة الظهرية عند طرق الجهة الإنسية للظنوب للأسفل والذي يشاهد في مرض السبيل الهرمي.
- **orbicularis s.** علامة الدويرية. لا يمكن غلق العين على الجهة المشلولة في الفالج (الشلل النصفي) من دون غلق العين الثانية.
- **Parrot's s.** علامة بارو. توسع الحدقة عند قرص جلد الرقبة في التهاب السحايا.
- **peroneal s.** علامة الشطوي. انثناء ظهري وتقريب القدم كعلامة للتكزز الكامن وتظهر عند نقر العصب الشطوي تحت رأس الشظية مباشرة عندما تكون الركبة مرتخية ومنثنية قليلاً.
- **physical s. (= objective s.)** علامة موضوعية.
- **Plotrowski's s.** علامة بليوتروفسكي. يؤدي قرع العضلة الظنبوبية الأمامية إلى ثني القدم ظهرياً وبسطها وعندما يكون هذا المنعكس مفرطاً فإنه يدل على وجود مرض عضوي للجهاز العصبي المركزي.
- **Pitre's s.** علامة بترن. فرط حساسية الصفن والخصيتين في التابس الظهري.
- **Prevost's s.** علامة بريفوست. الانحراف المتقارن للعينين والرأس في الفالج بحيث تنظر العين إلى جهة
- **Lasegue's s.** علامة لازيك. ثني الورك في عرق النسا يؤلم كثيراً عندما تكون الركبة منبسطة ولكنه لا يؤلم عندما تكون الركبة منثنية وبهذا يفرق هذا المرض عن اضطرابات مفصل الورك.
- **Leichtenstern's s.** علامة ليشتنسترن. يؤدي قرع أي عظم بصورة خفيفة في التهاب السحايا الدماغية النخاعية إلى أن يجفل المريض بصورة مفاجئة.
- **Leri's s.** علامة ليري. لا يؤدي ثني اليد والرسغ في الجهة المصابة بالفالج (الشلل النصفي) إلى الانثناء الطبيعي في الساعد.
- **Lhermitte's s.** علامة ليرميت. ظهور صدمات فجائية عابرة كهربائية النوع تنتشر إلى كل الجسم عند ثني المريض رأسه للامام ويشاهد ذلك خاصة في التصلب المتعدد وكذلك في انضغاط النخاع الرقبي واضطراباته الأخرى.
- **Lichtheim's s.** علامة ليشتيم. بالرغم من عدم تمكن المريض من الكلام في الحبسة تحت القشرية لكنه يتمكن من الإشارة بأصابعه إلى عدد المقاطع في الكلمة التي يفكر فيها.
- **Linder's s.** علامة ليندر. يؤدي ثني الرأس للأفعل في المريض المستلقي أو الجالس مع امتداد ساقيه إلى ألم فيهما أو في المنطقة القطنية وذلك في عرق النسا.
- **Macewen's s.** علامة ماكينون. يصدر نغم رنيني أشد مما يتولد في الحالة الطبيعية عند قرع منطقة القحف خلف اتصال العظام الجبهية والصغوية والجدارية في حالة موه الرأس الباطن وخراج الدماغ.
- **Marie-Foix s.** علامة ماري-فوا. سحب الساق السفلية عند الضغط المستعرض للرصغ أو الثني المشدد لأصابع القدم حتى عندما لا تتمكن الساق من الحركة الإرادية.
- **Mayo's s.** علامة مايو. ارتخاء عضلات الفك السفلي الذي يدل على الخدر الشديد.
- **Minor's s.** علامة ماينور. طريقة قيام الشخص المصاب بعرق النسا من وضع الجلوس فهو يسند نفسه على الجهة السليمة ثم يضع إحدى يديه على ظهره ويثني الساق المصابة ويوازن نفسه على الساق السليمة.
- **Morquio's s.** علامة موركووا. مقاومة المريض

- نصف كرة المخ المصاب وبعيداً عن جهة الاطراف المشلولة.
- **pronation s. (= Babinski's s.)** علامة بابينسكي.
- **pseudo- Babinski's s.** علامة بابينسكي الكاذبة. تحوير منعكس بابينسكي في التهاب سنجابية النخاع بحيث ينسبط إبهام القدم فقط بسبب شلل كل عضلات القدم ما عدا العضلات المثنية الظهرية لإبهام القدم.
- **Queckenstedt's s.** علامة كوكنسيتيت. عند الضغط على أوردة الرقبة على الجهتين أو على جهة واحدة يرتفع ضغط السائل الدماغي النخاعي عند الأشخاص الأصحاء ولكنه سرعان ما يزول عند رفع الضغط عنها، أما عند وجود انسداد في القناة الشوكية فلا يتأثر ضغط السائل الدماغي النخاعي بهذه العملية أبداً.
- **Raimiste's s.** علامة ريميسيت. يرفع الفاحص يد المريض وساعده عالياً فإذا كانت اليد سليمة تبقى مرفوعة عندما يتركها الفاحص وإذا ما كانت مشلولة فإنها تنثني مباشرة عند المعصم.
- **Revilliod's s. (= orbicularis s.)** علامة الدويرية. علامة ريفيلود.
- **Romberg's s.** علامة رومبرغ. تمايل الجسم أو سقوطه عند الوقوف مع ضم القدمين وغلغ العينين في التابيس الظهرية.
- **rope s.** علامة الحبل. تكوين الزاوية الحادة بين الذقن والحجرة بسبب ضعف العضلات اللامية ويشاهد ذلك في التهاب سنجابية البصلة.
- **Rosenbach's s.** علامة رورنباخ. غياب المنعكس البطني الجلدي عند قرص جلد البطن على الجهة المشلولة في الفالج.
- **Roser's s. (= Roser- Braun s.)** علامة رورز. غياب نبضات الجافية كعلامة لورم الدماغ أو لخراجه.
- **Saenger's s.** علامة سينغر. عودة منعكس الضوء الحدقي المتوقف بعد البقاء لفترة قصيرة في الظلام ويشاهد ذلك في افرنجي الدماغ ولكنه لا يحدث في التابيس الظهرية.
- **Sarbo's s.** علامة سارو. شلل العصب الشظوي الذي يلاحظ أحياناً في التابيس الظهرية.
- **Saunder's s.** علامة سوندر. يترافق فتح الفم كثيراً في الأطفال مع حركات اليد التي تتكون من فتح اليد وبسطها وانفراج أصابعها.
- **Schlesinger's s.** علامة شليزinger. عند مسك الساق في التكرز من مفصل الركبة وثني مفصل الورك بشدة تشاهد بعد فترة وجيزة تشنجا انبساطياً في مفصل الركبة مع بسط القدم.
- **Schultze's s. (= 1.Chvostek's s. 2.tongue phenomenon)** ظاهرة اللسان؛ علامة شولتز.
- **Schultze Chvostek s. (= Chvostek's s.)** علامة شولتز شفوستك؛ علامة شفوستك.
- **Seeligmuller's s.** علامة سيلينغمولر. توسع الحدقة على الجهة المصابة بالآلم العصبي.
- **setting sun s. (= rising sun s.)** علامة غيَاب الشَّمْس. انحراف العينين للأسفل بحيث تبدو القرحتان كأنما «غائبتان» تحت الجفن السفلي مع انكشاف الصلبة البيضاء بين حافة الجفنين مما يدل على زيادة ضغط داخل القحف (كالنزيف أو التهاب السحايا والبطانة العصبية) أو تهيج جذع الدماغ (مثلاً في اليرقان النووي).
- **Signorelli's s.** علامة سينيورلي. الآلم الشديد عند الضغط على النقطة خلف الفك السفلي في التهاب السحايا.
- **Simon's s.** علامة سيمون. فقدان التزامن السوي بين حركات الحجاب الحاجز والصدر الذي يشاهد عند ابتداء التهاب السحايا.
- **spine s.** علامة السيساء. عدم رغبة المريض على ثني العمود الفقري للأمام في التهاب سنجابية النخاع.
- **Squire's s.** علامة سكواير. توسع وتضيق حدقة العين المتناوبين في التهاب السحايا القاعدية.
- **stairs s.** علامة السلالم. صعوبة نزول السلم في التابيس الظهرية.
- **Strumpell's s.** علامة شترومبل. 1. انثناء القدم للجهة الظهرية عند سحب الفخذ للأعلى باتجاه الجسم ويشاهد في الشلل التشنجي للطرف السفلي ويسمى علامة الظنوبية 2. عدم المقدرة على غلق الكف من دون البسط الشديد للمعصم ويسمى علامة الكعبرية 3. الانثناء المنفصل للمساعد الذي يتولد عن الكب

- ويشاهد في الفالج (الشلل النصفي) ويسمى علامة الكب.
- **Tinel's s.** علامة تِنَل. حس نخزي في النهاية القصوية من الطرف عند نقر موقع العصب المقطوع وهي علامة تدل على آفة جزئية للعصب أو على بدء تجرده.
- **toe s. (= Babinski's s.)** علامة أصبع القدم
- **trepidation s. (= patellar clonus)** علامة الإهتزاز.
- **Turyn's s.** علامة تورين. عند ثني إبهام القدم للأعلى في عرق النسا يشعر المريض بال ألم في المنطقة الالوية.
- **Uththoff's s.** علامة أوثهوف. رارة العينين التي تحدث في التصلب الدماغي النخاعي المتعدد.
- **Vanzetti's s.** علامة فانزيتي. يكون الحوض في عرق النسا أفقياً دائماً بالرغم من الجنف ولكن في الأمراض الأخرى المترافقة مع الجنف يكون الحوض مائلاً.
- **vital s's.** العلامات الحيوية. النبض والتنفس والحرارة.
- **Wartenberg's s.** علامة وَرْتَنْبِرْغ. 1. علامة شلل الزندي وتتكون من ابتعاد وضع الخنصر 2. قلة أو غياب الحركات النواسية للذراعين عند السير بسبب مرض المخيخ.
- **Weber's s.** علامة وِيبَر. شلل العصب محرك العين على جهة واحدة وفالج (شلل نصفي) على الجهة الأخرى.
- **Westphal's s.** علامة وستفال. فقدان النفخة الركبية في التابس الظهرى.
- **Wood's s.** علامة وُود. ارتشاء العضلة الدويرية وتثبتت مقلة العين وحول وحشي للدلالة على التخدير العميق.
- simesthesia (= osseous sensibility)**
الحس العظمي.
- simultagnosia (= simultanagnosia)**
عمّة التكامّل.
- simultanagnosia** عمّة التكامّل البصري. عدم المقدرة على فهم أكثر من عنصر واحد من منظر بصري في وقت واحد أو عدم المقدرة على فهم كل مكونات أية صورة لتكوين مفهوم شامل لها.

1. يساري 2. أغسر. 1. متعلق **sinistral**
بجهة الجسم اليسرى 2. شخص يفضل استعمال أعضاء جهته اليسرى في الوظائف الإرادية.
- sinistrality** عسر؛ عسروية. تفضيل استعمال أعضاء الجهة اليسرى من الجسم في أداء الحركات والوظائف الإرادية كاستعمال العين والأذن واليد والساق اليسرى.
- sinistrocerebral** مُحَيّ يساري. متعلق بنصف كرة المخ اليسرى أو يقع فيها.
- sinistromanual (= left handed)** أغسر.
- sinistropedal (= left footed)** أغسر القدم.
- sinus** جَنِب. (ج: جُيُوب). كهف أو قناة، وهو مصطلح لأحياز متوسعة أو أقتية للدم الوريدي في القحف أو الكبد أو للهواء في العظام القحفية 2. قناة شاذة أو ناسور يسمح بمرور القيح.
- **s. cavernosus (= cavernous s.)** الجَنِب الكهفي. حيز وريدي غير منتظم الشكل في الأم الجافية على جانبي جسم العظم الوددي ويمتد من النهاية الإنسية للشق الحجاجي العلوي في الأمام حتى قمة العظم الصخري الصدغي في الخلف ويستلم الوريد العيني والوريد المخي السطحي الوسطي والجيب الوددي الجداري ويتصل مع الجيب الكهفي المقابل ومع الجيب المستعرض والوريد الوداجي الباطن عن طريق الجيوب الصخرية. وهو يضم عادة قناة وريدية واحدة أو أكثر ويحوي أيضاً الشريان السباتي الباطن والعصب المبعد.
- **cerebral s.** جَنِب دِمَاعِي. أي من بطينات الدماغ.
- **circular s.** الجَنِب الدائري. حلقة وريدية حول النخامية تتكون من الجيبين الكهفيين والجيبين بين الكهفيين الأمامي والخلفي، ويسمى أيضاً جيب ريدي.
- **cranial s's. (= s. durae matris)** الجُيُوب القَحْفِيَّة؛ جيوب الأم الجافية.
- **s's. of dura mater (= s. durae matris)** جُيُوب الأم الجافية. أقتية وريدية كبيرة تكون جهازاً تفاغرياً كبيراً بين طبقات الأم الحنون في الرأس وهي خالية من الصمامات ولا تتخمس أو تنخفق عندما تنزح وهي تحتوي على تراكيب في بعض أقسامها وتقوم بنزح الاوردة الدماغية وبعض الاوردة بين

اللوحتين والسحائية إلى الأوردة الرقبية كما تنزح الجيوب الموجودة في قاعدة القحف معظم الدم من الحجاج وتتصل في بعض المواقف مع الأوردة السطحية بواسطة أوردة مشبرية، وتسمى أيضاً الجيوب الحفية.

- s. intercavernous الجَيْبَانُ بَيْنَ الكَهْفَيْنِ. جيبان وريديان يربطان الجيبين الكهفيين. أحدهما يمر أمام قمع النخامية ويمر الثاني خلفها.

- lateral s. (= s. transversus durae matris) الجيب المستعرض للأم الجافية؛ الجَيْبُ الجَانِبِيّ.

- longitudinal s. inferior (= inferior sagittal s.) الجَيْبُ السهمي السفلي؛ الجَيْبُ الطَوْلَانِيّ السُّفْلِيّ.

- longitudinal s., superior (= superior sagittal s.) الجَيْبُ الطَوْلَانِيّ العُلَوِيّ.

- occipital s. (= s. occipitalis) الجَيْبُ القَذَالِيّ. جيب وريدي مفرد يبدأ بالفرعين الأيمن والأيسر والجيوب الهامشية ويمر إلى الأعلى على طول الحافة الملتصقة لمنجل المخيخ لينتهي عند مقرن الجيوب.

- parasinoidal s. parasinoidal's (= lacunae laterales) الجُيُوبُ المحيطة بالجَيْبِ: الجوبات الوحشية. أحد الأحياز العديدة في الأم الجافية التي تفتح في أحد جيوب الجافية وتسمى هذه الأحياز عادة الجوبات الوحشية.

- s. petrosus inferior (= inferior petrosal s.) الجَيْبُ الصَخْرِيّ السُّفْلِيّ. جيب وريدي ينبع من الجيب الكهفي ويجري على طول خط الالتحام الفصروفي الصخري القذالي إلى البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن.

- s. petrosus superior الجَيْبُ الصَخْرِيّ العُلَوِيّ. جيب ينبع عند الجيب الكهفي ويمر على طول خط التصاق حافة الخيمة المخيخية وينزح إلى الجيب المستعرض.

- s. rectus الجَيْبُ المُسْتَقِيم. جيب وريدي للأم الجافية يقع في خط التحام شراع الدماغ وخيمة المخيخ ويتكون من اتصال الوريد الدماغى الكبير

والجيب السهمي السفلي وعادة ما ينتهي في الجيب المستعرض المقابل عند مقرن الجيوب.

- rhomboid s. of Henle (= ventriculus terminalis medullae spinalis) الجَيْبُ المُعَيَّنِيّ لِهَنْلِيّ؛ البطين الانتهازي للمخاخ.

- s. sagittalis inferior الجَيْبُ السَّهْمِيّ السُّفْلِيّ. جيب وريدي صغير في الأم الجافية يقع في القسم السفلي من الحافة المقعرة لمنجل المخ وعند الفتحة في النهاية العلوية للجيب المستقيم.

- s. sagittalis superior الجَيْبُ السَّهْمِيّ العُلَوِيّ. جيب وريدي مفرد في الأم الحنون يبدأ أمام عرف الديك ويمتد إلى الخلف في الحافة المحدبة لمنجل المخ وينتهي بالقرب من الناشئة القذالية الباطنة في مقرن الجيوب وهو يستلم الأوردة المخية العلوية ويتصل مع الجوبات الوحشية للجافية المحاورة وهو عادة ما ينغلف جزئياً بالتحجب العنكبوتي.

- sigmoid s. الجَيْبُ السِّنِّيّ. أحد الجيبين الوريديين في الأم الجافية وهما استمرارية للجيبين المستعرضين ويدور كل منهما للأسفل من خيمة المخيخ ليصبح مستمراً مع البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن.

- s. sphenoparietalis الجَيْبُ الوُتْدِيّ الجِدَارِيّ. جيب وريدي في الجافية يبدأ من وريد سحائي بجوار قمة الجناح الصغير للعظم الوددي ثم ينزح إلى القسم الأمامي من الجيب الكهفي.

- subarachnoidal s. (= cisternae subarachnoidales) الجُيُوبُ حَتَّى العَنَكَبُوتِيّة.

- subpetrosal s. (= s. petrosus inferior) الجَيْبُ الصَخْرِيّ السُّفْلِيّ.

- superpetrosal s. (= s. petrosus superior) الجَيْبُ الصَخْرِيّ العُلَوِيّ.

- tentorial s. (= s. rectus) الجيب المستقيم؛ الجَيْبُ الخَيْمِيّ.

- s. transversus durae matris جَيْبُ الأُم الجَافِيّة المُسْتَقْرَض. أحد الجيبين الوريديين الكبيرين في الأم الجافية وهو يبدأ بطرق مختلفة عند مقرن الجيوب بالقرب من الناشئة القذالية الباطنة، ويتبع كل جيب الحافة الملتصقة لخيمة المخيخ بالعظم الصدغي الصخري حيث يصبح الجيب السيني. ويتصل الجيبان الأيمن والأيسر عند بدايتهما مع بعضهما

البعض ومع الجيب السهمي العلوي ومع الجيب المستقيم.

sitomania هَوَسُ الأَكْلِ. 1. الجوع المفرط والرغبة الملحة في الأكل 2. نهام دوري.

sitophobia رَهَابُ الأَكْلِ. الخوف الشاذ من تناول الطعام.

skelalgia أَلَمُ السَّاقِ. ألم في الساق.

skelasthenia وَهْنُ السَّاقِ. ضعف الساقين.

skull (= cranium) القحف؛ الجُفْجَمَة. الصَّنَدُوقُ العَظْمِيُّ للرأس المكون من عظام القحف والوجه.

sleep نَوْمٌ. فترة راحة للجسم والفكر تغيب فيه الإرادة والوعي جزئياً أو كلياً وتتعلل فيه وظائف الجسم جزئياً وهو يوصف على أنه حالة سلوكية تتصف بالوضعية السكونية الخاصة للجسم وقلة الحساسية للمنبهات الخارجية وهي حالة عكوسة. وينقسم النوم إلى مرحلتين: النوم معدوم الحركات العينية السريعة ونوم الحركات العينية السريعة.

- **active s. (= REM s.)** النوم الفاعل؛ النَوْمُ الفَعَّالُ؛ نوم الريم.

- **deep s. (= NREM s.)** النَوْمُ العميق؛ نوم لا ريمي.

- **desynchronized s. (= REM s.)** النَوْمُ اللامُتَّزِمُ.

- **dreaming s. (= REM s.)** النَوْمُ الإخْلَامِيّ.

- **electric s.** نَوْمٌ كَهْرَبَائِيّ. فقدان الحركات الإرادية مع تخدير عام يتولد عند تطبيق رأس تيار كهربائي سريع التقطع.

- **electrotherapeutic s. (= cerebral electrotherapy)** نَوْمٌ علاجيّ كَهْرَبَائِيّ.

- **fast wave s. (= REM s.)** نَوْمُ المَوْجَاتِ السَّريّة. نوم الحركات العينية السريعة.

- **non-rapid eye movement s. (= NREM s.)** نَوْمٌ بِدُونِ الحَرَكَاتِ العَيْنِيّةِ السَّريّة.

- **NREM s.** نَوْمٌ بِدُونِ الحَرَكَاتِ العَيْنِيّةِ السَّريّة؛ نَوْمٌ لا ريمي. فترة النوم الخالية من الاحلام وتتكون من أربع مراحل من درجات عمق النوم

تكون خلالها الموجات الدماغية بطيئة وذات فولتية عالية وتبطأ خلالها الفعاليات المستقلة كضربات القلب التي تكون بطيئة ومنتظمة ويهبط ضغط الدم وتتخلل ذلك فترات من نوم حركات العين السريعة ويكون النوم بدون حركات العين السريعة حوالي 80% من وقت النوم الكلي.

- **orthodox s. (= NREM s.)** النَوْمُ التَقْلِيدِيّ؛ نَوْمٌ قَوِيم. نوم بدون حركات العين السريعة.

- **paradoxical s. (= REM s.)** نَوْمٌ مُتَنَاقِض. نوم الحركات العينية السريعة.

- **paroxysmal s. (= narcolepsy)** نَوْمٌ انْتِبَاطِيّ. سبخ.

- **prolonged s.** نَوْمٌ مَطْوَل. معالجة الاضطرابات العقلية بالنوم المستمر لمدة عدة أيام تحت تأثير العقاقير المنومة.

- **quiet s. (= NREM s.)** نَوْمٌ هَادِئ. نوم بدون الحركات العينية السريعة.

- **rapid eye movement s. (= REM s.)** نَوْمُ الحَرَكَاتِ العَيْنِيّةِ السَّريّة، نوم الريم.


- **REM s. (= rapid eye movement s.)** نَوْمُ الحَرَكَاتِ العَيْنِيّةِ السَّريّة؛ نوم الريم. فترة النوم التي تكون فيها موجات الدماغ سريعة ومنخفضة الفولتية والفعاليات الذاتية كالتنفس وضربات القلب غير منتظمة. وترافق الاحلام هذا النوع من النوم كما تحدث فيها انقباضات عضلية لا إرادية بسيطة وحركات عينية سريعة وتحدث نوبات هذا النوم حوالي 3-4 مرات في الليلة الواحدة بفترات تتراوح بين 80-120 دقيقة تدوم كل نوبة منها خمس دقائق إلى أكثر من ساعة وتكون نسبة هذا النوع من النوم حوالي 20% من مجموع وقت النوم الكلي.

- **slow wave s. (= NREM s.)** نَوْمٌ بَطِيء المَوْجَات؛ نَوْمٌ لا ريمي.

- **synchronized s. (= NREM s.)** نَوْمٌ مُتَّزِم.


- **twilight s.** نَوْمٌ غَلَسِيّ. حالة تسكين ونساعة تتولد عن حقن المورفين والسكوبولامين تحت الجلد، وبالرغم من أن المريض يستجيب في هذه الحالة للالام لكنه لا يحفظه في ذاكرته.

sleep talking (= somniloquism) كلامٌ نومي؛ تَكَلُّمٌ نَوْمِيّ.



skull

منظر جانبي ايسر للججمة: (1) العظم الجبهي (2) الدرز التاجي (3) العظم الأنفي (4) الفك العلوي (5) الفك السفلي (6) الفك السفلي (7) القوس الوجني (8) الصماخ السمعي الظاهر (9) الفتوة الخشائي (10) الدرز القفوي الصدغي (11) العظم الصدغي (12) العظم القفوي (13) الدرز اللامي (14) العظم الجداري.



akull

منظر أمامي للججمة: (1) الدرع الجبهي الأنفي (2) الدرع بين المنخرين (3) تجويف الأنف (4) الدرع الوجني الغلمي (6) القلب الذقني (7) الفك السفلي (8) الفك العلوي (9) العظم الوجني (10) العظم الأنفي (11) الحاجاج (12) العظم الصدغي (13) العظم الجداري (14) العظم الجبهي.

sleep walking (= somnambulism)

سَيْرٌ نَوْمِي.

slows (= trembles)

إِرْتِعَاشٌ.

sociopathy اِعْتِلَالٌ اِجْتِمَاعِيّ.

سلوكية لا اجتماعية أو معادية للمجتمع.

sodomist سَدُومِيّ.

أو ممارس الاتصالات الجنسية الشاذة.

sodomy سَدُومِيَّةٌ.

نوع من الشذوذ.

الجنسي يصفه القانون ليشمل الاتصال الجنسي بين الإنسان والحيوانات من أنواع مختلفة وكذلك الممارسة الجنسية الفموية أو الشرجية بين الأفراد ويقتصر استعمال المصطلح طبياً على الاتصال الجنسي بين الإنسان والحيوان واللواط.

softening تَلَيُّنٌ بِقُفْرِ الدَّم.

عملية تليين النسيج أو العضو مرضياً مثل تليين الدماغ أو النخاع الشوكي.

- anemic s. تَلَيُّنٌ قُفْرَدِمِيّ.

تليين نسيج الدماغ وانحلاله بسبب نقص الدم المجهز له.

- s. of the brain تَلَيُّنُ الدِّمَاغِ.

1. استعمال شائع للخرف الشللي 2. تليين الدماغ.

somasthenia وَهَنٌ جَسَدِيّ.

ضعف جسمي عام مع ضعف الشهية للطعام وقلة النوم وعدم المقدرة على القيام بالحياة العادية السوية من دون إنهاك عام.

somatalgia أَلَمٌ جَسَدِيّ.

ألم بدني.

somatasthenia (= somasthenia) وَهَنٌ جَسَدِيّ.

جسدي.

somatesthesia (= somatognosis) حِسٌّ

الجسد. الحس بوجود الجسد.

somatic جَسَدِيّ.

1. متعلق بالجسد أو ما يتصف به 2. متعلق بجدار الجسم وغير متعلق بالأحشاء.

somaticovisceral جَسَدِيّ حَشَوِيّ.

متعلق بالجسد والأحشاء.

somatoceptor مُسْتَقْبِلٌ جَسَدِيّ.

مستقبل يستلم المنبهات من العضلات الهيكلية والجسدية.

somatopsychic جَسَدِيّ نَفْسَانِيّ.

متعلق بالجسد والعقل وهو يدل على اضطراب جسدي يولد أعراضاً نفسية.

somatopsychosis دُهَانٌ جَسَدِيّ.

مرض نفسي يترافق مع داء جسدي.

somesthesia (= somatesthesia) حِسٌّ

الجسد.

somnambulance (= somnambulism)

سَيْرٌ نَوْمِيّ.

somnambulation (= somnambulism)

سَيْرٌ نَوْمِيّ.

somnambulism سَيْرٌ نَوْمِيّ.

القيام من الفراش والسير أثناء حالة النوم وعادة ما يحدث ذلك في الثلث الأول من الليل ويدوم من بضع دقائق لنصف ساعة.

somnambulist السَّائِرُ النَّوْمِيّ.

المصاب بالسير النومي.

somniloquism تَكَلُّمٌ نَوْمِيّ.

التكلم أثناء النوم.

somnolence نَيْمُومَةٌ.

وَسَنٌ. النعاس الطبيعي أو الشعور غير الطبيعي به.

somnolentia نَيْمُومَةٌ.

وَسَنٌ. 1. نعاس 2. حالة نوم غير كامل تتصف بفقدان الاهتمام وبسلوك هياجي أو استثنائي.

sophomania هَوَسٌ

إِدْعَاءُ الْحِكْمَةِ. اعتقاد المصاب غير المسبب برجاجة عقله وحكمته.

soporiferous مُنَوِّمٌ.

ما يولد نوماً عميقاً.

soporific مُنَوِّمٌ.

1. يولد نوماً عميقاً 2. دواء أو أي عامل آخر يولد النوم.

sopororous مَسْنُوتٌ.

مترافق مع أو مصاب بالوسن أو السبات.

space حَيْزٌ.

(ج: أَخْيَاز); فَضَاءٌ (ج: أَفْضِيَّة)

1. باحة محددة 2. تجويف حقيقي أو كامن في الجسم 3. اتساع الكون خارج الأرض والجو.

epicerebral s. الْحَيْزُ فَوْقَ الدِّمَاغِ.

الحيز الكامن بين الدماغ والأم الحنون.

- epidural s. (= cavitas epiduralis) الْحَيْزُ

فَوْقَ الْجَافِيَّةِ.

- epispinal s. الْحَيْزُ فَوْقَ النُّخَاعِ.

الحيز الكامن بين النخاع الشوكي والأم الحنون.

- **subarachnoid s.** الحَيْرُ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّة. تشنُّج (ج: تشنُّجات) 1. تقلص مفاجيء وشديد ولا إرادي لإحدى العضلات أو لعدة عضلات مع المها وتوقف وظيفتها وقد يولد حركات لا إرادية أو انفتال العضو 2. تضيق مفاجيء ولكنه عابر لممر أو قناة أو فتحة.
- **s. of accommodation** تشنُّج التَّكْيُف. تشنُّج العضلات الهدبية مولداً فرط تكيف البصر للأجسام القريبة.
- **athetoid s.** تشنُّج كَنَعَانِي. تشنُّج يتحرك فيه العضو المصاب حركات تشبه حركات الكنع.
- **Bell's s. (= convulsive tic)** تشنُّج بيل؛ تشنُّج الوجه. عرة اختلاجية (وجبهة).
- **canine s. (= risus sardonicus)** تشنُّج كَلْبِي؛ تَكْشِيرَةٌ سَرْدُونِيَّة.
- **carpopedal s.** تشنُّج اليَدِ والقَدَم. تشنُّج عضلات اليدين والقدمين أو الإبهامين والأبخرسين الكبيرين ويشاهد في التكرز.
- **cerebral s.** تشنُّج مُخَي. تشنُّج بسبب آفة مخية.
- **clonic s.** تشنُّج رَمَعِي. تشنُّج ترتخي فيه العضلات مباشرة بعد صملمها.
- **cynic s. (= risus sardonicus)** تشنُّج كَلْبِي؛ تَكْشِيرَةٌ سَرْدُونِيَّة.
- **dancing s. (= saltatory s.)** تشنُّج رَقْصِي.
- **diffuse esophageal s.** تشنُّج مَرِيئِي مُنْتَشِر. تقلصات شديدة غير منسقة وغير دافعة للمريء يهيجها البلع وخصوصاً عند الشيوخ ويشاهد جوف المريء بالأشعة مع الباريوم بشكل سلسلة تضيقات متراكزة أو ملف لولبي.
- **facial s.** تشنُّج وَجْهِي. تشنُّج عضلات الوجه الذي يغذيها العصب الوجهي ويمكن أن يشمل كل جهة الوجه أو المنطقة التي تحيط بالعين.
- **fixed s.** تشنُّج ثَابِت. تشنُّج دائم في إحدى العضلات أو في مجموعة منها.
- **glottic s. (= laryngospasm)** تشنُّج مَزْمَارِي؛ تشنُّج الحَنَجْرَةِ.
- **habit s. (= tic)** تشنُّج العَادَةِ؛ عُرَّة.
- **histrionic s. (= facial s.)** تشنُّج مُتَكَلِّف؛ تشنُّج العَادَةِ؛ عُرَّة.

تشنُّج الوجْهِ التَّمْيِيلِي. اختلاج عضلات الوجه الشبيه بمعصر الكتاب.

- **infantile massive s. (= jackknife seizure)** تشنُّج طِفْلِي كُتْلِي. متلازمة رمع عضلي شديد يظهر في الشهور الثمانية عشرة الأولى من حياة الطفل ويترافق ذلك مع اضطراب دماغي شديد ويتصف بتشنُّج انثنائي شديد للرقبة والرأس والجذع وانبساط الأطراف العلوية والسفلية.
- **intention s.** تشنُّج قَصْدِي. تشنُّج عضلي يحدث عند محاولة القيام بحركة إرادية.
- **lock s.** تشنُّج قَافِل. تشنُّج توترِي يظهر وكأنه يقلل الأصابع مع بعضها كما يحصل في معصر الكتاب وفي الإصابات المماثلة.
- **malleatory s. (= malleation)** تشنُّج طَرَقِي؛ نَقْضَانُ اليَد.
- **massive s.** تشنُّج كُتْلِي. نوبة تنصف بتقلص معظم عضلات الجسم.
- **mixed s.** تشنُّج مُخْتَلِط. تشنُّج تظهر فيه حركات تشنجية انثنائية وانبساطية.
- **mobile s. (= athetosis)** تشنُّج حَرَكِي؛ كَنَع.
- **myopathic s.** تشنُّج الإِغْتِلَالِ العَضَلِي. تشنُّج يرافق الاعتلال العضلي.
- **nictating s. (= winking s.)** تشنُّج رَفِي؛ تشنُّج غَمَزِي.
- **nodding s.** تشنُّج إِيمَانِي. تشنُّج رمعي في العضلات القصية الخشائية يولد حركات إيمائية ويترافق ذلك مع الرأرة، ويسمى أيضاً اختلاج سلامي.
- **perineal s. (= penneal vaginismus)** تشنُّج عَجَانِي. تشنُّج المهبل العجاني.
- **phonatory s.** تشنُّج صَوَوِيَّتِي. تشنُّج مَوْتَرَات الحبال الصوتية.
- **progressive torsion s. (= dystonia musculorum deformans)** تشنُّج التَوَائِي مُزْرَق؛ خلل التوتر العضلي المشوه.
- **respiratory s.** تشنُّج تَنَفُّسِي. تشنُّج عضلات التنفس.
- **retrocollic s.** تشنُّج الرَقَبَةِ الخَلْفِي. انثناء الرأس التشنجي للخلف.

- **Romberg's s.** تَشْنُجٌ رُومْبِرْغ. تشنج مضفي للعضلات التي يغذيها العصب الخامس.
- **rotatory s.** تَشْنُجٌ دَوْرَانِي. تشنج منقطع للعضلة الخشائية فيسبب دوران الرأس.
- **salaam s. (= nodding s.)** تَشْنُجٌ سَلَامِي.
- **saltatory s.** تَشْنُجٌ قَفْزِي. تشنج رمعي لعضلات الساق يولد حركة قفزية غريبة عند وقوف المريض.
- **synclonic s.** تَشْنُجٌ رَمْعِي مُتْرَافِن. تشنج رمعي لاكثر من عضلة واحدة في وقت واحد.
- **tetanic s. (= tonic s. = tetanus)** تَشْنُجٌ كَرَّازِي؛ تَكَرَّرٌ فَيَزِيدُ لَوْجِي. حالة تقلص عضلي مستمر من دون فترات ارتخاء تنتج عن التنبيه المستمر للعصب الحركي بنبضات سريعة وتندمج الاستجابات العضلية لكل منها مع بعضها.
- **tonoclonic s.** تَشْنُجٌ نَقْضَانِي؛ تَشْنُجٌ تَوْتَرِي رَمْعِي. نقضان اختلاجي للعضلات.
- **torsion s.** تَشْنُجٌ التَوَانِي. تشنج يتصف بانفعال أو دوران الجسم وخصوصاً الحوض كالذي يحصل في خلل التوتر العضلي المشوه.
- **toxic s.** تَشْنُجٌ سُمِّي. تشنج يتولد عن التسمم بأحد السموم.
- **winking s.** تَشْنُجٌ رَفِّي؛ تَشْنُجٌ غَفْزِي. نقضان تشنجي للعضلة الجفنية الدويرية وللجفن.
- **writer's (= writer's cramp)** تَشْنُجٌ الكُتَّاب. معص الكُتَّاب.
- spasmodic** تَشْنُجِي. يتصف بالتشنج أو ذو خاصية تشنجية.
- spasmogen** مُشْنُج. مادة تولد التشنج.
- spasmolygmus (= hiccup)** قُوق. مُزِيلُ التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج.
- spasmolysant** مُزِيلُ التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج. مادة تحل أو تفرج عن التشنج.
- spasmolysis** إِزَالَةُ التَشْنُج؛ حَلُّ التَشْنُج. التفريج عن التشنج.
- spasmolytic (= antispasmodic)** مُزِيلُ التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج. مضاد التشنج.
- spasmophilia** شَنْج؛ أَهْبَةٌ تَشْنُجِيَّة؛ سُرْعَةُ التَشْنُج. حالة تظهر فيها الأعصاب الحركية

حساسية مفرطة شاذة للمنبهات الآلية أو الكهربائية ويظهر المريض استعداداً للتكرز والاختلاج والتشنج.

spasmophilic شَنْجِي؛ سَرِيعُ التَشْنُج. ما يظهر أهبة تشنجية.

spasmus (= spasm) تَشْنُج.

- **s. nutans (= nodding spasm)** تَشْنُجٌ إِيْمَانِي.

spastic تَشْنُجِي؛ شَنْجِي. 1. يتصف بالتشنج 2. مفرط التوتر ولذلك تكون العضلة متيبسة وحركاتها غير منتظمة 3. شخص مصاب بالشَّنْج كما يحصل في الشلل التشنجي أو الشلل الدماغي.

spasticity شَنْج. حالة فرط التوترية التشنجية أو زيادة التوتر في العضلة أعلى من الحد السوي مع زيادة منعكساتها الوترية.

- **clasp-knife s.** شَنْجٌ مُنْفَلَت؛ شَنْجُ المِوس الكَبَّاس. الظاهرة التي تحدث عندما تمدد عضلة مفرطة التوتر بطريقة متفعلة إذ يحدث ارتخاء مفاجئ بعد مقاومة شديدة في الابتداء.

spatium subdurale الْحَيَرُ تَحْتَ الْجَافِيَّة. حيز ضيق تحت الجافية يحوي السائل النخاعي الشوكي وأحياناً مجرد حيز كامن بين الجافية والعنكبوتية.

speech كَلَام. تكوين أصوات تتقل بعض الأفكار.

- **alaryngeal s. (= esophageal s.)** كَلَامٌ لَا حَنْجَرِي.

- **clipped s.** كَلَامٌ مُتَدَاخِل. كلام تتداخل فيه الكلمات وتكون ناقصة ويحدث ذلك أحياناً كأحد أعراض الخرف الشللي.

- **echo s. (= echolalia)** كَلَامٌ صُدُوي؛ لَفْظٌ صُدُوي.

- **esophageal s.** كَلَامٌ مَرِئِي. طريقة كلامية تشاهد بعد استئصال الحنجرة مع توليد الكلام باهتزاز عمود الصوت الموجود في الحنجرة قابل المصرة الحلقي البلعومية.

- **explosive s.** كَلَامٌ انفجاري. نطق عال فجائي يولده المريض في بعض أمراض الدماغ.

- **incoherent s.** كَلَامٌ لَا مُتَرَابِط. كلام لا يوجد ترابط بين الأفكار التي يعبر عنها بسبب اضطراب سلسلة أفكار المريض.

- jumbled s. (= anarthria) كَلَامٌ مَشْوُوشٌ: عَقْلَةٌ.
- mirror s. كَلَامٌ مِرْآئِيٌّ. اضطرابٌ كلامي يعكس فيها ترتيب مقاطع الكلمات في الجملة الكلامية.
- plateau s. كَلَامٌ مُضَبِّي. كلام يتصف بالمحافظة على وتيرة واحدة من دون أي تغيير في نغمة الصوت فيه.
- pressured s. كَلَامٌ مُضْطَغَطٌ. كلام سريع أو متسارع شديد الهياج بحيث يصعب على العضلات الصوتية ربط كلماته فلا يصبح مفهوماً للسامع.
- scamping s. (= clipped s.) كَلَامٌ مُتَدَاخِلٌ.
- scanning s. كَلَامٌ تَقْرَئِيٌّ. كلام تكون فيه المقاطع مفصولة بفواصل.
- slurred s. (= clipped s.) كَلَامٌ مُتَدَاخِلٌ.
- staccato s. نَطْقٌ مُفَكَّكٌ. كلام ينطق فيه كل مقطع بصورة منفصلة ويشاهد ذلك في التصلب المتعدد.
- sphenocephalus مُسَقَّنُ الرَّأْسِ. جنين ذو رأس إسفيني الشكل.
- sphenocephaly تَسَقُّنُ الرَّأْسِ. شذوذ تنموي يتصف برأس ذي مظهر إسفيني الشكل.
- sphincter مَصْرَعة. (ج: مَصْرَعات). شريط عضلي حلقي الشكل يضيق أحد الممرات أو يغلق إحدى الفتحات.

sphingomyelin سَفِنْغُومِيلِين. مجموعة من الشحومات الفسفورية التي تولد عند تحليلها حمض الفسفوريك والكولين والسفنجوزين وأحد الحموض الدهنية وتوجد عادة في الأنسجة العصبية وعادة في أغشيتها.

spina شَوْكَةٌ؛ سِنْسِنَةٌ. نتوء أو بارزة شوكية الشكل.

- s. bifida السِنْسِنَةُ المَشْقُوقَةُ. عيب تنموي يتصف بانفلاق معيب للمحفظة العظمية للنخاع الشوكي تبرز من خلاله السحايا والنخاع وقد لا تبرز منه.

- s. bifida anterior السِنْسِنَةُ المَشْقُوقَةُ الأَمَامِيَّةُ. عيب في انفلاق السطح الأمامي للقناة الشوكية العظمية وعادة ما يترافق مع تنامٍ معيب في الأحشاء الصدرية والبطنية.

- s. bifida aperta (= s. bifida cystica) السِنْسِنَةُ المَشْقُوقَةُ الكَيْسِيَّةُ.

- s. bifida cystica السِنْسِنَةُ المَشْقُوقَةُ الكَيْسِيَّةُ. سنسنة مشقوقة يبرز من خلالها ورم كيسوي يحوي السحايا (قيلة سحائية) أو النخاع الشوكي (قيلة نخاعية) أو كليهما (قيلة سحائية نخاعية).



spina bifida

السِنْسِنَةُ المَشْقُوقَةُ مع ظهور لمة من الشعر في نهاية العمود الفقري.

- s. bifida manifesta (= s. b. cystica)
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الظَّاهِرَةُ.

- s. bifida occulta
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْخَفِيَّةُ.
سِنْسِنَةٌ مَشْقُوقَةٌ فِيهَا عَيْبٌ فِي الْقَنَاةِ الشُّوكِيَّةِ مِنْ دُونِ بَرُوزِ النِّخَاعِ أَوْ السَّحَابِ.

- s. bifida posterior
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْخَلْفِيَّةُ. سِنْسِنَةٌ مَشْقُوقَةٌ بِسَبَبِ عَيْبٍ فِي انْفِلَاقِ سَطْحِهَا الْخَلْفِيِّ.

spinalgia
أَلَمُ السِّنْسِنَاءِ. أَلَمٌ فِي مَنطَقَةِ السِّنْسِنَاءِ.

spindle
مِفْزَلٌ. 1. مِفْزَلُ نَوَاةِ الْخَلِيَّةِ عِنْدَ انْقِسَامِهَا. 2. مِفْزَلُ مَوَاجِتِ الْمَخْطَطِ الْكَهْرِبَايِّ لِلدَّمَاعِ. 3. مِفْزَلُ الْعِضْلَةِ.

- muscle s.
مِفْزَلُ الْعِضْلَةِ. مُسْتَقْبَلَةُ آيَةِ انْتِهَائِيَّةٍ تَوْجِدُ بَيْنَ أَلْيَافِ الْعِضْلَاتِ الْهَيْكَلِيَّةِ وَمُرْتَبَةٌ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِيَةٍ مَعَهَا وَتُسْتَجِيبُ لِلتَّمْدِيدِ الْإِلْفَاعِلِ لِلْعِضْلَةِ وَلَكِنِهَا تَتَوَقَّفُ عَنِ الْاسْتِجَابَةِ عِنْدَ تَقْلُصِ الْعِضْلَةِ الْمَتَسَاوِيِ الشَّدِّ وَبِهَذَا فَهِيَ تُؤَشِّرُ طَوْلَ الْعِضْلَةِ وَلِذَا فَهِيَ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِلتَّمْدِيدِ الْعِضْلِيِّ أَوْ لِمُنْعَكْسِ تَمْدِيدِ الْعِضْلِ.

- neuromuscular s. (= muscle s.)
الْمِفْزَلُ الْعَصْبِي الْعِضْلِي.

- tendon s. (= Golgi tendon organ)
مِفْزَلُ الْوَتَرِ.

- tigroid s's. (= Nissl bodies)
أَجْسَامُ نَيْسِلٍ. مَغَازِلُ غَرِيبَةِ الشَّكْلِ.

spine
1. شَوْكَةٌ. 2. السِّنْسِنَاءُ؛ الصُّلْبُ؛ الْعَمُودُ الْفَقْرِي. 1. نَتَوءٌ أَوْ بَارِزَةٌ شَوْكِيَّةٌ الشَّكْلِ. 2. الْعَمُودُ الْفَقَارِيُّ.

- cleft s. (= spinal bifida)
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ.

spinibulbar
نُخَاعِيٌّ بَصَلِيٌّ. مُتَعَلِّقٌ بِالنِّخَاعِ الشُّوكِيِّ وَالْبَصَلَةِ (النِّخَاعِ الْمُسْتَطِيلِ).

spinocerebellar
نُخَاعِيٌّ مَخِيخِيٌّ. مُتَعَلِّقٌ بِالنِّخَاعِ الشُّوكِيِّ وَالْمَخِيخِ.

spinocerebellum (= paleocerebellum)
الْمَخِيخُ الْقَدِيمُ.

spinocollicular (= spinotectal)
نُخَاعِيٌّ أَكِيمِيٌّ.

spinocortical (= corticospinal)
قَشْرِيٌّ نُخَاعِيٌّ. نُخَاعِيٌّ قَشْرِيٌّ.

spinotectal (= tectospinal)
سَقْفِيٌّ نُخَاعِيٌّ. نُخَاعِيٌّ سَقْفِيٌّ.

spiral, tendon
حَلَزُونَةُ الْوَتَرِ؛ لَوْلَبِيَّةُ الْوَتَرِ. مُسْتَقْبَلَةٌ حَلَزُونِيَّةٌ لَوْلَبِيَّةٌ فِي وَتَرِ الْعِضْلَاتِ الْهَيْكَلِيَّةِ.

splanchnesthesia (= visceral sense)
الْحِسُّ الْحَشَوِيِّ.

splanchnicectomy (= splanchnic neurectomy)
قَطْعُ الْعَصَبِ الْحَشَوِيِّ.

splanchnicotomy
بَضْعُ الْعَصَبِ الْحَشَوِيِّ. قَطْعُ أَحَدِ الْأَعْصَابِ الْحَشَوِيَّةِ.

splenalgia
أَلَمُ الطَّحَالِ. أَلَمٌ عَصَبِيٌّ فِي الطَّحَالِ.

splenium of corpus callosum
ضِمَادَةُ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ؛ شَرِيطُ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ. النِّهَايَةُ الْخَلْفِيَّةُ الْمَدَوْرَةُ لِلْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

splenodynia
وَجَعُ الطَّحَالِ. وَجَعٌ فِي الطَّحَالِ.

spodiomyelitis (= acute anterior poliomyelitis)
إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدَّمَاعِ الْأَمَامِيَّةُ الْحَادَّةُ.

spondylalgia
أَلَمُ الْفَقْرَةِ. أَلَمٌ فِي إِحْدَى الْفَقَرَاتِ.


spondylexarthrosis (= dislocation of a vertebra)
خَلْعُ الْفَقْرَةِ.

spondylitis
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ.

- ankylosing s. (= rheumatoid s.)
النَّهَابُ الْفَقَارِ الْجَاسِيءُ؛ إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الرُّوماتُويْدِيِّ.

- muscular s.
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الْعِضْلِيِّ. حَالَةٌ مَرَضِيَّةٌ لِلْفَقَارِ تَنْتُجُ عَنْ ضَعْفِ الْعِضْلَاتِ وَلَيْسَ عَنِ النَّهَابِ حَقِيقِيٍّ فِيهَا.

- rheumatoid s.
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الرُّوماتُويْدِيِّ. نَوْعٌ مِنَ النَّهَابِ الْمَفَاصِلِ الرُّوماتُويْدِيِّ الَّذِي يَصِيبُ الْفَقَارَ وَخَاصَّةً الذِّكُورَ الْإِحْدَاثَ وَيُؤْدِي إِلَى الْأَلَمِ وَالتَّيْسِ نَتِيجَةً لِلنَّهَابِ الْمَفَاصِلِ الْعِزْجِيَّةِ الْوَرَكِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَقَارِيَّةِ وَالضِّلْعِيَّةِ الْفَقَارِيَّةِ مَعَ تَكَلسُّهَا وَقَسْطِهَا وَالتَّصَاقِهَا فَيُؤْدِي إِلَى الصَّمَلِ الْكَامِلِ لِلْعَمُودِ الْفَقَارِيِّ وَالصَّدْرِ.



spindle, muscle

الارتباط العصبي العضلي: (1) المنطقة الاستوائية (2) مفزل عضلي (3) ليف عضلي (4) مفصل (5) ليف عصبي حركي (6) جذع العصب الحركي (7) حزمة عصبية للمفزل العضلي (8) عصب حسي من العضو الحسي للوتر (10) نهاية حركية (11) ليف عضلي داخل المفزل (12) نهاية أولية (13) محفظة (14) ليف حسي من المفزل العضلي (15) ليف عصبي حركي إلى العضلة داخل المفزل.

- spondylodynia** وَجَعُ الْفَقَارِ. وجع في الفقرّة.
- spondylolisthesis** انْزِلَاقُ الْفَقَارِ. انزلاق إحدى الفقرات للأمام فوق الفقرّة الأخرى وعادة ما تكون القطنية الخامسة فوق جسم العجز أو القطنية الرابعة فوق جسم القطنية الخامسة وعادة ما يكون بسبب عيب تنموي في القسم بين المفاصل الفقارية.
- spondylolysis** انْحِلَالُ الْفَقْرَةِ. انحلال أو تخرب الفقرّة بسبب عدم تنسج القوس الفقاري وانفصال الجسم بين المفاصل.
- spondylomalacia** تَلَيُّنُ الْفَقَارِ.
- spondyloptosis (= spondylo-listhesis)** تَدَلِّيُ الْفَقَارِ.
- spondylopyosis** تَفْقِيعُ الْفَقَارِ.
- spondyloschisis** انْشِقَاقُ الْفَقَارِ. انشقاق خلقي للقوس الفقاري.
- spondylosis** 1. قَسَطُ فَقَارِي 2. فَقَارٌ. 1. قسط المَفَصَلُ الفقاري 2. اصطلاح عام للتغيرات التنكسية المولدة عن الفصال العظمي.
- cervical s.** فَقَارٌ رَقَبِيّ. مرض مفصلي تنكسي يصيب الفقرات العنقية والألواح بين الفقرات والاربطة والأنسجة الضامة المحيطة بها وأحياناً مع الألم والمذل المنتشر للأسفل حتى الساعد بسبب الضغط على الجذور العصبية.
- s. chronica ankylopoietica (= ankylosing spondylitis)** داء الفقار الجاسيء المزمّن؛ الْتِهَابُ الْفَقَارِ الرّوماتويدي.
- lumbar s.** فَقَارٌ قَطْنِيّ. مرض مفصلي تنكسي يصيب الفقرات القطنية والألواح بين الفقرات ويسبب الألم والتيبس وأحياناً مع الانتشار الوركي بسبب الضغط على الجذور الذي تولده الألواح المنزقة أو النابتات العظمية.
- s. uncovertebralis** فَقَارٌ شِصِّي فَقَارِيّ. فقرار رقبى يصيب الناتئ الشِصِّي لإحدى الفقرات.
- spondylosyndesis** الْتِحَامُ الْفَقَارِ.
- spondylotomy (= rachitomy)** بَضْعُ السَّيْسَاءِ.
- spondylous (= vertebral)** فَقَارِيّ.
- spongioblast** 1. إِحْدَى أَرْوَمَةُ الْإِسْفَنْجِيَّةِ. الخلايا الظهارية التي تتطور حول الأنبوب العصبي والتي يتحول بعضها بعد ذلك إلى خلايا دبقية عصبية وبعضها الآخر إلى خلايا البطانة العصبية 2. خلايا لا محوارية.
- spongioblastoma (= gliosarcoma, glioblastoma)** وَرَمٌ أَرْوَمِي إسْفَنْجِيّ؛ سَارْكُومَةُ دِبْقِيَّةٍ. ورم يحوي أرومات الاسفنجية.
- s. multiforme** ورم أرومي إسفنجي عديد الأشكال؛ سَارْكُومَةُ دِبْقِيَّةٍ عَدِيدَةِ الْأَشْكَالِ. سَارْكُومَةُ دبقية تكون خلاياها متعددة الأشكال في ترتيبها.
- s. unipolar** ورم أرومي إسفنجي أحادي القطب؛ سَارْكُومَةُ دِبْقِيَّةٍ أَحَادِيَّةِ الْقُطْبِ. سَارْكُومَةُ دبقية تكون خلاياها الأرومات الإسفنجية أحادية الاقطاب غالباً.
- spongiocyte** خَلِيَّةٌ دِبْقِيَّةٌ؛ خَلِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّةٌ 1. خلية دبقية عصبية 2. إحدى خلايا قشرة الغدة الكظرية ذات الجبلّة الإسفنجية المفجأة.
- spongiocytoma (= spongioblastoma)** ورم أرومي إسفنجي؛ سَارْكُومَةُ دِبْقِيَّةٍ جَبَلَّةٍ إِسْفَنْجِيَّةٍ.
- spongioplasm** 1. المادّة الحبيبية للمحوار 2. الخيوط الموجودة في المادّة الخلوية والمكوّنة لشبكته.
- spontaneous** عَفْوَيّ؛ تَلَقَّائِيّ. 1. إرادي، غريزي 2. يحدث من دون تأثير خارجي.
- spot** بُقْعَةٌ. مساحة محدّدة وصغيرة ومميّزة بلونها أو بموضعها.
- acoustic s's.** الْبَقْعُ الصَّوْتِيَّةُ. البقع الكيسية والقريبة.
- blind s. (= discus nervi optici)** الْبُقْعَةُ الْعَمِيَاءُ؛ قَرَصُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ.
- cribriform s's. (= maculae cribrosae)** الْبَقْعُ الْمِصْفُوتِيَّةُ.
- pain s's.** بُقْعُ الْأَلَمِ. نقاط على الجلد من الممكن عندها فقط تنبيه حس الألم.
- temperature s's.** بُقْعُ الْحَرَارَةِ. بقع البرودة أو الحرارة عادة ما تكون غير حساسة للألم والضغط وحساسة للبرودة والحرارة على التوالي وهي مرتبة بخطوط عادة ما تكون مقوسة.
- vital s.** بُقْعَةُ حَيَوِيَّةٍ. اسم يطلق أحياناً على

- أحد المراكز المستقلة الرئيسية في البصلة (النخاع المستطيل) والضرورية للحياة.
- staccato (= staccato speech)** نَطَقٌ مُفَكَّكٌ.
- staggers** تَرَنُّجٌ. 1. دُوار، سدر 2. نوع من الدوار يحدث في داء الفواص.
- blind s.** تَرَنُّجٌ أَعْمَى. 1. دوار 2. التسمم الحاد بالسلينيوم في الحيوانات.
1. مُلَوَّن 2. تَلَوَّن؛ لَوَّن. 1. مادة أو صبغة تستعمل لتلوين مقاطع الأنسجة وتهيئتها للفحص المجهرى. 2. عملية تلوّن الأنسجة.
- staining** تَلَوِّين. عملية تلوين الأنسجة.
- Golgi mixed method s.** طَرِيقَةُ تَلَوِّينِ غُولْجِي الْمُخْتَلِطَةِ. طريقة لتلوين الخلايا العصبية وفروعها.
- Nissl s.** تَلَوِّينٌ نَيْسِل. عملية تلوين خاصة لدراسة أجسام الخلايا العصبية.
- Weigert's myelin sheath s.** طَرِيقَةُ تَلَوِّينِ وَيغَرْت لِغِشَاءِ المِيعَالِينِي. طريقة لتلوين الغمد المِيعَالِينِي لفروع الخلايا العصبية.
- Weigert's neuroglia fiber's.** طَرِيقَةُ تَلَوِّينِ وَيغَرْت لِأَلْيَافِ الدِّيقِيَّةِ. طريقة معقدة لإظهار الألياف الدبقية وتعمل بصورة جيدة في أنسجة الإنسان.
- stalk** سَوَيْقَةٌ. بنية رفيعة وطويلة تشبه سويق الشجرة.
- cerebellar s.** سَوَيْقَةُ المَخِيخ. أي من سويقات المخيخ الثلاث على كل من جهتيه.
- hypophesial s.** سَوَيْقَةُ النُخَامِي. 1. قمع الوطاء 2. جزء النخامية الحديبي.
- Infundibular s.** قِمْعُ الوِطَاء.
- neural s. (= infundibulum hypothalami)** قِمْعُ الوِطَاء.
- optic s.** السَوَيْقَةُ البَصَرِيَّة. بنية رفيعة تربط الحويصلة البصرية بجدار الدماغ في الجنين.
- pituitary s.** السَوَيْقَةُ النُخَامِيَّة. 1. قمع الوطاء 2. جزء النخامية الحديبي.
- s's. of thalamus (= thalamic peduncles)** سَوَيْقَاتُ المِهَاد.

- state** حَالَةٌ. (ج: حَالَات). 1. حالة أو مقام 2. نقطة تحول أو تبدل نوبة أحد الأمراض.
- acute confusional s. (= delirium)** حَالَةٌ تَخْلِيطِيَّةٌ حَادَّةٌ؛ هَذِيَان.
- alpha s.** حَالَةٌ أَلْفَا. حالة الارتخاء واليقظة الهادئة المترافقة مع موجات ألفا الدماغية السائدة في الفعالية الكهربائية للدماغ.
- anelectrotonic s.** حَالَةُ التَوَثُّرِ الكَهْرَبَائِيّ المَصْغَعِيّ. الحالة التي تحدث في العصب بالقرب من المصدر خلال مرور تيار مستمر فيه.
- anxiety s. (= anxiety neurosis)** حَالَةُ قَلَقٍ. عصاب قلقي.
- anxiety tension s. (= neuromuscular hypertension)** حالة التوتر القلبي؛ قَرْطُ الضَّغْطِ العَصَبِيِّ العَضَلِيِّ. حالة زيادة الاستثارية والهيجونية للاستجابة الانعكاسية.
- borderline s.** حَالَةٌ حَدِّيَّة. مصطلح تشخيصي يستعمل عند وجود صعوبة لمعرفة الأعراض فيما إذا كانت عصابية أو نفسية.
- catelectrotonic s.** حَالَةُ التَوَثُّرِ الكَهْرَبَائِيّ المَهْبُطِيّ. حالة العصب بالقرب من المهبط عند مرور تيار مستمر فيه.
- central excitatory s.** حَالَةُ الإِسْتِثَارَةِ المَرْكَزِيَّة. حالة يختزن فيها في مركز انعكاسي في النخاع الشوكي عدد من المنبهات التي لا تعبر عن نفسها في الاستجابة الانعكاسية.
- dreamy s.** حَالَةٌ أَحْلَامِيَّة. حالة تغيير في الوعي تدوم لبضعة دقائق وتترافق مع الأهلاس وتشاهد في أفات الفص الصدغي.
- epileptic s. (= status epilepticus)** حالة صرعية؛ حَالَةٌ صَرْعٌ مُسْتَمِرٌّ.
- hypnagogic s.** حَالَةٌ مُنَوِّمة. حالة نصف الوعي التي تسبق النوم مباشرة.
- hypnoid s.** حَالَةٌ نَعَاسِيَّة. في نظرية فرويد هي التغيير في حالة الوعي والتي تتصف بارتفاع حالة الإحياء التي تحصل في الهستيريا أثناء الكرب العاطفي والتي تكون الأساس لتكوين الأعراض الهستيرية الجسدية.
- hypnopompic s.** حالة غيبوبة سطحية تالية

- النوم؛ **حَالَة** بعد النَّوْم. حالة نصف الوعي التي تسبق مباشرة الاستيقاظ الكامل من النوم وتستمر لفترة قصيرة بعد ذلك.
- **local excitatory s.** **حَالَة** الإِسْتِثَارَة المَوْضِعِيَّة. حالة العصب التي يولدها منبه غير كاف.
- **persistent vegetative s.** **الحَالَة** الإِنْبَاتِيَّة المُسْتَدِيمة. حالة عدم الاستجابة الكاملة أثناء حالة اليقظة الناتجة عن إصابة الدماغ بأي مستوى كان ويتصف بقشرة دماغية غير عاملة وغياب الاستجابة التمييزية الموانعة للمنبهات الخارجية وللمحيط وعدم الحركة والصمات ويكون المخطط الكهربائي للدماغ متساوي التكهرب أو يظهر فعالية شاذة.
- **twilight s.** **حَالَة** الغُلَس. حالة وقتية من فقدان الوعي يمكن أن يقوم المرء خلالها ببعض الفعاليات بصورة لا إرادية ومن دون أن يتذكرها بعد ذلك.
- status (= state)** **حَالَة**. (ج: خَالَات).
- **absence s.** **حَالَة** غِيَاب. تغييم الوعي المستمر لعدة ساعات من دون فترات فعاليات دماغية طبيعية والقليل من الحركات النمطية ولكن من دون فعالية حركية شاذة.
- **s. choreicus** **حَالَة** رَقْصِيَّة. نوع شديد ومستمر من الرَقْص.
- **s. convulsivus (= s. epilepticus)** **حَالَة** اِخْتِلَاجِيَّة. حالة صرعية مستمرة.
- **s. cribalis (= s. cribrosus)** **حَالَة** مِصْفَوِيَّة. حالة الدماغ الشبيهة بالغربال بسبب توسع الأحياز المليفة حول الأوعية.
- **s. criticus** **حَالَة** حَرْجَة. حالة من النوبات التابسية الشديدة والمستمرة.
- **s. dysraphicus** **حَالَة** سَوْء الرِّفْو. الانفلاق المغلوط للأنبوب العصبي الجنيني الذي يولد تكويناً مغلوط لبنات الخط الوسطي عند البالغين كالذي يحدث في العماد الفقري وعظم القص والشديين والحنك.
- **s. epilepticus** **حَالَة** الصَّرَع المُسْتَعِر. سلسلة من الاختلاجات الصرعية المتلاحقة بسرعة من دون أية فترة وعي بين النوبة والآخرى.
- **s. hemicranicus (= migrainicus s.)** **حَالَة** شَقِيقِيَّة. حالة تتصف بنوبات معاودة ومستمرة لداء الشقيقة.
- **s. lacunaris (= s. lacunosus)** **حَالَة** جَوْبِيَّة. حالة دماغية تتصف بتكون عدد من الاحتشاءات أو من فقدان مادة الدماغ.
- **s. marmoratus** **حَالَة** رُخَامِيَّة. حالة تتصف بفرط تنخع الألياف العصبية للجسم المخطط كما يحصل في متلازمة فوغت.
- **petit mal s.** **حَالَة** الصَّرَع الصَّغِير. حالة تخليط فكري تدوم لعدة دقائق أو ساعات وتترافق بموجات دماغية مستمرة من نوع الموجة والسفافة تشاهد في التخطيط الكهربائي للدماغ بمعدل 3 دورات بالثانية.
- **s. raptus** **حَالَة** شَطْح. حالة ذمول.
- **s. spongiosus** **الحَالَة** الإسْفَنْجِيَّة. تنفج منتشر وغزير في قشرة الدماغ.
- **s. verrucosus** **حَالَة** بروقِيَّة. مظهر قشرة الدماغ الشبيهة بالتؤلولي يتكون من سوء ترتيب الأرومات العصبية مما يولد عدم انتظام شقوق القشرة واتلافها بصورة غير متوقعة.
- **s. vertiginosus** **حَالَة** دَوَارِيَّة. حالة دوار طويلة.
- staxis (= hemorrhage)** نَزْف.
- stellectomy** اِسْتِنْصَال العُقْدَة النَجْمِيَّة.
- استئصال العقدة النجمية للتفريغ عن الألم.
- stellreflex (= postural reflex)** مُنْعَكَس وَضْعِي.
- stenobregmatic** ضَيْقُ الهَامَة. ضيق القسم الأمامي العلوي من الرأس.
- stenocephalous** مُسْتَمُّ الرُّأْس. ضيق الرأس.
- stenocephaly** تَسْتَمُّ الرُّأْس. تضيق الرأس الشديد.
- stenocortaphia, stenocortaphy** تَضْيِيق الصُّدْغ. تضيق المنطقة الصدغية من الرأس.
- stereoanesthesia (= asteriognosis)** عَمَة التَّجَسُّيم. نقص القدرة على معرفة نوع الأجسام بتحسس حجمها ووزنها وبنياتها.
- stereoencephalotomy** بضع الدماغ المَجْسَم؛ بَضْعُ الرُّأْس المَجْسَم. الجراحة المجسمة للرأس.

stereognosis مَعْرِفَةُ التَّجْسِيمِ. 1. قابلية تحسس وإدراك شكل وطبيعة الأجسام والمواد عند لمسها. 2. إدراك الحواس لجسامة المواد.

stereotaxis (= thigmotaxis) التَّوَجُّه باللمس؛ انْجِدَابٌ لِمَسِّي. تَوَجُّه الكائن استجابةً لِمُنْبَهٍ لِمَسِّي.

stereotaxy (= stereotaxic surgery) جِرَاحَةٌ تَوْضِيعِيَّةٌ. الجراحة التي تستعمل جهازاً محدداً لثلاثة أبعاد ليعين موضع القسم الذي تجري الجراحة فيه.

stereotropism (= thigmotropism) تَوَجُّه باللمس؛ تَوَجُّهٌ لِمَسِّي.

stereotypy نَمَطِيَّةٌ. التكرار المستمر لأعمال أو كلمات تافهة لا معنى لها.

- s. of attitude نَمَطِيَّةٌ وَضْعِيَّةٌ. التكرار المستمر لوضعية معينة.

- s. of movement (= echopraxia) نَمَطِيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ. التكرار المستمر لحركة معينة.

- s. of speech (= echolalia, verbi-geration) نَمَطِيَّةٌ كَلَامِيَّةٌ. التكرار المستمر لبعض الكلمات أو المقاطع.

stethomyositis إِلْتِهَابُ عَضَلَاتِ الصَّدْرِ.

stethoparalysis شَلْلُ عَضَلَاتِ الصَّدْرِ.

sthenia نَشَاطٌ؛ بَاسٌ. حالة قوة ونشاط.

sthenometer مِقْيَاسُ النِّشَاطِ. آلة لقياس النشاط العضلي لأحد أقسام الجسم.

sthenometry قِيَاسُ النِّشَاطِ. قياس نشاط الجسم.

stigma سِمَةٌ. (ج: سِمَات). علامة عقلية أو جسدية أو خاصة تساعد على التعرف على إحدى الحالات أو تشخيصها.

stimulant مُنْبَهٍ. (ج: مُنْبَهَات). 1. ما يولد التنبيه خصوصاً تنبيه العضلات خلال عصبها الحركي وزيادة توترها. 2. عامل أو علاج يولد التنبيه.

- central s. مُنْبَهٌ مَرْكَزِيٌّ. منبه الجهاز العصبي المركزي.

- cerebral s. مُنْبَهٌ دِمَاعِيٌّ. منبه يُنَشِطُ كلُّ فعاليات الدماغ.

- diffusible s. مُنْبَهٌ غَاطِرٌ. منبه يعمل بصورة عاجلة وشديدة ولكن بصورة عابرة أو زائلة.

- general s. مُنْبَهٌ عَامٌ. منبه يعمل على كل أقسام الجسم.

- genital s. (= aphrodisiac) بَاهِي. منبه جنسي.

- local s. مُنْبَهٌ مَوْضِيعِيٌّ. منبه يؤثر بصورة رئيسية على القسم الموضوع عليه فقط.

- nervous s. مُنْبَهٌ عَصَبِيٌّ. منبه يؤثر بصورة رئيسية على المراكز العصبية مثل المنبهات الدماغية أو النخاعية.

- spinal s. مُنْبَهٌ نَخَاعِيٌّ. منبه يعمل على النخاع الشوكي أو من خلاله.

- topical s. (= local s.) مُنْبَهٌ مَوْضِيعِيٌّ.

stimulate يُنْبِئُهُ. يثير إحدى الفعاليات الوظيفية.

stimulation تَنْبِيهِ. عملية التنبيه أو حالة التنبيه.

- areal s. تَنْبِيَةٌ بَاحِيَّةٌ. تنبيه جزء واسع من أحد أعضاء الحس.

- audio-visual- tactile s. تَنْبِيَةٌ سَمْعِيَّةٌ - بَصَرِيَّةٌ - لَمْسِيَّةٌ. التنبيه النظامي المتزامن لمستقبلات السمع والبصر واللمس.

- nonspecific s. تَنْبِيَةٌ لَا نَوْعِيَّةٌ. تنبيه أحد أعضاء الحس بمنبه غير المنبه النوعي الخاص به.


- paradoxical s. تَنْبِيَةٌ تَنَاقُضِيَّةٌ. تنبيه نقطة حس برودة بمنبه ساخن فيولد حساً بالبرودة بدلاً من حس السخونة.

- paraspecific s. (= nonspecific s.) تَنْبِيَةٌ لَا نَوْعِيَّةٌ.

- punctual s. تَنْبِيَةٌ نُقْطِيَّةٌ. تنبيه أحد أعضاء الحس بتنبيه نقطة واحدة فيه فقط.

stimulator مُنْبِئُهُ. أي عامل أو آلة تنبه إحدى الفعاليات الوظيفية.

stimulus مُنْبَهٍ. (ج: مُنْبَهَات). أي عامل أو فعل أو تأثير يولد استجابة وظيفية أو نمائية من إحدى المستقبلات أو من نسيج هيج.



stimulatio

ديد للجلد يؤدي إلى انبعاث جسيم باسيني وتنبه حس اللمس. كما انه يؤدي إلى تخريب النهايات العصبية الحرة
الآلم.

- **adequate s.** مُنَبِّةٌ وَافٍ. منه ذو طاقة نوعية مناسبة للتأثير على المستقبل.
- **aversive s.** مُنَبِّةٌ مُنْبِطٌ. منه يؤدي عند وضعه بعد استجابة العضو لأحد المنبهات إلى تقليل شدة استجابات ذلك العضو للمنبهات التالية له.
- **chemical s.** مُنَبِّةٌ كِيمِيَاءِيَّةٌ. مادة كيميائية تتمكن من توليد استجابة في أحد الكائنات خلال تنبيه مستقبلاته الكيميائية.
- **conditioned s.** مُنَبِّةٌ شَرْطِيَّةٌ. منه يكتسب القدرة على توليد استجابة معينة إذا كرر بالاشتراك مع منه نوعي خاص يولد تلك الاستجابة طبيعياً.
- **discriminative s.** مُنَبِّةٌ تَمَيِّيزِيَّةٌ. منه يترافق مع آخر معزز له ويؤثر على نوع معين من السلوك ويمكن الشخص من التمييز بين مختلف المنبهات المشابهة له ولكنه لا يستجيب إيجابياً إلا عند وجود المنبه المعزز معه.
- **electric s.** مُنَبِّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ. منه تيار كهربائي غلفاني أو غيره يولد استجابة من نسيج حيوي.
- **eliciting s.** مُنَبِّةٌ مُثِيرٌ. منه شرطي أو غير شرطي يستثير استجابة من النسيج الهويج.
- **homologous s. (= adequate s.)** مُنَبِّةٌ وَافٍ. منه قريب من الحد العتبي.
- **liminal s.** مُنَبِّةٌ عَتَبِيَّةٌ. منه قريب من الحد العتبي.
- **reinforcing s.** مُنَبِّةٌ مُعَزِّزَةٌ. أي منه يتلو الاستجابة ويزيد من احتمال ظهورها.
- **subliminal s.** مُنَبِّةٌ تَحْتَ الْعَتَبِيَّةِ. منه تحت الحد العتبي.
- **supraliminal s.** مُنَبِّةٌ فَوْقَ الْعَتَبِيَّةِ. منه فوق الحد العتبي.
- **threshold s.** مَنَبَّةٌ عَتَبِيَّةٌ. منه له أقل درجة من الشدة الكافية لتوليد الاستجابة.
- **unconditioned s.** مُنَبِّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ. منه يولد استجابة لا شرطية.
- stomalgia (= stomatalgia)** ألم الفم. ألم في الفم.
- stomatodynia** ألم الفم. ألم في الفم أو التهاب الحلق.
- strain** إجهاد. فرط النشاط والتمارين الجسدية لحد مضر.
- stratum** طبقة. (ج: طبقات). كتلة من

- مادة صفيحية الشكل متساوية السمك تقريباً وقد تكون واحدة من عدة طبقات.
- **s. album profundum corporis quadri-gemini** الطبقة البيضاء العميقة للجسم الرباعي. طبقة من المادة البيضاء بين الجسم الرباعي والطبقة السنجابية المركزية لمسال الدماغ.
- **s. cerebrale retinae (= pars nervosa retinae)** الجزء العصبي للشبكية.
- **s. ganglionare nervi optici** الطبقة العقدية للعصب البصري.
- **s. gangliosum cerebelli** الطبقة العقدية للمخيخ. الطبقة السنجابية الرقيقة من قشرة المخيخ والمكونة من طبقة واحدة من خلايا بركنجي، وتسمى أيضاً حلقة بركنجي.
- **s. granulosum cerebelli** الطبقة الحبيبية للمخيخ. الطبقة العميقة من قشرة المخيخ وهي تحتوي على العديد من العصبونات الصغيرة (خلايا حبيبية) وتفصلها طبقة بركنجي عن الطبقة الجزيئية.
- **strata (grisea et alba) colliculi superioris** الطبقات (السنجابية والبيضاء) للسويق العلوي. الطبقات الأربع الأعمق للسويق وهي السنجابيتان والبيضاويتان وتتكون من خلايا عصبية مختلفة الأنواع. وتكون الطبقتان السنجابية والبيضاء المتوسطتان من الباحة الواردة الرئيسية للسويق وتكون الطبقتان السنجابية والبيضاء العميقتان الباحة الصادرة الرئيسية للسويق.
- **s. griseum centrale cerebri (= substantia grisea centralis cerebri)** المادة السنجابية المخية المركزية.
- **s. interolivare lemnisci** طبقة الفتيل بين الزيتونتين. الياف من النواتين الزيتونيتين والاسفينية التي تصعد بين النواتين لتكون الفتيل الإنسي.
- **s. lacunosum** الطبقة الجوفية. اللبغية التي تقع بين الطبقة الشعية والطبقة الجزيئية للوطاء وتتكون بصورة رئيسية من طبقة الياف كثيفة مترافقة مع الياف محاور شيفر الجانبية الصاعدة من الشكوة والمحاور والفروع الجانبية الصاعدة من الطبقة المرجحة.

- **s. lemnisci** (= **s. interolivare lemnisci**)
طبقة القَتِيل بَيْنَ الزَيْتُونَتَيْنِ.
- **s. lucidum hippocampi** الطبقة الصَّافِيَّةُ
للْحُصَيْنِ. الجزء الخلوي (غير الليفى) من طبقة
الخلايا الهرمية للحصين.
- **s. moleculare cerebelli** الطبقة الجَزِيئِيَّةُ
لِلْمُخِيخِ. الطبقة السطحية لقشرة المخيخ والتي
تحوي نسبياً عدداً قليلاً من العصبونات النجمية
ومفصلة عن الطبقة الحبيبية بطبقة بركنجي.
- **s. moleculare hippocampi** الطبقة
الجَزِيئِيَّةُ الحُصِينِيَّةُ. الطبقة السطحية للحصين حيث
تنتهي النهايات القمية لتغضنات الخلايا الهرمية.
- **s. neuronorum piriformium** طبقة
العَصْبُونَاتِ الكُفْثَرِيَّةِ الشَّكْلِ. طبقة عصبونات
بركنجي تقع بين الطبقة الجزيئية الظاهرة والطبقة
الحبيبية الباطنة لقشرة المخيخ ويعتبرها البعض
الطبقة العميقة للطبقة الجزيئية.
- **s. nucleare medullae oblongatae** الطبقة
النُّوَوِيَّةُ لِلْبَصْلَةِ. عمود المادة السنجابية الذي يوجد
في النخاع المستطيل (البصلة) والذي يحوي نوى
الأعصاب القحفية.
- **s. opticum** الطبقة البَصَرِيَّةُ. طبقة من الألياف
البيضاء في الأكمة العلوية تحت الطبقة السنجابية
مباشرة.
- **s. oriens** الطبقة المَتَجِّهَةُ. إحدى طبقات الحصين
التي تتكون من عصبونات ومحاور صاعدة (خلايا ذات
سلة) وتفرعات التغضنات القاعدية للخلايا الهرمية
والفروع الجانبية للمحاور والواقعة بين الشكوة
والطبقة الهرمية للوطاء.
- **s. plexiforme cerebelli** (= **s. moleculare cerebelli**)
الطبقة الضَفِيرِيَّةُ
لِلْمُخِيخِ؛ الطبقة الجزيئية للمخيخ.
- **s. pyramidale** الطبقة الهرميَّةُ. طبقة مزدوجة
واضحة الحدود من الخلايا الهرمية التي تمتد
تغضناتها من الطبقة الموجهة حتى الطبقة الجزيئية
للحصين.
- **s. radiatum** الطبقة الشُعْعيَّةُ. الجزء السطحي
من طبقة الخلايا الهرمية للحصين والتي يتكون

معظمها من التغضنات القمية مع المحاور وبعض
الخلايا الهرمية.

- **white s. of quadrigeminal body, deep**
(= **s. album profundum corporis quadrigemini**)
الطبقة البَيضاء العميقة
لِلجِسْمِ الرُّبَاعِيِّ.
- **s. zonale corporis quadrigemini** الطبقة
الْمُنْطَقِيَّةُ لِلجِسْمِ الرُّبَاعِيِّ. طبقة سطحية من الألياف
البيضاء للجسم الرباعي.
- **s. zonale thalami** الطبقة الْمُنْطَقِيَّةُ لِلْمَهادِ.
طبقة من الألياف نخاعية تغطي الناحية الظهرية من
ظهر المهاد.
- streak** تَلَمَّ. (ج: أَتْلَامٌ). خط أو سطر.
- **medullary s. (= neural groove)** الأخْدُوذُ
العَصْبِيّ.
- **meningeal s. (= tache cerebrale)** التَلَمَّ
السِّحَائِي؛ اللطخة الدماغية.

strephosymbolia إبصارٌ مقلوب. 1. خلل
إدراكي تتراءى فيه الأجسام للشخص بصورة
مقلوبة. 2. نوع من صعوبة القراءة لدى الأطفال
وخصوصاً للحروف المراتبة مثل الحروف (b-d)
و (p-q)، وقد يغلط في تلفظها أو كتابتها.

stress 1. إجهاد. 2. كَرْبٌ. (ج: كُرُوبٌ).
1. ضغط أو تأثير يفرض بالقوة. 2. مجموع
الاستجابات البيولوجية لأي منبه معاكس أو مؤز
سواء كان فيزيائياً أو كيميائياً أو فكرياً أو عاطفياً
داخلياً كان أو خارجياً والذي يمكن أن يؤدي إلى أي
اضطراب لاستتباب الكائن، وإذا لم تكن هذه
الاستجابات كافية لمعالجة هذه المنبهات فيؤدي
ذلك إلى الاضطراب والكرب.

stria سَطْرٌ. خط أو بنية ضيقة شريطية الشكل،
وهو اصطلاح يستعمل لمجموعة ضيقة طولانية من
الألياف العصبية في الدماغ.

- **acoustic striae (striae medullaris ventriculi quarti)** السُطُورُ السَّمْعِيَّةُ،
السُطُورُ النخاعية للبطين الرابع.
- **auditory striae (= striae medullaris ventriculi quarti)** السُطُورُ السَّمْعِيَّةُ؛
- **s. diagonalis (= diagonal band of Broca)** السطر المَائِلُ. شريط من الألياف

العصبية التي تطوق المنطقة الذنبية للمادة المثقبة الامامية حيث يلاصق السبيل البصري المتواصل على جهته الذنبية الوحشية مع الباحة حول اللوزية ويمر للجهة الراسية الانسية فوق التصالبة البصرية ليندمج مع التلفيف جنب الانتهازي.

- s. laminae granularis externa corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبَبِيَّةِ الظَّاهِرَةِ
لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المنحرفة الاتجاه في الطبقة الحبيبية الظاهرة لقشرة المخ.

- s. laminae granularis interna corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبَبِيَّةِ البَاطِنَةِ
لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية البيضاء المنحرفة الاتجاه في الطبقة الحبيبية الباطنة لقشرة المخ. ويكون هذا الخط سميكا في التلم المهادي ويشاهد بسهولة ويسمى خط غيناري.

- s. laminae molecularis corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبَبِيَّةِ لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المغمدة المنحرفة الاتجاه في الطبقة الجزئية لقشرة المخ.

- s. laminae plexiformis corticis cerebri

(= laminae molecularis corticis cerebri)
سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الصِّفْرِئَةِ لِقَشْرَةِ المَخ.

- s. laminae pyramidalis interna corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الهرَمِيَّةِ البَاطِنَةِ لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المنحرفة الاتجاه في الطبقة الهرمية الباطنة لقشرة المخ.

- s. lancisli (= s. of Lanci = s.

longitudinalis medialis corporis callosi)
سَطْر لانسي: السَطْرُ الطُولَانِي الإنْسِي للجِسْمِ الثَّقْنِي.

- s. longitudinalis lateralis corporis callosi

السَطْرُ الطُولَانِي الوَحْشِي للجِسْمِ الثَّقْنِي. أحد الشريطين الدقيقين من الالياف المغمدة التي تكون الحرف الطولاني للستر السنجابي على الناحية العلوية الانسية من كل من نصفي الجسم الثقني.

- s. longitudinalis medialis corporis callosi

السَطْرُ الطُولَانِي الإنْسِي للجِسْمِ الثَّقْنِي. أحد الشريطين الرقيقين من الالياف المغمدة التي تكون الحرف الطولاني للستر السنجابي على الناحية العلوية من كل من نصفي الجسم الثقني.

- s. medullaris thalami السَطْرُ الخُخَاعِي

للمهاد. حزمة ليفية تبدأ من التلفيف تحت الثقني وجنوب الانتهازي ومن الباحتين أمام البصرية واللوزية وتجري للخلف على طول اتصال السطحين الظهري والإنسي للمهاد لتصل نواة العنان.

- striae medullares ventriculi quarti

السُطُورُ الخُخَاعِيَّةُ لِلْبَطْنِ الرَّابِع. حزم الياف بيضاء تسير بصورة مستعرضة عبر قاع البطن الرابع وهي تبدأ من النوى المقوسة وتمر ظهرياً بالقرب من خط الوسط وبعد وصولها البطن الرابع تدخل أخيراً السويقة المخيخية السفلية.

- meningitic s. (= tache cerebrale) السطر

السحائي؛ لطفة المخ.

- striae olfactoriae medialis et lateralis

السُطُورُ الشَّمِّيَّةُ الإنْسِيَّةُ والوَحْشِيَّةُ. الياف السبيل الشمي المتشعبة التي تنفرج إلى الشريطين الإنسي والوحشي عند المثلث الشمي لتحد المادة المثقبة الامامية. ويغطي التلفيفان الشميان الوحشي والإنسي هذين الشريطين على التوالي.

- s. olfactory, intermediate السَطْرُ الشَّمِّي

المَنُوسَط. شريط صغير من الالياف يمر من مركز المثلث الشمي ليثقب المادة المثقبة الامامية وهو غير موجود دائماً.

- s. terminalis السَطْرُ الإنْتِهَازِي.

شريط من الالياف على طول الحافة الوحشية للسطح البطني للمهاد يغطي الوريد المهادي المخططى ويتبع خط الوريد مؤشراً خط انفصال المهاد عن النواة الذنبية وهو يمتد من منطقة الثقب بين البطينين إلى القرن الصدغي للبطين الجانبي حاملاً أليافاً من النواة اللوزية إلى الباحت الحاجزية والوطائية والمهادية.

- striae transversae corporis callosi

السُطُورُ المُسْتَعْرِضَةُ للجِسْمِ الثَّقْنِي. أشرطة مستعرضة من الياف عصبية على السطح العلوي للجسم الثقني.

مُخَطَّطِي striatonigral (= strionigral)

أسودِي. ساقط من الجسم المخطط إلى المادة السوداء.

striatum (= 1.striped 2.corpus

1. مُخَطَّط striatum 3.neostriatum)

2. الجِسْمُ المُخَطَّط 3. المُخَطَّطُ الجَدِيد.

stroke سَكَّة؛ ضَرْبَة. نوبة شديدة حادة ومباغثة. **stroke** سَكَّة. - apoplectic s. (= apoplexy)

- heat s. ضَرْبَة الحَرَارَة. حالة تتولد عن التعرض الطويل للحرارة المفرطة وتتصف بتبيس الجلد والدوار والصداع والعطش والغثيان والمغص العضلي وقد ترتفع درجة الحرارة لدرجة خطرة بعكس الإنهاك الحاراري حيث يمكن أن تكون درجة الحرارة دون الحد السوي.

- paralytic s. سَكَّة شَلَلِيَّة. نوبة شلل فجائية تنتج عن إصابة دماغية أو نخاعية.

stroma سَدَى. النسيج السائد أو مطرس العضو بالمقارنة مع نسيجه الوظيفي أو المتن.

strychnine سترِكْنِين. قلواني سام جداً يولد استئارة كل أقسام الجهاز العصبي المركزي يقوم بذلك بحصر كل النبضات المثبطة بعد التشابكية. وكان يستعمل كمنبه مركزي مع الادوية الهرورة.

stun إَغْمَاء. إصابة الشخص بفقدان الوعي نتيجة صدمة أو ضربة شديدة.

stupefacient مخدِّر؛ مُذهِّل. ما يولد الذهول أو عامل يولد الذهول.

stupefactive مُخدِّر؛ مُذهِّل. ما يولد الخدر أو الذهول.

stupor ذُهول. فقدان الوعي الجزئي أو الكامل تقريباً يظهر في الأشخاص الذين يستجيبون فقط للمنبهات الشديدة. وفي الأمراض النفسية هو ضعف قابلية الاستجابة للمنبهات.

- anergic s. ذُهولٌ وَهْنِي. ذهول مع ضعف الحركة.

- benign s. ذُهولٌ خَمِيد. حالة ذهول تشاهد أحياناً في الطور الاكتئابي للذهان الهوسي الاكتئابي.

- epileptic s. ذُهولٌ صَرْعِي. ذهول يتلو نوبة اختلاج الصرع.

- postconvulsive s. (= epileptic s.) ذُهولٌ تَالٍ لِلإخْتِلَاج. ذهول يتلو النوبة الصرعية.

stuttering تَأَنُّة. مشكلة كلامية تشمل ثلاثة عوامل (أ) عدم انسيابية الكلام وخصوصاً إعادة بعض أقسام الكلمات أو كل الكلمات وإطالة بعض الأصوات بين الكلمات أو تضمين بعض الكلمات أو الأصوات مع فترات طويلة، (ب) رد فعل السامعين لعدم انسيابية نطق المتكلم وحكمهم عليه بأنه غير

مقبول وشاذ، (ج) رد فعل المتكلم لردود فعل المستمعين له ورفضهم كلامه ورد فعله هو لنفسه واعترافه بأنه متأثر.

- labiochoreic s. (= labiochorea) تاتاة الرقص الشفوي؛ الرقص الشفوي.

1. غير مُكتمل الوعي 2. دُونُ subconscious الشُعُور. حالة كون الشخص واعٍ جزئياً.

subconsciousness عَدَمُ اكتمالِ الوَعْي. حالة وعي جزئي.

subdelirium هَذْيَانٌ بَسِيط. هذيان جزئي.

subdural تَحْتَ الجَافِيَّة. ما يقع بين الجافية والعنكبوتية.

subjective شَخْصَانِي. متعلق بالشخص أو يدركه الشخص المصاب نفسه ولا تدركه حواس الأشخاص الآخرين.

subparalytic مَشْلُولٌ جُزْئِيًّا. مُصابٌ بشكل غير كامل.

subpial تَحْتَ الحَنُون. ما يقع تحت الأم الحنون.

substance مَادَّة. (ج: مَوَاد). المادة التي يتكون منها الجسم أو العضو.

- neurosecretory s. مَادَّةُ الإفْرَازِ العَصَبِي.

- s. of nissl (= Nissl's bodies) أَجْسَام نِيسْل.

- receptive s. مَادَّةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ. مادة فرضية من المفروض أنها موجودة في النسيج العضلي بالقرب من الصفيحة الانتهازية الحركية للأعصاب وتقوم بوظيفة نقل الدفعات العصبية.

- reticular s. of medulla oblongata (= reticular formation of medulla oblongata) المَادَّةُ الشَبَكِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ.

- Rolando's gelatinous s. (= substantia gelatinosa) مَادَّة رولاند الهلامية؛ المَادَّةُ الهَلَامِيَّة.

- tigroid s. (= Nissl's bodies) مَادَّة نَمْرَاء؛ أَجْسَام نِيسْل.

- transmitter s. (= neurotransmitter) مَادَّة نَاقِلَةٌ؛ النَاقِلَةُ العَصَبِيَّة.

- white s. (= substantia alba) المَادَّةُ البَيَضَاءُ.

- white s. of Schwann (= myelin) مادة شوان (مَيَالِين) البيضاء: مَيَالِين.

- white s. of spinal cord المَادَّةُ البَيَضَاءُ لِلنَّخَاعِ.

substantia (= substance) مَادَّةٌ.

- s. alba المَادَّةُ البَيَضَاءُ. النسيج العصبي الأبيض الذي يكون الجزء الناقل للدماغ والنخاع ويتكون بصورة رئيسية من الألياف العصبية النخاعية والمرتبطة في ثلاثة حبال الظهرية والبطنية والجانبية.

- s. alba medullae spinalis المَادَّةُ البَيَضَاءُ لِلنَّخَاعِ. وتتكون من الألياف عصبية ميالينية مرتبة بحزم طولانية متوازية.

- s. cinerea (= s. grisea) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ.

- s. corticollis cerebelli (= cortex cerebelli) مَادَّةُ القَشْرَةِ المخيخية.

- s. ferruginea (= locus ceruleus) المَادَّةُ الحَدِيدِيَّةُ: المَوْضِعُ الأزرق.

- s. gelatinosa centralis المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ. منطقة المادة الهلامية الشكل المكونة أساساً من الدبق العصبي ولكنها تحتوي أيضاً بعض الألياف والخلايا العصبية والتي تحيط بالقناة المركزية للنخاع الشوكي والتي تحيط بها المادة السنجابية المركزية المتوسطة.

- s. gelatinosa collimnae posterioris (= Rolando's gelatinous substance) المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ لِلنَّخَاعِ: المادة الهلامية لرولاندا.

الغطاء الهلامي الشكل الذي يكون القسم الظهري من العمود الظهري للنخاع والذي يتكون من عصبونات من نوع غولجي نمط 2 وطبقة من الخلايا العصبية.

- s. grisea المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ. نسيج المادة السنجابية المكون من أجسام الخلايا العصبية والألياف عصبية غير نخاعية ونسيج ضام.

- s. grisea centralis cerebri المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلدِّمَاغِ. المادة السنجابية التي تحيط بمسال الدماغ.

- s. grisea intermedia centralis medullae spinalis (= s. intermedia

centralis medullae spinalis) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَتَوَسِّطَةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.

- s. grisea intermedia lateralis medullae spinalis (= s. intermedia lateralis medullae spinalis) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَتَوَسِّطَةُ الوَحْشِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.

- s. grisea medullae spinalis المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ لِلنَّخَاعِ. مادة تحتوي القليل من الألياف النخاعية ولكنها تحوي الكثير من أجسام الخلايا العصبية والألياف عصبية عديمة الميالين وأوعية دموية أكثر مما توجد في المادة البيضاء.

- s. innominata المَادَّةُ اللأُسْمَاءُ. نسيج عصبي خلف المادة المثقبة الأمامية مباشرة وبالجبهة البطنية من الكرة الشاحبة والعروة العدسية.

- s. intermedia centralis medullae spinalis المَادَّةُ المَتَوَسِّطَةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلنَّخَاعِ. الشريط المستعرض للمادة السنجابية التي تحيط بالقناة المركزية للنخاع الشوكي وخارج المادة الهلامية المركزية والذي يربط الكتلتين اليسرى واليمنى للمادة السنجابية.

- s. intermedia lateralis medullae spinalis المَادَّةُ المَتَوَسِّطَةُ الوَحْشِيَّةُ لِلنَّخَاعِ. المادة السنجابية للنخاع التي تتوسط بين المادة المركزية المتوسطة والعمود الوحشي والعمودين البطني والظهري.

- s. nigra المَادَّةُ السُّودَاءُ. طبقة المادة السوداء التي تفصل الأقسام الظهرية من السويقتين المخيتين (سقيفة الدماغ المتوسط) عن الأقسام البطنية منها وتتكون من القسم الظهري المكتنز الذي يحوي العديد من الخلايا الصبغية ومن القسم الشبكي البطني الذي تحوي خلاياه القليل من الصباغ.

- s. perforata anterior (= s. perforata rostralis) المَادَّةُ المَثْقَبَةُ الأَمَامِيَّةُ.

- s. perforata interpeduncularis المَادَّةُ المَثْقَبَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ. قاع الحفرة بين السويقتين المخيتين التي تثقبها الفروع المركزية للشريان المخي الخلفي، وتسمى أيضاً المادة المثقبة الخلفية.

- s. perforata posterior (= s. perforata interpeduncularis) المَادَّةُ المَثْقَبَةُ الخَلْفِيَّةُ.

- **s. perforata rostralis (= s. perforata anterior)** المَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ الأَمَامِيَّةُ. باحة على

قاع الدماغ أمام السبيلين البصريين تحوي العديد من الثقوب التي تمر خلالها الفروع الصغيرة من الشريائين الدماغيين المتوسط الامامي إلى البنيات العميقة.

- **s. reticularis alba of Arnold (= formatio reticularis pontis)** مادة أرنولد الشبكية (البياض: التَشَكُّلُ الشَّبَكِيُّ الجِسْرِيِّ).

- **s. reticularis medullae oblongata (= formatio reticularis medullae oblongatae)** المادة الشبكية للنخاع المستطيل: التَشَكُّلُ الشَّبَكِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- **s. Rolandi (= s. gelatinosa)** المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ. **subthalamus (= thalamus ventralis)** تحت المهاد: المِهَادُ البَطْنِي.

subwaking يَفَقْظَةٌ جُزْئِيَّةٌ. وسط بين اليقظة والسبات.

succinylcholine chloride كلُورِيدُ السُكْسِينِيلُكُولِين. مادة ترخي العضلات الهيكلية بالحصص عند التوصيل العصبي العضلي ويستعمل لهذه الخاصية عند التنظير الداخلي وكمساحد عند التخدير العام لإرخاء العضلات.

sufentanil سَفَانْتِينِيل. دواء يستعمل كمسكن.

suggestibility قَابِلِيَّةُ الإِيحَاء. حالة الاستعداد للإيحاء.

suggestible قَابِلُ الإِيحَاء. شخص عظيم الاستعداد للإيحاء.

suggestion إِيحَاءٌ؛ إِقْتِرَاحٌ. 1. تمرير فكرة إلى أحد الأشخاص من الخارج 2. فكرة تمرر من الخارج.

- **hypnotic s.** إِيحَاءٌ تَقْوِيَمِي. إيحاء يمرر إلى أحد الأشخاص في حالة التنويم يرحى إليه به بتغيير أحد مداركه أو ذكرياته أو ليقوم ببعض الأفعال.

- **posthypnotic s.** إِيحَاءٌ بَعْدَ التَقْوِيم. غرز إيحاء في دماغ أحد الأشخاص أثناء التنويم ليقوم بعمل ما بعد زوال حالة التنويم منه.

sulcus تَلَمٌّ. (ج: أَثْلَامٌ). أخدود أو خندق

أو وهدة خاصة تلك التي توجد على سطح المخ والتي تفصل التلافيف عن بعضها.

- **anterolateral s. of medulla oblongata (= s. ventrolateralis medullae oblongatae)** التَلَمُّ الأَمَامِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- **anterolateral s. of spinal cord (= s. ventrolateralis medullae spinalis)** التَلَمُّ الأَمَامِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلنَّخَاعِ.

- **s. basilaris pontis** التَلَمُّ القَاعَدِيُّ لِلْجِسْرِ. الأخدود الأمامي الناصفي في الجسر الذي يحوي الشريان القاعدي.

- **s. bulbopontinus** التَلَمُّ البَصْلِيُّ الْجِسْرِيِّ. أخدود مستعرض أمام وعلى جهتي الجسر والذي يحده عن النخاع المستطيل.

- **s. calcarinus** التَلَمُّ الْمُهْمَازِي. تلم على السطح الإنسي للفص القذالي يفصل الإسفين عن التلفيف اللساني.

- **callosal s. (= s. corporis callosi)** تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

- **callosomarginal s (= s. cinguli)** التَلَمُّ الثَّقَنِيِّ الخَافِي.

- **s. callosus (= s. corporis callosi)** تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

- **s. canalis innominatus (= s. nervi petrosi minoris)** تَلَمُّ القَنَاةِ اللامُسَمَّاةِ.

- **s. centralis cerebri** التَلَمُّ الْمَرْكَزِيُّ لِلْمُخِّ. تلم عميق نسبياً وعمودي تقريباً على سطح نصف كرة المخ وهو يفصل الفص الجبهي عن الفص الجداري.

- **s. centralis insulae** التَلَمُّ الْمَرْكَزِيُّ لِلْجَزِيرَةِ. خندق عميق مائل يقسم الجزيرة إلى قسم أمامي كبير وآخر خلفي صغير.

- **cerebral s., lateral (= s. lateralis cerebri)** التَلَمُّ الْوُخْشِيُّ لِلْمُخِّ.

- **sulci cerebri** أَثْلَامُ الْمُخِّ. الأخاديد بين تلافيف المخ.

- **s. chiasmatis (= s. prechiasmaticus)** التَلَمُّ التَّصَالِبِيِّ.

- **s. cinguli** التَلَمُّ الْحِزَامِي. تلم طويل غير منتظم الشكل على السطح الإنسي لنصف كرة المخ والذي

يفصل التلفيف الحزامي إلى الأسفل عن التلفيف الجبهي الإنسي والفصيص جنيب المركزي إلى الأعلى ومن الممكن تقسيمه إلى القسمين الجبهي والهامشي.

التَلَمُّ الحَزَامِي. (s. cingulatus = s. cinguli)

التَلَمُّ الدَّائِرِي لِلْجَزِيرَةِ. s. circularis insulae
شق يحيط تقريباً بالجزيرة ويفصلها عن الوصاد.

التَلَمُّ الجَانِبِي. تلم طولاني s. collateralis
على السطح السفلي لنصف كرة المخ بين التلفيفين المغزلي المجاور للحصين.

تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِي. تلم s. corporis callosi
يحيط بالناحية المحدة للجسم الثقني في قاع الشق المخي الطولاني.

s. dorsolateralis medullae oblongatae
التَلَمُّ الظُّهْرِي الْوَحْشِي لِلْبَصَلَةِ. امتداد علوي للثلم الظهري الوحشي للنخاع الشوكي وهو يوفر مرتكزاً للياف الاعصاب اللساني البلعومي والمبهم والإضافي.

التَلَمُّ s. dorsolateralis medullae spinalis
الظُّهْرِي الْوَحْشِي لِلنَّخَاع. تلم طولاني على السطح الظهري الوحشي للنخاع يوفر مدخلاً للجذور النخاعية الظهرية ويفصل الحبلين الظهرية والوحشي عن بعضهما.

التَلَمُّ الجَبْهِي السُّفْلِي. s. frontalis inferior
تلم طولاني قصير يفصل التلفيفين الجبهيين السفلي والوسطي عن بعضهما.

التَلَمُّ الجَبْهِي الْعُلْوِي. s. frontalis superior
تلم طولاني يفصل التلفيفين الجبهيين الوسطي والعلوي عن بعضهما.

التَلَمُّ العِنَانِي. أخذود يفصل s. habenulae
مثلث العنان عن السطح العلوي للمهاد.

التَلَمُّ الحُصِينِي. التلم الذي s. hippocampi
يمتد من ضمادة الجسم الثقني حتى قمة الفص الصدغي تقريباً ويكوّن الحدود الانسية للتلفيف المجاور للحصين.

s. horizontalis cerebelli (= fissura horizontalis cerebelli)
الشَّقُّ الأفقي
المُخَيَّخِي.

التَلَمُّ الوِطَائِي. تلم s. hypothalamicus
ضحل مدور على جدار البطين الثالث يمتد من الثقبه بين البطينين حتى مسال الدماغ.

s. Intermedius dorsalis medullae spinalis
التَلَمُّ الْمُتَوَسِّطُ الظُّهْرِي لِلنَّخَاع.

تلم طولاني في القسمين الرقبى والصدرى من النخاع الشوكي بين الحزمتين الإسفينية والدقيقة للنخاع.

s. intermedius posterior medullae spinalis (= s. intermedius dorsalis medullae spinalis)
التَلَمُّ الْمُتَوَسِّطُ الْخَلْفِي لِلنَّخَاع.

s. Intraparietalis
التَلَمُّ دَاخِلِ الْجِدَارِي.
تلم غير منتظم الشكل على السطح المحدب للفص الجداري وبين الفصيصين الجداريين السفلي والعلوي.

lateral s. of medulla oblongata, anterior (= s. ventrolateralis medullae oblongatae)
التَلَمُّ الْوَحْشِي الْأَمَامِي لِلْبَصَلَةِ:
التلم البطناني الوحشي للبصلة.

lateral s. of medulla oblongata, posterior (= s. dorsolateralis medullae oblongatae)
التَلَمُّ الْوَحْشِي الْخَلْفِي لِلْبَصَلَةِ:
التلم الظهراني الوحشي للبصلة.

lateral s. of spinal cord, anterior (= s. ventrolateralis medullae spinalis)
التَلَمُّ الْوَحْشِي الْأَمَامِي لِلنَّخَاع:
التلم البطناني الوحشي للنخاع.

lateral s. of spinal cord, posterior (= s. dorsolateralis medullae spinalis)
التَلَمُّ الْوَحْشِي الْخَلْفِي لِلنَّخَاع:
التلم الظهراني الوحشي للنخاع.

s. lateralis cerebri
التَلَمُّ الْوَحْشِي لِلْمُخ.
شق عميق يبدأ من المادة المنقبة الامامية ويمتد وحشياً بين الفصين الصدغي والجبهي ثم يدور إلى الخلف بين الفصين الصدغي والجداري وهو ينقسم إلى الفروع الامامي والصاعد والخلفي ويسمى أيضاً شق سيلفيس.

s. lateralis mesencephali
التَلَمُّ الْوَحْشِي لِلدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ. أخذود طولاني على جانب الدماغ المتوسط يفصل ساق المخ عن السقيفة.

s. lateralis pedunculi cerebri (= s. lateralis mesencephali)
التَلَمُّ الْوَحْشِي لِسَاقِ الْمُخ.

- s. lateralis posterior medullae oblongata (= s. dorsolateralis medullae oblongatae) التَلَمُّ الْوَحْشِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلْبَصَلَةِ.
- s. lateralis posterior medullae spinalis (= s. dorsolateralis medullae spinalis) التَلَمُّ الْوَحْشِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلنُّخَاعِ.
- s. limitans التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ. أخدود في منتصف المسافة على السطح الداخلي لكل من الجدارين الداخليين للقناة العصبية والذي يفصله إلى الصفحة الجانحية الظهرية والصفحة القاعدية البطنية.
- s. limitans fossae rhomboideae التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِلْحَفْرَةِ الْمَعْيِنَةِ. أخدود طولاني على الجهة الوحشية للبارزة الانسية يمتد على طول قاع البطن الرابع.
- s. limitans Insulae (= s. circularis Insulae) التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِلْجَزِيرَةِ: التَلَمُّ الدائري للجزيرة.
- s. limitans ventriculorum cerebri (= s. limitans) التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِبُطْنِ الدِّمَاغِ.
- s. lunatus التَلَمُّ الْهَلَالِي. وحدة صغيرة هلالية الشكل تشاهد أحياناً على السطح الوحشي للفص القذالي للدماغ.
- s. medialis cruris cerebri (= s. oculomotorius) التَلَمُّ الْإِنْسِيُّ لِسَاقِ الْمُخ؛ تلم محرك المقلة.
- s. medianus dorsalis medullae oblongatae التَلَمُّ النَّاصِفُ الظَّهْرِيُّ لِلْبَصَلَةِ. أخدود ضيق يوجد فقط في القسم المفلق من البصلة (النخاع المستطيل) والذي يمثل امتداداً للتلم الناصف الظهري للنخاع الشوكي وهو يفصل الحزمتين الدقيقتين عن بعضهما.
- s. medianus dorsalis medullae spinalis التَلَمُّ النَّاصِفُ الظَّهْرِيُّ لِلنُّخَاعِ. أخدود عمودي ضحل على السطح الظهري للنخاع الشوكي في المستوى الناصف والذي يمتد منه الحاجز الناصف الظهري وهو يفصل الحبلين الظهرين عن بعضهما.
- s. medianus posterior medullae oblongatae (= s. medianus dorsalis medullae oblongata) التَلَمُّ النَّاصِفُ الْخَلْفِيُّ لِلْبَصَلَةِ.
- s. medianus posterior medullae spinalis (= s. medianus dorsalis medullae spinalis) التَلَمُّ النَّاصِفُ الْخَلْفِيُّ لِلنُّخَاعِ.
- s. medianus ventriculi quarti للْبُطْنِ الرَّابِعِ. أخدود ناصف في قاع البطن الرابع.
- s. mesencephali medialis (= s. medialis cruris cerebri) التَلَمُّ الْإِنْسِيُّ لِلدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.
- s. of Monro (= s. hypothalamicus) تَلَمُّ مُونَرُو. التلم الوطائي.
- s. nervi oculomotorii (= s. oculomotorius) تَلَمُّ الْعَصَبِ مُحَرِّكِ الْمُقْلَةِ.
- s. nervi petrosi majoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الْكَبِيرِ. أخدود صغير في قاع الحفرة القحفية الوسطية يجري إلى الأمام وإلى الجهة الإنسية من فرجة قناة الوجهي حتى الثقب الممزقة وهو يضم العصب الصخري الكبير.
- s. nervi petrosi minoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الصَّغِيرِ. أخدود صغير في قاع الحفرة القحفية الوسطية يجري إلى الأمام وإلى الجهة الإنسية بالجهة الوحشية من تلم العصب الصخري الكبير ويؤوي العصب الصخري الصغير.
- s. nervi petrosi superficialis majoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ السَّطْحِيِّ الْكَبِيرِ (= s. nervi petrosi majoris).
- s. nervi petrosi superficialis minoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ السَّطْحِيِّ الصَّغِيرِ (= s. nervi petrosi minoris).
- s. nervi radialis تَلَمُّ الْعَصَبِ الْكُعْبُرِيِّ. أخدود عريض مائل على السطح الخلفي للعضد لمرور العصب الكعبري والشریان العضدي العميق.
- s. nervi spinalis تَلَمُّ الْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ. الأخدود على السطح العلوي لكل من الفقرات الرقبية الذي يمتد من الثقب الأفقية إلى الجهة الوحشية ويفصل الدورتين الأمامية والخلفية عن بعضهما وهو يضم الفرع البطني من العصب الرقبى.
- s. nervi ulnaris تَلَمُّ الْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. أخدود ضحل عمودي على السطح الخلفي للْقَيْمَةِ الْعُضْدِ الْإِنْسِيَّةِ وهو يضم العصب الزندي.

- **s. obturatorius ossis pubis** التَلَمُّ السِّدَادِيُّ
لِعَظْمِ الْعَانَةِ. أخدود يعبر السطح السفلي للجناح العلوي لعظم العانة ويوفر ممراً للعصب السدادي وللأوعية الدموية السدادية.
- **s. occipitalis anterior** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ الْأَمَامِيُّ
أخدود عمودي متغير على السطح المحدب للمخ والذي يعتبره البعض الخط الفاصل بين الفصين الجداري والقذالي.
- **sulci occipitales laterales** الْأَتْلَامُ الْقَذَالِيَّةُ
الْوَحْشِيَّةُ. أخاديد مستعرضة تقسم التلافيف القذالية الوحشية إلى قسمين علوي وسفلي.
- **sulci occipitales superiores** الْأَتْلَامُ
الْقَذَالِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ. أتلَام غير منتظمة متعلقة بالتلافيف القذالية العلوية.
- **s. occipitalis transversus** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ
الْمُسْتَعْرِضُ. تلم عمودي خلف التلفيف الزاوي والذي يساعد في تكوين الحدود الأمامية للفص القذالي أو قد يكون أحياناً من ضمنه.
- **s. occipitotemporalis** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ الصَّدْعِيُّ
تلم طولاني على السطح السفلي للفص الصدغي ويفصل التلفيف الصدغي السفلي عن التلفيف القذالي الصدغي الوحشي.
- **s. oculomotorius** تَلَمُّ مُحَرِّكِ الْعَيْنِ. أخدود
طولاني على السطح الإنسي من القسم البطني من سويقة المخ الذي يؤدي العصب محرك العين.
- **s. olfactorius lobii frontalis** التَلَمُّ الشَّمْعِيُّ
لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. تلم مستقيم جنب السهمي على السطح السفلي للفص الجبهي والذي يضم البصلة الشمية والسبيل الشمي ويفصل التلفيفين المستقيم والحجائي عن بعضهما.
- **optic s. (= s. prechiasmaticus)** التَلَمُّ
الْبَصَرِيُّ؛ التلم أمام التصلّبة.
- **sulci orbitales lobii frontalis** الْأَتْلَامُ
الْحَاجِجِيَّةُ لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. أتلَام غير منتظمة بين الأتلَام الحجاجية للفص الجبهي.
- **s. parieto-occipitalis** التَلَمُّ الْجِدَارِيُّ الْقَذَالِيُّ
تلم في السطح الإنسي من كل من نصفي كرة المخ يجري من التلم المهادي إلى الأعلى ويؤشر الحدود بين الإسفين والطلل (أمام الاسفين) وكذلك بين الفصين الجداري والقذالي.
- **s. paraolfactorius anterior** التلم الأمامي
المجاور للفصِّ الشَّمْعِيِّ الْأَمَامِيِّ. تلم على السطح الإنسي لنصف كرة المخ بين الباحة المجاورة للشمية إلى الخلف والتلم الجبهي الأمامي من الأمام.
- **s. paraolfactorius posterior** التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ
المجاور للفصِّ الشَّمْعِيِّ. تلم مخي على السطح الإنسي لنصف كرة المخ تحت ضمادة الجسم الثفني وبين التلفيفين المجاور للأنتهائي المجاور للشمي.
- **polar s.** تَلَمُّ قُطْبِي. أي من الشقوق الصغيرة
التي تحيط النهاية الخلفية للتلم المهادي.
- **pontobulbar s.** التَلَمُّ الْجِسْرِيُّ الْبَصَلِيِّ. التلم
الذي يفصل الجسر عن البصلة.
- **pontopeduncular s.** التَلَمُّ الْجِسْرِيُّ السُّوَيْفِيِّ. **s.**
التلم الذي يفصل الجسر عن الدماغ المتوسط (الذي يمثل سويق المخ).
- **s. postcentralis** التَلَمُّ خَلْفِ الْمَرْكَزِيِّ. تلم
على السطح العلوي الوحشي للمخ يفصل التلفيف خلف المركزي عن باقي أقسام الفص الجداري.
- **postclival s.** التَلَمُّ خَلْفِ الْمَحْدَرِ. شق في
المخيخ بين المحدر وورقة الدودة.
- **posterointermediate s. of spinal cord**
(= **s. intermedius dorsalis medullae spinalis**)
التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ الْمُتَوَسِّطُ لِلنُّخَاعِ.
- **posterolateral s. of medulla oblongata**
(= **s. dorsolateralis medullae oblongatae**)
التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلْبَصَلَةِ.
- **posterolateral s. of spinal cord (= s. dorsolateralis medullae spinalis)** التَلَمُّ
الْخَلْفِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلنُّخَاعِ.
- **postnodular s.** التَلَمُّ خَلْفِ الْعُقَيْدَةِ. تلم على
الجهة السفلية من المخيخ بين العقيدة ولهة الدودة.
- **postpyramidal s.** التَلَمُّ خَلْفِ الْهَرَمِيِّ. تلم على
الجهة السفلية من المخيخ بين الهرم وحيدة الدودة.
- **s. precentralis** التَلَمُّ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ. تلم عمودي
على السطح المحدب من نصف كرة المخ يفصل التلفيف أمام المركزي عن باقي الفص الجبهي.
- **s. prechiasmaticus** التَلَمُّ أَمَامَ التَّصَالِبَةِ.
أخدود على السطح العلوي للعظم الوتدي إلى الأمام مباشرة من حديبة السرج وهو يضم التصلّبة البصرية.

- **preclival s.** التَلَمَّ أَمَامَ المَحْدَر. شق في المخيخ بين القنة والمحدَر.

- **prepyramidal s.** التَلَمَّ أَمَامَ الهرمي. تلم على السطح السفلي للمخيخ بين لهاة الدودة والهرم.

- **prerolandic s. (= s. precentralis)** التَلَمَّ أَمَامَ الرُّولَانْدِي؛ التلم أمام المركزي.

- **retrocentral s. (= s. postcentralis)** التَلَمَّ وَرَاءَ المَرْكَزِي.

- **s. rhinalis** التَلَمَّ الأنفي. شق على السطح السفلي لنصف كرة المخ يفصل القسم الامامي من التليف المجاور للحصين عن باقي الفص الصدغي.

- **s. subparietalis** التَلَمَّ تَحْتَ الجِدَارِي. تلم على الوجه الإنسي لنصف كرة المخ فوق ضمادة الجسم الثفني ويفصل الطلل عن التليف الحزامي.

- **s. Sylvii (= fossa lateralis cerebri)** تَلَمَّ سلفيوس؛ الخَفْرَةُ المخيَّة الوَحْشِيَّة.

- **s. temporalis inferior** التَلَمَّ الصَّدْغِي السُّفْلِي. 1. تلم طولاني على السطح الوحشي للفص الصدغي يفصل التليفين الصدغيين الوسطي والسفلي عن بعضهما البعض.

- **s. temporalis medius (= s. temporalis inferior)** التَلَمَّ الصَّدْغِي الوُسْطِي.

- **s. temporalis superior** التَلَمَّ الصَّدْغِي العُلَوِي. تلم طولاني على السطح الوحشي من نصف كرة المخ يمر إلى الأسفل وإلى الامام من التليف الزاوي حتى القطب الصدغي ويفصل التليفين الصدغيين العلوي والسفلي.

- **sulci temporalis transversi** الإِتْلَامُ الصَّدْغِيَّة المُسْتَعْرِضَة. أنلام عمودية غير منتظمة في قسم الفص الصدغي الذي يقع داخل التلم الوحشي.

- **Turner's s. (= s. intraparietalls)** تَلَمَّ تَرْنَر؛ التلم داخل الجداري.

- **s. ventralis medullae spinalis (= ventral median fissure of spinal cord)** التَلَمَّ النَّاصِفِ البَطْنَانِي لِلخُخَاع؛ التلم البطناني للخُخَاع. انظر fissure.

- **s. ventrolateralis medullae oblongata** التَلَمَّ البَطْنَانِي الوَحْشِي لِلْبَصْلَة. تلم طولاني على السطح البطني للبصلة (الخُخَاع المستطيل) بالجهة

الوحشية من الهرم تمر فيه الياف العصب تحت اللساني.

- **s. ventrolateralis medullae spinalis** التَلَمَّ البَطْنَانِي الوَحْشِي لِلخُخَاع. الأخدود الطولاني على السطح البطني الوحشي للخُخَاع الشوكي من حيث تظهر الجذور العصبية البطنية وهو يفصل الحبلين البطني والوحشي.

- **vermicular s.** التَلَمَّ الدُّودِي الشَّكْل؛ تَلَمَّ الدودة. شق بين الدودة ونصف كرة المخيخ.

- **vertical s. (= s. precentralis)** التَلَمَّ أَمَامَ المَرْكَزِي.

summation تَرَاكُم؛ جَمْع. التأثير التراكمي لعدد من المنبهات التي توضع على العضلة أو العصب أو قوس المنعكس.

- **central s.** تَرَاكُم مَرْكَزِي. حالة تجمع منبهات متتالية دون العتبوية في مركز منعكسي حتى تتجمع وتولد استجابة منعكسية.

- **spatial s.** تَرَاكُم حَيَازِي. تراكم يتولد من تجمع منبهات دون العتبوية أو دفعات عصبية مترامنة وقريبة في حيز محدد تولد استجابة منعكسية.

- **temporal s.** تَرَاكُم زَمَنِي. تراكم يتولد من تجمع منبهات دون عتبوية أو دفعات عصبية متشابهة في النوع ولكنها مترامنة أو قد تكون متتالية ضمن فترة معينة.

sunstroke ضَرْبَةُ الشَّفْس؛ الرَّعْن. حمى حرارية تتولد عن التعرض للشمس وتتصف بالاختلاج والسبات والحرارة العالية وخصوصاً في الجلد.

superego الأَنَا العُلْيَا. في التحليل النفسي هي الحالة الشخصية التي تعمل كمراقب على فعاليات الأنا ومقارنتها بالمقاييس المثالية وتشمل الوظائف النفسية التي تظهر في المواقف الاجتماعية ونقد الذات ومفهوم الصحيح والغلط والضمير والقيم الخلقية.

supersensitivity فَرَطُ الحَسَاسِيَة. فرط التحسس الشاذ.

- **disuse s.** فَرَطُ الحَسَاسِيَة بِعَدَمِ الإِسْتِغْمَال. زيادة فعالية سبيل عصبي بعد تعرضه المزمّن الطويل

إلى دواء مضاد ويتولد ذلك من تغير في حساسية المستقبلات بعد التشابكية.

مُسْتَقْلِق: مستلق على ظهره ووجهه **supine** للأعلى.

كَبْت: 1. التوقف المفاجيء **suppression** للإفراز أو الإبراز أو التفريغ الطبيعي 2. في الطب النفساني هو التثبيط الواعي لفكرة أو منبه غير مرغوب فيهما وهو غير الكظم غير الواعي.

فَرْطُ الإِسْتِفَازَةِ: **surexcitation**.

جِرَاحَةٌ نَفْسِيَّةٌ: **surgery, psychiatric** جراحة دماغية تجري لمعالجة بعض الاضطرابات النفسية.

جِرَاحَةٌ تَجْسِيمِيَّةٌ: **surgery, stereotaxic** جراحة التوضيع بالفراغ. تقنية إجراء تخريبات محددة في مجموعة من باحات الأنسجة المريضة الصغيرة المعينة في أعماق البنية الدماغية المصابة بعد تعيين حدود المنطقة بدقة بواسطة ثلاثة إحداثيات. وتجرى التخريبات بالحرارة أو بالبرودة أو بأشعة اكس أو بالأشعة فوق الصوتية.

دَرَزٌ: نوع من المفاصل الليفية حيث **sutura** يتحد السطحان المتقابلان من العظمين بطبقة ليفية رقيقة جداً ولا يمكن تحريكهما على بعضهما أبداً وهي توجد في الجمجمة.

الدَّرَزُ الإِكْلِيلِيّ: خط اتصال العظم **s. coronalis** الجبهي مع العظمين الجداريين.

الأدراز: **suturæ cranialis (= s. cranii)** **الْحَقْفِيَّةُ**: الأدراز بين مختلف عظام الجمجمة.

الدَّرَزُ الْمُشْرِشِرُ: **s. dentata (= s. serrata)** **الدَّرَزُ المَسْنَنُ**.

الدَّرَزُ الْغُرْبَالِيّ: **s. ethmoidolacrimalis** **الدَّمْعِيّ**: الدرز العمودي عند الاتصال بين العظم الدمعي والصفحة الحاجبية للعظم الغربالي على الجدار الإنسي للحجاج.

الدَّرَزُ الْغُرْبَالِيّ الْفَكِّيّ: **s. ethmoidomaxillaris** **الْعُلْوِيّ**: خط الاتصال بين الصفحة الحاجبية للعظم الغربالي والوجه الحاجبي للفك العلوي.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ: الدرز العابر عادة **s. frontalis** للاتصال بين النصفين الأيمن والأيسر للعظم الجبهي وقد يدوم قسمه السفلي في البالغين.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ: **s. fronto-ethmoidalis** **الْغُرْبَالِيّ**: خط الاتصال في الحفرة القحفية الأمامية بين العظم الجبهي واللوحة المصفوية للعظم الغربالي.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الدَّمْعِيّ: **s. frontolacrimalis** خط الاتصال بين الحافة العلوية للعظم الدمعي والجزء الحاجبي من العظم الجبهي.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الْفَكِّيّ: **s. frontomaxillaris** **الْعُلْوِيّ**: خط الاتصال بين العظم الجبهي والناثئ الجبهي للفك العلوي.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الْأَنْفِيّ: **s. frontonasalis** خط الاتصال بين النهاية الجبهية للعظمين الأنفيين.

الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الْوُجْنِيّ: **s. frontozygomatica** خط الاتصال بين العظم الوجني والناثئ الوجني للعظم الجبهي.

دَرَزٌ مُسَطَّحٌ: درز **s. harmonia (= s. plana)** منسق.

الدَّرَزُ الْقَاطِعِيّ: درز غير واضح **s. incisiva** يشاهد أحياناً ممتداً إلى الجهة الوحشية من الحفرة القاطعية إلى الحيز بين السن النابي والقاطع الوحشي وهو يؤشر خط التحام العظمين الفكي العلوي ومقدم الفكي العلوي.

الدَّرَزُ تَحْتَ الْحَجَّاج: درز **s. infraorbitalis** يشاهد أحياناً ممتداً من الثقب تحت الحجاج إلى الأخدود تحت الحجاج.

الدَّرَزُ بَيْنَ عَظْمِيّ الْفَكِّ: **s. intermaxillaris** **الْعُلْوِيّ**: خط الاتصال بين العظمين الفكيين العلويين للجهتين تحت الشوكية الأنفية السفلية.

الدَّرَزُ بَيْنَ عَظْمِيّ الْأَنْفِ: خط **s. Internasalis** الاتصال بين عظمي الأنف.

الدَّرَزُ الدَّمْعِيّ الْفَرْيَنِيّ: **s. lacrimoconchal** خط الاتصال بين العظم الدمعي والقرين السفلي للأنف.

الدَّرَزُ الدَّمْعِيّ الْفَكِّيّ: **s. lacrimomaxillaris** **الْعُلْوِيّ**: درز على الجدار الداخلي للحجاج بين العظم الدمعي والفك العلوي.

الدَّرَزُ الْأَمِّيّ: خط الاتصال **s. lambdoidea** بين العظمين القذالي والجداري.

دَرَزٌ مَتَدَاخِلُ الْحَوَافِ: طرز من **s. limbosa** الأدراز يشاهد فيه تتشابح الحواف المائلة المشطوفة.

- **s. metopica** الدَّرَزُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ.
درز جبهتي باقي في البالغين.
- **s. nasofrontalis (= s. frontonasalis)** الدَّرَزُ الْجَبْهِي الْأَنْفِي.
الدَّرَزُ الْأَنْفِيُّ الْفَكِّي الْغُلَوِيُّ. خط الاتصال بين الحافة الوحشية للعظم الأنفي والناتئ الجبهي للفك العلوي.
- **s. nasomaxillaris** الدَّرَزُ الْأَنْفِيُّ الْفَكِّي الْغُلَوِيُّ. خط الاتصال بين الحافة الوحشية للعظم الأنفي والناتئ الجبهي للفك العلوي.
- **s. notha** دَرَزٌ مُتَلَصِّقُ الْحَوَافِ؛ دَرَزٌ مُصَاقِبٌ. نمط من الأدرار يتكون من تلاصق السطوح الخشنة لحواف العظام المشتركة في الدرز.
- **s. occipitomastoidea** الدَّرَزُ الْقَذَالِيُّ الْخَشَائِي. امتداد للدرز اللامي بين العظم القذالي والحافة الخلفية للجزء الخشائي للعظم الصدغي.
- **s. palatina mediana** الدَّرَزُ الْخَنْكِيُّ النَّاصِفِ. خط الاتصال بين الجزء المستعرض للعظمين الحنكيين للجهتين.
- **s. palatina transversa** الدَّرَزُ الْخَنْكِيُّ الْمُسْتَعْرِضِ. خط الاتصال بين نواتئ الفك العلوي والأقسام المستعرضة للعظمين الحنكيين للجهتين.
- **s. palato-ethmoidalis** الدَّرَزُ الْخَنْكِيُّ الْغُرْبَالِي. خط الاتصال بين الناتئ الحاجبي للعظم الحنكي والصفحة الحاجبية للعظم الغربالي.
- **s. palatomaxillaris** الدَّرَزُ الْخَنْكِيُّ الْفَكِّي الْغُلَوِيُّ. درز في قاع الحجاج بين الناتئ الحاجبي للعظم الحنكي والجزء الحاجبي للفك العلوي.
- **s. parietomastoidea** الدَّرَزُ الْجِدَارِيُّ الْخَشَائِي. خط الاتصال بين الزاوية السفلية الخلفية للعظم الجداري والناتئ الخشائي للعظم الصدغي.
- **s. plana** دَرَزٌ مُسَطَّحٌ. نمط من الأدرار يتكون من مصاقبة بسيطة للسطوح المتجاورة المتناشبة من حواف العظام المشتركة.
- **s. sagittalis** الدَّرَزُ السُّهُمِيُّ. خط الاتصال بين العظمين الجداريين.
- **s. serrata** دَرَزٌ مُسَرَّشَرٌ. نمط من الأدرار تتصل فيه العظام بحواف متناشبة تشبه حافة المنشار.
- **s. spheno-ethmoidalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْغُرْبَالِي. خط الاتصال بين جسم العظم الوددي والصفحة الحاجبية للعظم الغربالي.
- **s. sphenofrontalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْجَبْهِي. درز طويل يوصل الجزء الحاجبي للعظم الجبهي إلى الجناحين الكبير والصغير للعظم الوددي على جهتي الجمجمة.
- **s. sphenomaxillaris** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْفَكِّي الْغُلَوِيُّ. درز يشاهد أحياناً بين الناتئ الجناحي للعظم الوددي والفك العلوي.
- **s. sphenoorbitalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْحَجَاجِي. خط الاتصال بين الناتئ الحاجبي للعظم الحنكي وجسم العظم الوددي.
- **s. sphenoparietalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْجِدَارِي. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددي والعظم الجداري.
- **s. sphenosquamosa** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الصَّدْفِي. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددي والجزء الصدفي من العظم الصدغي.
- **s. sphenovomeriana** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْمِيكَعِي. خط الاتصال بين النواتئ القمعية للصفائح الجناحية للعظم الوددي وجناح الميكة.
- **s. sphenozygomatice** الدَّرَزُ الْوَتْدِيُّ الْوُجْنِي. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددي والعظم الوجني.
- **s. squamosa** دَرَزٌ حَرَشَفِي. نمط من الأدرار يتكون من تراكب الحواف المائلة للعظام المشتركة.
- **s. squamosa cranii** الدَّرَزُ الصَّدْفِيُّ الْقَحْفِي. الدرز بين الجزء الصدفي للعظم الصدغي والعظم الجداري.
- **s. squamomastoidea** الدَّرَزُ الصَّدْفِيُّ الْخَشَائِي. درز يوجد بين الجزئين الصدفي والخشائي للعظم الصدغي.
- **s. temporozygomatice** الدَّرَزُ الْوُجْنِي الصَّدْفِي. الدَّرَزُ الصَّدْفِيُّ الْوُجْنِي. خط الاتصال بين الناتئ الوجني للعظم الصدفي والناتئ الصدفي للعظم الوجني.
- **s. vera** دَرَزٌ حَقِيقِي. درز حقيقي لا تتولد أية حركة فيه.
- **s. zygomaticofrontalis (= s. frontozygomatice)** الدَّرَزُ الْجَبْهِيُّ الْوُجْنِي.
- **s. zygomaticomaxillaris** الدَّرَزُ الْوُجْنِي

الفَكِّي العُلُويّ. خط الاتصال بين العظم الوجني والناتئ الوجني للفك العلوي.

- s. zygomaticotemporalis (= s.

temporozygomatica) الدُرُزُ الصُّغَيُّ الوجنيّ.

1. دُرُز 2. خِيَاطَة 3. خَيْط 4. غُرْزَة suture

symbolia الإدراك اللُّغسيّ. إدراك طبيعة الأجسام بواسطة حاسة اللمس فقط.

symbolism الرّمزيّة. 1. حالة عقلية شاذة

تمثل فيها مدارك الشخص وحاجياته برموز أو بأجسام أخرى 2. في التحليل النفسي هي عملية التفكير اللاواعي وعادة ما تكون ذات طبيعة جنسية حيث تحول معانيها الحقيقية بحيث لا تدرك بأنها أفكاراً جنسية من قبل الأنا العلوية.

sympathectomy قَطْعُ الوُدّي. قطع أو فصل أو استئصال جزء من السبيل العصبي الودي.

قَطْعُ الوُدّي الكِيَمِيائيّ. كبت فعالية chemical s. الجهاز العصبي الودي بواسطة الادوية الخاصة المناسبة لذلك.

sympathetic وُدّي. 1. منسوب إلى التواد أو مسبب به أو يظهره 2. عصب ودي أو الجهاز العصبي الودي.

sympatheticomimetic (= sympathomimetic) مُحَاكِي الوُدّي.

sympatheticoparalytic شَلَلِي وُدّي. مسبب عن أو مصاب بشلل الجهاز العصبي الودي.

sympatheticotonia تَغْلُبُ الوُدّي. حالة يسود فيها الجهاز العصبي الودي على الوظائف العامة لأعضاء الجسم وتتصف بالتشنج الوعائي وارتفاع ضغط الدم وتكون جلد الوز والمنعكس الهدابوي النخاعي.

sympathic (= sympathetic) وُدّي.

sympathicectomy (= sympathethectomy) قَطْعُ الوُدّي.

sympathicoblastoma وَرَمُ أُرُومَة الوُدّيّة. ورم خبيث يحوي أرومات الودية.

sympathicogonioma (= sympathicoblastoma) وَرَمُ أُرُومَة الوُدّيّة.

sympathicolytic (= sympatholytic)

حَالُ الوُدّي.

sympathicomimetic (= sympathomimetic) مُحَاكِي الوُدّي.

sympathicopathy إغْتِلَالُ وُدّي. أي مرض يتولد عن اضطراب الجهاز العصبي الودي.

sympathicotonia (= sympatheticotonia) تَغْلُبُ الوُدّي.

sympathicotripsy هَرَسُ الوُدّي. الهرس الجراحي للعصب أو للعقدة أو للضفيرة العصبية الودية.

1. أَلِفُ الوُدّي sympathicotropic
2. مُوجِبَة لِلوُدّي. 1. ماله ألفة للجهاز العصبي الودي 2. عامل له ألفة للجهاز الودي أو يؤثر على الجهاز العصبي الودي.

sympathicus (= sympathetic الجهازُ العَصَبِيّ الوُدّي.

sympathin سِمْبَاثِين. وسيط عصبي هرموني للدفعات العصبية عند التشابكات العصبية الودية وأهم أنواعه هما الأبينيفرين والنورأبينيفرين ويستعمل المصطلح سمباثين فقط عند عدم معرفة طبيعة الوسيط.

sympathism الإيحائيّة؛ الوُدّيّة. الاستعداد للتأثر بالتنويم أو بالإيحاء أو نقل الاحاسيس من شخص لآخر.

sympathoadrenal وُدّي كُظُرِيّ. منسوب إلى الجهاز العصبي الودي ولب الغدة الكظرية.

sympathoblastoma (= sympathicoblastoma) وَرَمُ أُرُومَة الوُدّيّة.

sympathogonia سُلَيْفَات الوُدّيّة. خلية جنينية غير مميزة تنامي لتولد الخلية الودية.

sympathogonioma (= sympathoblastoma) وَرَمُ أُرُومَة الوُدّيّة.

sympatholytic حَالُ الوُدّي. عامل مضاد لتأثير الدفعات التي تنقلها الألياف العصبية البعد التشابكية الأدرينالية الفعل للجهاز العصبي الودي.

sympathomimetic مُحَاكِي الوُدّي. عامل

يولد تأثيراً مشابهاً لتأثير الدفعات العصبية التي تنقلها الألياف الودية بعد التشابكة.

sympathy 1. مشاركة عاطفية لافكار
الاشخاص الآخرين واحاسيسهم وخبراتهم 2. تأثير
يحدث في أحد الاعضاء نتيجة إصابة أو مرض في
عضو آخر من الجسم 3. العلاقة الموجودة بين
الدماغ والجسم والتي تؤدي إلى تأثر أحدهما
بالآخر 4. التأثير الذي يحدثه أحد الافراد على فرد
آخر كما يحدث في التنويم أو عند التناوب أو عند
انتقال الاعراض المستتربة.

symptom عَرَض. (ج: أعراض). أي من الدلائل الشخصية للمرض أو حالة المريض كالدلائل التي يدركها المريض أو بعض الحالات التي تدل على تغير حالة المريض الجسدية أو العقلية.

- abstinence s. (= withdrawl s.) عَرَضُ
الإمْتِنَاعِ. عرض نفسي يظهر عند توقف المدمن عن
تناول المخدر.

- Barany's s. عَرَضُ بَارَانِي. عند اضطرابات التوازن الناتجة عن مرض الجهاز الدهليزي يتأثر اتجاه السقوط بتغيير وضع الرأس.

- Bekhterev's s. عَرَضُ بَخْتَرِيف. شلل عضلات الوجه للحركات الذاتية في مرض التابس الظهري.

- Bonhoeffer's s. عَرَضُ بُونْهَؤُوفِر. فقدان التوتّر العضلي في داء الرقص.

- colliver's s. عَرَضٌ كُولِيْفَر. حركات نفضائية
أو رعشية أو اختلاجية غريبة في الأطراف والوجه
والفك وأحياناً في كل الجسم تشاهد في المرحلة قبل
الشللية في التهاب سنجابية النخاع.

- dissociation s. عَرَضُ تَفَاقُيٍّ. خدر للآلم
والحرارة والبرودة من دون فقدان حس اللمس
وبشاهد ذلك في تكهف النخاع.

- Epstein's s. عَرَضُ إِبْستَيْن. عرض يشاهد في الأطفال العصبيين يتكون من عدم حركة الجفن العلوي للأسفل فمعطى ذلك المريض سحنة مرعبة.

عَرَضُ هِينِلْ. قلة التحسس عند الضغط. **- Haenel's s.** على المقلتين في التابس الظهرى.

- reflex s. عَرَضٌ مُنْعَكِسٌ. عرض يحدث في منطقة بعيدة عن تلك المصابة بالمرض.

- Remak's s. عَرَضُ رِيْعَاك. تعدد مواقع الإحساس

أو مرور وقت طويل قبل إدراك حس الألم وهما من علامات التآبس الظهرى.

- **Seguin's signals.** عَرَضُ إِشَارَةِ سِغُونِ.
التقلص اللاإرادي للعضلات قبل نوبة الصرع.

- Trendelenburg's s. عرض ترندلنبيرغ. مشية متهدأة بسبب شلل العضلات الالوية.

- Wartenberg's s. عَرَضُ فَارْتِنْبِرْغ. 1. انتشاء الإبهام عند ثني الأصابع الأخرى بوجه المقاومة ويشاهد ذلك في آفات الهرمي. 2. الشعور بالحك في المناخر وفي قمة الأنف في أورام الدماغ.

- withdrawal s. (= withdrawl) أعراض
الامتناع. العزل.

synalgia الْمُحَوَّل. ألم يحس به في إحدى
المناطق نتيجة آفة في موضع آخر من الجسم.

مَشْبَكَة. (ج: مَشَابِك). موقع تقارب **synapse** العصونات الوظيفي حيث تنتقل الدفعات العصبية من عصبون لآخر بطريقة كيميائية أو كهربائية وفي المشبك النمطي تنتقل الدفعات بواسطة الناقل العصبي (كالأسيتيل كولين أو النورإبينفرين... الخ) الذي تطلقه نهايات الأعصاب قبل المشبكية المثارة الذي ينتشر عبر الأخدود المشبكي ليتحد مع المستقبلات على الفشاء بعد المشبكي والذي يولد تغييراً كهربائياً فيه يؤدي إلى توليد الدفعات العصبية فيه.


- adrenergic s. مَشْبِكٌ أَذْرِينَالِينِي الفِعْل. مشبك
يكون الأدرينالين الناقل العصبي فيه.

• **axoaxonic s.** **مَشْبَكٌ مَحَوَارِيٌّ مَحَوَارِيٌّ.**
 مشبك بين محوار أحد العصبونات ومحوار عصبون آخر.

- axodendritic s. **مَشْبَكٌ مِخْوَارِيٌّ تَغْصَنِيٌّ.**
 مشبك بين محوار أحد العصبونات وتغصن عصبون آخر.


- axodendrosomatic s. مَشَبِكٌ مُخَوَارِيٌّ
تَقْصِيصِيٌّ جَسَدِيٌّ. مشبك بين محوار أحد العصبونات
وتقصنات وجسم عصبون آخر كما هو الحال في
العصبونات الحركية.

- **axosomatic s.** مَشْبِكٌ مَحْوَارِيٌّ جَسَدِيٌّ.
 مشبك بين محوار أحد العصبونات وجسم عصبون آخر.



synapse

رسم تخطيطي لعصبون يبين اتصالاته والمشبك: أ - عصبون (باللون الأحمر) واتصالاته الشبكية مع الياف عصبية واردة إليه وصادرة منه (باللون الأسود): (1) تغصن (2) زر (3) جسم العصبون (4) الغمد المياليني (5) المحوار (6) تغصن. ب - مشبك: (7) زر (8) حويصلة (9) الفج المشبكي (10) المحوار (11) متقذرة (12) الغشاء قبل المشبكي (13) الغشاء بعد المشبكي.



synapse

أ - تخطيط أحد العصبونات وبعض نتوءاته. وتظهر بعض نهايات العصبونات الأخرى المنتهية عليه بلون اسود غامق. ب - تخطيط لمشبك إحدى النهايات: ج - نهايات عصبية على سطح العصبون. (1) الغشاء بعد المشبك (2) حويصلات مشبكية (3) الغشاء قبل المشبك.

- **catacholaminergic s.** مَشَبِكٌ كَاتَاكُولِ أَمِينِي الْفِغْل. مشبك يكون فيه الكاتاכול أمين هو الناقل العصبي.

- **cholinergic s.** مَشَبِكٌ كُولِينِي الْفِغْل. مشبك يكون الأسيتيل كولين هو الناقل العصبي فيه.

- **dendrodendritic s.** مَشَبِكٌ غَصْنِي تَفْصِنِي. مشبك من تفصن أحد العصبونات إلى تفصن عصبون آخر.

- **en passant s.** مَشَبِكٌ عُيُورِي. تماس مشبكي يتصف بتعابر وتماس أغشية الياف العصبونات المتجاورة على طول أحدهما الآخر.

- **excitatory s.** مَشَبِكٌ إِسْتِفَارِي. مشبك يستثار لنقل الدفعات عبره.

- **Inhibitory s.** مَشَبِكٌ تَقْطِيطِي. مشبك يثبط نقل النبضات عبره.

- **loop s.** مَشَبِكٌ عُزُوي. مشبك فيه باحة تلامس كبيرة بين أغشية اليافها.

- **neuromuscular s.** مَشَبِكٌ عَصْبِي عَضَلِي. الاتصال العصبي العضلي.

synapsis تَشَابُك. تلامس النهايات العصبية مع جسد أو محوار أو تفصن عصبون آخر.

synchiria حِسٌّ عُيُورِي. حالة يؤدي فيها تنبيه منطقة في إحدى جهتي الجسم إلى حس مماثل في جهتيه.

synchronism تَرَافُن. حدوث حدثين أو فعاليتين أو أكثر في نفس الوقت.

synchronous مُزَامِن. يحدث في نفس الوقت مع حدث آخر أو أحداث أخرى.

syncope غَشْي. فقدان الوعي الوقتي بسبب إقفار الدماغ العام.

- **postural s.** غَشْيٌ وَضْعِي؛ غَشْيٌ الْوَضْعَة. فقدان الوعي الذي ينتج عن تغيير الوضع.

- **stretching s.** غَشْيٌ التَّمَدُّد؛ غَشْيٌ بَسْطِي. الغشي الذي يحدث عند تمديد الذراعين للأعلى مع تمديد العمود الفقري.

- **tussive s.** غَشْيٌ سُعَالِي. فقدان الوعي العارض المترافق مع نوبة سعال شديدة.

syncytium مَخْلَى. كتلة جبلية عديدة النوى تتولد عن اندغام عدد من الخلايا.

syndrome مُتَلَاَزِمَة. مجموعة أعراض تحدث سوية أو مجموعة علامات حالة مرضية أو معقد علامات مرضية.

- **abstinence s. (= withdrawal s.)** مُتَلَاَزِمَة الْإِمْتِنَاع. الانعزال.

- **acute brain s. (= organic brain s.)** مُتَلَاَزِمَة الدُّمَاغِ الْحَادَّة.

- **Adie's s.** مُتَلَاَزِمَة أَدِي. متلازمة تتكون من استجابة حدقية مرضية (حدقة متوترة) وأهم صفاتها هي التورثر العضلي عند التكيف فتنقلص الحدقة على الجهة المصابة. عند الرؤية القريبة أبطأ من تقلص الحدقة على الجهة المعاكسة وكذلك فإنها تتوسع أبطأ من العين على الجهة السليمة ولا تستجيب الحدقة المصابة للضوء المباشر أو غير المباشر بطريقة طبيعية ولكنها قد تستجيب بطريقة شاذة. وتكون بعض المنعكسات الوترية مفقودة أو ضعيفة ولكن لا توجد أية اضطرابات حركية أو حسية وليست هناك أية تغيرات ظاهرة تدل على وجود مرض في الجهاز العصبي.

- **adiposogenital s. (= adiposogenital dystrophy)** مُتَلَاَزِمَة شَحَامِيَّة تَنَاسُلِيَّة؛ خَلَلٌ شَحَامِي تَنَاسُلِي.

- **Alajouanine's s.** مُتَلَاَزِمَة الْأَجَوَانِين. آفات متناظرة للعصبين السادس والسابع القحفيين مع شلل وجهي بالجانبين وفي العضلة المستقيمة الوحشية في العين مع حنف القدم بالجهتين.

- **«Alice in Wonderland» s.** مُتَلَاَزِمَة «اليس في أرض العجائب». حالة توهم تظهر بنكران الذات واضطراب صورة الجسم واختلال حس مرور الوقت وتوهمات وانخداعات عديدة أخرى ومن الممكن أن ترافق مع الفصام أو الصرع أو الشقيقة أو أمراض الفص الجداري أو الحالات المنومة أو العقاقير المولدة للهلوس.

- **amnesic s.** مُتَلَاَزِمَة فَقْدِ الذاكرة. اضطراب عقلي عضوي يتصف بضعف الذاكرة سواء اللاحقة أو السابقة ويحدث مع حالة وعي طبيعي، ولا تشمل هذه المتلازمة ضعف الذاكرة الذي يشاهد في الخرف أو الهذيان. ومن الممكن أن ترافق هذه الأعراض مع

التوهان والتخريف وقلة التبصر وضعف الذاكرة ولكنها ليست أعراضاً دائمية. ومن أهم أسبابها عوز الثيامين المترافق مع تعاطي الكحول ولكنها يمكن أن تتولد عن أية آفة مرضية تؤدي إلى تخريب بعض بنيات الدماغ البيني والفص الصدغي (كالتكوين الحصيني والأجسام الحلمية والنوى الظهرية الإنسية للمهاد) كما تشمل الأسباب رضح الرأس وأورام الدماغ والاحتشاء ونقص الأكسجين والتسمم بأول أكسيد الكربون والتهاب الدماغ بالهربس البسيط.

- anterior cord s. مُتَلَاَزِمَةُ النُّخَاعِ الأَمَامِيِّ. إصابة موضعية للقسم الامامي للنخاع الشوكي تتصف بالشلل التام ونقص حس الألم والخدر حتى مستوى الإصابة مع الاحتفاظ النسبي بإحساسات العمود الخلفي وهي إحساسات اللمس والوضع والاهتزاز.

- anterior cornual s. مُتَلَاَزِمَةُ الْقَرْنِ الأَمَامِيِّ. ضمور عضلي بسبب إصابة القرن الامامي للنخاع الشوكي.

- anticholinergic s. مُتَلَاَزِمَةُ مُضَادِّ الفِعْلِ الكُولِينِيِّ. التأثير المركزي والمحيطي الناتج عن فرط جرعة الادوية المضادة للفعل الكولينيني أو سوء الاستجابة لها (مثل الاتروبين والفينوتازين ومضاد الهستامين ومضادات الكآبة ثلاثية الدورات) وتشمل أعراضها وعلاماتها القلق والهذيان والتوهان والاهلاس والنوبات وتسرع القلب وارتفاع حرارة الجسم وتوسع الحدقة وتوسع الاوعية واحتباس البول والمعدة ونقص الافرازات اللعابية والعرقية والقصبية والانفية البلعومية.

- anxiety s. مُتَلَاَزِمَةُ القَلْق. الاعراض الجسدية التي ترافق القلق مثل خفقان القلب والتنفس السريع الضحل والتعرق والشحوب والشعور بالهلع.

- Apert's s. (= acrocephalosyndactyly) مُتَلَاَزِمَةُ اِبْرَتْ. تسنم الرأس مع ارتفاق الاصابع.

- auriculotemporal s. المُتَلَاَزِمَةُ الأذُنِيَّةُ الصَّدْغِيَّةُ. ظهور منطقة تعرق حمراء على الوجنة عند تناول الطعام ويشاهد ذلك في آفات الغدة النكفية، وهي تنشأ عن بعض إصابات العصب الأذني الصدغي.

- Avellis's. مُتَلَاَزِمَةُ أَفِيلِيْس. شلل الحبال الصوتية والحقاف (شراع الحنك) على نفس الجانب

مع فقدان حسي الحرارة والألم من ساق وجذع وذراع ورقبة الجهة المعاكسة من جلد فروة الرأس.

- Babinski's s. مُتَلَاَزِمَةُ بَابِنْسْكِي. ترافق اضطرابات القلب والشرابين مع التهاب السحايا الزهري المزمن والتابس الظهري والخرف الشللي والاعراض الزهرية المتأخرة الأخرى.

- s. of Babinski- Nageotte مُتَلَاَزِمَةُ بَابِنْسْكِي - نَاغِيُوت. متلازمة تنتج عن آفات متعددة تصيب الهرم البصري والسبل الحسية والسويقات المخيخية والتكوين الشبكي وتتصف بالفالج (الشلل النصفي) والخدر بالجهة المعاكسة (ويكون الخدر فقط في حسي الألم والحرارة عادة) مع تعذر التأزر النصفي والرنح النصفي ومتلازمة هورنر في نفس الجهة.

- Babinski-Vaquez s. (= Babinski's s.) مُتَلَاَزِمَةُ بَابِنْسْكِي فَاقُوز.

- Balint's s. مُتَلَاَزِمَةُ بَالِنْت. شلل التثبيت البصري القشري مع رنح بصري واضطراب الانتباه البصري مع الاحتفاظ بالحركات العينية المنعكسية المستقلة وتتولد عن الآفة الجدارية القذالية بالجهتين.

- Bannworth's s. مُتَلَاَزِمَةُ بَانُورْث. التهاب السحايا والاعصاب في مرض لايم.

- Barré- Guillain s. (= acute febrile polyn- euritis) مُتَلَاَزِمَةُ بَارِيه - غِيلَان؛ التهاب الاعصاب الحموي الحاد.

- Benedikt's s. مُتَلَاَزِمَةُ بِنِيدِكْت. متلازمة تتصف بشلل محرك العين على نفس الجهة مع فرط الحركية والرعاش وخزل الذراع والساق على الجهة المعاكسة والرنح على نفس الجهة. وتنتج هذه المتلازمة عن آفات تخرب العصب محرك العين (القحفي الثالث) والنواة الحمراء والسبيل القشري النخاعي.

- Bernard's s. (= Horner's s.) مُتَلَاَزِمَةُ بَرْنَارْد. برنارد.

- Bernhardt-Roth s. (= meralgia paresthetica) مُتَلَاَزِمَةُ بَرْنِهَارْت - رُوث. ألم الفخذ المذلي.

- Bertolotti's s. مُتَلَاَزِمَةُ بَرْتُولُوتِي. تعجز الفقرة القطنية الخامسة مع عرق النسا والجنف ويحدث ذلك باندغام الفقرة مع عظم العجز.

- body of Luys's. (= hemiballismus)

مُتَلَاَزِمَةٌ جِسْمُ لُوْز؛ رَقْنٌ شَقِي. قَذَائِفِيَّةٌ شَبَقِيَّةٌ.

- Borjeson's s. مُتَلَاَزِمَةٌ بُوْرْجِيْسُون. متلازمة

مرتبطة بالصبغي اكس تتصف بتخلف عقلي شديد والصرع وقصور القندية وقصور الاستقلاب والسمنة المفرطة مع تورم الانسجة تحت الجلدية للوجه واذنين كبيرتين.

- brachial s. مُتَلَاَزِمَةٌ عَضْدِيَّة. حالة مرضية

تنتج عن انضغاط أو تهيج أعصاب الضفيرة العضدية.

- Briquet's s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرِيْكَه. هستيريا خاصة

تتصف بأعراض متعددة وتدفع المريض لمراجعة الأطباء المستمرة ولاستعمال أدوية كثيرة من دون داع.

- Brissaud-Marie s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرِيْسُو - ماري.

تشنج نصفي لساني شفوي هستيري.

- Brissaud-Sicard s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرِيْسُو - سِيْكَار.

فالج تشنجي ينتج عن آفات الجسر.

- Bristowe's s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرِيْسْتُو. سلسلة من

الأعراض الشديدة الخاصة بورم الجسم الثفني وهي
1 - بداية تدريجية للشلل النصفي الفالج ب - ترافق الفالج في إحدى الجهتين مع أعراض فالجية على الجهة الأخرى، ج - ذهول ونعاس وصعوبة في البلع وعدم المقدرة على الكلام، د - من دون ظهور أية إصابة في الأعصاب القحفية، هـ - الموت بالسبات أو الغيبوبة.

- Brown-Sequard s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرَاوْن - سِيْكَوار.

متلازمة تنتج عن تخريب أحد نصفي النخاع الشوكي مما يولد شللاً مع فقدان الحس المميز وحس المفاصل على نفس الجهة وفقدان حس الألم والحرارة على الجهة الأخرى من الجسم.

- Bruns's s. مُتَلَاَزِمَةٌ بَرُونْز. صداع متقطع مع

الدوار والقيء والاضطرابات البصرية وهي أعراض خاصة بعدوى في البطين الرابع بالكيسة المذنبة أو آفاته الأخرى أو أورام الخط الوسطي للمخيخ والبطين الثالث أو البطين الجانبي.

- bulbar s. (= Dejerine's s.) مُتَلَاَزِمَةُ الْبَصَلَة.

متلازمة ديجيرين.

- callosal s. مُتَلَاَزِمَةُ الثَّقْفِي. مجموعة من الأعراض

كان يعتقد بأنها ناتجة عن آفة الجسم الثفني.

- Capgras' s. مُتَلَاَزِمَةُ كِبْغْرَاس. التوهم بأن

الأشخاص الآخرين في محيط المريض هم ليسوا أنفسهم الحقيقيين بل إنهم غيرهم أو أشباههم.

- capsular thrombosis s. مُتَلَاَزِمَةُ خُثَار

المَحْفَظَة. فالج ينتج عن خثار وعاء دموي بجهاز المحفظة الداخلية.

- capsulothalamic s. الْمُتَلَاَزِمَةُ الْمُحْفَظِيَّة

المِهَادِيَّة. فالج وعمى شقي وإدراك الألم المنحرف بسبب آفة المهاد والمحفظة الباطنة.

- carotid sinus s. مُتَلَاَزِمَةُ الْجَيْبِ السِّيَّاتِي.

غشي يترافق أحياناً مع نوبات اختلاجية تنتج عن فرط فعالية منعكس الجيب السباتي عند تنبيه أحد الجيبين السباتيين أو كليهما.

- carpal tunnel s. مُتَلَاَزِمَةُ الثَّقْفِي الرَّسْغِي.

مجموعة أعراض تتولد من انضغاط العصب الناصف مع ألم ومذل حراري أو محرق في الأصابع واليد ويمتد أحياناً حتى المرفق.

- cauda equina s. مُتَلَاَزِمَةُ ذَنَبِ الْفَرَس. ألم كلي

في العجان والمثانة والعجز وينتشر بصورة عامة على طريقة عرق النسا ويترافق مع مذل وشلل لا انعكاسي بسبب انضغاط جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

- caudal dysplasia s. مُتَلَاَزِمَةُ خَلَلٍ تَنَسُّج

الذَنَب. عدم تكون جزء أو كل وحدات الفقرات العصبية والعجزية وأحياناً القطنية وشدقات النخاع الشوكي الذنبية المناسبة لها مما ينتج خلل وظائف الأمعاء والمثانة.

- caudal regression s (= caudal

dysplasia s.) مُتَلَاَزِمَةُ خَلَلٍ تَنَسُّجِ الذَنَب.

- cavernous sinus s. مُتَلَاَزِمَةُ الْجَيْبِ الْكَهْفِي.

وذمة الملتحمة والجفن العادي وجذر الأنف وجحوظ العين مع شلل الأعصاب القحفية الثالث والرابع والسادس بسبب خثار الجيب الكهفي.

- central cord s. مُتَلَاَزِمَةُ الْحَبْلِ الْمَرْكَزِي. إصابة

الجزء المركزي من النخاع الشوكي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل أكثر في الأطراف العليا عما هو في الأطراف السفلى وتنتج هذه التغيرات المرضية إما عن وذمة النخاع أو النزف.

- centroposterior s. مُتَلَاَزِمَةُ مَرْكَزِيَّة خَلْفِيَّة.

تفارق تكهفي نخاعي للاضطرابات التحسسية والحركية الوعائية بسبب آفات الأجزاء المركزية الخلفية للمادة السنجابية للنخاع الشوكي.

- cerebellar s. مُتَلَاَزِمَةُ المَخِيخ. رنح مخيخي وراثي.
- cerebrohepatorenal s. مُتَلَاَزِمَةُ دِمَاغِيَّة كَبِدِيَّة كُلَوِيَّة. اضطراب جسدي متنحٍ ينصف بشواذ قحفية وجهية ونقص التوتر وضخامة الكبد واليرقان وكلية متعددة الاكياس والموت اثناء الطفولة المبكرة والذي يترافق مع فقدان البيروكسيزوم من الكبد والكلية.
- cervical s. مُتَلَاَزِمَةُ رَقَبِيَّة. حالة تنتج عن تهيج أو انضغاط جذور الاعصاب الرقبية وتتصف بالم في الرقبة ينتشر إلى المنكبين والذراعين والساعدين ويعتمد ذلك على أي من الاعصاب الرقبية هو المصاب.
- cervical rib s. (= cervicobrachial s. = scalenus s.) مُتَلَاَزِمَةُ الضِّلَع الرَقَبِيَّة.
- Cestan's s. (= s. of Cestan- Chenais) مُتَلَاَزِمَةُ سَيْسَتَان. ترافق الشلل النصفي (الفالج) والخدر الشقي في الجهة المقابلة مع الانسياق الجانبي واللاتأزمية الشقية ومتلازمة هورنر وشلل الحنجرة بنفس الجهة ويتولد كل ذلك عن آفات منتشرة في السبيلين الهرمي والحسي وفي السويقة المخيخية السفلية والنواة المتلبسة والمركز العيني الحدي.
- Charcot's s. مُتَلَاَزِمَةُ شَارْكَوت. 1. تصلب وحشي ضموري عضلي 2. عرج متقطع 3. حمى كبدية متقطعة تنتج عن التهاب الارعية الصفراوية.
- chiasma s. (= chiasmatic s.) مُتَلَاَزِمَةُ التَّصَالِبَة. متلازمة تدل على إصابة التصالبة البصرية التي تؤدي إلى خلل البصر وتحديده وتضييق الساحة البصرية وعتمة مركزية وصداغ ودوار وغشي.
- Citelli's s. مُتَلَاَزِمَةُ شَيْتَلِي. تخلف عقلي وفقدان المقدرة على التركيز والنعاس أو الارق الذي يشاهد في الاشخاص المصابين بالغدانيات أو التهاب الجيوب.
- Claude's s. مُتَلَاَزِمَةُ كَلَاوُد. شلل العصب القحفي الثالث على جهة واحدة وتعدُّر التأزر على الجهة المعاكسة مع الرتبة.
- Claude Bernard- Horner s. (= Horner's s.) مُتَلَاَزِمَةُ كَلَاوُد بَرْنَارْد - هُورْنَر.
- closed head s. مُتَلَاَزِمَةُ الرَأْسِ المُغْلَق. معقد الاعراض الخاصة بإصابة الرأس من دون انتقاب القحف.
- Cockayne's s. مُتَلَاَزِمَةُ كُوكَيْن. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية ويتصف بالقزامة وضمور الشبكية والصمم مع الشياخ والقمم والتخلف العقلي والحساسية للضوء.
- Collets s. (= Collet-Sicard s.) مُتَلَاَزِمَةُ كُولِه. شلل نصفي لساني حنجري بلعومي كتفي ينتج عن آفة الاعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.
- compression s. مُتَلَاَزِمَةُ الإِنْضِغَاط. صدمة مع تبؤل دموي وقلة البول بعد الانضغاط الطويل المستمر لأحد الاطراف كالذي يحدث عند سقوط بناء على المصاب.
- concussion s. مُتَلَاَزِمَةُ الإِنْجَاج. اعتلال دماغي ينتج عن رضح الرأس.
- s. of corpus striatum (= Vogt's s.) مُتَلَاَزِمَةُ الجِسْم المُخَطَّط.
- Cotard's s. مُتَلَاَزِمَةُ كُوتَارْد. زور مع ترفم الإهمال مع النزعة للانتحار واضطرابات حسية نفسية.
- Creutzfeldt-Jakob s. مُتَلَاَزِمَةُ كُروِتْزْفيلْد - جَاكُوب. انظر disease.
- cri du chat s. مُتَلَاَزِمَةُ المِوَاء. مرض وراثي خلقي يتصف بوسع الأبعاد وصغر الرأس والتخلف العقلي الشديد وصراخ شبيه بمواء القطط بسبب خبن الذراع القصير للصبغي 5.
- s. of crocodile tears مُتَلَاَزِمَةُ دُمُوع التَّمَاسِيح. تدمع تلقائي يحدث موازياً للإلعاب الطبيعي عند الأكل وهو يتلو شلل الوجهي ويظهر أنه ينتج عن ضلال بعض الالياف العصبية المتجددة التي تذهب إلى الغدد الدمعية بدلاً من الغدد اللعابية.
- Crouzon s. (= craniofacial s.) مُتَلَاَزِمَةُ كُروِزُون؛ متلازمة قحفية وجهية.
- crush s. مُتَلَاَزِمَةُ الهُزَس. ودمة وقلة البول وأعراض الفشل الكلوي الأخرى التي تتلو هرس جزء من الجسم وخصوصاً جزء كبير منه خصوصاً كتلة عضلية كبيرة.
- cubital tunnel s. مُتَلَاَزِمَةُ النُّفَق المِرْفَقِي. معقد من الاعراض التي تتولد من إصابة أو انضغاط العصب الزندي عند المرفق مع الالم والخدر على طول الناحية الزندية لليد والساعد مع ضعف اليد.

مُتَلَاَزِمَةُ كُوشِنْغ. 1. حالة تصيب **Cushing's s.** - الإناث غالباً تنتج عن فرط الغدية القشرية لقشرة الكظر بسبب أورامها وقد تنتج عن أورام النخامية الغدية أو عن كثرة استعمال القشرانيات السكرية لأسباب علاجية 2. أعراض تتولد في أورام الزاوية المخيخية الجسرية والأورام السمعية وتؤدي إلى سماع الأصوات الشخصاني وتردي السمع والرنح الدماغي على نفس الجهة وأخيراً خلل وظائف العصبين السادس والسابع على نفس الجهة مع ارتفاع ضغط داخل القحف.

مُتَلَاَزِمَةُ سِيَرِيَاكْس. متلازمة تنتج **Cyriax's s.** - عن أنزلاق غضاريف الاضلاع التي تضغط على الأعصاب عند المفصل بين الغضاريف مما يسبب ألماً في منطقة الغضروف ينتشر إلى المنكب والذراع أو بالمشية بالذبحة الصدرية.

مُتَلَاَزِمَةُ دَاكُوسْتَا. وهن عصبي **Da Costa's s.** - دوراني.

مُتَلَاَزِمَةُ دَانْدِي - وُوكِر. **Dandy-Walker s.** - موه الرأس الخلفي بسبب انسداد ثقبتي ماجندي ولوشكا.

مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين. 1. متلازمة **Dejerine's s.** - اضطرابات القشرة الحسية تتصف بضعف التمييز الحسي (عمه التجسيم) وضعف معرفة حسن الضغط 2. الآفات البصلية العلوية التي تولد شلل العصب الثاني عشر على نفس جهته والفالج (الشلل النصفي) على الجهة المعاكسة. وتولد الآفات في القسم السفلي من البصلة شلل الحنجرة وشرع الحنك (الحفّاف) 3. أعراض التهاب الجذور أي انتشار حس الألم والعيوب الحسية والحركية في منطقة توزيع الجذور أو الشدقات وليس على طول مجرى العصب المحيطي 4. متلازمة تشبه التابس الظهري مع ضعف الحس العميق ويبقى حس اللمس سليماً، وتنتج عن آفة الياف الجذور الطويلة في العمود الخلفي.

مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين كلُومْبَكَة. **Dejerine- Klumpke s. (= Klumpke's paralysis)**

مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين رُوسِي. المتلازمة المهادية **s. of Dejerine- Roussy (= thalamic s.)**

مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين **Dejerine-Scottas s.** - سكوتاز. اعتلال عصبي خلالي ضخامي متروّ.

مُتَلَاَزِمَةُ دِي لَانْغَة. متلازمة **de Lange's s.**

خلقية يترافق فيها التخلف العقلي الشديد مع شواذ عديدة تشمل القزامة وقصر الرأس وتوضع الأذن السفلي ووتر الرقبة وتشوه الفم المصيب وانخساف جسر الأنف مع انثناء قمته للأعلى وتكون المناخر متجهة للأمام وحواجب كثة وملتقبة عند خط الوسط وشعر خشن وغير منتظم ينمو إلى الأسفل على الجبين وإلى الرقبة مع يد مسطحة ذات أصابع مستدقة تدريجياً.

مُتَلَاَزِمَةُ دِنِي - مَارْفَان. **Dennie - Marfan s.** - شلل تشنجي وتخلف عقلي يترافق مع الزهري الخلقي.

مُتَلَاَزِمَةُ دِي **De Sanctis Cacchione s.** - **سَانِكْتِس كاشيُون.** متلازمة وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تتكون من جفاف الجلد المنصبغ والمرتافق مع التخلف العقلي وتخلف النمو ونقص تنسج الغدد التناسلية وأحياناً مع مضاعفات عصبية وحساسية للضوء.

مُتَلَاَزِمَةُ الدِّمَاغِ الدِّينِي. **diencephalic s.** - عدم المقدرة على البقاء حياً مع الهزال الشديد وأحياناً مع تخلف الالتئام.

مُتَلَاَزِمَةُ دَاون: ثلاثية الصبغي 21. **Down's s.** - اضطراب صبغي يتصف بجمجمة صغيرة مسطحة أمامية خلفية وجسر أنف مسطح وطيبة غضنية وسلاحيات قصيرة واتساع المسافة بين إبهام اليد والقدم وسبابتها مع تخلف عقلي شديد أو معتدل ويصاب المريض بداء الزهايمر في العقد الرابع أو الخامس من عمره.

Duchenne-Erb s. (= Duchenne- Erb disease) **مُتَلَاَزِمَةُ دُوشِين إِرْب.**

مُتَلَاَزِمَةُ دُوبرِيَة: **Dupré's s. (= meningism)** - التشنج السحائي المنشأ

مُتَلَاَزِمَةُ دَايك - دَاڤِيدُوف. **Dyke- Davidoff s.** - متلازمة يحتمل أن تنتج عن إصابة شديدة أو مرض شديد يصيب إحدى جهتي الدماغ خلال الفترة الوليدية وتتصف بالتخلف العقلي وعدم تناظر الوجه ومختلف درجات الشلل النصفي (الفالج) وتردي الوظائف العصبية في الجهة المقابلة للإصابة مع ضمورها.

مُتَلَاَزِمَةُ **dysmnestic s. (= amnesic s.)** - **نَسَاوِيَّة:** متلازمة خلل الذاكرة.

مُتَلَاَزِمَةُ إِيْتِن - لَامْبَرْت. **Eaton- Lambert s.** - متلازمة شبيهة بالوهن العضلي الذي يصيب عضلات

الأطراف ولا تصاب فيه عضلات العين. كما يظهر نقص في جهد الفعل فيها عند تنبيه أعصابها ولكنه يعزز عند تنبيهها المتكرر وهو يترافق عادة مع سرطان الرئة الشوفاني الخلايا.

- effort s. (= neurocirculatory asthenia)

مُتَلَاَزِمَةُ الجُهد. وهن عصبي دوراني.

- empty sella s.

مُتَلَاَزِمَةُ السَّرْجِ الفَارِغ.

متلازمة تشخص بالأسفة وتنصف بحاجز أثري للسرج ويكون السرج التركي امتداداً للحيز تحت العنكبوتية ويمتلا بالسائل الدماغي النخاعي وتبدو الحفرة النخامية خالية بالرغم من وجود الغدة النخامية فيه بشكل مسطح وقد يكون إفرازها سوياً أو مفرطاً أو ناقصاً.

- encephalotrigeminal vascular s.

المُتَلَاَزِمَةُ الوَعَائِيَّةُ الدِّمَاغِيَّةُ الثَّلَاثِيَّةُ التَّوَائِم. ترافق الأورام الوعائية المتعددة في الدماغ والوحمات الوعائية في منطقة انتشار العصب ثلاثي التوائم.

- epiphyseal s.

المُتَلَاَزِمَةُ المشاشية. التطور

المبكر للأعضاء التناسلية الظاهرة وللوظائف الجنسية والتنامي المبكر الشاذ للعظام الطويلة وظهور علامات موه الدماغ في غياب كل الأعراض الحركية والحسية الأخرى مما يدل على آفة الجسم الصنوبري.

- Erb's s.

مُتَلَاَزِمَةُ إِرَب. مجموعة علامات

الوهن العضلي الوبيل.

- extrapyramidal s.

مُتَلَاَزِمَةُ خَارِجِ الهَرَمِيَّة.

أي من مجموع الاضطرابات السريرية التي تنصف بحركات لا إرادية شاذة والتي تشمل الباركنسونية والكنع والرقص.

- floppy infant s.

مُتَلَاَزِمَةُ الطِّفْلِ الرِّخْو.

اعتلال عضلي خلقي في الأطفال يتصف سريرياً بنقص التوتر وضعف العضلات. وتشمل التغيرات المرضية في العضلات الهيكلية وجود العديد من البلورات الحمضية (اليوزينية) في داخل الخلايا مع شكلياء بلورية مميزة وتشدد ليفي عضلي وبلورات هيولية عضلية وتوسع شريط Z فيها.

- Foster- Kennedy s. (= Kennedy's s.)

مُتَلَاَزِمَةُ فُوسْتَر كَنَدِي.

- Foville's s.

مُتَلَاَزِمَةُ فُوِيل. متلازمة تشبه

متلازمة ميلارد - غوبلر ما عدا وجود شلل إضافي لحركات العين للداخل بالإضافة لشلل حركاتها للخارج.

- fragile X s.

متلازمة أْكْس الهَشِّ.

مرتبطة بالصبغي أكس بوجود موقع هش على ذراعه الطويل عند الموقع 27-28، ويترافق مع التخلف العقلي وضخامة الخصيتين وارتفاع الجبهة وضخامة الفك السفلي وطول الأذنين في معظم الذكور المصابين مع تخلف عقلي بسيط في معظم الإناث متبايني الزيجوت، وقد ينجو بعض الذكور في بعض العائلات من هذه المتلازمة الوبائية.

- Frey's s. (= auriculotemporal s.)

فري؛ المتلازمة الأذنية الصدغية.

- Froin's s.

مُتَلَاَزِمَةُ فَرْوَان. حالة في السائل

النخاعي القطني تنصف بتلونه بلون أصفر شفاف صافي (اصفرار) مع وجود كمية كبيرة من البروتين فيه، وهو سريع التخرر مع عدم وجود زيادة في عدد الكريات فيه. وهو يشاهد في بعض الأمراض العصبية العضوية التي ينقطع فيها اتصال السائل النخاعي القطني مع السائل في البطينات.

- frontal lobe s.

مُتَلَاَزِمَةُ الفَصِّ الجَبْهِي.

الظواهر السريرية التي تتولد من آفة في أحد الفصين الجبهيين فقد تؤدي آفة القشرة الحركية إلى صرع جاكسوني أو خزل شقي أو فالج (شلل شقي) في الجهة المقابلة. أما الآفة التي تقع أمام المنطقة الحركية فإنها تؤدي إلى النسابة والضمور وضعف التركيز والانتباه مع الهيجوية والتصرف غير المناسب وقلة الكبت وإذا ما أصيبت الجهة السائدة فإنها تؤدي أيضاً إلى حبسة بروكا. وإذا ما أصيبت الباحة الجبهية البصرية فيؤدي ذلك إلى انحراف العين إلى الجهة المعاكسة. كما قد يحدث رنح جبهي وتعدُّر الأداء وخشام بجهة واحدة مع بعض الاضطرابات الشرطية والمستقلية وكل ذلك يعتمد على منطقة الفص الجبهي المصابة.

- Ganser's s.

مُتَلَاَزِمَةُ غَانْسَر. إعطاء أجوبة

تقريبية أو غير صحيحة تماماً للأئلة في حالات النسابة والتوهان واضطرابات الإدراك والشراد والانقلاب.

- Gelineau's s. (= narcolepsy)

غِيلِينَاو. نوم انتبائي، أو سبخ.

- gender dysphonia s.

مُتَلَاَزِمَةُ قَلَقِ الجِنْس. مجموعة من المشاكل النفسية التي ترافق مع التناقض بين تعيين الجنس العضوي وشخصية الجنس النفسية.

- general adaptation s.** مُتَلَاذِمَةُ الْقَلَاؤُمِ
الْعَامِّ. مجموع الاستجابات الجهازية اللائوعية المنظمة للجسم عند التعرض الطويل للكره المزمن.
- Gerstmann's s.** مُتَلَاذِمَةُ غَرَسْتَمَان. مجموعة
عمه الأصابع وتوهان اليمين واليسار وتعذر الحساب
وتعذر الكتابة وغالباً تعذر الاداء البناهي بسبب آفة في
التلفيف الزاوي لنصف كرة المخ السائد.
- Gilles de la Tourette's s.** مُتَلَاذِمَةُ غِيلَّةِ دِي
لَا تُوْرِيْت. متلازمة عرة وجهية وصوتية تبدأ في
الطفولة وتتطور إلى حركات نفصية في أي قسم من
أقسام الجسم مع صداء لفظي وبذاء وقد كان المعتقد
بأنه مرض سيء الإنذار ولكنه وجد اليوم بأنه
يستجيب للمعالجة بالبيوثيروفينون.
- Gower's s. (= vasovagal attack)** مُتَلَاذِمَةُ
كَأَوْر. نوبة وعائية مبهمية.
- Gradenigo's s.** مُتَلَاذِمَةُ غَرَادِينِيْكَو. شلل
العصب السادس وصداع شقي في مرض الأذن
الوسطى التقيحي ينتج عن إصابة العصبين المبعد
وثلاثي التوائم لانتشار العدوى المباشر إليهما.
- gray spinal s.** مُتَلَاذِمَةُ سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاع.
ضمور عضلي واضطراب حسي تكهفي نخاعي وحركي
وعائي بسبب آفة المادة السنجابية للنخاع الشوكي.
- Guillan- Barré s. (= acute febrile polyneuritis)** مُتَلَاذِمَةُ غِيلَان - بَارِيه.
التهاب الاعصاب الحموي الحاد.
- gustatory s. (= auriculotemporal s.)** مُتَلَاذِمَةُ ذَوْقِيَّة.
مُتَلَاذِمَةُ حَكِيم. موه الرأس
إسوي الضغط.
- Hallervorden- Spatz s.** مُتَلَاذِمَةُ
هَالِرْفُورْدِن - سِبَاتَز. اضطراب وراثي يتصف بنقص
شديد في عدد الاغداد المياليينية للكرة الشاحبة والمادة
السوداء مع تراكم صباغ الحديد وحمل مترقي يبدأ في
الساقين وحركات رقصية كنعية والرتة (عسر التلطف)
وتردد عقلي مترقي. وهو ينتقل كصفة جسدية متنحية
ويبدأ عادة في العقد الاول أو الثاني من العمر وينتهي
بالموت قبل سن الثلاثين.
- hand- shoulder s.** مُتَلَاذِمَةُ الْيَد - الْكَتِف.
حتل ودي انعكاسي في الطرف العلوي. انظر hand-
shoulder dystrophy
- Heidenhain's s.** مُتَلَاذِمَةُ هَيْدِنْهَيْنَز. مرض
يتطور بسرعة كبيرة ويظهر كعمى قشري وخرف قبل
الشيخوخي والرتة (عسر التلطف) والرنح والحركات
الكنعية والصمل العام.
- Hoffmann-Werdnig s. (= Werdnig-Hoffmann)** مُتَلَاذِمَةُ هُوفْمَان - فِرْدِنْغ.
- Holmes- Adie s. (= Adie's s.) مُتَلَاذِمَةُ
هُولْمَز - أَدِي.
- Homen's s. (= postconcussional s.)**
المتلازمة التالية للارتجاج؛ مُتَلَاذِمَةُ هُومِن. مرض
يتصف بالدوار والرنح والرتة (عسر التلطف) والخرف
المتزايد تدريجياً مع صمل الجسم وخاصة الساقين
ويتولد من الرضح المتتالي للرأس كالذي يحدث
للملاكمين.
- Horner's s. (= Horner- Bernard s.)** مُتَلَاذِمَةُ هُورْنَر.
انكماش العين وغزورها وتدلي
الجفن العلوي وارتفاع الجفن السفلي الجزئي وتضيق
الشق الجفني وعدم التعرق واحمرار الجهة المصابة
من الوجه والذي ينتج عن شلل الاعصاب الودية
الرقبية.
- Horton's s.** متلازمة هُورْتَن. 1. ألم الاعصاب
الشقيقي 2. التهاب الشريان الصدغي.
- Hunt's. (= Ramsay-Hunt s.)** مُتَلَاذِمَةُ هُنْت.
- Hutchinson- Gilford s. (= progeria) مُتَلَاذِمَةُ هِتْشَنْسُون - غِلْفُورْد؛ شياخ.
- hyperabduction s.** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ التَّبَعِيد.
متلازمة مخرج الصدر التي تسبب انضغاط جذور جذع
الضفيرة العضدية والواعية الإبطية بالعضلة الصدرية
الصفيرة والناتئ الغرابي عند تمديد الذراع فوق
الرأس كما يحصل أثناء النوم مثلاً.
- hyperactive child s.** مُتَلَاذِمَةُ الطِّفْلِ مُفْرِط
النشاط. اضطراب نقص الانتباه عند الطفل مفرط
الفعالية.
- hyperkinetic s. (= hyperactive child s.)** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ الْحَرَكَةِ.
- hypertelorism- hypospadias s. (= Oplitz s.)** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ التَّبَاعَد - مَبَالِ تَحْتَانِي.
متلازمة وراثية سائدة مع فتوق وتنصف في الذكور
بمبال تحتاني واختفاء الخصية وانشقاق الصفن مع
عيوب قلبية وتشوهات قصبية مريئية وعدم انفتاح

الشرج وعيوب كلوية وفرط تنسج الرئة وتضييق الشق الجفني.

hypothalamic s. - **مُتَلَاَزِمَةٌ وَطَائِيَّةٌ**. أي من الأمراض أو المتلازمات العديدة التي تنتج عن آفة الوطاء وسبله الصادرة وتتصف باضطرابات النوم والقهم والهزال أو فرط الشهية واضطرابات تنظيم درجات حرارة الجسم والعيوب التنفسية والقلبية الوعائية واضطرابات الاستقلاب الرئيسية مثل الدراق الجحوظي والبولية التفهة أو البيلة السكرية وشذوذ النمو مثل القزامة. كما تحصل اضطرابات جنسية ونفسية وفكرية وعاطفية وذاكرية.

hypothalamic commissural s. - **مُتَلَاَزِمَةٌ وَطَائِيَّةٌ صَوَائِيَّةٌ**. متلازمة تتولد من إصابة في منطقة بين المهاد والدماغ المتوسط، وهي تشمل فقدان الحس العميق في أحد الأطراف وخزل شقي في الجهة المقابلة مع عمى شقي مماثل وحركات رقصية كتعية وعيوب مخيخية بجهة واحدة.

inferior s. of red nucleus (= Claude's s.) - **الْمُتَلَاَزِمَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْفَوَاةِ الْحُمْرَاءِ**.

Jakson's s. - **مُتَلَاَزِمَةٌ جَاكْسُون**. شلل الاعصاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر القحفية مع شلل الحفّاف (شراع الحنك) والحنجرة ونصف اللسان والعضلتين القصية الخشائية وشبه المنحرفة.

jaw-winking s. (= Gunn's s.) - **مُتَلَاَزِمَةُ رَفَّة**. تدلي الجفن على جهة واحدة مع ترافق حركات الجفن المصاحب مع حركات الفك السفلي.

Jugular foramen s. (= Vernet's s.) - **مُتَلَاَزِمَةُ الْفُجَّةِ الْوَدَاجِيَّةِ**.

Kearns-Sayre s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كِيرْنِس - سَايِر**. شلل عيني مترقي مع تنكس الشبكية الصباغي والاعتلال العضلي والرنح وغيب التوصيل القلبي، وهو مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويبدأ قبل سن الخامسة عشر.

Kennedy's s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كَنْدِي**. التهاب العصب البصري خلف العقلة والعنمة المركزية والضمور البصري على جهة الآفة ووذمة الحليمة البصرية على الجهة المعاكسة ويحدث ذلك في أورام الفص الجبهي التي تضغط الأسفل.

Kiloh-Nevin s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كِيلُو - نِين**. اعتلال

عضلي عيني مع تدلي الجفن وشلل العين الخارجي المترقي.

Klinsbourne s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كِلِنْزْبُورْن**. اعتلال دماغي رمعي عضلي في الأطفال.

Klein-Levin s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كَلَايْن - لِيْفِن**. فترات عارضة من النوم المفرط وكثرة الأكل تدوم لعدة أسابيع وعادة ما تحدث في الأولاد البالغين.

Klippel-Feil s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كَلِيل - فَايِل**. حالة تتصف بقصر الرقبة لسبب نقص عدد الفقرات الرقبية أو اندغام عدد من أنصاف الفقرات بكتلة عظمية واحدة مما يحدد حركة الرقبة مع انخفاض خط الشعر عليها.

Klumpke-Dejerine s. (= klumpke's paralysis) - **مُتَلَاَزِمَةُ كُلُومْبَكَة - دِيْجِيرِين**: شلل كلومبكية.

klüber-Bucy s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كُلْفَر - بُوْسِي**. اضطرابات سلوكية غريبة تظهر في القرود بعد استئصال الفصين الصدغيين التجريبي الذي يتلف بنيات حوفية مهمة. كما يمكن أن تحدث المتلازمة في الإنسان بسبب إصابة قاعدة الدماغ بالرضح الذي يخرب السطح السفلي للفصين الصدغيين. وتتصف المتلازمة برغبة المريض بفحص الأشياء بواسطة الفم وضعف الإرادة والانفعالات العاطفية وفرط التحول وضعف الكبت الجنسي.

Korsakoff's s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كُورْسَاكُوف**. متلازمة فقد الذاكرة السابقة واللاحقة مع تخريف يترافق مع التهاب الاعصاب الكحولي أو اللاكحولي وتوصف هذه المتلازمة ضمن متلازمة فقد الذاكرة وقد تنتج عن عوز الثيامين.

Krause's s. - **مُتَلَاَزِمَةُ كِرَاوُزَة**. خلل التنسج في الشبكية والدماغ الذي يشاهد في الولدان الخدج عدة أشهر بعد ولادتهم ويتصف بسوء تكون المشيمية والشبكية والعصب البصري والعمى المحتمل والساد والزرق والثلامة وصغر العين ويشمل سوء التنسج الدماغي أو عدم تنسجه أو فرط تنسجه أو ضخامته مع موه الدماغ وصغر الرأس والتخلف العقلي.

Kugelberg-Welander s. (= juvenile familial muscular atrophy) - **مُتَلَاَزِمَةُ كُوكُلْبِيرْغ - فِلَانْدَر**. الضمور العضلي الحداثي العائلي.

Landry's s. (= acute febrile polyneuritis) - **مُتَلَاَزِمَةُ لَانْدْرِي**. التهاب الاعصاب الحموي الحاد.

- **Laurence- Moon s.** مُتَلَاَزِمَةُ لَوْرَنْس - مُون. اضطراب جسدي متنحٍ يتصف بالتخلف العقلي والاعتلال الشبكي الانصبغي وقصور الغدد التناسلية والشلل النصفي التشنجي.
- **Launois s.** مُتَلَاَزِمَةُ لُونُوَا. عملقة بسبب فرط إفراز الغدة النخامية تظهر قبل البلوغ وقبل التحام المشاشات.
- **Leigh s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِي. اعتلال دماغي نخاعي.
- **Lennox s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِينُوَكْس. اعتلال دماغي سرعي طفولي يتصف بظهور موجات وتدبة بطيئة منتشرة في المخطط الكهربائي لدماغ الاطفال المصابين
- **Lermoyez's s.** متلازمة ليرموياز. طنين وفقدان السمع اللذان يسبقان نوبة الدوار ثم يختفيان بعد ظهور الدوار ودوامه.
- **Lesch-Nyhan s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِيَش - نِيَهَان. اضطراب نادر مرتبط بالصيفي أكس لاستقلاب البورين يتصف بالتخلف الجسدي والعقلي والخلل الدماغي التشنجي واضطراب الوظائف الكلوية.
- **levator s.** مُتَلَاَزِمَةُ الرَّافِعَةِ. ألم عارض مع الشعور بالامتلاء والضغط في المستقيم والمنطقة العجزية العصبية بسبب تشنج العضلة رافعة الشرج.
- **Leyden-Moebius s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِيدِن - مُوبِيُو. حثل عضلي في حزام الذراع. انظر limb girdle muscular dystrophy
- **Lichtheim's s. (= subacute combined degeneration of the spinal cord)** مُتَلَاَزِمَةُ لِخْتِهَيْم. انظر degeneration.
- **«locked in» s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْمُنْحَبِس. حالة الشلل التام ما عدا بعض أنواع حركات العين الإرادية بسبب آفة الطرق الحركية للأعصاب القحفية السفلية والأعصاب الحركية للأطراف بالجهتين.
- **Louis Bar s. (= ataxia- telangiectasia)** مُتَلَاَزِمَةُ لُويس بَار. متلازمة توسع الشعيرات الرنحي.
- **lower radicular s. (= Klumpke's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الْجَذُورِ السُّفْلِيَّة.
- **Lowe's s. (= oculocerebrorenal s.)** مُتَلَاَزِمَةُ لُفِي: المتلازمة العينية المخية الكلوية.
- **Mackenzie's s. (= Jakison's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ مَكَنْزِي.
- **manic s. (= manic episode)** مُتَلَاَزِمَةُ هُوسِيَّة: نوبة هُوسية.
- **maternal deprivation s.** مُتَلَاَزِمَةُ جُزْمَان. تأخر النمو وسلوك انطوائي وتخلف عقلي ينتج عن الحرمان من الأم أو عن الأمومة المحبة.
- **Menier's s. (= Menier's disease)** مُتَلَاَزِمَةُ مَنِيِير.
- **Millard-Gubler s.** مُتَلَاَزِمَةُ مِيلَارْد - غُوبِلَر. شلل متصالب يصيب إحدى جهتي الجسم ونصف الوجه على الجهة المعاكسة مع شلل حركة العين للخارج وينتج ذلك عن احتشاء الجسر الذي يصيب العصبين القحفيين السادس والسابع والياف السبيل القشري النخاعي.
- **Mobius's s.** متلازمة موبْيوس. عدم تكون أو عدم تنسج النوى الحركية للأعصاب القحفية والذي يتصف بشلل الوجه الخلقي بالجانبين بمختلف الصور مع شلل مبعده العين على جهة واحدة أو على الجهتين والذي يترافق أحياناً مع إصابة بعض الأعصاب القحفية الأخرى خصوصاً محرك العين وثلاثي التوائم وتحت اللساني مع تشوهات الأطراف.
- **Monakow's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُونَاكُوف. فالج (شلل شقي) على الجهة المعاكسة على آفة انسداد الشريان المشيمي الأمامي والذي يترافق أحياناً مع الخدر الشقي والعمى الشقي.
- **Moore's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُور. صرع بطني.
- **Morquio's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُورْكِيُو. مرض كيميائي حيوي يتصف بطرح سلفات الكريتان بالبول ويؤثر المرض سريرياً في البداية على العضلات الهيكلية وثم على الجهاز العصبي ومن أعراضه قصر الرقبة والجذع وسحنة واسعة الفم مع صمم مترق وتغيم القرنية الجزئي ومن دون تأثير على ذكاء المريض أو على قواه العقلية.
- **Morvan's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُورفَان. 1. تكهف النخاع 2. أعراض تكهف النخاع مع تثخن النسيج تحت الجلدي للبدن التي تصبح وذمية ولينة ومتورمة

وزراقية وباردة مع تفرح غير مؤلم لنهايات الاصابع ومذل وضمور الساعدين واليدين.

- myasthenia gravis s. (= Erb's s.)

مُتَلَاَزِمَةُ الْوَهْنِ الْعَضَلِيِّ الْوَيْبِل.

- neocerebellar s. **مُتَلَاَزِمَةُ الْمُخَيِّخِ الْحَدِيث.** مجموعة من المظاهر تنتج عن آفات نصف كرة المخيخ التي تشمل نقص التوتر واندفاع جانبي نحو جهة الإصابة وعدم التناسق الحركي وخلل القياس والرعاش القصدي وخصوصاً في الذراعين وقد تظهر في الساقين أيضاً. وتزداد هذه الاضطرابات سوءاً عندما تصيب الآفة النواة المسننة أيضاً.

- neuroleptic malignant s. **الْمُتَلَاَزِمَةُ الْوَيْبِلَةُ.** لِمُضَادَّاتِ الدُّهَانِ. رد فعل نادر وأحياناً مميت لبعض مضادات الدهان والذي يتصف بارتفاع درجة الحرارة والصلل والسبات (الغيبوبة).

- Nonne's s. (= hereditary cerebellar ataxia) **مُتَلَاَزِمَةُ نُونَة.** رنح مخيخي وراثي.

- Nothnagel's s. **مُتَلَاَزِمَةُ نُوثْنَايَجِل.** شلل محرك العين على جهة واحدة مع رنح مخيخي يحدث في آفات السويقتين المخيخيتين.

- oculocerebrorenal s. **مُتَلَاَزِمَةُ عَيْنِيَّة.** بِمَآغِيَّةٍ كَلَوِيَّةٍ. اضطراب مرتبط بالصبغي اكس يتصف برخد فيتامين D المستعصي على المعالجة وموه العين والزرق الخلقي والساد والتخلف العقلي وسوء وظيفة إعادة الامتصاص الكبيبي مما يؤدي إلى نقص الفسفورتيمة والحمض وبيلة الحمض الاميني.

- oral-facial-digital s. **مُتَلَاَزِمَةُ قَمَوِيَّة - وَجْهِيَّة - إصْبَعِيَّة.** مجموعة اضطرابات وراثية تنتقل كصفات جسمية متنحية وتؤدي إلى تشوهات الاصابع وعيوب قحفية ووجهية ولسانية وسنية وتخلف عقلي ورعاش عائلي والحاصة والمث الوجهيين.

- organic anxiety s. **مُتَلَاَزِمَةُ الْقَلْقِ الْعُضْوِي.** متلازمة عقلية عضوية تتصف بنوبات هلع شديدة معاودة أو قلق عام ينتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان، ومن اسبابها الاضطرابات الصماوية كفرط الدرقية وورم القواتم وقلة سكر الدم وفرط الكورتيزول أو استعمال الادوية المؤثرة نفسياً.

- organic brain s. (= organic mental s.) **مُتَلَاَزِمَةُ الدُّمَاغِ الْعُضْوِيَّة.**

- organic delusional s. **مُتَلَاَزِمَةُ الْوُهَامِ**

الْعُضْوِي. متلازمة دماغية عضوية تتصف بالوهام الذي ينتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان ومن المواد المسببة لها الامفيتامين والقنب والمهلسات والامراض العضوية كصرع الفص الصدغي ورضح الرأس أو آفات الدماغ أو رقص هنتنغتون. وتسمى المتلازمات التي تولدها الادوية اضطرابات فيقال مثلاً اضطراب التوهم الكتابسي.

- organic mental s. **الْمُتَلَاَزِمَةُ النَّفْسِيَّةُ الْعُضْوِيَّة.** مجموعة من الاعراض والعلامات النفسية أو السلوكية التي تترافق مع واحد أو أكثر من العوامل العضوية النوعية المسببة للأمراض النفسية وهي تشمل ست متلازمات دماغية نوعية عضوية وهي الهذيان مع الخرف ومتلازمة النساء أو الهلوسة العضوية ومتلازمة التوهم العضوي ومتلازمة المزاج العضوية ومتلازمة القلق العضوي ومتلازمة الشخصية العضوية والتسمم والانعزال، وهناك بعض المتلازمات النفسية العضوية التي لم تصنف بعد وعندما يكون السبب أحد المواد أو الادوية تسمى المتلازمة «اضطراب». فيقال اضطراب الوهام الناتج عن الحشيش أو القنب مثلاً.

- organic mood s. **مُتَلَاَزِمَةُ الْمَزَاجِ الْعُضْوِيَّة.** متلازمة دماغية عضوية تتصف بالمزاج الهوسي أو الاكتئابي وتنتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان ومن اسبابها الرئيسية العقاقير والمواد المؤثرة نفسياً مثل الريفزبين والمثيل دوبا وبعض الادوية المثيرة للهلوسة والاضطرابات الصماوية مثل متلازمة كوشينغ وداء اديسون وفرط الدرقية وفرط الدرقية والاخماج الفيروسية.

- organic personality s. **مُتَلَاَزِمَةُ الشَّخْصِيَّةِ الْعُضْوِيَّة.** متلازمة دماغية عضوية تتصف بالتغير الكبير في سلوك المصاب وشخصيته مثل التقلقل العاطفي الذي يتصف بالخمول وعدم السيطرة على الإدارة أو التفكير الزوراني ويتولد كل ذلك عن عامل عضوي ولا يرافق هذه المتلازمة أي هذيان أو خرف ومن أهم اسبابها آفة حيزية في الدماغ أو رضح الرأس أو الامراض الدماغية الوعائية.

- painful arc s. **مُتَلَاَزِمَةُ الْقَوْسِ الْوَلِيم.** ألم المنكب الذي يصيب جزءاً من القوس الذي يتكون عند تباعد الذراع من جنب الجسم إلى الوضع المرتفع العالي والذي يحدث عند التهاب اوتار العضلة فوق الشوكة.

- **paleocerebellar s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْمُخَيِّخِ الْقَدِيمِ. المتلازمة السريرية التي تترافق مع أمراض المخيخ القديم (وخاصة الدودة ونوى السقف) وتتصف بصعوبة سير المريض الذي يترنح من جهة لأخرى في سيره والذي يجد صعوبة في الوقوف أو الدوران ولكن هناك القليل أو عدم وجود أية علامات للرنح أو عدم تناسق الحركات عند فحص الأطراف بصورة مفردة.

- **paleostriatal s. (= juvenile paralysis agitans)** مُتَلَاَزِمَةُ الْجِسْمِ الْمُخَطَّطِ الْقَدِيمِ. الشلل الرعاشي اليقفي.

- **pallidal s. (= juvenile paralysis agitans)** مُتَلَاَزِمَةُ الشَّاحِبَةِ. الشلل الرعاشي الحداثي.

- **pallidomesencephalic s.** مُتَلَاَزِمَةُ الدُّمَاغِ العنوسط والكرو الشاحبة. متلازمة تتصف بالصملا وضعف الحركة وبطنها وقد تصل إلى حد حالة الباركنسونية.

- **Pancoast's s.** مُتَلَاَزِمَةُ بَانْكُوسْت. متلازمة تتصف بوجود ظل صورة شعاعية في قمة الرئة مع ألم عصبي في الذراع وضومر عضلاته وعضلات اليد ومتلازمة هورنر وتشاهد في الأورام القريبة من قمة الرئة والتي تؤثر على الضفيرة العضدية أيضاً.

- **paratrigeminal s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَطْيِرَةِ الثَّلَاثِيّ التَوَائِم. ألم عصبي انتيابي في الوجه يترافق مع شلل الودي (متلازمة هورنر).

- **Parinaud's s.** مُتَلَاَزِمَةُ بَارِيْفُو. شلل حركات العينين المترافقة للأعلى من دون شلل التقارب ويترافق ذلك مع آفات الدماغ المتوسط مثل ورم الغدة الصنوبرية.

- **parkinsonian s.** المُتَلَاَزِمَةُ الْبَارِكِنْسُونِيَّة. نوع من الباركنسونية ينتج عن التنكس المجهول السبب للجسم المخطط أو المادة السوداء وغالباً ما يحدث كعقبول لالتهاب الدماغ الوسني كما يمكن أن ينتج عن التصلب الشرياني الدماغية والسموم والزهرى العصبي والرضح. ويتصف المرض بالصملا والسحنة الجامدة (السحنة الباركنسونية) والرعاش اللاإرادي البطيء (الذي يظهر عند الراحة ولكنه يختفي أثناء النوم وعند القيام بالحركات الإرادية) وانعدام الحركات الذاتية المرافقة والمشي المهرولة والوضعية المنحنية والإلعاب.

- **Parry-Romberg s. (= facial hemiatrophy)** مُتَلَاَزِمَةُ بَارِي - رُومْبِرْغ. ضمور شقي وجهي.

- **pineal s. (= epiphyseal s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الصَّنُوبَرِيَّة.

- **postconcussional s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لِإِلْزَاج. النساوة والصداع والدوام والطنين والهبوبية والتعبية والتعرق وخفقان القلب والأرق وصعوبة التركيز وهي الأعراض التي تحدث بعد ارتجاج الدماغ.

- **posterior cord s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْخَيْلِ الْخَلْفِي. ظواهر حسية ورنحية تنتج عن آفة الحبال الخلفية للنخاع الشوكي كالرنح التحركي.

- **posterolateral s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْخَلْفِي الْوُخْشِي. حالة رنحية وتشنجية تنتج عن آفات الأقسام الخلفية الوحشية للنخاع الشوكي.

- **post-lumbar puncture s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لِلْبَزْلِ الْقَطْنِي. صداع عند الوقوف وأحياناً ألم قفوي وغثيان وقياء وتعرق غزير وفطور وهي أعراض تزول كلها عند الاستلقاء وتحدث بعد عدة ساعات من البزل القطني وتدوم لعدة أيام وهي تنتج عن انخفاض الضغط داخل القحف لتسرب السائل النخاعي الشوكي خلال إبرة البزل.

- **post-traumatic brain s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لَوُضْخِ الدُّمَاغِ. مصطلح عام يدل على كل الأعراض التي تحدث بعد إصابة الرأس.

- **prefrontal s.** مُتَلَاَزِمَةُ أَمَامِ الْجَبْهِي. مجموعة اضطرابات تنتج عن آفات الفص أمام الجبهي وتشمل قصور التنسيق الحركي وتعذر الأداء والاضطرابات النفسية (الشمق وعدم الكبت والثرثرة غير المناسبة وأحياناً الكآبة) مع انحطاط الذكاء والذاكرة وعدم المقدرة على التركيز، وقلما توجد كل هذه الاضطرابات مجتمعة مرة واحدة.

- **premotor s.** مُتَلَاَزِمَةُ أَمَامِ الْحَرَكَةِ. ترافق الفالج التنشجي مع فرط المنعكسات واضطرابات الحركات الحذقة والقبضة الشديدة والاضطراب الوعائي الحركي العابر وكلها تحدث في إصابات الباحة أمام الحركية.

- **pseudoclaudication s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْفَرْجِ الْكَاذِب. حالة تتصف بأعراض شبيهة بأعراض العرج

- المتقطع وتتولد عن انضغاط ذنب الفرس بسبب ضخامة احرف الفقرات وانزلاق القرص القطني.
- radicular s.** مُتَلَاَزِمَةٌ جَذَرِيَّة. متلازمة تتسبب عن آفات جذور الاعصاب النخاعية وتتكون من تحديد حركات العمود الفقري وآلام جذرية.
- Ramsay Hunt s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَمَزِي هَنْت. 1. هربس. 2. متلازمة يصيب الوجه والاعصاب السمعية ويترافق مع شلل وجهي على نفس الجانب وعادة ما يكون عابراً مع حويصلات هربسية في الاذن الخارجية او غشاء الطبل وقد يترافق او لا يترافق مع الطنين والدوار واضطرابات السمع 3. الشلل الرعاشي الحدسي 3. تعذر التأزر المخيخي المترقي.
- restless leg s.** مُتَلَاَزِمَةٌ تَعْلَلُ السَّاقَيْن. الإنزعاج الشديد العميق في ربلة الساق عند الجلوس أو الاستلقاء وخصوصاً قبل النوم مما تسبب الرغبة التي لا تقاوم في تحريك الساق.
- Rett s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَت. اضطراب مترقٍ يصيب المادة السنجابية للدماغ ويصيب الإناث فقط منذ الولادة. ويتصف بالسلوك التلقائي والرنج والخرف والاختلاجات وفقدان المقدرة على استعمال اليدين لأغراض نافعة مع ضمور دماغي وفقرت أمانيا الدم ونقص مستويات الحموض الامينية الضرورية.
- Rey's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رِي. داء نادر حاد ومميت أحياناً في الأطفال وغالباً ما يحدث كعقبول للحماق أو الخمج الفيروسي التنفسي العلوي ومن أعراضه القيء المتكرر مع تغيرات في الكبد والاحشاء الأخرى وله طور اعتلال دماغي يتصف بتورم الدماغ الحاد واضطرابات الوعي والنوبات التي تتلو ذلك.
- rib-tilt s.** مُتَلَاَزِمَةٌ زَوَاة الضِّلَع. اعتلال عصبي وربي ينتج عن شذوذ حركة النهايات الامامية للاضلاع السفلية.
- Riley-Day s. (= dysautonomia)** مُتَلَاَزِمَةٌ رَايِلِي - دَاي. خلل الفعل الذاتي.
- Riley-Smith s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَايِلِي - سَمِيْث. ضخامة الرأس من دون موهه والعديد من الارام الوعائية الدموية ووذمة الحليمة البصرية الكاذبة.
- rolandic vein s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْوَرِيدِ الرُّوْلَانْدِي. فالج ينتج عن اضطراب الدورة الوريدية.
- Roth's s. (= meralgia paresthetica)** مُتَلَاَزِمَةُ رُوْث: ألم الفخذ المذلي.
- Roussy-Dejerine s. (thalamic s.)** مُتَلَاَزِمَةُ رُوسِي - دِيَجِيرِين: المتلازمة المهادية.
- Roussy-Levy s.** مُتَلَاَزِمَةُ رُوسِي - لِيْفِي. اضطراب وراثي بطيء الترقى ينتقل كصفة جسدية سائدة يترافق فيه الرنج الحسي مع انعدام المنعكسات وضمور عضلات الأطراف السفلية خصوصاً العضلات الشظوية مع رعاش سكوني (رعاش الوضعة) في اليد مع قدم خمصاء وقدم مخلبية وأحياناً جنف حدابي.
- Rubinstein's s.** مُتَلَاَزِمَةُ رُوبِنْشْتَاين. حالة خلقية تنصف بخلف عقلي وحركي وأصابع غليظة وأصابع قدم كبيرة وبنية قصيرة وسحنة مميزة وتشمل الحنك العالي القوس والانف المنقاري وشذوذات عينية مختلفة وتكون الجدرات في الندبات الجراحية وثقبة عظمية واسعة وشذوذ الفقرات والقص.
- rubrospinal cerebellar peduncle s.** مُتَلَاَزِمَةُ الرُّسُوقَةِ والنَّوَاة الحَمْراء النخاعية المخيخية.
- Sanfilippo's s.** مُتَلَاَزِمَةُ سَانَ فِيلِيْبُو. أربعة أنواع من أشكال داء عديد السكريدات المخاطية المتبانية كيميائياً حيويّاً ولكن لا يمكن تفريقها سريريّاً والتي تنصف ببيلة سلفات الهباران وبالتردي العقلي السريع مع أعراض جسدية بسيطة ورأس كبير وتبدأ في سن 2-6 من العمر وتؤدي إلى الوفاة قبل سن العشرين.
- scalenus s. (= scalenus anticus s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الْأَحْمَعِيَّة. ألم فوق المنكب غالباً ما يمتد إلى الذراع (المتلازمة الرقبية العضدية) أو ينتشر إلى الأعلى خلف الرقبة وينتج عن انضغاط الاعصاب والأوعية بين الضلع الرقبى والعضلة الأخمصية الامامية وتسمى أيضاً متلازمة الضلع الرقبى.
- scapulocostal s.** المُتَلَاَزِمَةُ الْكَتِفِيَّةُ الصُّدْرِيَّة. ألم في الناحية العلوية أو الخلفية من حزام الكتف وينتشر إلى المناطق المجاورة نتيجة التغيير الطويل الأمد في العلاقة بين الكتف والجدار الظهري للصدر.
- Schafer's s.** مُتَلَاَزِمَةُ شَيْفَر. ثخن الاظفار الخلقي المترافق مع تخلف التطور الجسدي والعقلي.
- Schmidt's s.** مُتَلَاَزِمَةُ شَمِيْث. شلل في جهة واحدة يصيب الحبال الصوتية وشراع الحنك والعضلتين شبه المنحرفة والقصبة الترقوية الخشائية بسبب آفة النواتين الملتبسة والإضافية.

- **segmentary s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْقِطْعِيَّة. متلازمة تتولد من أفة المادة السنجابية للنخاع وتتصف بالضعف الشديد وضمور الشدافات العصبية.

- **shoulder-hand s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْكَتِفِ وَالْيَد. متلازمة تتصف بالَم المنكب وتيبسه مع تورم اليد والمها بنفس الجهة ويحصل ذلك أحياناً بعد احتشاء العضلة القلبية ولكنه قد يحدث لأسباب أخرى غير معروفة.

- **Shy-Drager s.** مُتَلَاَزِمَةُ شَاي - دَرَاغَر. اضطراب مترق مجهول السبب يولد عجزاً شديداً أو الموت. ويبدأ بأعراض عدم كفاءة الجهاز المستقل ويشمل العنانة (في الذكور) والإمساك والحاجة التبول أو انحباس البول وانقطاع التعرق ونقص الضغط القياسي والذي تتلوّه علامات خلل الوظائف العصبية العام مثل الاضطرابات الشبيهة بالباركنسونية وعدم التناسق الدماغي وضمور العضلات وتنكسها والرعاش الغليظ للساقين.

- **sleep apnea s.** مُتَلَاَزِمَةُ انْقِطَاعِ النَّفَسِ النَّوْمِي. أعراض توقف التنفس التي تحدث عند التحول من النوم بدون الحركات العينية السريعة إلى نوم الحركات العينية السريعة أو عند تكرار اليقظة والنعاس أثناء النهار ويحدث غالباً عند الأشخاص السمان متوسطي العمر ويعتقد أن ذلك عدة أسباب منها تقبض المجاري الهوائية بسبب تضييق التوتر العضلي أثناء نوم الحركات العينية السريعة.

- **Sly's s.** مُتَلَاَزِمَةُ سَلَاي. متلازمة تنتج عن داء عديد السكريات المخاطية وتتصف كيميائياً ببيلة سلفات الدرمانات ومن أعراضه السريرية التخلف العقلي.

- **Smith-Lemli-Opitz s.** متلازمة سميث - ليملي - أوبتز. متلازمة وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تتصف بعيوب خلقية عديدة ومنها صغر الرأس والتخلف العقلي ونقص التوتر وعدم اكتمال تطور الأعضاء التناسلية الذكرية وتشوهات الأنف وأصابع اليدين والقدمين.

- **social breakdown s.** مُتَلَاَزِمَةُ انْقِطَاعِ الْعَلَاَقَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّة. أعراض المرضى النفسيين الذين ينقطعون عن مجتمعاتهم في مستشفياتهم وهي أعراض إضافية لمرضهم العقلي وتشمل الأعراض السلبيه المفرطة وتمثيل دور المرضى المزمنين

وضمور القابلية على العمل وعلى التصرف الاجتماعي السوي.

- **Sohval-Soffer s.** مُتَلَاَزِمَةُ سُوفَال سُوفَر. متلازمة خلقية تتصف بقصور الغدد التناسلية الذكرية المترافقة مع التشوهات العضلية الفقارية والرقبية المتعددة والتخلف العقلي.

- **somnolence s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْوَسَن. حالة عابرة من النعاس والوسن والقهم (نقص الشهية) والهيجية والتغيرات في المخطط الكهربائي للدماغ ويحدث ذلك في الأطفال بعد تشيعمهم في ابيضاض الدم أو الورم اللمفي غير الهدجكن.

- **Sorsby's s.** مُتَلَاَزِمَةُ سُورْسْبِي. حالة خلقية تتصف بالثلامة البقعية بالجهتين المترافقة مع الحثل القمي لليدين والقدمين وغالباً مع قصر الاصابع خصوصاً في السلاميتين الانتهاثيتين.

- **Sotos's s. (= cerebral gigantism)** مُتَلَاَزِمَةُ سَوْتُو. العملقة الدماغية.

- **split-brain s.** مُتَلَاَزِمَةُ الدِّمَاغِ الْمُشْطُور. مجموعة أعراض تتولد عن قطع الاتصال بين نصفي كرة الدماغ.

- **Steele-Richardson-Olszewski s.** مُتَلَاَزِمَةُ سْتِيل - رِيشارْدِسُون - أولزفسكي. اضطراب عصبي مترق يبدأ خلال العقد السادس من العمر ويتصف بالشلل العيني فوق النووي وخصوصاً شلل الحملقة السفلية والشلل شبه البصلي وخلل التلفظ وصلل التوتر المختل في الرقبة والجذع والخرف.

- **Steinbrocker's s. (= shoulder-hand s.)** مُتَلَاَزِمَةُ شَتَاينْبِرُوكَر. متلازمة الكتف - اليد.

- **stiff-man s.** مُتَلَاَزِمَةُ الرَّجُلِ الْمُتَيَّبِس. حالة مجهولة السبب تتصف بصمل متذبذب مترق للعضلات المحورية والظرافية في حالة غياب أي مرض دماغي أو نخاعي ولكن مع فعالية كهربائية عضلية مستمرة.

- **stroke s.** مُتَلَاَزِمَةُ السَّكْتَةِ. حالة تبدأ ببدائية مفاجئة تتسبب عن آفات الدماغ الوعائية مثل النزف أو الانصمام أو الخثار أو انفجار أم الدم وتبدأ الحالة كفالج أو خزل شقي والدوار والتأمل والحيرة والرتة وعادة ما يتبع ذلك تلف عصبي دائم.

- **Sturge-Weber s.** مُتَلَاَزِمَةُ سْتِرْج - وَيِير. متلازمة خلقية مجهولة السبب تتكون من باحات من الوحات الحلورية اللون منتشرة فوق منطقة العصب

الثلاثي التوائم مترافقة مع اضطراب وعائي في السحايا الكائنة تحتها وعلى قشرة المخ وهي عادة ما تحدث بجهة واحدة.

subclavian steal s. مُتَلَاَزِمَةٌ سَرِقَةٍ تَحْتَ التَّرْقُوة. إقفار دماغي أو جذعي دماغي ينتج عن انحراف جريان الدم من الشريان القاعدي إلى الشريان تحت الترقوي عند وجود مرض انسداد في الجزء العلوي من الشريان تحت الترقوي.

tarsal tunnel s. مُتَلَاَزِمَةُ النَّفَقِ الرَّصْفِيِّ. مجموعة من الاعراض التي تتولد من انضغاط العصب الظنبوبي الخلفي أو الاعصاب الاخصية في النفق الرصفي الذي يولد الالم والتئمل والمذل النخري في اخمص القدم.

tegmental s. المُتَلَاَزِمَةُ السَّقِيفِيَّة. فالج يترافق مع حركات عينية مضطربة ورنح يتولد عن آفة السقيفة والنواة الحمراء والسبيل القشري النخاعي.

temporomandibular s. المُتَلَاَزِمَةُ الصَّدْغِيَّة. صمم جزئي مع حس انسداد الاذن والطنين وقرقعة المفصل الصدغي الفكي السفلي وصداغ وحراق والم في الاذن والبلعوم والانف واللسان.

tethered cord s. مُتَلَاَزِمَةُ الْحَبْلِ الْمُطْوَل. شذوذ خلقي يتصف بعخروط نخاعي واطيء شاذ مطول باحد أشكال الشذوذ داخل الجافية مثل خيط انتهائي قصير وسميك أو اشربة ليفية أو التصاقات أو ورم شحمي داخل الجافية.

thalamic s. (= thalamic pain s.) المُتَلَاَزِمَةُ المِهادِيَّة. مجموعة من الاعراض التالية 1. خدر نصفي سطحي مستقيم 2. فالج معتدل 3. رنح شقي معتدل وعمة التجسيم التام تقريباً 4. ألم شديد ومستديم في الجهة المشلولة 5. حركات رقضية كنعانية في الاقسام المشلولة.

Thiele's s. مُتَلَاَزِمَةُ تَيْلَة. ألم وإيلام في منطقة القسم السفلي من العجز والعصعص أو في الانسجة الرخوة والعضلات المجاورة لهما.

thoracic outlet s. مُتَلَاَزِمَةُ مَخْرَجِ الصَّدْر. انضغاط الجذوع العصبية للضفيرة العضدية الذي يتصف بالذراع ومذل الاصابع وباعراض حركية وعائية (الشحوب وزراق النهايات وأعراض رينو الثانوية..الخ) مع ضعف وضمور العضلات الصغيرة لليد. ومن الممكن أن تنتج عن سقوط حزام الكتف أو

الضلع الرقبي أو اليد الليفية أو الضلع الاول الشاذ أو فرط تباعد الذراع المستمر أو انضغاط حافة العضلة الاخصية الامامية.

trisomy 8 s. مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 8. متلازمة تترافق مع وجود صبغي 8 إضافي ويتصف بتخلف عقلي بسيط إلى شديد مع بروز الجبهة وانخساف العينين وثخن الشفاه وبروز الاذن.

trisomy 13 s. مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 13. زيغ صبغي يسبب فيه صبغي 13 الاضافي عيوباً في الجهاز العصبي المركزي وتخلفاً عقلياً مع قلع الحنك والشفة والعنث (زيادة الاضابع) وعيوباً جلدية وشذوذات في القلب والاحشاء والاعضاء التناسلية.

trisomy 18 s. مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 18. حالة تتصف بالتخلف العقلي والراس الزورقي وشواذ القحف الاخرى وعيوب الراس والاحشاء وتنتج عن وجود صبغي 18 إضافي.

trisomy 22 s. مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 22. متلازمة تتولد عن وجود صبغي 22 إضافي وتتصف بتخلف عقلي وتنموي وصغر الراس وتشوه الاذن ومرض قلبي خلقي وفي الذكور يكون القضيب صغيراً مع عدم نزول الخصيتين.

vagoaccessory s. (= Schmidt's s.) مُتَلَاَزِمَةُ المُبْهَمِ والإِضَافِي. متلازمة شميت.

Vernet's s. مُتَلَاَزِمَةُ فِرْنَة. شلل الاعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر بسبب آفة في منطقة الثقب الوداجية وتتصف بشلل المضيق العلوية للبلعوم وصعوبة بلع المواد الصلبة وشلل شراع الحنك (الحقاف) والحنك مع خدر هذه الاقسام والبلعوم وفقدان الذوق في الثلث الخلفي من اللسان وشلل الحبال الصوتية وخدر الحنجرة وشلل العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة. وتسمى أيضاً متلازمة الثقب الوداجية.

Villaret's s. مُتَلَاَزِمَةُ فِيلَارِيَّة. شلل الاعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر وأحياناً السابع على جهة واحدة بسبب آفة في الحيز خلف النكفية ويتصف بشلل التضيق البلعومي العلوي وصعوبة بلع المواد الصلبة وشلل الحقاف (شراع الحنك) والحنك مع خدر كل هذه الاقسام والبلعوم وفقدان الذوق في الثلث الخلفي من اللسان وشلل الحبال الصوتية وخدر الحنجرة وشلل العضلتين القصية الترقوية الخشائية والاعصاب الودية الرقبية (متلازمة هورنر).

- Volkman's s. مُتَلَاَزِمَةُ فُولْكَمَان. فرط التوتر العضلي التالي للرضح والتهاب الاعصاب التنكسي.

- Wallenberg's s. مُتَلَاَزِمَةُ فَالِنْبِرْغ. متلازمة تنتج عن انسداد الشريان الفقري وأحياناً قليلة فرعه الشريان المخيخي السفلي العلوي الخلفي وتتصف بفقدان حسي الألم والحرارة على نفس الجهة من الوجه وعلى الجهة المعاكسة من الأطراف والجذع مع رنج بنفس الجهة ومع صعوبة البلع والرتة والارارة.

- Waterhouse-Friderichsen s. مُتَلَاَزِمَةُ وَوترهاوس - فريدرسن. الشكل الخبيث أو الخاطف من التهاب السحايا الدماغية النخاعية الوبائي الذي يتصف ببداية مفاجئة وفترة قصيرة مع الحمى والسبات (القيوبية) والوهط والزراق والنزف الحبري في الجلد والأغشية المخاطية ونزف الكظريتين بالجانبين.

- s. of Weber مُتَلَاَزِمَةُ وَيْبِر. شلل العصب محرك العين على نفس جهة الآفة مولداً التدلي والحوّل وفقدان منعكس الضوء والتكيف مع الفالج (الشلل الشقي) التشنجي في الجهة المعاكسة للآفة وزيادة المنعكسات وفقدان المنعكسات السطحية.

- Wernicke- Korsakoff s. متلازمة فرنيكة - كورساكوف. اضطراب عصبي نفسي ينتج عن نقص الثيامين وغالباً ما يكون بسبب الإدمان على الكحول والمترافق مع الاعتلالات العصبية التغذوية الأخرى. ويحدث الاعتلال الدماغى الفرنيكى (التخليط والرنج والارارة وشلل العين) كنوبة حادة من الممكن الشفاء منها بالمعالجة بالثيامين، ما عدا بعض الرنج والارارة. وقد تحصل متلازمة كورساكوف (النسابة السابقة واللاحقة الشديدة) بالترافق مع الاعتلال الدماغى الفرنيكى أو قد تظهر بعده. ولا يشفى من النسابة أكثر من 20% من المصابين.

- whiplash shake s. مُتَلَاَزِمَةُ هَزِّ السَّوْط. مجموعة من إصابات الدماغ والعين التي قد تحدث عندما يكون الطفل أقل من ثلاث سنوات من العمر وغالباً أقل من العام الواحد عند هز الطفل بعنف لدى مسكه من الجذع أو الأطراف من دون إسناد للرأس، إذ يسبب ذلك تعدد اوعية الدماغ وتمزق أنسجته مما يؤدي إلى أورام دموية تحت الجافية ونزف في الشبكية مع رض الدماغ أحياناً ومن الممكن أن يؤدي

ذلك إلى شلل أو عمى أو اختلالات بصرية أخرى أو اختلاجات أو الموت.

- withdrawal s. مُتَلَاَزِمَةُ الإِمْتِنَاع؛ متلازمة العزل. انظر withdrawal.

- Zellweger s. (= cerebrohepatorenal s.) مُتَلَاَزِمَةُ زَلْوِيْفَر؛ المتلازمة الدماغية الكبدية الكلوية.

synencephalocoele قَيْلَةُ دِمَاغِيَّةُ الْإِنْصَاقِيَّة. قيلة دماغية مع التصاقها بالأقسام المجاورة.

synergetic مُتَّازِر؛ تَآزُرِي. يعمل بالتعاون مع الآخرين كالعضلات التي تعمل سوياً لتوليد وظيفة أو حركة منسقة.

synergism تَآزُر. العمل المشترك للعوامل ليكون تأثيرها أكبر من المجموع الجبري لأعمالها الفردية.

synergy تَآزُرِيَّة. العمل المنسق أو التعاون بين عاملين أو دوائين أو بنيتين أو أكثر ويتم ذلك في وظائف الجهاز العصبي بتعاون مختلف أقسامه لتوليد وظيفة أو حركة منسقة.

synesthesia الحِسُّ المُوَاقِب. حس ثانوي يرافق الإدراك الحقيقي أو الإحساس الذي يحسه الشخص في محل ما من جسمه نتيجة التنبيه الموضوع في محل آخر من الجسم أو حالة توليد أحد المنبهات الحسية حساً مخالفاً لطبيعته كتوليد حس الضوء عند التنبيه بالصوت.

- s.algica الحِسُّ المُشْتَرَكُ المُؤَلِم.

synesthesialgia الحِسُّ المُشْتَرَكُ المُؤَلِم. حالة توليد أحد المنبهات حساً مؤلماً في الجهة المصابة من الجسم بينما لا يولد أي حس في الجهة السليمة أو يولد حساً بهيجاً فيها.

synkinseia (= synkinesis) حَرَكَة مُتَرَابِطَة.

synkinesis حَرَكَة مُتَرَابِطَة. حركة مترافقة، حركة لا إرادية وغير مقصودة ترافق الحركة الإرادية.

- imitative s. حَرَكَة مُتَرَابِطَة مُحَاكِة. حركة لا إرادية في الجهة السليمة ترافق محاولة تحريك قسم في الجهة المشلولة.

- mouth and hand s. حَرَكََةُ الفَمِ وَالْيَدِ
المُتَرَابِطَةِ. انظر Saunder's sign.

- spasmodic s. حَرَكَةٌ مُتَرَابِطَةٌ تَشْنُجِيَّةٌ. حركة تشنجية في الجهة المشلولة عند حركة قسم إرادي في الجهة السليمة.

synreflexia تَرَابُطُ المُنْعَكَسَات. الترابط الموجود بين المنعكسات المختلفة.

syphilis الزهري. مرض منقول جنسياً دون الحاد أو مزمن تولده الملتوية اللولبية الشاحبة والذي ينتقل عادة بالاتصال الجنسي أو ينتقل في الرحم من الأم للجنين ويصيب كل أقسام الجسم ومنها الجهاز العصبي.

- cerebrospinal s. الزهري الدُمَاعي النُخاعي. انظر Erb's spastic paraplegia.

- meningovascular s. الزهري السِّحَائي الوَعَائي. انظر neurosyphilis.

syphilomania (= syphilophobia) هَوَسُ الزهري: رُهاب الزهري.

syphilophobia رُهابُ الزهري. 1. الخوف من الإصابة بالزهري 2. توهم الشخص بأنه مصاب بالزهري.

syringobulbia تَكَهَفُ البَصَلَةِ. تكهف الدماغ الذي تمتد فيه الكهوف إلى النخاع المستطيل.

syringocoele (= myelocoele) قَبْلَةُ نَخَاعِيَّة. قنطرة النخاع الشوكي خلال عيب عظمي في السنسنة المشقوقة والذي يحوي كهفاً في داخله.

syringocoele قَنَاةُ النُخَاعِ المَرْكَزِيَّة. النفق المركزي للنخاع الشوكي.

syringoencephalia تَكَهَفُ الدَّمَاع. توليد كهوف شاذة في مادة الدماغ.

syringoencephalomyelia تَكَهَفُ الدَّمَاع والنُخَاع. وجود كهوف في داخل مادة النخاع والدماغ.

syringomeningocoele قَبْلَةُ سَحَائِيَّة تَكَهَفِيَّة. قيلة سحائية شبيهة بالقيلة النخاعية التكيفية.

syringomyelia تَكَهَفُ النُخَاع. متلازمة متروية بطيئة يحدث التكيف فيها في الشدات

المركزية من النخاع الشوكي وعادة ما تصيب المنطقة الرقبية ولكنها قد تمتد إلى النخاع المستطيل (تكهف البصلة) أو إلى المنطقة الصدرية وقد يكون التكهف تنموي الأصل أو ثانوي للأورام أو نتيجة رضح أو احتشاء أو نزيف أو غير معروف السبب ويؤدي في المرض إلى عيوب عصبية تتكون بصورة عامة من ضعف عضلي شدي في وضوم يرتافق مع فقدان حسي متفارق (فقدان حسي الألم والحرارة والاحتفاظ بحس اللمس) كما يظهر عادة الجنف الصدري.

- traumatic s. تَكَهَفُ النُخَاعِ الرُّضْجِي. تكهف النخاع الذي ينتج عن رضح النخاع الشوكي.

syringomyelitis إِبْتِهَابُ النُخَاعِ التَكَهَفِي. التهاب النخاع الشوكي مع تكوين كهوف فيه.

syringomyelocoele قَبْلَةُ النُخَاعِ التَكَهَفِيَّة. أنفتاق النخاع الذي يحوي كهوفاً مرتبطة بقناته المركزية خلال عيب عظمي في السنسنة المشقوقة.

syringomyelus (= syringomyelia) تَكَهَفُ قَنَاةِ النُخَاع. توسع القناة المركزية للنخاع وتكهفها وتحول المادة السنجابية إلى نسيج ليفي.

syringopontia تَكَهَفُ الجِسْرِ. حالة تكون كهوف في الجسر.

1. جُمْلَةٌ 2. جَهَازٌ 3. مَجْمُوعٌ 4. نِظَامٌ. system 1. مجموعة أو سلسلة من أقسام مترابطة ومتعاونة (كالأجسام والأعضاء والكائنات) التي تعمل سوية لتحقيق هدف مشترك أو لتحقيق وظائف لا يمكن لأي واحد منها تحقيقه بمفرده 2. مدرسة فكرية أو أسلوب عمل يستند على أسس ومبادئ معينة.


- ascending reticular activating s. الجَهَازُ الشَّبَكِي (= reticular activating s.) الصَّاعِدُ المُنَشِّط.

- association s. الجَهَازُ التَّوَابُطِي. سبل الألياف العصبية في الدماغ التي تترابط عن طريقها الإدراكات مما يجعل عملية التفكير ممكنة.

- autonomic nervous s. الجَهَازُ العَصْبِي المستقل. قسم الجهاز العصبي الذي ينظم عمليات العضلة القلبية والعضلات الملساء والغدد وينتظم في مجموعتين القسم الصدري القطني أو الجهاز العصبي الودي والقسم القحفي العجزي أو الجهاز العصبي اللاودي.


- **brain-cooling s.** جَهَازُ تَبْرِيدِ الدِّمَاغِ. جهاز آلي منظم حرارياً لتنظيم وقياس درجة حرارة الدماغ ويستعمل في التجارب والتطبيقات الفيزيولوجية العصبية والتفسيّة العصبية.
- **central nervous s.** الجَهَازُ العَصْبِيُّ المَرْكَزِيُّ. قسم الجهاز العصبي الذي يشتمل على الدماغ والنخاع الشوكي والذي يوجد داخل القحف والعمود الفقري.
- **centrencephalic s.** الجَهَازُ المَرْكَزِيُّ لِلدِّمَاغِ. جهاز العصبونات الموجود في اللب المركزي للنخاع العلوي من جذع الدماغ من المهاد حتى النخاع المستطيل وهو يربط نصفي كرة المخ.
- **cerebrospinal s. (= central nervous s.)** الجَهَازُ الدِّمَاغِيُّ. الجهاز العصبي المركزي.
- **craniosacral s. (= parasympathetic nervous s.)** الجَهَازُ القَحْفِيُّ القَطَنِيُّ؛ الجهاز العصبي اللاودي.
- **exteroceptive nervous s.** جَهَازُ الإِسْتِقْبَالِ العَصْبِيِّ الخَارِجِيِّ. قسم الجهاز العصبي الجسدي الوارد الذي يستقبل المنبهات التي ترد الجسم من خارجه.
- **extracortical s. (= extrapyramidal s.)** الجَهَازُ خَارِجُ القَشْرِيِّ النُّخَاعِيِّ؛ الجهاز خارج الهرمي.
- **extrapyramidal s.** الجَهَازُ خَارِجُ الهَرَمِيِّ. قسم من الجهاز العصبي الحركي خارج الجهاز الهرمي يشمل النوى القاعدية والعديد من نوى جذع الدماغ المتعلقة بها كالنواة تحت المهادية والمادة السوداء والنواة الحمراء والتكوين الشبكي مع اتصالاتها بالمخ والمخيخ والتي تعتبر كلها كوحدة واحدة تنظم مجموعة الوظائف الحركية غير تلك التي ينظمها الجهاز الهرمي كوظائف التوازن وضعة الجسم وتثبيته. ومن الامراض التي تتولد عن إصابة الجهاز خارج الهرمي داء باركنسون.
- **fusimotor s.** الجَهَازُ المِغْفَرِيُّ الحَرَكَيُّ. مجموعة من العصبونات الحركية (تسمى عصبونات غاما الحركية) توجد في المادة السنجابية البطنية للنخاع الشوكي والتي تخرج محاورها مع الجذور البطنية للنخاع وتذهب لتغذي ألياف داخل المغازل في العضلات الهيكلية.
- **interoceptive nervous s.** جَهَازُ الإِسْتِقْبَالِ العَصْبِيِّ البَاطِنِيِّ. الجهاز الذي ينقل الدفعات العصبية الواردة من الأحشاء والتي تسير في ألياف عصبية مستقلة أو جسدية تتجه نحو المركز.
- **involuntary nervous s. (= autonomic nervous s.)** الجهاز العصبي اللاإرادي؛ الجَهَازُ العَصْبِيُّ المَسْتَقْل. الجهاز التَنَبُّهِي. قسم العضو الدهليزي القوقعي الذي يعنى بالمحافظة على توازن الجسم.
- **limbic s.** الجَهَازُ الخَوْفِي. مصطلح يستعمل للدلالة على مجموعة من بنيات الدماغ (التي تشمل الحصين والتلفيف المسنن مع قشرتهما القديمة والتلفيف الحزامي والباحات الحاجزية واللوزة) والمرتبطة بوظيفتها مع الشم ولكن لدرجة أكبر مع فعاليات أخرى كالوظائف المستقلة وبعض نواحي العاطفة والسلوك.
- **muscular s.** الجَهَازُ العَضَلِي. مجموع العضلات التي تعتبر كجهاز واحد.
- **nervous s.** الجَهَازُ العَصْبِيُّ. الجهاز العضوي الكبير الذي ينظم وينسق بالاشتراك مع الجهاز الصماوي كل استجابات الكائن للحالات الداخلية والمحيطية وهو يتكون من القسمين المركزي والمحيطي.
- **parasympathetic nervous s.** الجَهَازُ العَصْبِيُّ الأَوْدِي. القسم القحفي العجزي من الجهاز العصبي المستقل.
- **peripheral nervous s.** الجَهَازُ العَصْبِيُّ المُحِيطِي. قسم الجهاز العصبي المكون من الأعصاب والعقد العصبية والذي يوجد خارج الدماغ والنخاع الشوكي.
- **periventricular s.** الجَهَازُ حَوْلَ البُطَيْنِ. اسم جماعي للسبيل الصادرة من الوطاء التي تنبع أساساً من النوى فوق البصرية والخلفية والحديبية والتي تنزل في المادة السنجابية حول البطين.
- **proprioceptive nervous s.** جَهَازُ الإِسْتِقْبَالِ العَصْبِيِّ الغَمِيقِ. قسم الألياف العصبية الجسدية الواردة التي تنقل الإحساسات الواردة من داخل الجسم.

- pyramidal s. (= fasciculus pyramidalis medullae oblongatae) **الجهاز الهرمي:** الخزمة الهرمية للصلة.
- reticular activating s. **الجهاز الشبكي:** المنشط. جهاز خلايا التكوين الشبكي في النخاع المستطيل (الصلة) الذي يستلم فروعا جانبية من الطرق الحسية الصاعدة والذي يسقطها إلى المراكز العصبية العليا. وهي تسيطر على درجة النشاط العام لفعاليات الجهاز العصبي المركزي ومنها البقطة والانتباه والنوم.
- sensory storage s. **جهاز الذاكرة الحسية:** جهاز خزن الإحساسات. اقصر أنواع الذاكرة الذي يخزن المعلومات المدركة لفترة تقل عن الثانية وتذكر لفترة قصيرة.
- somatic nervous s. **الجهاز العصبي الجسدي:** اقسام الجهاز العصبي التي تقوم بتوصيل الدفعات العصبية من وإلى اقسام الجسم اللاشعوية كالعضلات الهيكلية والعظام والمفاصل والاورتار والجلد والعين والانف والاذن واللسان وبعض الأغشية المخاطية.
- sympathetic nervous s. **الجهاز العصبي الودي:** القسم الصدري القطني من الجهاز العصبي المستقل.
- thoracolumbar nervous s. (= sympathetic nervous s.) **الجهاز العصبي الصدري القطني:** الجهاز العصبي الودي.
- vasomotor s. **الجهاز المحرك الوعائي:** قسم الجهاز العصبي الذي ينظم سعة الاوعية الدموية.
- vegetative nervous s. (= autonomic nervous system) **الجهاز العصبي الانبثاتي:** الجهاز العصبي المستقل.
- vestibular s. (= labyrinthine s.) **الجهاز الدهليزي:**
- visceral nervous s. (= autonomic nervous s.) **الجهاز العصبي الحشوي:** الجهاز العصبي المستقل.
- systema (= system) **جُملة: جهاز.**
- s. nervosum (= nervous s.) **الجهاز العصبي.**
- s. n. autonomicum (= autonomic nervous s.) **الجهاز العصبي المستقل.**
- s. n. centrale (= central nervous s.) **الجهاز العصبي المركزي.**
- s. n. periphericum (= peripheral nervous s.) **الجهاز العصبي المحيطي.**
- s. n. sympatheticum (= sympathetic nervous s.) **الجهاز العصبي المستقل.**




system, autonomic nervous

الأعصاب المستقلة والسلسلة الودية في الصدر: (1) العقدة الودية الرقبية السفلية (2) العقدة الصدرية الأولى (3) الفروع الودية القلبية (4) الفروع الاتصالية (5) العصب المبهم الأيمن (مقطوع) (6) عصب وربي (7) العقدة الودية الصدرية السادسة (8) العصب الحشوي الكبير (9) العقدة الودية الصدرية التاسعة (10) العصب الحشوي الصغير (11) العصب الحشوي الأدنى (12) الحبل المعدي الأمامي للمبهم (13) الضفيرة العريضة (14) المريء (15) الضفيرة الرئوية الأمامية (16) الشاف مبهمية للضفيرة الرئوية الخلفية (17) العصب الحنجري الرابع (18) الضفيرة القلبية (19) العصب المبهم الأيسر (مقطوع) (20) الرغامى (21) العروة تحت الترقوية.




system, autonomic nervous

الأعصاب المستقلة للحوض: (1) الفرعان الاتصاليان الأبيض والسنجابي (2) الفرع الاتصالي السنجابي (3) الضفيرة القطنية العجزية (4) أعصاب حوضية (العصب الناعظ اللاودي العجزى) (5) العصب الفرجي (عصب جسدي) (6) جسم القضيب (7) الضفيرة الكهفية (8) الضفيرة البروستاتية (9) الضفيرة المستقيمة (10) الضفيرة المثانية (11) الضفيرة الحوضية اليمنى (12) الشريان والصفيرة الباسورية العلوية (13) الضفيرة الخلفية (14) الشريان والصفيرة المساريقية السفلية (15) العقدة المساريقية السفلية (16) الضفيرة الأبهريّة (17) العقدة الودية القطنية الثانية.




system, autonomic nervous

الجهاز العصبي الذاتي (المستقل) يبين الأعصاب والعقد الودية باللون الأحمر والأعصاب والعقد اللاودية باللون الأزرق. (1) العقدة الهدابوية (2) العقدة الوتدية الحنكية (3) العقدة الأنفية (4) حبل الطبل (5) العصب اللساني (6) العقدة تحت اللسان (7) العصب المبهم (8) الضفيرة القلبية العميقة (9) الضفيرة القلبية السطحية (10) الضفيرة المريشية (11) العقدة البطنية (12) الشريان البطنى مع الأعصاب البطنية (13) العقدة المساريقية العلوية (14) الشريان المساريقي العلوي والأعصاب المساريقية (15) الضفيرة الأبهريّة (16) العقدة المساريقية السفلية (17) الشريان المساريقي السفلي (الباسوري العلوي) والأعصاب المساريقية السفلية (18) الضفيرة الخلفية (19) الضفيرة المثانية (20) الضفيرة البروستاتية (21) الضفيرة الحوضية (22) العصب الحوضي (23) العصب الحشوي الأصفر (24) العصب الحشوي الصغير (25) العصب الحشوي الكبير (26) الفروع الاتصالية (27) العقدة الودية الصدرية السابعة (28) العصب الصدري (الوريي) السادس (29) السلسلة الودية (30) العقدة الرقبية (31) العقدة الرقبية الودية لوسطية (32) العصب الرقبى الرابع (33) العقدة الرقبية الودية العلوية (34) العصب والصفيرة السباتيان (35) العصب المبهم (36) العصب اللساني البلعومي (37) العصب الوجهي (38) العصب المحرك للعين.




system, autonomic nervous

الأعصاب المستقلة في البطن: (1 و 3) العصب الحشوي الكبير (2 و 4) العصب الحشوي الصغير (5) للعصب الحشوي الأدنى (6) العقدة الودية القطنية الخامسة (7) أعصاب للضفيرة الحوضية اليمنى (8) السلسلة الودية الحوضية (9) أعصاب للضفيرة الحوضية اليسرى (10) الشريان والصفيرة الياسورية العلوية (11) الضفيرة الخلفية (12) الشريان والأعصاب القولونية اليسرى للجهة اليسرى من القولون (13) العقدة والصفيرة المساريقية السفلية (14) الشريان والصفيرة المنوية الداخلية (15) الضفيرة الأبهريّة (16) العقدة الودية القطنية الأولى (17) الضفيرة الكلوية (18) العصب الحشوي الأدنى (19) العقدة المساريقية العلوية (20) العصب الحشوي الصغير (21) للعقدة البطنية (22) العصب الحشوي الكبير (23) العصب المبهم المعدي الخلفي (24) العصب المبهم المعدي الأمامي.




system, central nervous

مقطع نصفى للدماغ مبيناً (1) الجسم الصنوبري (2) خيمة المخيخ (3) الأجسام الرباعية (4) المسال المخي (5) البطين الرابع (6) القناة المركزية (7) المحور (8) الفهقة (9) العظم الوددي (10) النخامي (11) القبو (12) الحاجز الشفاف (13) الجسم النخفي (14) الكتلة المتوسطة (15) البطين الثالث




system, central nervous

الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والجبل الشوكي) لمولود حديث: (1) البصلة (النخاع المستطيل) (2) الدماغ (3) العظم القذالي (4) الجذور الخلفية للأعصاب الشوكية الصدرية (5) الجبل الشوكي (النخاع الشوكي) (6) الأضلاع (7) الضخامة القطنية (8) ذنب الفرس (9) العقد الشوكية العجزية (10) المخروط النخاعي (11) جناح عظام الحرقفة (12) الكتلة اليمنى (13) العقد الشوكية العجزية (14) الأعصاب الجلدية الوحشية (15) الأقسام العصبية الأولية للأعصاب الصدرية (16) الأقسام الأولية للأعصاب الوربية (17) العقد الشوكية الرقبية (18) الضخامة الرقبية للجبل الشوكي (19) العقد الشوكية الرقبية الثانية (20) المخيخ (21) نصف الكرة المخية.



system, central nervous

رسم تخطيطي عام لأقسام الجهاز العصبي المركزي I - المخ II - جذع الدماغ الذي يشمل: (1) الدماغ البيني (2) الدماغ المتوسط (3) الجسر (4) النخاع المستطيل (المنخع). III - النخاع الشوكي وتظهر فيه (5) التضخم الرقبى (6) التضخم القطني. IV - المخيخ



system, sensory nervous

أحد السبل الحسية التي تبدأ من المستقبلات الحسية الجذبية ويمر خلال الأعصاب الشوكية صاعداً إلى المناطق الحسية المركزية: (1) الدماغ المتوسط (2) للقتيل الإنسي (3) النخاع المستطيل السفلي (4) السبيل الشوكي المهادي الوحشي (5) السبيل الشوكي البطني (6) النخاع الرقبي (7) للنواة الناحلة (8) النواة الإسفينية (9) حبل الناحلة (10) حبل الإسفينية (11) العادة الهلامية (12) ألياف عديمة الميالين (للالام والحرارة والبرودة) (13) ألياف مغمدة (للحس العميق) (14) ألياف مغمدة (للحس) (15) النواة البطنية الوحشية المهاد (16) المحفظة الداخلية (17) التكم خلف المركزي. (F.E) نهايات عصبية حرة (H) نهايات عصبية في الجريب الشجري (M) جسيم ميسنر (MS) مغزل عضلي (VP) جسيم باسيني.

T

tabes التَّابِس. 1. أي ضمور في الجسم، الضمور المترقي للجسم أو لجزء أو لعضو فيه. 2. التابيس الظهرى.

- **diabetic t.** التَّابِسُ السُّكْرِيّ. اعتلال عصبي محيطي يحدث عند الأشخاص المصابين بالبول السكري ويتصف بأعراض شبيهة بالتابيس الظهرى.

- **t. dorsales** التَّابِسُ الظَّهْرِيّ. زهري عصبي متني يتصف بتكسب بسيط في الأعمدة الخلفية والجذور والعقد الخلفية للنخاع الشوكي ويتم ذلك بعد 15-20 سنة بعد الإصابة الأولية بالزهري ويتصف بالآلام برقية راحة ولس البول والرنح وفقدان حسي الوضع والاهتزاز والضمور البصري ونقص التوتر وفرط الانعكاسية والتتكسب المفصلي النمائي (مفاصل شاركوت).

- **t. ergotica** التَّابِسُ الإِرْغُوتِيّ. حالة تشبه التابيس الظهرى تنتج عن التسمم بالارغوت.

- **Friedreich t. (= Fredreich ataxia)** تَابِس فَرِيدْرَايْخ. رنح فريدرايخ.

- **t. infantum** تَابِسٌ وَلِيدِيّ. تابيس يشاهد في الولدان المصابين بالزهري الولادي.

- **t. mesenterica (= t. mesaralca)** تَابِسٌ مَسَارِيْقِيّ. سل الغدد المساريقية في الأطفال يؤدي إلى اختلالات هضمية وضمور الجسم.

- **peripheral t. (= pseudotabes)** تَابِسٌ مُحِيطِيّ. نظير التابيس.

- **t. spinalis (= t. dorsalis)** التَّابِسُ النُّخَاعِيّ. التابيس الظهرى.

tabescent إِضْمَحْلَالٌ. ذُبُولٌ.

tabetic 1. تَابِسِيّ 2. مَتَبَّوسٌ. منسوب للتابيس أو مصاب به.

tabetiform شَبِيهُ التَّابِس. تابسي الشكل.

tabification إِضْمَحْلَالٌ؛ ذُبُولٌ. نحولٌ شديد.

taboparalysis (= taboparesis) التَّابِسُ الشَّلَلِيّ؛ تَابِسٌ خَزَلِيّ. ترافق الخزل العام مع التابيس الظهرى.

tache (= spot) بُقْعَةٌ؛ لُطْخَةٌ. بقعة أو لطخة مسطحة.

- **t. cerebrale** البُقْعَةُ الدُّمَاغِيَّةُ. تلم محتقن يتولد في الجلد عند خدشه بالأظفر ويحدث ذلك في بعض الأمراض العصبية أو الدماغية.

- **t. meningeale (= t. cerebrale)** البُقْعَةُ السَّحَائِيَّةُ.

- **t. motrice** البُقْعَةُ الحَرَكِيَّةُ. نوع من النهايات العصبية تمر فيه اللييفات العصبية إلى الخلايا العضلية حيث تنتهي فيها بتضخّات صغيرة.

- **t. spinale** البُقْعَةُ النُّخَاعِيَّةُ. فقاعة تشبه الحرق في الجلد تنسب عن مرض النخاع الشوكي.

tachistoscope المِنْظَرُ التَّوْفِضِيّ. آلة تستعمل في الدراسات النفسية الفيزيولوجية حيث تمتحن الذاكرة البصرية بعرض الصور أمام الشخص لفترة محددة وعادة ما تكون أقل من عشر الثانية ثم يمتحن المريض فيما إذا يتذكرها.

tachylalia تَسْرُوعُ الكَلَام. تسرع الكلام.

tachyphagia تَسْرُوعُ الأكل. تسرع ازدراد الطعام.

tachyphrasia تَسْرُوعُ النُّطْق. النطق السريع.

tachyphrenia تَسْرُوعُ التَّفْكِير. التفكير السريع.

tachypragia تَسْرُوعُ العَمَل. العمل السريع.

tactile لَمْسِيّ. منسوب أو متعلق باللمس.

taction (= touch) اللمس. 1. عملية أو فعل اللمس. 2. حسّ اللمس أو الإدراك باللمس.

tactometer مِقْيَاسُ اللمس. آلة لقياس حدة حسّ اللمس.

tactor لَمَاس؛ نِهَايةُ حِسِّيَّةٍ لَمْسِيَّةٍ.

tactual لَمْسِيّ. منسوب إلى اللمس أو ما ينفذ بحسّ اللمس.

tactus اللمس.

- t. eruditus اللمس الخبير؛ اللمسُ الحَذِيقُ. حسّ اللمس الدقيق الذي يكتسب بالخبرة والمران.

- t. expertus (= t. eruditus) اللمسُ الحَذِيقُ

talalgia ألم الكاحل؛ ألم العَقَب. ألم في العقب أو الكاحل.

talantropia (= nystagmus) رَأْرَأة.

talipes حَنَف. شوه خلقي في القدم التي تدور وتحرف عن وضعها السوي.

- t. calcaneus حَنَف عَقَبِيّ. شوه يتصف بانثناء القدم للأعلى.

- t. equinovagis حَنَف قَدِيّ أروحي؛ حَنَف أبخَسِيّ. شوه يتصف بانثناء القدم نحو الأخص مما يؤدي إلى مشية المصاب على أصابعه.

- t. valgus حَنَف رَوحيّ. شوه يتصف بدوران العقب للخارج بعيداً عن الخط الوسطي.

- t. varus حَنَف فَحَجِيّ. شوه يتصف بدوران العقب للداخل نحو الخط الوسطي.

tangle حَبِيكَة؛ عُقْدَة.

- neurofibrillary t. حَبِيكَة لِئَبْيَفَةِ عَصَبِيَّة؛ عُقْدَة لِئَبْيَفَةِ عَصَبِيَّة. عقد أو كتلة من ليفات عصبية تشاهد في داخل خلايا قشرة المخ في داء ألزهايمر.

tangoceptor مُسْتَقْبِلُ تَلَامُسِيّ. عضو حسي يستجيب للتماس الفيزيائي فقط كاللمس مثلاً.

tapeinocephaly تَسَطُّحُ الرَّأْس. قحف واطىء ومستطح في الأمام وله معامل عمودي أقل من 72.

tapetum بَسَاط. 1. بنية غطاء أو طبقة من الخلايا. 2. بساط الجسم الثفني.

- t. corporis callosi بَسَاطُ الجِسْمِ الثَّفَنِيّ.

طبقة من البياض صوارية في الجسم الثفني على الناحية العلوية الوحشية للقرن القذالي للبطين الجانبي.

taste مَذَاق؛ ذُوق؛ طَعْم. الحس الخاص الذي يتولد عند ملامسة المواد الذوّبية للسان، فهو الحس الذي يتولد عند تنبيه المستقبلات الذوقية في اللسان وحوله ويدرك في المراكز الذوقية. وهناك أربعة أنواع رئيسية منه الحلو والمر والحامض والمالح.

- color t. ذُوق لَوْنِيّ. حس ذوقي كاذب يترافق مع حس إبصار الألوان.

- franklinic t. ذُوقُ فَرَانكَلِينِيّ. حس ذوق حمض يتولد عند تنبيه اللسان بكميائية ستاتية.

taste blindness عَمَة الذُوق. عدم المقدرة على تذوق بعض المواد مثل الفينيل ثايويوريا.

tectocephaly (= scaphocephaly) تَزَوُّقُ الرَّاس؛ الرَّأْسُ الزَّوَرَقِيّ.

tectospinal سَقْفِيّ نُخَاعِيّ. يمتد من سقف الدماغ المتوسط حتى النخاع الشوكي.

tectum سَقْف. بنية سطحية الشكل.

- t. mesencephali سَقْفُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. جزء سقيفة الدماغ المتوسط الذي يحتوي الصفحة السفلية والأكيمات القحفية والذنبية.

tegmen سَقْفِيّ. غطاء أو سقف.

- t. ventriculi quarti سَقْفِيّ البُطَيْنِ الرَّابِع. سقف البطين الرابع الذي يتكون من الشرايين العلوي والسفلي.

tegmentum السَقْفِيَّة. 1. غطاء. 2. سقيفة الدماغ المتوسط. 3. القسم الظهري لكل من سويقتي المخ.

- t. auris (= membrana tympani) السَقْفِيَّة السَّمْعِيَّة؛ غِشَاءُ الطَّبَل.

- hypothalamic t. (= subthalamie t.) سَقْفِيَّةُ الوِطَاء.

- t. mesencephali سَقْفِيَّةُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. الجزء الظهري من الدماغ المتوسط الذي يتكون من استمرارية القسم الظهري من سويقتي المخ عبر المستوى الناصف ويمتد على جهتيه من المادة السوداء حتى مستوى مسال الدماغ المتوسط.

- t. of pons (= t. pontis) سَقِيْفَةُ الجِسْرِ. الجزء الظهري من الجسر.

- t. rhomboencephali (= pars posterior pontis) سَقِيْفَةُ الدِّمَاغِ الْمُؤَخَّرِ؛ القسم الخلفي من الجسر.

- subthalamie t. سَقِيْفَةُ تَحْتَ المِهَادِ. جزء سَقِيْفَةُ السَّوْفَةِ المَخِيَّةِ الذي يمتد تحت المهاد.

teinodynia (= tenodynia) أَلَمُ الوَتَرِ.

tela نَسِيجَةٌ. غشاء رقيق شبيه بالشبكة.

- t. choroidea ventriculi laterali النَسِيجَةُ المَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيِّ. الامتداد الرخشي للنسجة المشيمية للبطين الثالث إلى الشق المشيمي للبطين الجانبي من الدماغ ومنه تغلف الطيات الوعائية بطانة عصبية لتكون الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي.

- t. choroidea ventriculi quarti النَسِيجَةُ المَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. طَيَّةٌ أو طَيَّتَانِ مِنَ الأم الحنون بين المخيخ والقسم السفلي من سطح البطين الرابع وتحوي الطبقة الامامية من الطية بالاشتراك مع البطانة العصبية للبطين فروعا وعائية تكون الضفيرة المشيمية.

- t. choroidea ventriculi tertii النَسِيجَةُ المَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الثَّالِثِ. طَبَقَتَانِ أو طَيَّتَانِ مِنَ الأم الحنون تَكُونَانِ بالاشتراك مع البطانة العصبية للبطين سطح البطين الثالث والذي سطحه فروعا وعائية لتكون الضفيرة المشيمية.

telalgia (= referred pain) أَلَمٌ مُحَوَّلٌ؛ أَلَمٌ رَاجِعٌ.

teleceptor مُسْتَقْبِلٌ بُعَادِيٌّ. نهاية عصبية حسية حساسة للمنبهات التي تصدر من مسافة بعيدة عن الجسم مثل تلك التي توجد في العين أو في الأذن.

telencephalon الدِّمَاغُ الأَنْتِهَائِيّ.

1. الحويصلتان الدماغيتان المزدوجتان المكونتان من الانزلاق الامامي الوحشي للدماغ المقدم وبالإشتراك مع الجزء الناصفي غير المزدوج والصفحة الانتهازية تكون الاقسام التي تشتق منهم جميعاً نصفاً كرة المخ 2. الحويصلة الامامية من الحويصلتين اللتين تتكونان من تمايز الدماغ المقدم في الجنين المتنامي.

teleneuron (= nerve ending) نِهَآةٌ عَصَبِيَّةٌ.

telepathy تَخَاطُرٌ. إدراك فرق حسي للفعاليات الدماغية لشخص آخر.

1. تَلْقَائِيَّةٌ 2. التَّفْعِيلُ البُعَادِيّ. 1. تلقائية العمل أو المساعدة 2. الفعل الفرضي لدماغ أحد الافراد في التأثير على فعالية دماغ شخص آخر.

telesthesia حِسٌّ بُعَادِيٌّ. إدراك فوق حسي بطبيعة الأشياء أو الحالات.

teloglia يَبْقُ اِنْتِهَائِيٌّ. خلية شفاء الانتهازية التي توجد عند النهاية العصبية الحركية.

telolemma غَمْدُ النِّهَآةِ؛ غَمْدُ اِنْتِهَائِيٍّ. الغطاء أو شئ الطيات الذي يغطي القرص الحركي الانتهازية والمكون من غمد الليف العضلي وامتداد غمد هنلي.

teloreceptor (= teleceptor) مُسْتَقْبِلٌ بُعَادِيٌّ.

temperament مَزَاجٌ. (ج: أَمْزَجَةٌ). الاستعداد الغريزي البنيوي للاستجابة للمنبهات بصورة معينة.

- atrabilious t. (= melancholic t.) مَزَاجٌ سَوْدَاوِيٌّ.

- billous t. (= choleric t.) مَزَاجٌ صَفْرَاوِيٌّ.

- choleric t. مَزَاجٌ صَفْرَاوِيٌّ. مزاج يعزى إلى سيادة الصفراء الصفراء (الفاتحة) ويتصف بالفضب السريع أو المستمر.

- lymphatic t. (= phlegmatic t.) مَزَاجٌ لُغْفِيٌّ.

- melancholic t. مَزَاجٌ سَوْدَاوِيٌّ. مزاج يعزى إلى سيادة الصفراء السوداء (القانية) ويتصف بالخمول والجمود.

- sanguine t. مَزَاجٌ دَمَوِيٌّ. المزاج الذي يعزى إلى سيادة الدم ويتصف بالبهجة والتفاؤل.

temperantia (= sedatives) مُهْدِّئَاتٌ؛ مَرَكِّزَاتٌ.

1. صُدْغِيٌّ 2. زَمَنِيٌّ. 1. منسوب إلى المنطقة الوحشية من الرأس فوق القوس الوجني 2. متعلق أو منسوب للزمن.

tenalgia أَلَمُ الْوَتَرِ. ألم في أحد الأوتار.

tenderness إِيْلَام. الحساسية الشاذة أو المؤلمة للمس أو للضغط.

- pencil t. إِيْلَامٌ قَلَمِيّ. الإيْلَام الموضعي عند الضغط على الموضع برأس القلم المطاطي.

- rebound t. إِيْلَامٌ إِرْتِدَادِيّ. حس الألم الذي يدرك بعد رفع الضغط.

tenodynia وَجَعُ الْوَتَرِ. وجع في أحد الأوتار.

tension تَوَتُّرٌ؛ تَوَتِير. عملية التمديد والشد.

- muscular t. تَوَتُّرُ الْعَضَل. حالة التقلص المعتدل للعضلة عند تمديدها.

tentorium خَيْفَةٌ. قسم تشريحي يشبه الغطاء أو الخيمة.

- t. cerebelli خَيْفَةُ الْمُخَيخ. امتداد الجافية الذي يسند القصين القذاليين ويغطي المخيخ وله حافة حرة فيها ثلمات الخيمة وتلتصق حافته الخارجية بالقحف ويضم الجيب المستعرض في الخلف.

- t. of hypophysis (= diaphragma sellae) خَيْفَةُ النُّخَامِيَّة. الْحِجَابُ السَّرْجِيّ.

tentum (= the penis) الْقَضِيْب.

tephromalacia تَلَيُّنُ السِّنْجَابِيَّة. تلين سنجابية الدماغ أو النخاع.

tephromyelitis الْتِهَابُ سِنْجَابِيَّة النُّخَاع. التهاب المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

terminatio نِهَائِيَّة. منطقة انقطاع البنية أو نهايتها.

- terminationes nervorum liberae النِّهَائِيَّاتُ الْعَصْبِيَّةُ الْحُرَّة. المستقبلات العصبية التي لها أبسط الأشكال حيث ينقسم الليف المحيطي إلى فروع دقيقة تنتهي بصورة حرة في نسيج ضام أو في ظهارة أو بطانة.

terror رُعب؛ قَرَعٌ؛ دُغْر. الخوف الشديد.

- day t. (= pavor diurnus) قَرَعٌ نَهَارِيّ. الخوف الشديد أثناء النهار.

- night t. (= pavor nocturnus) قَرَعٌ لَيْلِيّ. الخوف الشديد أثناء الليل.

test اخْتِبَار. فحص أو تجربة.

- Babinski's t. (= Babinski's sign) اخْتِبَارُ بَابِنْسْكِي. اختبار لتحزّي وجود إصابة عصبية هرمية.

- Babinski-Weil t. اخْتِبَارُ بَابِنْسْكِي - فايل. يطلب من المريض السير إلى الأمام وإلى الخلف في ساحة خالية مع إغلاق عينيه، فينعرف المصاب بمرض التيه عن الخط المستقيم وينثني إلى إحدى الجهتين عند سيره للأمام وإلى الجهة المعاكسة عند سيره للخلف.

- Barany's pointing t. اخْتِبَارُ بَارَانِي لِلتَّأْشِير. يطلب من المريض التأشير إلى نقطة ثابتة وعينيه مفتوحتين ومفلوحتين على التوالي ويدل اللفظ الدائم في التأشير بالعين المغلقة على وجود آفة دماغية.

- Bekhterev's t. اخْتِبَارُ بَخْتِيرِيف. عند الطلب من المريض الجالس في فراشه تمديد ساقيه سوياً لن يتمكن من ذلك عندما يكون مصاباً بعرق النسا ولكنه يتمكن من تمديد كل من الساقين على انفراد.

- Bender gestalt t. (= Bender visual-Motor gestalt t.) اخْتِبَارُ بَنْدَرٍ لِلْإِدْرَاكِ الْكُلِّيّ. اختبار نفسي يستعمل لتعيين التنسيق الإدراكي الحركي لتقييم ديناميات شخصية الفرد كفحص لاختلال الدماغ الحركي أو لقياس النضوج العصبي لديه. إذ يطلب من الشخص استنساخ تسعة أشكال هندسية بسيطة تعطى له بصورة منفصلة كل واحدة منها على بطاقة خاصة أو يطلب منه أحياناً عمل رسوم لهذه الأشكال من ذاكرته ثم تقيم رسومه.

- Binet's t. اخْتِبَارُ بِيْنَت. اختبار لفحص القدرة الفكرية للأطفال والأحداث بتوجيه سلسلة من الأسئلة الموضوعة لتلائم مستوى الأطفال الأسوياء في الأعمار المختلفة ويعين السن العقلي للأطفال حسب مستوى أجوبتهم.

- Craft's t. اخْتِبَارُ كْرَافْت. يؤدي ضرب السطح الظهري للكاحل بنقطة كلية وإلى الأعلى على السطح الظهري للكاحل عند بسط الساق وإرخاء العضلات إلى الانثناء الظهري لإبهام القدم شبيه بمنعكس بابنسكي وذلك في الأمراض العضوية للسبيل الهرمي.

- Elsberg's t. اخْتِبَارُ الزَّبَرْغ. طريقة اختبار حس الشم لتعيين وجود ورم دماغي وتستعمل الاختلافات في أنواعه أو في سرعة تعبئه للتفريق بين الأورام خارج الدماغ أو داخله.

- **femoral nerve stretch t.** إختِبَارُ تَمْدِيدِ الْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ. يؤدي ثني مفصل الركبة للافعال في وضع الانكباب إلى ألم في الظهر أو في الالية ويستعمل الاختبار في آفات القرص القطني الثالث أو الرابع.

- **finger-to-finger t.** إختِبَارُ الإصْبَعِ لِلإصْبَعِ. عند تمديد الذراعين يطلب من المريض تقريب نهايات أصابع اليد إلى نظائرها في اليد الثانية لفحص تنسيق حركات الأطراف.

- **finger-nose t.** إختِبَارُ الإصْبَعِ لِلأنْفِ. مع تمديد الذراع إلى الخارج يطلب من المريض لمس ذروة أنفه ببطء بنهاية سبابته وذلك لفحص الحركات المنسقة للأطراف.

- **Fournier's t.** إختِبَارُ فُورْنِيَه. يطلب من المريض القيام من وضع الجلوس والسير إلى الامام ثم التوقف بسرعة عندما يطلب ذلك منه ثم السير ثانية والدوران للخلف عندما يطلب ذلك منه ومن الممكن بهذه الطريقة إظهار المشية الرنحية.

- **heel-knee t.** إختِبَارُ الْعَقَبِ - الرُّكْبَةِ. اختبار تنسيق حركات الأطراف حيث يطلب من المريض المستلقي على ظهره لمس ركبة إحدى ساقيه بعقب الساق الثانية ومن ثم إمراره ببطء على مقدمة حرف الظنوب حتى الكاحل عندما تكون عينه مغلقة.

- **intelligence t.** إختِبَارُ الذِّكَاء. مجموعة اختبارات أو وظائف لتقييم مقدرة الشخص وقابلياته الذاتية في التحكم والفهم والتسبب بصورة عامة بها أو فهمها أو معرفة أسبابها.

- **Lichtheim t.** إختِبَارُ لِيخْتَهَايم. إذا تمكن المريض من معرفة عدد المقاطع اللفظية في الكلمات التي لا يتمكن من تلفظها فإن ذلك يدل على أن قشرة دماغه غير مصابة بقدر إصابة الألياف الترابطية في الدماغ.

- **Naffziger's t.** إختِبَارُ نَافْزِيْجَر. فحص لانضفاط الجذور العصبية حيث يؤدي الضغط باليد على الوريدين الوداجيين إلى زيادة الألم أو الاضطراب الحسي في منطقة انتشار الجذر العصبية المصابة مما يؤكد وجود انزلاق الغضروف بين الفقرتين أو أية كتلة مرضية أخرى.

- **nystagmus t. (= Barany's symptom)** إختِبَارُ الرَّأْرَأة.

- **performance t.** إختِبَارُ النَّادِيَةِ. اختبار ذكاء

يطلب من الشخص فيه إجراء بعض الأعمال بدلاً من إجابة الاسئلة فقط.

- **pointing t. (= Barany's pointing t.)** إختِبَارُ النَّاشِير.

- **psychological t.** إختبار نفسي: اختبار سيكولوجي. أحد الاختبارات التي تجرى لفحص تطور الفرد وإنجازاته وشخصيته وذكاؤه وعملياته الفكرية وما شابه ذلك.

- **psychomotor t.** إختِبَارُ نَفْسِيّ حَرَكيّ. اختبار لتقييم مقدرة الشخص على استلام التعليمات والإرشادات للقيام باستجابات حركية وعادة ما يشمل قياس سرعة استجاباته لها.

- **Queckenstedt's t. (= Queckenstedt sign)** اختبار كويكنشتيد: علامة كويكنشتيد.

- **Romberg's t.** عَلَامَةُ رُومْبِرْغ. علامة للتفريق بين الرنحين المحيطي والمركزي حيث تشاهد زيادة في عدم انتظام كافة الحركات وفي وسع المشية وعدم ثباتها عند غلق عيني المريض في الرنح المحيطي ولا يحصل مثل ذلك في الرنح المخيخي.

- **station t.** إختِبَارُ الوُقُوف. إختبار المحطة. اختبار لاضطرابات التنسيق الحركي يجري بوضع المريض في وضع الوقوف المنتصب مع وضع العقبين والاباحس بالقرب من بعضها، فإذا كان اهتزاز الجسم وترنحه أكثر من الطبيعي فإن ذلك يدل على اضطراب التنسيق.

- **Stein's t.** إختِبَارُ شَتَاين. عدم التمكن من الوقوف على ساق واحدة، ويشاهد ذلك في امراض التيه.

- **Tensilon t.** إختِبَارُ تَنْسِيلُون. اختبار للوهن العضلي الوبيل يتم بعد إدخال التنسيلون (كلوريد الإيدروفنيوم) فتقل كثيراً علامات المرض التي تظهر على عين المريض (التدلي وشذوذ العضلات الخارجية للعين).

- **Wada t.** إختِبَارُ وَاْدَا. اختبار لفحص السيادة المخية لوظيفة الكلام حيث يحقن الاموباربيتال إلى الشريان السباتي الباطن لتوليد خزل شقي في أطراف الجهة المقابلة. ويولد الحقن في شريان جهة السيادة للكلام حبسة عابرة بينما لا يولد الحقن في الجهة غير السائدة أي خلل لوظيفة الكلام.

ألم الخُصِيَّة. ألم في الخصية. testalgia

tetanic 1. كُرَّازِيّ 2. مُكَّرَز. منسوب
أو يتصف بالكزاز أو مولد له.

tetaniform كُرَّازِيّ الشَّكْل. شبيه بالكزاز
أو بالتكزز.

tetanization تَكْرِيز. عملية تكثير العضلة.

tetanospasmin تَتَانُوسِيَّازِمِين؛ المَشْنُجُ
الْكُرَّازِيّ. الجزء السمي العصبي للذيفان الخارجي
(ذيفان الكزاز) الذي تولده المطثية الكزازية والذي
يحصر النهايات المشبكية في الجهاز العصبي
المركزي فيولد التشنج العضلي، وهو من أقوى
السموم المعروفة.

1. كُرَّاز 2. تَكَّرَز. 1. داء عدواني
حاد تولده عصيات المطثية الكزازية ويولد ذيفانها
المشنج الكزازي تقلصات عضلية تكززية وفراط
المنعكسات وتشنج المزمار والضرز والتشنج
العضلي العام والتشنج الظهري والتنفسي والنوبات
والشلل. وهناك نوع معتدل منه وهو الكزاز
الموضعي الذي يولد نفضات وتشنجات في
العضلات بالقرب من موقع الإصابة وقد ينتشر بعد
ذلك 2. التكزز الفيزيولوجي وهو حالة تقلص
عضلي مستمر من دون انبساط يتولد عن التنبيه
المستمر للعصب الحركي بتردد سريع جداً لدرجة
تؤدي إلى اندغام التقلصات الفردية للعضل ولا
يمكن تقريبها الواحدة عن الأخرى.

- cephalic t (= cerebral t. = cephalote-
tanus t.) الكُرَّازُ الرَّأْسِيّ الدُّمَاغِيّ. نوع نادر من
الكزاز العدواني سيء الانذار الذي يحدث بعد إصابة
الراس أو الوجه أو يترافق مع التهاب الأذن الوسطى
بوجود المطثيات الكزازية فيها ويتصف باختلال
وظائف الأعصاب القحفية خاصة السابع منها وهو
يؤدي إلى الضرر (تشنج الفك) وقد يبقى موضعياً أو
ينتشر ليولد كزازاً عاماً.

- cryptogenic t. الكُرَّازُ خَفِيّ المَنْشَأ. كزاز يتولد
من دون أي جرح أو سبب ظاهر.

- neonatal t. الكُرَّازُ الْوَلِيدِيّ. كزاز عدواني
وخيم يحدث خلال الأيام الأولى من حياة الوليد ينتج
عن التضخم اللاصحي للحبل السري أو عند ختان
الولدان الذكور وضعف التمتع الأمومي.

- physiological t. (= tetanus) التَكَّرَز
الفيزيولوجي. التكزز الوظيفي.

tetany 1. فراط استثنائية الأعصاب
والعضلات بسبب نقص تركيز الكالسيوم المتأين
خارج الخلية الذي يمكن أن يترافق مع حالات مثل
نقص وظيفة الدرقية أو نقص الفيتامين والقلء أو
تناول كميات كبيرة من الأملاح القلوية. وهو
يتصف بتشنج رسغي قدمي ونفضان عضلي
ومعص وتشنج الحنجرة وصرير شهيق وفراط
المنعكسات وحركات رقصية الشكل 2. التكزز
الفيزيولوجي.

- duration t. تَكَّرَزٌ مُدِيد؛ تَكَّرَزٌ دَائِم. تقلصات
تكززية مستمرة استجابة للتنبيه بتيار كهربائي مستمر
وشديد ويحدث ذلك خاصة في العضلات المتكسدة.

- gastric t. تَكَّرَزٌ مُعِدِيّ. نوع وبيل من التكزز
ينتج عن مرض المعدة والذي يتصف بصعوبة التنفس
والتشنج التوتري المؤلم للأطراف.

- hyperventillation t. تَكَّرَزٌ فُرْطُ التَّهْوِيَّة.
تكزز ينتج عن الشهيق والزفير الشديدين والمستمرين
لفترة طويلة.

- latent t. تَكَّرَزٌ كَامِن. تكزز يظهر عند التنبيه
بمنبهات كهربائية أو ميكانيكية.

- neonatal t. (= t. of newborn) تَكَّرَزٌ وَلِيدِيّ.
تكزز بنقص الكالسيوم الذي يحدث في الأيام الأولى من
حياة الوليد والذي يتصف بالهيجوية والنفضان
العضلي والعصبية المفرطة والرعاش والاختلاج
وأحياناً تشنج الحنجرة والتشنج الرسغي القدي.

- parathyroid t. التَكَّرَزُ الدُّرَيْقِيّ. التكزز بمرض
الدرقية أو بإزالتها.

tetraparesis خَرَلٌ رُبَاعِيّ. ضعف عضلي
يصيب الأطراف الأربعة.

tetraplegia (= quadriplegia) شَلَلٌ
رُبَاعِيّ. شلل يصيب الأطراف الأربعة.

thalamectomy (= thalamotomy) قَطْع
المِهاد؛ بَضْعُ المِهاد، تَخْرِيبُ المِهاد.

thalamencephalon الدُّمَاغُ المِهادِيّ.
قسم الدماغ البيني الذي يضم المهاد والمهاد التالي
وجنب المهاد.

thalamocoele جَوْفُ المِهاد. البطين الثالث
للدماغ.

thalamocortical مِهادِيّ قَشْرِيّ. منسوب
للمهاد ولقشرة المخ.

thalamolenticular مَهَادِيَّ عَدَسِيّ.

متعلق بالمهاد والنواة العدسية.

thalamomamillary مَهَادِيَّ حَلَمِيّ. متعلق

بالمهاد والجسمين الحلميين.

thalamotegmental مَهَادِيَّ سَقِيْفِيّ. متعلق

بالمهاد وبالسقيفة.

thalamotomy بَضْعُ المِهَاد. تخريب المهاد

بطريقة الجراحة التجسيمية للتخريب المحدد لمجموعة معينة من خلايا المهاد كطريقة في التفريغ عن الألم أو الرعاش والصمل في داء باركنسون.

- anterior t. بَضْعُ المِهَادِ الأَمَامِيّ. تخريب النواة

الامامية للمهاد.

- dorsomedial t. بَضْعُ المِهَادِ الظَّهْرِيّ الإنْسِيّ.

تخريب النواة الظهرية الإنسية للمهاد.

thalamus المِهَاد. أحد الجسمين البيضويين

الكبيرين المؤلفين بصورة رئيسية من المادة السنجابية ويقع كل واحد منهما في إحدى الجهتين ويكون الجدار الوحشي للبطين الثالث. وينقسم المهاد إلى قسمين رئيسيين ظهري وبطني ويحتوي كل قسم منهما العديد من النوى، وعند استعمال المصطلح «المهاد» فإنه يعني عادة «المهاد الظهري».

- dorsal t. (= t. dorsalis) المِهَادُ الظَّهْرِيّ.

منطقة القسم الظهري من الدماغ البيني التي تكون معظم الجدار الوحشي للبطين الثالث وتتكون بصورة رئيسية من مادة سنجابية مترافقة مع صفائح من مادة بيضاء وهي تنقسم إلى أقسام أمامية وإنسية ووحشية يحوي كل منها مجموعات من النوى التي تعمل كمحطات ترحيل للدفعات الحسية وللاسقاطات المخيخية والنوى القاعدية إلى قشرة المخ. وأهم المجموعات الرئيسية للنوى المهادية هي الشبكية والامامية والناصفية والإنسية والبصلية وداخل الصفائح والبطنية الوحشية والخلفية.

- optic t. (= corpus geniculatum laterale) المِهَادُ البَصَرِيّ. الجسم الركبي الوحشي.

- t. ventralis المِهَادُ البَطْنِيّ. المنطقة البطنية

من الدماغ البيني التي تتوسط بين المهاد الظهري والوطاء وسقيفة الدماغ المتوسط والتي تحوي الجسمين الركبيين الإنسي والوحشي والنوى تحت

المهادية والشبكية والمنطقة الغائرة ونوى الباحة (ساحات فوريل)، وتسمى أيضاً تحت المهاد.

thanatophobia وَهَابُ المَوْت. الخوف غير المسبب من الموت.

theca قُرَاب. (ج: قُرَاب). غطاء أو غلاف.

- t. medullare spinalis قُرَابُ النُّخَاع. الأم الجافية للنخاع الشوكي.

- t. vertebralis قُرَابُ العَمُودِ الفَقَارِيّ. الأم الجافية للنخاع الشوكي.

thelalgia ألمُ الحَلَمَة. ألم حلمة الثدي.


therapy مُعَالَجَة: مُدَاوَاة. معالجة الأمراض ومداواتها.

- behavior t. مُعَالَجَة سُلُوكِيَّة. أسلوب علاجي يركز فيه على سلوك المريض المنظور بدلاً من الصراعات والعمليات اللاشعورية التي يفترض وجودها في حالات السلوك المنحرف، ويتم ذلك من خلال معالجة المتغيرات المحيطة والسلوكية المتعلقة بسلوك معين يؤمل تحويله، وهناك طرق عديدة للقيام بذلك.

- conditioning t. (= behavior t.) مُعَالَجَة إِشْرَاطِيَّة. معالجة سلوكية.

- convulsive t. مُعَالَجَة إِخْتِلَاجِيَّة. معالجة الأمراض العقلية وخصوصاً الكآبة بإحداث الاختلاجات، والطريقة المستعملة اليوم هي بالصدمات الكهربائية الاختلاجية وقد كانت تستعمل سابقاً بعض الأدوية كالميترازول لإحداث الاختلاجات.

- electroconvulsive t. المُعَالَجَة بِالتَّخْلِيغ الكهربيّ؛ المُعَالَجَة بِالصَّعْدَةِ الكَهْرَبَائِيَّة. معالجة الاضطرابات النفسية وخصوصاً الكآبة بإحداث الاختلاجات وفقدان الوعي باستعمال تيار كهربائي متناوب ومنخفض الفولطية لتنبية الدماغ خلال فروة الرأس ولفترة جزء من الثانية. وعادة ما يستعمل دواء مرخٍ للعضل لمنع الأذى للعضلات خلال التوبة وعادة ما تدوم الغيبوبة لمدة خمس دقائق بعد الصدمة تتلوها فترة تخليط حاد تدوم لمدة ساعة تقريباً وغالباً ما تتلو ذلك فترة فقد ذاكرة جزئي قد تدوم لعدة أسابيع بعد العلاج. وقد تؤدي هذه الطريقة العلاجية إلى استجابات علاجية جيدة في معظم حالات الكآبة. وقد استعملت هذه الطريقة أيضاً في معالجة بعض حالات الفصام.



thalamus

مقطع القلي للدماغ يبين المهاد وبعض أقسامه الرئيسية الأخرى: (1) النواة المنزنية (2) المحفظة الباطنة (3) النواة العدسية (4) القرن السفلي للبطين الجانبي (5) الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي (6) الحصين (7) ذنب النواة المنزنية (8) القرن الخلفي للبطين الجانبي (9) الأجسام الرباعية (10) الجسم الركبي الإنسي (11) الجسم الركبي الوحشي (12) الوسادة (13) الجسم الصنوبري (14) السطر الانتهائي (15) البطين الثالث (16) الكتلة المتوسطة (17) الحبيبة الأمامية للمهاد (18) أمعة القبول (مقطوعة) (19) الثقب بين البطينات (20) الحاجز الشفاف (21) الجسم اللقني (مقطوع).

- electroshock t. (= electroconvulsive t.)
مُعالِجَةٌ بِالصَّعْمَةِ الكَهْرِبَائِيَّةِ.

- narcosis t. مُعالِجَةٌ تَحْدِيرِيَّةٌ. معالجة بعض حالات القلق الشديد والإنهاك والهباج الوبيل بتنويم المريض لمدة طويلة (18-24 ساعة يومياً لمدة أسبوعين) باستعمال العقاقير المنومة وتستعمل الباربيتورات عادة لذلك وتسمى هذه الطريقة أيضاً معالجة تنويمية.

- psychoanalytic t. (= psychoanalysis)
تَحْلِيلٌ نَفْسِيٌّ.

- shock t. (= convulsive t.) مُعالِجَةٌ إِخْتِلَاجِيَّةٌ. معالجة بالصدمة.

- sleep t. (= narcosis t.) مُعالِجَةٌ بالنوم. معالجة الأمراض بالإيهاء التنويمي.

thermalgesia حُرَاقٌ؛ إِيْلَامٌ حَرَارِيٌّ. حالة الشعور بالألم عند التنبيه الحراري.

thermalgia (= causalgia) أَلَمٌ حَرَارِيٌّ. حالة الشعور بحس ألم محرق شديد.

thermanalgesia فَقْدُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. عدم الشعور بالألم عند التنبيه بالحرارة أو عدم الحسِّ بالمنبهات الحرارية.

thermanesthesia فَقْدُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. عدم المقدرة على الشعور بحسي الحرارة والبرودة.

thermesthesia حِسُّ الحَرَارَةِ. المقدرة على الشعور بحسي الحرارة والبرودة.

thermesthesiometer مِقْيَاسُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. آلة لقياس حس الحرارة.

thermhyperesthesia فَزْطُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. فرط حس الحرارة والبرودة.

thermhypesthesia نَقْصُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. نقص الحس السوي للحرارة والبرودة.

thermoaesthesia (= thermesthesia) حِسُّ الحَرَارَةِ.

thermohyperalgesia فَزْطُ التَّأَلُّمِ بِالْحَرَارَةِ. حالة تتصف بالتألم الشديد عند التنبيه بالحرارة المعتدلة.

thermohyperesthesia فَزْطُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. التحسس المفرط للحرارة والبرودة.

thermohypesthesia نَقْصُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ. حالة نقص التحسس للحرارة المرتفعة.

thermohypoesthesia (= thermohypesthesia) نَقْصُ حَسِّنِ الحَرَارَةِ.

thermoneurosis عُصَابٌ حَرَارِيٌّ. سخونة ناتجة عن منشأ وعائي حركي.

thermoplegia (= heat stroke) شَلْلٌ حَرَارِيٌّ. ضربة الحرارة.

thigmesthesia (= tactile sensibility) حِسُّ اللمس.

thigmotaxis إِتْجَاذٌ لِمَسِيٍّ. توجه الكائن استجابة لحس اللمس أو للتلامس.

thinking تَفْكِيرٌ. فعالية دماغية فكرية (بعكس الفعالية العاطفية) أو سريان الأفكار والرموز والترابطات التي تولد المدارك والاسباب.

- autistic t. (= autism) إِنْطَوَاءٌ عَلَى الذَّاتِ. تفكير ذاتي مغلق.

- dereistic t. (= dereism) وهل؛ التَفَكُّيرُ التَّخَيُّلِيُّ. تفكير خيالي غير واقعي.

thiopental sodium ثِيُوبَنْتَالُ الصُّوْدِيُومِ. باربيتورات تستعمل كمخدر عام سريع وقصير الأمد ويعطى قبل المخدرات الأخرى بحقنه داخل الوريد، ويعطى أيضاً كدواء مضاد للاختلاج.

thiopropazate hydrochloride هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الثِيُوبِرُوبَازِيْتِ. دواء يعطى في علاج الذهان أو لإيقاف الفعالية العضلية اللاإرادية في رقص هنتنغتون ويستعمل عن طريق الفم.

thioridazine hydrochloride هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الثِيُورِيدَازِينِ. دواء مهدئ وله تأثير مهدئ ويؤثر على السلوك ويعطى عن طريق الفم.

thiothixene ثِيُوثِيكْسِينِ. دواء مضاد للذهان ويعطى عن طريق الفم.

thioxanthene ثِيُوزَانْتِينِ. واحد من مجموعة الأدوية المضادة للذهان.

thiphenamil hydrochloride هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الثِيْفِينَامِيلِ. دواء مضاد للفعل

الكولينيني وله فعل قوي مضاد للتشنج ومرخ لتشنجات العضلات الملساء التي تحصل في الاضطرابات المعدية ويعطى عن طريق الفم.

thoracalgia ألم في جدار الصدر.

thoracodynia وجع في الصدر.

thought broadcasting إنتشار الأفكار.

شعور الشخص بأن أفكاره تنتشر إلى محيطه.

thought insertion غرز الأفكار. توهم

الشخص بأن أفكار الآخرين تنغرز في عقله.

thought withdrawal إزالة الأفكار. توهم

الشخص بأن شخصاً أو شيئاً ما يزيل الأفكار من عقله.

threshold عتبة. (ج: عتبات). 1. القيمة

الصغرى التي يولد عندها المنبه مجرد إحساس يدرك أو ليكون ضمن حدود الإدراك 2. الحاجز الفرضي الذي يجب أن يتعداه المنبه ليصل حد الإدراك.

- absolute t. عتبة مطلقة. أصغر حد ممكن من التنبيه الذي يتمكن من توليد إحساس ما.

- t. of conscionsness عتبة الوعي. أوطا حد للتحسس أو حد الوعي الذي يولد عنده المنبه إحساساً يدرك.

- convulsant t. عتبة الإختلاج. أصغر كمية من التيار الكهربائي أو من الدواء اللازمة لتوليد الاختلاج في العلاج الاختلاجي.

- differential t. العتبة التفرّيقية. نسبة الفرق بين منبهين إلى نصف حاصل جمعهما، وهي الحد الأدنى من الشدة اللازمة للتحسس التمييزي لكي يمكن إدراك الفرق بين شدتهما وتمييزهما عن بعضهما.

- displacement t. عتبة الإنزياح. عتبة إدراك انقطاع استمرارية إحدى الحافات أو محيط أحد الأجسام.

- double point t. عتبة النقطتين. أصغر مسافة بين نقطتي لمس يتمكن الشخص من إدراكهما منفصلتين عن بعضهما.

- galvanic t. (= rheobase) عتبة غلفانية. أصغر شدة من التيار الكهربائي غير محدودة المدة تتمكن من توليد نبضة عضلية.

- neuron t. عتبة العصبون. درجة تنبيه العصبون

الكافية لمجرد توليد استثارة ظاهرة منه (كالإحساس أو الحركة).

- relational t. العتبة النسبية. النسبة التي يجب أن تكون بين منبهين كي يمكن إدراك الفرق بينهما.

- resolution t. (= t. of consciousness) عتبة التمييز؛ عتبة الوعي.

- sensitivity t. (= stimulus t. = absolute t.) عتبة الإحساس؛ عتبة الحساسية.

thrill هزير. حس الاهتزاز الذي يحسه الفاحص عند جس الجسم.

thrombosis خثار. (ج: خثرات). تكوين أو وجود أو تنامي خثرة.

- cerebral t. خثار دماغي. خثار أحد الأوعية الدماغية الذي يمكن أن يولد احتشاء دماغياً.

thymoleptic (= antidepressant) مُعدّل المزاج؛ مُضاد الكآبة؛ مُنْعَش. دواء يحسن المزاج وينعشه في حالات الاضطرابات العاطفية كالكآبة أو الهوس.

tibialgia ألم الحرف الظنبوب.

tic عزة. (ج: عزّات). حركة لا إرادية إجبارية نمطية مكررة شبيهة بالحركة القصدية لأنها منسقة وتقوم بها عضلات في حالة تأزرها السوي وهي عادة ما تشمل الوجه والمنكبين.

- bowing t. (= nodding spasm) عزة الانحناء؛ عزة الإيماء. تشنج إيمائي أو انحنائي.

- convulsive t. عزة إختلاجية. تشنج أقسام الوجه التي يغذيها العصب السابع.

- degenerative t. عزة تنكسية. عزة تترافق مع تنكس الجهاز العصبي المركزي.

- t. de pensée عزة عفوية؛ عزة تغييرية. عادة التعبير عن أية فكرة تخطر على البال بصورة لا إرادية.

- diaphragmatic t. عزة جبابية. حركات الحجاب النفضانية التشنجية اللاإرادية.

- t. douloureux (= trigeminal neuralgia) عزة مؤلّمة. ألم العصب الثلاثي التوائم.

- facial t. عزة وجهية. تشنج عضلات الوجه.

- **gesticulatory t.** عَرَّةٌ إِيْمَائِيَّةٌ. عرة تتصف بحركات تشنجية تشبه إيماء الخطيب أو الممثل.

- **laryngeal t.** عَرَّةٌ حَنَجَرِيَّةٌ. عرة تتصف بقذف هوائه خلال المزمار.

- **local t.** عَرَّةٌ مُوَضِّعِيَّةٌ. عرة تصيب منطقة محددة مثل العين.

- **mimic t. (= facial t. = facial spasm)** عَرَّةٌ تَقْلِيدِيَّةٌ، عَرَّةٌ وَجْهِيَّةٌ؛ تَشْنَجٌ وَجْهِيٌّ.

- **motor t.** عَرَّةٌ حَرَكِيَّةٌ. عرة تتصف بحركة تشنجية فقط من دون أي اضطراب عقلي وهي تشمل التشنج الوجهي والدوراني الجفني والحنجري والحجابي وأنواع العرات الأخرى.

- **t. nondouloureux (= myoclonus)** عَرَّةٌ غَيْرٌ مُؤَلِّمَةٌ. رمع عضلي.

- **progressive choreic t.** عَرَّةٌ رَاقِصِيَّةٌ مُتَرَقِّقَةٌ. مرض مزمن يبدأ في مقتبل العمر ويتصف بتشنجات تصيب عضلات الرقبة في البداية وتنتشر إلى باقي أقسام الجسم مع تقدم المرض وينتهي عادة بالموت.

- **respiratory t. (= diaphragmatic t.)** عَرَّةٌ تَنَفُّسِيَّةٌ.

- **rotatory t. (rotatory spasm)** عَرَّةٌ دَوْرَانِيَّةٌ. تشنج دوراني.

- **saltatory t. (= saltatory spasm)** عَرَّةٌ قَفْزِيَّةٌ. تشنج قفزي.

- **t. de sommeil** عَرَّةٌ النَّوْمِ. حركة الرأس اللاإرادية أثناء النوم.

- **spasmodic t** عَرَّةٌ تَشْنَجِيَّةٌ. حالة تتصف بحركات تشنجية لمجموعة من العضلات تحدث في فترات غير منتظمة.

tickling دَغْدَغَةٌ. تنبيه خفيف لأحد أسطح الجسم يولد بعض الاستجابات اللاإرادية كالضحك والحركات الأخرى.

time, reaction زَمَنُ الْإِسْتِجَابَةِ. الوقت الذي يمر بين وضع المنبه والاستجابة أو رد الفعل له لولده عنه.

tingling فَخَزٌ. حسٌ نخزي الشكل يتسبب عن البرد أو عن ضرب أحد الأعصاب أو نتيجة بعض أمراض الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي.

tinnitus طَنِينٌ. ضوضاء في الأذن قرعية أو ضجيجية أو أزيزية أو قلقلية يسمعها المريض وأحياناً يسمعها الآخرون بالقرب منه

- **t. aurium** طَنِينٌ أُذُنِيٌّ. إحساس شخصي بسماع الضوضاء في الأذن.

- **cerebral t.** طنين دماغي. طنين يحس به الشخص كان في داخل الدماغ وليس من الأذنين.

- **clicking t.** طَنِينٌ قَلْقَلِيٌّ. صوت قلقلي يسمع في الأذن في التهاب الأذن الوسطى النزلي المزمن ومن الممكن أن يسمعها الآخرون غير المريض نفسه.

- **Leudet's t.** طَنِينٌ لُودِيَّت. صوت قرعقي في الأذن يسمعه المراقبون أيضاً يتولد عن التقلص اللاإرادي لعضلة باطنة ويتطابق مع عرة بعض الياف الفرع الفكي السفلي للعصب الثلاثي التوائم.

- **nervous t.** طَنِينٌ عَصَبِيٌّ. طنين يتولد عن بعض اضطرابات العصب السمعي أو ارتباطاته المركزية.

- **nonvibratory t.** طَنِينٌ لَا اهْتِرَازِيٌّ. طنين يتولد عن تغيرات كيميائية حيوية في الوظائف العصبية السمعية.

- **objective t.** طَنِينٌ مُوَضُّوعِيٌّ. أصوات شاذة أو مرضية تتولد داخل جسم المريض في منطقة الأذن يسمعها الأشخاص الآخرون غير المريض.

- **pulsative t.** طنين نبضي. طنين اهتزازي يحس به بتكرار نظمي يتزامن مع ضربات القلب.

- **vibratory t.** طَنِينٌ اهْتِرَازِيٌّ. طنين ينتج عن انتقال الاهتزازات التي تتولد في مناطق الجسم المجاورة للقوقعة إليها.

titubant مُتَرَنَّحٌ. الشخص الذي يترنح.

titubation تَرَنَّحٌ. مشية ترنحية أو تعثرية مع اهتزاز الجذع والرأس، وتُشاهد عادة في أمراض المخيخ.

- **lingual t. (= stuttering)** تَرَنَّحٌ لُطَقِيٌّ؛ تَأْتَأَةٌ.

tocophobia رُهَابُ الْمَخَاضِ. رهاب الولادة.

tomography تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ. تصوير شعاعي لأحد مقاطع الجسم الداخلية.

tonaphasia حُبْسَةٌ نَغْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ مُوسِيقِيَّةٌ.

- عدم المقدرة على تذكر النغمات الموسيقية.
- 1. تَوْتَر 2. نَغْمَة.** 1. درجة الشد أو tone
التوتر السوية، وفي العضلات هي درجة مقاومتها
للتمديد 2. إحدى خواص الصوت.
- نغمة الإحساس؛ نغمة الشعور.** حالة - feeling t.
الفكر والشعور الذي يرافق أية فكرة أو عمل.
- تَوْتَرِي رَمَعِي.** تشنج يتكون tonoclonic
من نقصان العضل الاختلاجي.
- لَوْزَةُ الْمُخِيخ.** كتلة مدورة tonsilla cerebelli
تكون جزءاً من الفص الذنبى لنصف كرة المخيخ
ومتصلة بلهاة الدودة.
- لَوْزَةُ الْمُخِيخ (= tonsilla cerebelli)**
تَوْتَرِيَّة؛ تَوْتَر. التقلص البسيط المستمر tonus
للعضلات الذي يساعد العضلات الهيكلية على
المحافظة على الوضع وعودة الدم إلى القلب.
- تَوْتَر مُخِي.** توتر العضلات الذي - cerebral t.
الذي يتولد عند إزالة المخ.
- تَوْتَر كِيمِيَائِي.** حالة الفعالية - chemical t.
الكيميائية البسيطة والمستمرة في العضلات في حالة
راحتها.
- تَوْتَر عَضَلِي الْمُنْشَأ.** تقلص - myogenic t.
العضلات التوتري الذي يعتمد على بعض خواص
العضلات نفسها أو بعض خلاياها العصبية الباطنة.
- تَوْتَر عَصَبِي الْمُنْشَأ.** تقلص - neurogenic t.
العضلات التوتري الذي ينتج عن التنبيه الذي تستلمه
خلال اعصابها الحركية.
- 1. عَمَة تَوْضِيع اللَّفْس** topagnosia
2. عَمَة لَفْس الْأَجْسَام. 1. عدم المقدرة على معرفة
موضع اللمس 2. عدم المقدرة على معرفة طبيعية
الأشياء الاعتيادية باللمس.
- عَمَة تَوْضِيع اللَّفْس.** عدم المقدرة topagnosis
على معرفة موضع اللمس.
- أَلَم مُتَوَضِع.** ألم متوضع في topalgia
نقطة واحدة وهو صفة عامة للألم الذي يتولد عن
سبب غير عضوي كما هو الحال في الاضطرابات
النفسية.
- إِسْتِئْصَالٌ مُوَضِعِي.** استئصال topectomy
- موضع محدد ومعين من القشرة الجبهية للمخ في
معالجة بعض الأمراض النفسية.
- جِسُّ تَوْضِيع اللَّفْس.** المقدرة topesthesia
على تعيين موضع حس اللمس.
- أَلَم مُوَضِع.** topoalgia (= topalgia)
- عَمَة تَوْضِيع اللَّفْس.** topoanesthesia
عدم المقدرة على معرفة موضع اللمس.
- شُدُوذُ تَوْضِيع اللَّفْس.** topodysesthesia
شذوذ توضع حس اللمس.
- جِسُّ تَوْضِيع اللَّفْس.** topognosis (= topesthesia)
- خَذَرٌ مُوَضِعِي.** toponarcosis
- مَذَلٌ مُوَضِع.** مذل متوضع topoparesthesia
في منطقة محدودة.
- مَقْيَاسُ الْجِسِّ** topothermesthesiometer
الحراري. آلة لقياس حس الحرارة الموضعي.
- مَقْص.** tormina (= colic)
- فُتُور.** قلة أو ضعف الاستجابة torpor
للمنبهات الاعتيادية.
- 1. لَوِي 2. انْفِطَال.** 1. عملية آلية torsion
تلوي فيها قوة خارجية أحد الأجسام حول محوره
2. عملية الانفثال حول المحور.
- دَوْرَانٌ سَلْبِي.** دوران باتجاه - negative t.
معاكس لدوران عقرب الساعة.
- دَوْرَانٌ إِيْجَابِي.** دوران باتجاه - positive t.
مساير لدوران عقرب الساعة.
- مَقْيَاسُ الْانْفِطَال.** آلة لقياس torsionometer
درجة انفثال العمود الفقري.
- صَعْرٌ.** حالة torticollis (= wryneck)
تقلص عضلات الرقبة تولد لوبها ووضع الرأس في
وضع غير طبيعي.
- صَعْرٌ خَلْقِي.** صعر ينتج عن - congenital t.
إصابة العضلة القصية الترقوية الخشائية في إحدى
الجهتين أثناء الولادة وتحولها إلى حبل ليفي لا يطول
مع تنامي الرقبة.
- صَعْرٌ هِسْتِيرِي.** صعر ينتج عن - hysteric t.
تفقع هستيري.
- صَعْرٌ** - intermittent t. (= spasmodic t.)
مُنْقَطِع. صعر تشنجي.



torticollis

الصعر السباتي: جنف الرقبة مع ميلان الرأس.

- labyrinthine t. صَعَرٌ يَهَيَّيْ. صعر يتولد عن تهيج الاقنية الهلالية على إحدى الجهتين.

- mental t. صَعَرٌ نَفْسِي. نوع من العرة أو التشنج المعتاد الذي يتصف بالتقلص التشنجي لعضلات الرقبة مولداً انحراف الرأس الذي يتوقف عادة عند الاستلقاء أو بالإمكان السيطرة عليه بمجرد الضغط البسيط.

- myogenic t. صَعَرٌ عَضَلِيّ الْمُنْشَأ. حالة عابرة تنتج عن تقلص عضلات الرقبة بسبب الروماتزم أو البرد.

- neurogenic t. صَعَرٌ عَصَبِيّ الْمُنْشَأ. صعر ينتج عن انضغاط العصب الإضافي أو تهيجه.

- ocular t. صَعَرٌ عَيْنِي. صعر يتولد عن درجة عالية من اللابؤرية أو عن شلل عضلات العين.

- reflex t. صَعَرٌ اِنْعَكَاسِي. صعر ينتج عن التهاب أو تقيح في الرقبة أو تضخم العقد اللمفية أو ورم اللوزتين أو الرقبة أو الحنجرة.

- rheumatoid t. صَعَرٌ رُوماتويدي. صعر ينتج عن الروماتزم وخصوصاً ذلك الذي يصيب العضلة القصية الترقوية الخشائية والعضلات المجاورة لها.

- spasmodic t. صَعَرٌ تَشْنُجِي. صعر ينتج عن التشنج المتقطع لبعض العضلات.

- spurious t. صَعَرٌ كَاذِب. التواء الرقبة أو تبيسها بسبب تسوس الفقرات الرقبية.

- symptomatic t. صَعَرٌ عَرَضِي. تبيس الرقبة بسبب الروماتزم.

tortipelvis انفَتَالُ الْحَوْض؛ اِتِّوَاءُ الْحَوْض. خلل التوتر العضلي المشوّه للحوض.

tortua اِحْتِضَار؛ عَذَاب.

- t. facies عَذَابُ الْوَجْه. تسمية ابن سينا للآلم العصبي لثلاثي التوائم.

touch مَسْ؛ لَمَس. 1. الحس الذي يعرف الشخص ببعض خواص المواد عند تماسها. 2. الجس أو التحري بالأصابع.

toxicophobia رُهَابُ التَّسَمُّ. الخوف غير الناجم عن التسمم.

trabecula تَرَبِيق. (ج: تَرَابِيق). خيط مثبت أو ساند من نسيج ضام وكذلك الخيط الذي يمتد من المحفظة إلى العضو الموجود في داخلها.

- arachnoid trabeculae تَرَابِيقُ الْعَنْكَبُوتِيَّة. خيوط ليفية رقيقة تربط السطح الداخلي للعنكبوتية بالأم الجافية.

tract سَبِيل. (ج: سُبُل)؛ فَسْلُك. (ج: فَسَالِك). منطقة خصوصاً الطويلة منها أو مجموعة أو حزمة من الألياف العصبية التي لها أصل واحد ووظيفة مشتركة ونهاية واحدة، أو مجموعة من الأعضاء مرتبة على شكل سلسلة تقوم بمجموعها بوظيفة معينة واحدة.

- Bekhterev's t. (= tractus tegmentalis centralis) سَبِيلُ بَخْتِيرِيف. السبيل السقيفي المركزي.

- bulbar t. سَبِيلُ بَصْلِي. أي من سبل الألياف العصبية للنخاع المستطيل أو (البصلة)

- Burdach's t. (= fasciculus cuneatus medullae spinalis) سَبِيلُ بُورْدَاخ؛ الْحَزْمَةُ اِلِسْفِينِيَّةُ النُّخَاعِيَّةِ الشُّوكِيَّة.

- central t. of auditory nerve السَبِيلُ الْمَرْكَزِيّ لِلْعَصَبِ السَّمْعِيّ. الياف تمر من النوى القوقعية إلى الزيتونة العلوية ثم إلى الفتل الوحشي على الجهتين المعاكسة والعكسية ثم إلى الأعلى خلال عضد الأكمة السفلية إلى الجسم الركبي الإنسي ومنه إلى قشرة التلافيف الصدغية المستعرضة.

- central of cranial nerves السَبِيلُ الْمَرْكَزِيّ لِأَعْصَابِ الْخَفَافِيَّة. الياف العديد من الأعصاب القحفية التي تمر إلى الأعلى حتى المهاد بالترافق مع الفتل الإنسي.

- central t. of trigeminal nerve السَبِيلُ الْمَرْكَزِيّ لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَائِم. حزمة بارزة تقريباً من الياف من العصب ثلاثي التوائم تمر إلى الأعلى حتى المهاد على الجهة الظهرية من الفتل الإنسي.

- cerebellorubrospinal t. السَبِيلُ الْمُخَيَّخِي الْحَمْرَائِي النُّخَاعِيّ. الياف تمر من النواة المسننة للمخيخ للنواة الحمراء على الجهة الأخرى ومنها إلى النخاع الشوكي.

- cerebellospinal t. السَبِيلُ الْمُخَيَّخِي النُّخَاعِيّ. الحزمة المعقوفة للمخيخ التي تمر من النواة الأوجية إلى النخاع الرقبي.

- cerebellotegmental t. of bulb
(= fastigiolobular t.) السَّبِيلُ الْمُخَيَّضُ
السَّقِيْفِيُّ لِلْبَصْلَةِ. السَّبِيلُ الْأَوْجِي البَصْلِي.
- comma t. of Schultze (= fasciculus
interfascicularis) السَّبِيلُ الضَّمِي لِشُولْتْز:
الْحَزْمَةُ بَيْنَ الْحَزَمِ.
- conarhophyseal t. السَّبِيلُ الصَّنُوبَرِيُّ
النَّخَاعِي. جزء من تجويف دماغ الجنين يربط الجسم
الصنوبري مع الغدة النخامية.
- cornucommissural t. السَّبِيلُ الْقَرْنِيُّ
الصُّوَارِي. الألياف عصبية في القسم الأمامي من
العمود الفقري للنخاع الشوكي تمتد خلال المنطقتين
العجزية والقطنية.
- corticocerebellar t's. (= corticopontile
t's.) السَّبِيلُ الْقَشْرِيَّةُ الْمُخَيَّضَةُ.
- corticorubral t. السَّبِيلُ الْقَشْرِيُّ الْحَمْرَائِي.
الألياف عصبية تمر من قشرة المخ إلى النواة الحمراء.
- corticospinal t. of medulla oblongata
(= fasciculus pyramidalis) السَّبِيلُ الْقَشْرِيُّ
النَّخَاعِيُّ لِلْبَصْلَةِ. الحزمة الهرمية.
- fastigiolobular t's. السَّبِيلُ الْأَوْجِيَّةُ الْبَصْلِيَّةُ.
حزم من الألياف عصبية صادرة تمر من النواة البرحاء
إلى البصلة (النخاع المستطيل).
- geniculocalcarine t. (= radiatio
optica) السَّبِيلُ الزُّكْبِيُّ الْمِهْمَازِي. الشع البصري.
- Goll's t. (= fasciculus gracilis
medullae spinalis) سَبِيلُ غُول. الحزمة
الناحلة النخاعية الشوكية.
- Gower's t. (= tractus spino-
cerebellaris ventralis) سَبِيلُ غَاوَر. السَّبِيلُ
النخاعي المخيخي البطني.
- Helweg's t. (= tractus olivospinalis)
سَبِيلُ هِلْفَغ. السَّبِيلُ الزَيْتُونِي النخاعي.
- Intermediolateral t. (= columna
intermediolateralis medullae spinalis)
السَّبِيلُ الْمُتَوَسِّطُ الْوَحْشِي. العمود الوحشي للنخاع.
- Internuncial t. السَّبِيلُ بَيْنَ النَّوَى: السَّبِيلُ بَيْنَ
الْعُزْكَزَيْن. السَّبِيلُ الموصِل بين نواتين أو مركزين.
- Intersegmental t's. of spinal cord السَّبِيلُ

بَيْنَ شَذَفِ النَّخَاع. الحزم المخصوصة للشخاع
الشوكي.

- Lissauer's t. (= tractus dorsolateralis)
سَبِيلُ لِيْسَاوَر.
- Lowenthal's t. (= tractus tectospinalis)
سَبِيلُ لَوْفَنْتَال: السَّبِيلُ السَّقْفِي النخاعي.
- Maissiat's t. (= tractus illiotibialis) سَبِيلُ
مَيْسِيَات: السَّبِيلُ الْحَرْقُفِيُّ الظَنْبُوبِي.
- mamillopeduncular t. السَّبِيلُ الْحَلْمِيُّ
السُّوَيْقِي. سَبِيل عَصْبِي من الجسم الحلمي إلى نوى
في الحفرة بين السويقتين.
- Marchi's t. (= tractus tectospinalis)
سَبِيلُ مَارْشِي: السَّبِيلُ السَّقْفِي النخاعي.
- Meynert's t. (= tractus habenulo
interpeduncularis) سَبِيلُ مَيْنَرْت: السَّبِيلُ
العناني بين السويقات.
- Monakow's t. (= tractus rubrospinalis)
سَبِيلُ مُونَاكُوف: السَّبِيلُ الحمرراوي النخاعي.
- motor t. سَبِيلُ حَرَكِي. أية حزمة من الألياف
العصبية التي تنقل دفعات عصبية حركية من الجهاز
العصبي الحركي إلى العضلات.
- peduncular t., transverse السَّبِيلُ السُّوَيْقِيُّ
الْمُسْتَقَرِّض. شريط صغير من الألياف العصبية يمر
من عضد الأكمة السفلية إلى التلم الإنسي لساق
الدماغ.
- pyramidal t. (= pyramidal t. of medulla
oblongata) السَّبِيلُ الْهَرَمِي (لِلْبَصْلَةِ). السَّبِيلُ
الهرمي للنخاع المستطيل. مجموعتان من الألياف
العصبية (القشرية النووية والقشرية النخاعية) تبدآن
بصورة رئيسية من المناطق الحسية الحركية لقشرة
المخ وتنزلان إلى المحفظة الباطنة والسويقة المخية
والجسر والبصلة (النخاع المستطيل). وتتشابك
الألياف القشرية النووية مع النوى الحركية على طول
جذع الدماغ. ثم تعبر معظم الألياف القشرية النخاعية
في التصالب الهرمي ثم تنزل في النخاع الشوكي
كالسبيل القشري النخاعي الوحشي وتكون معظم
الألياف غير العابرة السبيل القشري النخاعي البطني.
وتنتهي الألياف السبيليين بالتشابك مع العصبونات
الحركية والبينية. ومن الناحية التطورية يعتبر السبيل
الهرمي سبيلاً حديثاً وأكثر تطوراً في الإنسان، وهو

- يوفر سيطرة قشرية مخية على الحركات الحذقة الماهرة الدقيقة لليد والأصابع وحركات النطق، ويسمى أيضاً السبيل القشري النخاعي للصلة.
- **rubroreticular t.** السبيل الحُفْزَاوِي الشَّبَكِيّ. ألياف عصبية تمر من النواة الحمراء إلى التكوين الشبكي للجسر والصلة.
- **sensory t.** سَبِيل حِسِّيّ. ألياف حزمة من الألياف العصبية تنقل دفعات حسية من المستقبلات المحيطية إلى الجهاز العصبي المركزي.
- **spinocervicothalamic t.** السبيل النُخَاعِي الرَقَبِيّ المِهَادِيّ. سبيل يصعد من دون تعابر في القسم الظهري من الحبل الوحشي إلى النواة الرقبية الوحشية والذي يترحل في المهاد عن طريق الفئيل الإنسي على الجهة المعاكسة.
- **Spitzka's t. (= Spitzka's-Lissauer's t. = tractus dorsolateralis)** سَبِيل سَبِيحَتَا: السبيل الظهري الوحشي.
- **strionigral t.** السبيل المُخَطَّطِي السُّودَاوِيّ. حزمة من الألياف العصبية تمر من الجسم المخطط إلى المادة السوداء.
- **tectocerebellar t.** السبيل السَّقْفِيّ المَخِيخيّ. حزمة الألياف عصبية تمر من سقف الدماغ المتوسط إلى المخيخ.
- **tegmental t.** السبيل السَّقْفِيّ. حزمة ألياف عصبية في السقفة خلف نواة الجسم المنحرف الخلفية ويعتقد أنها تربطها مع الدماغ المتوسط.
- **thalamo-occipital t. (= radiatio optica)** السبيل المِهَادِيّ القَذَالِيّ: الشع البصري.
- **thalamo-olivary t.** السبيل المِهَادِيّ الزَيْتُونِيّ. حزمة الألياف عصبية تنزل من المهاد إلى النواة الزيتونية.
- **tuberohypophsial t.** السبيل الأَخْذَوِيّ النُخَاعِيّ. ألياف عصبية تبدأ من خلايا النواة القمية ونوى المنطقة النخامية المتوسطة التي يعتقد أنها تكون الطريق العصبي الإفرازي المرتبط بالسيطرة العصبية على الفعاليات الإفرازية للفص الأمامي للغة النخامية.
- **vestibulocerebellar t.** السبيل الدُهْلِيْزِيّ المَخِيخيّ. ألياف القسم الدهليزي للعصب الثامن التي تمر إلى قشرة المخيخ.

- **Vicq d'Azyr t. (= fasciculus mamillothalamicus)** سَبِيل فَك دَازِير. قَطْع السَبِيل. عملية قطع أو بضع السبيل العصبي.
- **mesencephalic t.** قَطْع السَبِيل الدُمَاغِيّ المُتَوَسِّط. قطع جراحي للسبيل العصبية في الدماغ المتوسط.
- **tractus (= tract)** سَبِيل. (ج: سُبُل). مصطلح يطلق غالباً على حزمة من الألياف عصبية أو مجموعة منها لها نفس البداية والنهاية وتخدم نفس الوظيفة.
- **t. bulboreticulospinalis** السبيل البَصْلِيّ الشَّبَكِيّ النُخَاعِيّ. مجموعة من الألياف العصبية في الفئيل الوحشي للنخاع الشوكي تنحدر محاورها من الخلايا العصبية في البصلة (النخاع المستطيل).
- **t. cerebellorubralis** السبيل المَخِيخيّ الحُفْزَاوِيّ. ألياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من النواة المسننة للمخيخ وتمر إلى النواة الحمراء على الجهة المعاكسة خلال السويق المخيخي العلوي وتترحل الدفعات منها إلى التكوين الشبكي والنخاع الشوكي.
- **t. cerebellothalamic** السبيل المَخِيخيّ المِهَادِيّ.
- **t. corticohypothalamic** السبيل القَشْرِيّ الوِطَاطِيّ. مجموعة منتشرة من الألياف العصبية التي تبدأ من أقسام مختلفة من الفص الجبهي وتنتشر بصورة مباشرة إلى الوطاء.
- **t. corticonuclearis** السبيل القَشْرِيّ النُّوَوِيّ. السبيل الليفي العصبي المكون من الألياف القشرية النووية للسبيل الهرمي الذي يبدأ من قشرة المخ وينزل في المحفظة الباطنة ويتشابك في مختلف النوى الحركية في الدماغ المتوسط والجسر والصلة (النخاع المستطيل).
- **t. corticospinalis anterior (= t. corticospinalis ventralis)** السبيل القَشْرِيّ النُخَاعِيّ الأَمَامِيّ.
- **t. corticospinalis lateralis** السبيل القَشْرِيّ النُخَاعِيّ الوحشيّ. مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الوحشي من النخاع الشوكي تبدأ من قشرة المخ وتسمى أيضاً السبيل الهرمي الوحشي.

- t. corticospinalis ventralis** السَّبِيلُ القَشْرِيُّ النُّخَاعِي البَطْنِي. مجموعة من الألياف العصبية في الحبل البطني من النخاع تبدأ من قشرة المخ، وتسمى أيضاً السبيل الهرمي الأمامي.
- t. dentatohthalmicus** السَّبِيلُ المُسَنَّنِي المِهَادِي. ألياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من النواة المسننة للمخيخ وتمر إلى النواة البطنية الوحشية للمهاد المعاكس خلال السويق المخيخية العلوية ثم تترحل للدفعات إلى الفص الجبهي، وتسمى أيضاً السبيل المخيخي المهادي.
- t. dorsolateralis** السَّبِيلُ الظَّهْرِيُّ الوَحْشِي. مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع الشوكي على الجهة الظهرية للعمود الظهري وتتكون جزئياً من الألياف حسية الألم والحرارة والتي تدخل النخاع الشوكي ثم تسير لمسافة بضعة شذفات في السبيل الظهري الوحشي ومن ثم تتشابك في العمود الظهري.
- t. frontopontinus** السَّبِيلُ الجَبْهِيُّ الجَسْرِي. سبيل الألياف العصبية الذي يتكون من الألياف الجبهية الجسرية في الفص الجبهي من نصف كرة المخ ويمتد لينتهي في النوى الجسرية.
- t. habenulo- interpeduncularis** السَّبِيلُ العِنَائِي بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ. حزمة من الألياف العصبية تبدأ من نوى العنان وتمتد بالاتجاه الراسي البطني إلى النواة بين السويقتين لتتفرع في التكوين الشبكي للدماغ المتوسط.
- t. hypothalamohypophysialis** السَّبِيلُ الوِطَائِي النُّخَاعِي. الألياف العصبية التي تكون السبل الصادرة من الوطاء والتي تبدأ من نوياتها وتنتهي في مستويات البارزة الناصفية والقمع والفص الخلفي للنخامية وتشتمل على عدة مجموعات من الألياف العصبية.
- t. mesencephalicus nervi trigeminalis** السَّبِيلُ الدِّمَاغِي المَتَوَسِّطُ لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَاتُمِ. ألياف حسية للعصب الثلاثي التوائم الداخل والتي تستمر راسياً على طول الجهة الإنسية للسويق المخيخي العلوي وتوجد أجسام خلاياها في نواة السبيل الدماغي المتوسط الذي يرافقها.
- t. olfactorius** السَّبِيلُ الشَّمِّي. شريط مثلث ضيق يوجد في التلم الشمي للفص الجبهي والذي يبدأ من البصلة الشمية ويمتد خلفاً لينتهي بانقسامه في

السطرين الشميين الإنسي والوحشي وينتهي السطر الوحشي منهما في القشرة الشمية الأولية.

- t. olivocerebellaris** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي المَخِيخِي. سبيل ألياف عصبية تبدأ من الزيتونة ويعبر إلى الجهة المقابلة ليثقب الزيتونة الثانية ويدخل المخيخ خلال السويق السفلي.
- t. olivocohlearis** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي الفُوقَعِي. ألياف عصبية تمتد من نواة الزيتونة العلوية وتنتهي عند الخلايا الشعرية في العضو الحلزوني للمقوعة.
- t. olivospinalis** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي النُّخَاعِي. مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الوحشي تشاهد في مقطع النخاع الشوكي كمنطقة مثلثة وهي تنزل من النواة الزيتونية إلى الشذفات الرقبية العلوية.
- t. opticus** السَّبِيلُ البَصَرِي. السبيل الذي يبدأ من التصالبة البصرية ويمر إلى الخلف حول السويق المخي وينقسم إلى الجذرين الوحشي والإنسي اللذين ينتهيان في الأكيمة العلوية والجسم الركبي الوحشي على التوالي.
- t. paraventriculohypophysialis** السَّبِيلُ جَنْبِ المِهَادِي النُّخَاعِي. ألياف السبيل الوطائي النخاعي التي تبدأ في النواة جنب البطني في الوطاء والتي ينتهي بعضها في القمع ويصل بعضها الآخر إلى الفص الخلفي للغدة النخامية حيث تخزن فيه موادها الإفرازية كالأوسيتوسين قبل تحريرها إلى الدورة الدموية.
- t. pontoreticulospinalis** السَّبِيلُ الجَسْرِي الشَّبَكِي النُّخَاعِي. مجموعة من الألياف العصبية الشبكية النخاعية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من المنطقة الجسرية البصلية.
- t. pyramidalis (= fasciculus pyramidalis medullae oblongata)** السَّبِيلُ الهرمي. الحزمة الهرمية البصلية.
- t. pyramidalis anterior (= t. corticospinalis ventralis)** السَّبِيلُ الهرمي الأمامي. السبيل القشري النخاعي البطني.
- t. pyramidalis lateralis (= t. corticospinalis lateralis)** السَّبِيلُ الهرمي الوَحْشِي. السبل القشري النخاعي الوحشي.
- t. reticulospinalis (= t. reticulospinalis anterior)** السَّبِيلُ الشَّبَكِي النُّخَاعِي. مجموعة

من الالياف العصبية تبدأ على الأكثر من التكوين الشبكي للجسر والصلة وبصورة رئيسية على نفس الجهة و ثم تهبط في الحبلين الامامي والوحشي إلى معظم مستويات النخاع الشوكي.

- t. rubrospinalis السَّبِيلُ الحَمْرَاوِي النُّخَاعِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي من النخاع تبدأ من الخلايا الكبيرة للنواة الحمراء في الدماغ المتوسط.

- t. solitarius medullae oblongatae السَّبِيلُ البَصَلِيُّ المُفْرَد. سبيل نازل في الصلة (النخاع المستطيل) بالجهة البطنية الوحشية للقسم الذنبى للبلطين الرابع بالقرب من النواة الظهرية لنواة العصبين المبهم واللساني البلعومي ويضم أليافاً حشوية أولية واردة من الأعصاب الوجهي والمبهم واللساني البلعومي.

- t. spinalis nervi trigeminalis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ لِلعَصَبِ ثَلَاثِي التَوَاقِم. سبيل نازل للعصب الثلاثي التوائم يمتد من مستوى دخول جذوره الحسية إلى الجسر حتى الشدقات الرقبية العلوية للنخاع. هو يقع بالجهة الوحشية لنواة السبيل النخاعي للعصب الثلاثي التوائم حيث تتشابك فيه أليافه ويحمل هذا السبيل بصورة رئيسية دفعات حسي الألم والحرارة من الوجه.

- t. spinocerebellaris anterior (= t. spino- cerebellaris ventralis) السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المُخَيَّخِيّ الأَمَامِيّ.

- t. spinocerebellaris posterior (= t. spino- cerebellaris dorsalis) السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المُخَيَّخِيّ الخَلْفِيّ؛ السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المُخَيَّخِيّ الظَهْرِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من العمود الصدري والتي تنشطها النهايات الجلدية والعضلية والوتيرية والمفصالية وهي تصعد إلى المخيخ عن طريق القسم الظهري للحبل الوحشي ثم خلال السويق المخيخي السفلي.

- t. spinocerebellaris ventralis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المُخَيَّخِيّ البَطْنِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ على الأكثر من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة والتي تنشطها النهايات العصبية الجلدية والعضلية والوتيرية

والمفصالية وتصعد إلى المخيخ عن طريق القسم الامامي من الحبل الوحشي ومن ثم خلال السويق المخيخي العلوي.

- t. spino- olivaris السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ الزَيْتُونِيّ. سبيل ألياف عصبية صاعدة في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من الأعمدة السنجابية الظهرية للنخاع وتصعد إلى النواة الزيتونية.

- t. spinoreticularis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ الشَّبَكِيّ. سبيل ألياف عصبية صاعدة في الحبل الوحشي للنخاع تصعد إلى التكوين الشبكي لجذع الدماغ.

- t. spinotectalis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ السَّقْفِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع ومعظمها ألياف عابرة من أصلها وتصعد إلى الاكيمينتين العلوية والسفلية وتحمل دفعات حسية جسدية.

- t. spinothalamicus anterior (= t. spinothalamicus ventralis) السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المِهَادِيّ الأَمَامِيّ.

- t. spinothalamicus lateralis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المِهَادِيّ الوَحْشِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة وتنشط بحسي الألم والحرارة وتصعد إلى المهاد مع الفتل الوحشي في جذع الدماغ.

- t. spinothalamicus ventralis السَّبِيلُ النُّخَاعِيّ المِهَادِيّ البَطْنِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الامامي للنخاع متواصلة مع السبيل النخاعي المهادي الوحشي وتتبع من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة حاملة دفعات تنشط باللمس الخفيف وتصعد إلى المهاد وترافق الفتل الإنسي في جذع الدماغ.

- t. supraopticohypophysialis السَّبِيلُ فَوْق البَصَرِيّ النُّخَاعِيّ. ألياف السبيل الوطائي النخاعي التي تبدأ من النواة فوق البصرية للمهاد وينزل بعضها إلى القمع ويصل بعضها الآخر إلى الفص الخلفي للغدة النخامية حيث تخزن فيه موادها الإفرازية مثل الهرمون مضاد التبول قبل تحريره إلى الدورة الدموية.

- t. tectobulbaris السَّبِيلُ السَّقْفِيّ البَصَلِيّ. ألياف عصبية تبدأ غالباً من الاكيمة العلوية وتهبط إلى

- الحافة السفلية للجسر وتنتهي في نوى جذع الدماغ وفي التكوين الشبكي.
- **t. tectospinalis** السَّبِيلُ السَّقْفِيّ النُّخَاعِيّ. مجموعة من الألياف العصبية وغالباً ما تكون متصالبة تبدأ بصورة رئيسية من الاكيمة العلوية وتهبط إلى النخاع الرقبي حيث تتوضع في الحبل البطني.
- **t. tegmentalis centralis** السَّبِيلُ السَّقْفِيّ المَرْكَزِيّ. سبيل الألياف عصبية يبدأ من سقيفة الدماغ المتوسط والمادة السنجابية حول المسال والنواة الحمراء ويهبط في السقيفة والتكوين الشبكي لينتهي في المعقد الزيتوني السفلي، كما يحوي هذا السبيل الأليافاً صاعدة من التكوين الشبكي، ويسمى أيضاً سبيل بختريف.
- **t. triangularis (= t. olivospinalis)** السَّبِيلُ المثلث. السبيل الزيتوني النخاعي.
- **t. vestibulospinalis** السَّبِيلُ الدهليزيّ النُّخَاعِيّ. ألياف عصبية تبدأ من النواة الدهليزية الوحشية وتهبط من دون تعابر بصورة رئيسية في القسم البطني للحبل الوحشي خلال معظم مستويات النخاع الشوكي كما يوجد بعض منها في الشدقات الذنبية للنخاع في الحبل البطني وقد يوجد أكثر من سبيل واحد من هذه السبل في نخاع الإنسان.
- trait** خَلَّة. (ج: خَلَال). أية صفة وراثية أو نمط سلوكي مميز.
- tramadol hydrochloride** هِيْدُرُوكلُوْرِيْد التَرَامَادُول. دواء مسكن.
- trance** غَيْبِيَّة. حالة تغير الوعي تتصف بحدّة الإدراك البؤري وقلة الإدراك المحيطي وهي حالة شبيهة بالنوم مع قلة الفعالية وضعف الوعي.
- **alcoholic t.** غَيْبِيَّة كُحُولِيَّة. حالة جمدة تتولد عن فرط تناول الكحول وإذا كانت الكمية المتناولة كبيرة فيمكن أن تولد خللاً دورانياً مع الاختناق بسبب خمود الجهاز العصبي المركزي. كما تهبط الفعاليات الحيوية إلى حد متدنٍ ويصبح من الصعب إيقاظ المريض.
- **hypnotic t.** غَيْبِيَّة تَنَوِيْمِيَّة. حالة غيبوبة تولد بالتنويم.
- tranquilizer** مُهْدِئ. دواء يهدئ مع تأثير ملطف.
- **major t. (= antipsychotic agent)** مُهْدِئ كبير. عامل مضاد الذهان.
- **minor t. (= antianxiety agent)** مُهْدِئ صَغِير. عامل مضاد القلق.
- transcortical** عبر القشرية. ما يربط قسمين مختلفين من قشرة المخ أو ما يعتمد على مرض السبل التي تربط أقساماً مختلفة من قشرة المخ.
- transdural** عبر الجافية. خلال أو عبر الأم الجافية.
- transmission** 1. انْتِقَال؛ سِرَايَة 2. مُرَوِّق. 1. مرور أو انتقال الدفعات العصبية من عصبون لآخر أو انتقال الأمراض من شخص لآخر 2. مرور الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.
- **duplex t.** انْتِقَال بالاتجاهين. انتقال الدفعات العصبية باتجاهين على طول العصب.
- **ephaptic t.** انْتِقَال تماسي؛ انْتِقَال مَلَمَسِيّ. انتقال الدفعات العصبية عبر التماس بدلاً من الانتقال المشبكي.
- **neurochemical t.** انْتِقَال عَصْبِيّ كِيْمِيَاثِيّ. انتقال الدفعات العصبية عبر الاتصال المشبكي بواسطة المادة الكيميائية الناقلة.
- **neurohumoral t. (= neurochemical t.)** انْتِقَال عَصْبِيّ هُرمُونِيّ.
- **neuromuscular t.** انْتِقَال عَصْبِيّ عَضَلِيّ. انتقال بتوسط كيميائي لجهد الفعل من العصب إلى العضل خلال الاتصال العصبي العضلي.
- **synaptic t.** انْتِقَال المَشْبَكِيّ. توصيل الدفعات العصبية من عصبون لآخر أو إلى ليف عضلي أو إلى غدة عبر المشبك.
- trauma** رَضْح. (ج: رَضُوح). جرح أو إصابة سواء كانت عضوية أو نفسية.
- **psychic t.** رَضْح نَفْسِيّ. صدمة عاطفية تولد اضطراباً عاطفياً أو نفسانياً.
- traumasthenia (= traumatic neurosthenia)** وَهْن عَصْبِيّ رَضْحِيّ.
- trebenzomine hydrochloride** هِيْدُرُوكلُوْرِيْد التَرِبِنْزومِين. دواء مضاد للكآبة.

tremble إِرْتَعَشَ؛ رُعَاشٌ.

tremens إِرْتَعَاشِيٌّ. يتصف بالارتعاش أو الحركات الاهتزازية أو الرعاش أو يترافق معها.

tremograph مِخْطَاطُ الرُّعَاشِ. جهاز لتسجيل الرعاش.

tremor رُعَاشٌ. ارتعاش أو اهتزاز لا إرادي.

- **action t.** رُعَاشُ الْحَرَكَةِ. حركات اهتزازية
نظمية لا إرادية عند القيام بحركة إرادية للأطراف
الممدودة مثلاً عند الكتابة أو عند رفع قذح ويمكن أن
يكون ارتعاشاً في الصوت أو الأقسام الأخرى من
الجسم.

- **coarse t.** رُعَاشٌ غَلِيظٌ. رعاش تكون حركاته
بطيئة نسبياً.

- **continuous t.** رُعَاشٌ مُتَوَاصِلٌ. رعاش مستمر
كما يحدث في الشلل الرعشي.

- **epileptoid t.** رُعَاشٌ شَبِيهِ الصَّرَعِ. تشنج
رمعي مع الرعاش.

- **essential t.** رُعَاشٌ أَسَاسِيٌّ. رعاش وراثي
غامض المنشأ يبدأ في مختلف الأعمار وعادة حوالي
سنّ الخمسين من العمر ويبدأ بحركات دقيقة سريعة
تختلف عن الرعاش الباركنسوني في اليمين ثم
ارتعاش الساعدين واللسان والراس والساقين والجذع
ويزداد سوءاً بالعوامل العاطفية ويشد بالحركات
الإرادية ويتحسن وقتياً بالكحول.

- **familial t. (= essential t.)** الرُّعَاشُ العَائِلِيُّ.

- **fibrillary t.** رُعَاشٌ لَيْقِيٌّ. ارتعاش نظمي دقيق
بسبب تقلص المتناوب لمختلف الليفيات العضلية
وهو الرجفان.

- **fine t.** رُعَاشٌ رَقِيقٌ. رعاش تكون اهتزازته سريعة
ودقيقة.

- **forced t.** رُعَاشٌ قَسْرِيٌّ. حركات اهتزازية تستمر
بعد الحركة الإرادية بسبب التنبيه المتقطع للمراكز
العصبية.

- **hereditary essential t. (= essential t.)**
رُعَاشٌ أَسَاسِيٌّ وَرَاثِيٌّ.

- **Hunt's t.** رُعَاشٌ هَنْتٌ. الرعاش الذي يرافق كل
حركة إرادية والذي يشاهد في إصابات المخيخ.

- **Intention t.** رُعَاشٌ قَصْدِيٌّ. رعاش يتولد أو
يشد عند القيام بحركة إرادية منسقة.

- **Intermittent t.** رُعَاشٌ مُتَقَطِعٌ. رعاش يشاهد
في الفالج (الشلل الشقي) أو عند محاولة القيام بحركة
إرادية.

- **kinetic t.** رُعَاشٌ حَرَكِيٌّ. رعاش يحدث في
أحد الأطراف عند القيام بحركة إرادية.

- **t. linguae** رُعَاشٌ لِسَانِيٌّ. رجفان اللسان
الذي يشاهد في الكحولية والحمى التيفية والخرف
الشللي.

- **motofacient t.** رُعَاشُ الْحَرَكَةِ. الرعاش الذي
يساهم في حركة العضلة.

- **t. opiophagorum** رُعَاشٌ مُدْمِنِي الْأَفْيُونِ.
رعاش المصابين بإدمان الأفيون.

- **passive t. (= rest t.)** رُعَاشٌ لَا فَاعِلَ؛
رُعَاشُ الرَّاحَةِ. الرعاش الذي يظهر عندما يكون
المريض مرتاحاً ومن دون حركة.

- **persistent t.** رُعَاشٌ مُسْتَدِيمٌ؛ رُعَاشٌ مُثَابِرٌ.
الرعاش الذي يحدث للمريض سواء كان مرتاحاً أو
قائماً بحركة إرادية أو غيرها.

- **t. potatorum (= delirium tremens)** رُعَاشٌ
مُدْمِنِي الْخَمْرِ؛ هَذْيَانٌ إِرْتَعَاشِيٌّ.

- **rest t.** رُعَاشُ الرَّاحَةِ. رعاش يحدث في الطرف
المرتخي والمسنود كالذي يحدث في الباركنسونية.

- **senile t.** رُعَاشٌ شَيْخُوخِيٌّ. رعاش يحدث
للشيوخ عند تقدمهم في السن.

- **static t.** رُعَاشٌ سَكُونِيٌّ. رعاش يحدث عند
محاولة وضع أحد الأطراف في وضع ثابت معين.

- **striocerebellar t.** رُعَاشٌ مُخْطَاطِيٌّ مُخَيِّجِيٌّ.
رعاش مشترك من الرعاشين المخططي والمخيخي
وعادة ما يكون بسبب تنكس الجهاز العصبي المركزي
المنتشر.

- **volitional t.** رُعَاشٌ إِرَادِيٌّ. رعاش كل أقسام
الجسم عند القيام بحركة إرادية يحدث في النصلب
المتعدد.

tremulous 1. رُعَاشِيٌّ 2. رَاعِشٌ. مهتز
أو مرتجف أو مرتعش.

trend تَرْعَةٌ. رغبة أو توجه لأحد
الاتجاهات أو المسارات.

trepidation 1. قَلَقٌ عَصَبِيٌّ 2. إِرْتَعَاشٌ.
1. قلق عصبي ورهاب 2. ارتعاش اهتزازي.

treppe التجميع: تدرُّج. ظاهرة زيادة شدة التقلص العضلي تدريجياً بتكرار التنبيه.

triad of skeletal muscle مُثَلَّثُ العَصَلَةِ الهَيْكَلِيَّة. زوج من الصهريجين الانتهاءين المقابلين للنيبب الثاني الذي يجري عرضياً عبر الليبية العضلية.

triangle, Wernicke's مُثَلَّثُ فيرنِيكَا. الباحة داخل الذراع الخلفي على المحفظة الداخلية حيث يتلامس فيها الشع البصري الذي يردها من الجسم الركبتي الوحشي مع الشعين السمعي والحسي الجسدي.

tribadism سِحَاق. 1. سحاق يقلد فيه الجماع الطبيعي بين الجنسين المختلفين 2. استعمال الأنثى لقضيب اصطناعي للقيام بعملية جنسية 3. احتكاك الاعضاء الجنسية بين اثنتين.

trichesthesia (= trichoesthesia) حِسُّ اللمس الشَّعْرِي: الحِسُّ الشَّعْرِي.

trichoanesthesia حَذَرُ شَّعْرِي. فقدان الحس الشعري.

trichoesthesia الحِسُّ الشَّعْرِي. الحس الذي يتولد عند لمس شعر الجلد.

trichoesthesiometer مِقْيَاسُ الحِسِّ الشَّعْرِي. جهاز كهربائي يقيس الحس الشعري.

trichomania (= trichotillomania) هَوَسُ التَّنْف. هَوَسُ التَّنْف. هوس الشخص لتنف شعر رأسه إجبارياً.

trichotillomania هَوَسُ التَّنْف. هوس الشخص لتنف شعر رأسه إجبارياً.

triclofos sodium صُودِيُومُ تَرَايُكْلُوفُوس. دواء منوم ويستعمل أيضاً عند التنويم قبل إجراء التخطيط الكهربائي للدماغ.

trifacial الثَّلَاثِيّ التَّوَائِم. يستعمل للدلالة على العصب القحفي الخامس الثلاثي التوائم.

trifluoperazine hydrochloride هِيْدُرُوكْلُورِيْدُ التَّرَايُفُوبَرَازِين. دواء مضاد للذهان يستعمل عن طريق الفم أو بالزرق في العضلات.

trifluoperidol تَرَايُفُوبَرِيْدُول. دواء مهدئ يستعمل في معالجة الهوس والفصام.

triflupromazine تَرَايُفُوبَرُومَازِين. دواء مضاد للذهان يستعمل عن طريق الفم.

trigeminal الثَّلَاثِيّ التَّوَائِم. يستعمل للدلالة على العصب القحفي الخامس.

trigone مُثَلَّث. باحة مثلثة.

trigonum (= trigone) مُثَلَّث. (ج: مُثَلَّثَات). اسم عام لباحة أو شكل ثلاثي الزوايا والأطراف.

- t. cerebrale (= fornix cerebri) مُثَلَّثُ المَخ. قَبو المَخ.

- t. collaterale ventriculi lateralis المَثَلَّثُ الجَانِبِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ. الباحة المثلثة في قاع البطين الجانبي بين القرنين المتباعدين القذالي والصبغي.

- t. collaterale ventriculi quarti (= t. nervi vagi) المَثَلَّثُ الجَانِبِيّ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِع. مثلث العصب المبهم.

- t. habenulae مُثَلَّثُ العِنَان. باحة صغيرة منخسفة على الناحية الظهرية الانسية من القسم الخلفي للمهاد والتي تحوي نوى العنان وتعين الصوار العناني.

- t. habenularis (= t. habenulae) مُثَلَّثُ العِنَان.

- t. hypoglossale (= t. nervi hypoglossi) مُثَلَّثُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ.

- t. interpedunculare (= fossa interpedunculare) الحُفْرَةُ بَيْنَ السُّوْنِقَتَيْنِ.

- t. lemnisci مُثَلَّثُ الفَتِيل. مثلث صغير محدد على جهة البرزخ وعلى الجهة الوحشية للأكمة السفلية يحده من الأسفل السويق المخيخي العلوي ومن الجهة الظهرية الإنسية عضد الأكمة السفلية ومن الجهة البطنية الوحشية التلم الوحشي للدماغ المتوسط.

- t. nervi hypoglossi مُثَلَّثُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. النهاية السفلية المستدقة لبارزة الحفرة المعينية مباشرة على الجهة السطحية لنواة تحت اللساني.

- t. nervi vagi مُثَلَّثُ العَصَبِ المُبْهَم. باحة في قاع البطين الرابع مباشرة على الجهة الوحشية لمثلث

العصب تحت اللساني وتقع تحته النواة الظهيرة للعصب المبهم.

- t. olfactorium المثلث الشمي. باحة المادة المتقبلة الامامية بين السطرين الشميين الإنسي والوحشي المتباعدين ويحدها خلفياً الشريط المائل.
- t. pontocerebellare المثلث الجسري الخفي. الانخساف الزاوي بين الحافة السفلية للجسر والسويق المخيخي السفلي وندفة المخيخ.
- t. vagale (= t. vagi = t. nervi vagi) مثلث العصب المبهم.

trihexyphenidyl hydrochloride

هيدروكلوريد التراهيكسي فينيديل. دواء يستعمل كمضاد للباركنسونية وله فعل شبيه بالأتروبين.

trimipramine ترايمبرامين. دواء مضاد للكآبة.

trineural ثلاثي الأعصاب. منسوب إلى ثلاثة أعصاب أو يحويها.

triplegia شلل ثلاثي. شلل ثلاثة أطراف.

trismus (= lockjaw) ضَرْز. اضطراب حركي للعصب الثلاثي التوائم يتصف بتشنج عضلات المضغ بصورة خاصة مع صعوبة فتح الفم وهي أعراض أولية مميزة لمرض الكزاز.

trisomy ثَلَاثُ صِبْغِي. وجود ثلاثة صبغيات في أحد مواضع الخلية بدلاً من صبغيين مما يولد أحد الأمراض الجينية.

tristimania (= melancholia) السوداوية.

tromomania (= delirium tremens) هَذْيَانُ إِرْتِعَاشِي.

trophoneurosis عَصَابُ إِغْتِدَائِي. أي مرض عصبي وظيفي ينتج عن نقص التغذية الناتج عن عيب عصبي أو بسبب نقص التغذية العصبية لأحد أقسام الجسم.

- facial t. (= facial hemiatrophy) عصاب اغتدائي وجهي؛ ضُمُورٌ وَجْهِي شَقِي.

- lingual t. عَصَابُ إِغْتِدَائِي لِسَانِي. ضمور لساني شقي مترقي.

- muscular t. عَصَابُ إِغْتِدَائِي عَضَلِي. تغير تفذوي في الأنسجة العضلية بسبب اعتلال عصبي فيها.

- t. of Romberg (= facial hemiatrophy) ضُمُورٌ وَجْهِي شَقِي.

trophonucleus (= macronucleus) نَوَاةٌ كَبِيرِيَّة.

truncus جذع. (ج: جذوع). الجزء الرئيسي من الجسم الذي يتصل به الرأس والأطراف أو هو جزء رئيسي قصير وغير مقسم من عصب أو شريان أو قناة أو وعاء لمفي.

- t. corporis callosi جذع الجسم الثفني. القسم المركزي الرئيسي من الجسم الثفني المميز عن شريطه ومنقاره.

- t. encephalicus (= brainstem) جذع الدماغ. جزء الدماغ الشبيه بالجذع الذي يوصل نصفي كرة المخ بالنخاع الشوكي ويتكون من الجسر والبصلة (النخاع المستطيل) والدماغ المتوسط ويعتبر البعض الدماغ البيني جزءاً من جذع الدماغ.

- t. inferior plexus brachialis الجذع السفلي للضفيرة العضدية. جذع الضفيرة العضدية الذي يتكون من الفروع البطنية للعصبين الرقبين الثامن والصدري الأول ويمكن أن يبدأ منه العصب الصدري الإنسي ويصبح فرعه الامامي الحبل الإنسي للضفيرة ويساعد فرعه الخلفي في تكوين حبلها الخلفي وهو جذع عصبي حركي وحسي عام.

- t. lumbosacralis الجذع القطني العجزي. جذع يتكون من اتحاد القسم السفلي من الفرع البطني للعصب القطني الرابع مع الفرع البطني للعصب القطني الخامس.

- t. medius plexus brachialis الجذع المتوسط للضفيرة العضدية. جذع يتكون من الفرع البطني للعصب الرقبى السابع ويساعد قسمه الامامي، الذي يعطي الأعصاب الصدرية الوحشية، في تكوين الحبل الوحشي للضفيرة، ويساعد قسمه الخلفي في تكوين الحبل الخلفي لها وهو عصب حركي وحسي عام.

- t. nervi accessori جذع العصب الإضافي. الجذع العصبي الذي يتكون من الجذور القحفية والنخاعية للعصب الإضافي والذي ينقسم إلى الفرعين الانتهايين الظاهر والباطن.

- t. nervi spinalis جذع العصب النخاعي.

الجذع القصير جداً الذي يتكون من الجذور الظهرية والبطنية للعصب النخاعي.

- trunci plexus brachialis جَذْعُ الصُّفِيرَةِ

العَضْدِيَّة. الجذوع الثلاثة (العلوي والانسلي والسفلي) للصفيرة العضدية التي تنبع من الفروع البطنية للأعصاب الرقبية السفلية الأربعة والعصب الصدري الأول بالقرب من الحافة الوحشية للعضلة الأخمعية الأمامية والتي تستمر إلى الجهة الوحشية السفلية فوق وخلف الشريان تحت الترقوة. وبالقرب من الترقوة ومن ثم ينقسم كل جذع إلى قسمين بطني وظهري ويتحد القسمان البطنيان للجذعين العلوي والانسلي ليكونا الحزمة الوحشية ويكون قسم الجذع السفلي الحزمة الإنسية ليكونا الحزمة الوحشية ويكون قسم الجذع السفلي الحزمة الإنسية للصفيرة وتكون الأقسام الظهرية للجذوع الثلاثة الحزمة الخلفية للصفيرة.

- t. superior plexus brachialis الجَذْعُ

الْعُلَوِيُّ لِلصُّفِيرَةِ العَضْدِيَّة. جذع الصفيرة العضدية الذي يتكون من الفروع البطنية للعصبين الرقبين الخامس والسادس. ويساعد قسمه الأمامي في تكوين الحبل الوحشي للصفيرة كما يساعد قسمه الخلفي في تكوين الحبل الخلفي ويعطي فروعاً إلى العصبين فوق الكتفي وتحت الترقوي وهو عصب حركي وحسي عام.

- t. sympathicus (= t. sympathicus)

الجَذْعُ الْوُدِّي. حبلان عصبين طويلان واحد على كل جهة من جهتي العمود الفقري ويمتدان من قاعدة القحف حتى العنق. ويحوي كل حبل منهما عقداً ودية رقبية وصدرية قطنية وعجزية ومرتبطة ببعضها بخيوط بينية. وتستلم هذه العقد الياًفاً قبل عقدية من الجذور البطنية الصدرية والقطنية العلوية عن طريق الفروع الاتصالية كما تعطي فروعاً إلى الضفائر أمام الفقارية وإلى الأحشاء والأوعية الدموية المجاورة.

- t. vagalis anterior الجَذْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْمُبْهَم.

جذع (أو جذوع) عصبي يتكون من الياف من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر تتجمع من القسم الأمامي من الصفيرة المريئية ومن ثم تنزل خلال الفتحة المريئية في الحجاب الحاجز لتغذي فروعاً للسطح الأمامي للمعدة.

- t. vagalis posterior الجَذْعُ الْخَلْفِيُّ لِلْمُبْهَم.

جذع (أو جذوع) عصبية يتكون من الياف من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر التي تتجمع من القسم الخلفي

للصفيرة المريئية ومن ثم تنزل خلال الفتحة المريئية للحجاب لتغذي فروعاً للسطح الخلفي للمعدة.

trunk (= truncus)

حَدْبَةٌ. (ج: حَدَبَات). 1. بنية ناشزة tuber أو تورم 2. الآفة الأساسية للتصلب الحدبي التي تتصف بكونها آفة دماغية ورمية عابية عقدية عدسية الشكل وشاحبة وصلبة وقد تتكلس أحياناً وتتولد غالباً في نصفي كرة المخ والمخيخ والبصلة والنخاع.

- t. antierius hypothalami (= t. cinereum)

حَدْبَةُ الْوِطَاءِ الْأَمَامِيَّة. الحدة الرمادية.

- t. cinereum

الحَدْبَةُ الرَّمَادِيَّة. طبقة من

المادة السنجابية وهي قسم من الوطاء وتكون جزءاً من قاع البطين الثالث وتقع أمام وبين الجسمين الحلميين وتندمج في الأمام في القمع.

tuberculum

حَدْبِيَّة. (ج: حَدْبِيَّات). حدة

أو عقيدة أو بارزة صغيرة.

- t. antierius thalami

حَدْبَةُ الْمَهَادِ الْأَمَامِيَّة.

تضخم واضح على السطح الظهري للقسم الراسي للمهاد والذي يحوي مجموعة النوى الأمامية للمهاد.

- t. cinereum (= 1. t. trigeminale 2. tuber

cinereum) 1. حَدْبِيَّةُ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم

2. الحَدْبَةُ الرَّمَادِيَّة.

- t. cuneatum

الحَدْبِيَّةُ الْإِسْفِينِيَّة. تضخم على

الحزمة الإسفينية للبصلة يقع مباشرة على الجهة الوحشية للحديبة الناحلة وتكونه النواة الإسفينية التي تقع تحتها مباشرة.

- t. gracillis

حَدْبِيَّةُ النَّاحِلَةِ. تضخم النواة

الناحلة في البصلة مكوناً الحافة السفلية الوحشية للبطين الرابع وتكونه النواة الناحلة التي تقع تحته.

- t. hypoglossi (= trigonum nervi

hypoglossi) حَدْبِيَّةٌ تَحْتَ اللِّسَانِي؛ مُثَلَّثٌ

العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَان.


- t. posterius thalami (= pulvinar

الحَدْبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلْمَهَادِ؛ وَسَادَةُ الْمَهَادِ. (thalami)

- t. trigeminale

حَدْبِيَّةُ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم. مرتفع

في القسم الذنب من السطح الخلفي للبصلة يقع بين الحزمة الإسفينية وجذور العصب الإضافي ويتكون من السبيل النخاعي النازل للعصب ثلاثي التوائم والسويق المخيخي الذنب (السفلي)، ويسمى أيضاً الحديبة السنجابية أو حديبة رولاندو.



truncus sympatheticus

الجهة اليسرى من المنصف بعد إزالة جدار الصدر والرئة يبين أعصابه وأنوعيته والجذع الودي: (1) الترقوة والعضلة تحت الترقوة (2) الوريد والشريان الإبطيان (3) الضلع الأولي (4) الشريان تحت الترقوة والعصب المبهم والشريان السباتي الأصلي (5) العصب الحجابي والوريد العضدي الراسي (6) للضفيرة الأيهرية والقلبية والعقدة (7) للضفيرة الرئوية الأمامية (8) التوتة (9) القصبة الرئيسية اليسرى والشريان والأوردة الرئوية (10) التامور اللففي (11) العصب الحجابي والشريان والوريد التاموريان (12) الجنبه الضلعية (13) الرذب الضلعي المنصفي (14) الجنبه المنصفية (15) عقد لمفية (16) الحجاب والجنبه الحجابية (17) الجنبه الضلعية (18) الجذع الودي والعقد الودية الصدرية (19) الوريد والشريان الوريبيان والعصب الوري الأيهرية الصدرية (20) العصب الحشوي الكبير (21) الفرع الودي الموصل والشريان والوريد الوريبيان الخلفيان (22) الأهر الصدري والضفيرة (23) المريء والعصب المبهم والضفيرة الرئوية الخلفية (24) الوريد الإضافي (25) العصب الحنجري الراجع (26) المريء والقناة الصدرية (27) الأعصاب القلبية (الودية واللاودية) (28) الجزء تحت الترقوي للضفيرة العضدية.

- tuberositas (= tuberosity)** أَخْدَوِيَّة. (ج: أَخَادِيْب). بارزة أو مرتفع.
- tubocurarine** تُوْبُوْكُوْرَارِين. المادة الأساسية للكوراري.
- t. chloride** كلُورِيْدُ التُوْبُوْكُوْرَارِين. عامل محصر للتوصيل العصبي ويستعمل بحقنه للوريد لإرخاء العضلات الهيكلية في الجراحة أو الكزاز أو التكرز أو العلاج بالصددمات أو لتشخيص الوهن العضلي الوبيل في بعض الحالات.
- tween-brain (= diencephalon)** الدُّمَاغُ البَيْنِيَّة.
- twitch** نَفْضَةٌ. استجابة تقلصية قصيرة للعضلة الهيكلية تولدها رشقه وأبل من الدفعات العصبية في العصب الحركي الذي يغذيها.
- twitching** نَفْضَانٌ. تقلص عضلي مفرد أو سلسلة من التقلصات العضلية.
- fascicular t.** نَفْضَانٌ حَزَمِيٌّ. تقلصات قصيرة لمجموعات كبيرة من حزم الألياف العضلية.
- fibrillar t.** نَفْضَانٌ لُيْنِيَّةٌ. تقلصات قصيرة متكررة تشمل عضلات الوجه.
- Trousseau's t.**
- type** نَمَطٌ. (ج: أَنْمَاطُ). الصفة العامة أو السائدة لآلية حالة مرضية أو شخص أو مادة أو أي شيء آخر.
- Dejerine t. (= amyotrophic lateral sclerosis)** نَمَطُ دِيَجِيرِين. تصلب وحشي ضموري.
- Dejerine-Landozy t. (= Landozy-Dejerine dystrophy)** نَمَطُ دِيَجِيرِين لَانْدُوْزِي. حثل لاندوزي ديجيرين.
- Duchenne's t. (= pseudohypertrophic muscular dystrophy)** نَمَطُ دُوْشِين. حثل عضلي ضخامي كاذب.
- Erb- Zimmerlin t.** نَمَطُ إِرْب - زِيْمَرْلِن. النمط الكتفي الطفلي للحثل العضلي الأولي.
- Fazio- Londe t.** نَمَطُ فَاْزِيُو - لُونْدَة. النمط البصلي الوجهي للضمور العضلي النخاعي الطفلي العائلي المترقي.
- Hutchison's t.** نَمَطُ هَتِّشِسُون. ورم الأرومة العصبية مع النفاث القحفية.
- kalmuck t. (= Down's syndrome)** نَمَطُ كَالْمُوك. متلازمة داون.
- Kertschmer t's.** أَنْمَاطُ كِرِيْشْمِر. أنماط البنية المتناسبة مع الشخصية أو النزعات المزاجية للشخص مثل البنيات الواهنة والرياضية والثنية (مختلة التنسج) والغليظة وما شاكل ذلك.
- leg t.** النَمَطُ السَّاقِي. الضمور العضلي الوراثي المترقي.
- Leichtenstern (= hemorrhagic encephalitis)** نَمَطُ لِيْشْتِشْتِيرِن. التهاب الدماغ النزفي.
- Levi- Loraln t. (= hypophysial infantilism)** نَمَطُ لِيْفِي لُوْرِيَان. طفالة نخامية.
- Leyden- Mobius t. (= limb- girdle muscular dystrophy)** نَمَطُ لِيْدِن - مُوبِيُوس. حثل عضلي حزامي - طرفي.
- Lorain t. (= hypophysial infantilism)** نَمَطُ لُوْرَان. طفالة نخامية.
- Putnam's t.** نَمَطُ بُوْتْنَام. التتسكس الشوكي المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي.
- pyknic t.** النَمَطُ الْغَلِيْظ. نمط بنيوي يتصف بجسم مدور ووجنات كبيرة ومنكبين واسعين ورأس عريض ورقبة قصيرة.
- Remak's t. (= Remak's paralysis)** نَمَطُ رِيْمَاك. شلل ريماك. شلل يصيب باسقاط الأصابع.
- scapulohumeral t.** نَمَطُ كَتْفِي غُضْبِي. ضمور عضلي نخاعي مترق يبدأ في المنكبين.
- Tooth t.** نَمَطُ تُوْث. ضمور عضلي (شظوي) اعتلال عصبي مترق.
- typhlolexia (= alexia)** تَعْدُرُ الْقِرَاءَة.

U

ulalgia (= gingivalgia) أَلَمُ اللِّثَةِ.

ulegyria تَنَدُّبُ اللَّافِيْف. حالة تكون فيها تلافيف المخ ضيقة ومشوهة بالندبات التي تتولد من آفات تولدت أثناء الحياة الجنينية أو في مقتبل الطفولة.

uncinate شِصْصِي. متعلق بالتلفيف الشِصْصِي أو مؤثر فيه مثل الصرع الشِصْصِي.

unconscious 1. فَاقِدُ الوَعْي 2. الْأَشْغُور.

1. غير حساس ولا يتمكن من الاستجابة للمنبهات الحسية أو تكوين إحساسات شخصية 2. قسم العقل الذي لا يصله الإدراك الواعي بسهولة بالطرق الاعتيادية ولكن من الممكن إظهار وجوده بالأعراض التي يولدها كالأحلام أو تحت تأثير بعض العقاقير، وهو أحد أنظمة فرويد للعقل الباطن.

الْأَشْغُور الْجَمَاعِي. حسب نظرية - collective u. يونغ، هو اللاشعور المشاع نظرياً بين كل البشر.

uncotomy بَضْعُ الشَّصْصِي. توليد آفة محددة في الشخص في معالجة بعض حالات الذهان.

uncus الشَّصْصِي. النهاية الأمامية المعقوفة إنسياً للتلفيف حول الحصين.

شِصْصِي الْفِقْرَة. بروز شِصْصِي - u. corporis الشكل على طرفي السطح العلوي للفقرات العنقية الثالثة حتى السابعة.

unmedullated عَدِيمُ المِيَالِين. لا يحوي غمد نخاعيني كوصف للليف العصبي عديم الميالين.

unmyelinated (= unmedullated) عَدِيمُ المِيَالِين

unrest (= restlessness) تَمَلُّل؛ عِلَز.

unstriated غير مُخَطَّط؛ أَمْلَس. من دون خطوط كوصف للعضلات الملساء.

uraniscolalia خَنِيف. عيب كلامي يتسبب عن الحنك المشقوق.

uranoplegia (= palatoplegia) شَلْلُ الْحَنَك.

urodynia وَجَعُ التَّبُول. الألم الذي يصاحب التبول.

urophobia رَهَابُ التَّبُول. التخوف من التبول من دون سبب.

uterodynia وَجَعُ رَجَمِي. ألم الرحم.

uveomeningitis الْتِهَابُ الْعَنَبِيَّةِ وَالسَّحَايَا. اضطراب يتصف بآفة العنبية يترافق مع علامات سحائية.

uveomeningoencephalitis الْتِهَابُ الْعِنَبِيَّةِ وَالسَّحَايَا وَالذَّمَاغ. التهاب العنبية المترافق مع التهاب السحايا والدماغ.

V

vagotomy قَطْعُ الْمُبْهِمِ. قطع قطعة صغيرة من العصب المبهم.

vaginodynia (= colpodynia) وَجَعُ الْمَهْبِلِ. ألم في المهبل.

vagoaccessorius الْعَصَبُ الْمُبْهِمُ الْإِضَافِي. العصب المبهم والجذور القحفية للعصب الإضافي والتي تعتبر مع بعضها عصباً واحداً.

vagoglossopharyngeal مُبْهِمِي لِسَانِي. مُلْغُومِي. متعلق بالعصبين المبهم واللساني البلعومي.

vagolysis تَحْرِيزُ الْمُبْهِمِ. إتلاف العصب المبهم جراحياً.

vagolytic (= parasympatholytic) حَالُ الْمُبْهِمِ. له تأثير يشبه ذلك الذي يتولد عن قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

vogomimetic مُحَاكِ الْمُبْهِمِ. له تأثير مشابه لذلك الذي يتولد عن تنبيه العصب المبهم.

vogosplanchnic (= vagosympathetic) مُبْهِمِي وَدِّي. متعلق بالتعصيب المبهمي والودي.

vagosympathetic مُبْهِمِي خَشَوِي؛ مُبْهِمِي وَدِّي. متعلق بالتعصيب المبهمي والودي.

vagotomy قَطْعُ الْمُبْهِمِ. قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

- bilateral v. قَطْعُ الْمُبْهِمَيْنِ. قطع المبهمين الأيمن والأيسر.

- highly selective v. الْبَالِغُ الْإِنْتِقَاءُ الْقَطْعُ لِمُبْهِمِ. قطع اليااف المبهم التي تجهز الغدد المعوية مفرزة الحمض فقط مع الاحتفاظ بتلك التي تغذي الفار والفروع الكبدية والبطنية.

- medical v. الْقَطْعُ الدَوَائِي لِلْمُبْهِمِ. قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم وذلك باستعمال أدوية مناسبة وهذا هو إحصار المبهم.

- parietal cell v. قَطْعُ مُبْهِمِ الْخَلَايَا الْجِدَارِيَّةِ. قطع انتقائي لالياف العصب المبهم التي تغذي الثلثين الراسيين للمعدة (الباحة الجدارية) ويجري ذلك لمعالجة قرحة الإثنا عشري.

- selective v. قَطْعُ الْمُبْهِمِ الْإِنْتِقَائِي. قطع اليااف العصب المبهم التي تغذي المعدة مع الاحتفاظ بالفروع الكبدية والبطنية.

- surgical v. قَطْعُ الْمُبْهِمِ الْجِرَاحِي. قطع العصب المبهم بالوسائل الجراحية.

- truncal v. قَطْعُ الْمُبْهِمِ الْجَذْعِي. القطع الجراحي لجذعي المبهمين البطنيين الرئيسيين عند خروجهما من الفرجة المريئية.

vagotonia غَلَبَةُ الْمُبْهِمِ؛ تَوَثُّرُ الْمُبْهِمِ. فرط استثنائية العصب المبهم وهي حالة يسود فيها العصب المبهم في وظائف الجسم العامة وتتصف بعدم الاستقرار الوعائي الحركي الشديد والإمساك والتعرق والتشنجات الحركية اللاإرادية مع الألم.

vagotony (= vagotonia) غَلَبَةُ الْمُبْهِمِ.

vagotropic مُوَجَّةٌ لِلْمُبْهِمِ. ما له تأثير على العصب المبهم.

vagotropism أَلْفَةُ الْمُبْهِمِ؛ تَوَجُّهُ مُبْهِمِي. ألفة الدواء أو السم للعصب المبهم.

vagus الْمُبْهِمِ. العصب القحفي العاشر.

vagusstoff مَادَّةُ الْمُبْهِمِ. مادة تفرزها نهايات العصب المبهم تثبط فعالية القلب وهي مشابهة للاسيتيل كولين.

vallecula أَخْدُود. انخساف أو وهدة.

- v. cerebelli أَخْدُودُ الْمُخَيِّخ. الانخساف الطولاني
على السطح السفلي للمخيخ بين نصفي كرتيه حيث
يستقر النخاع المستطيل.

- v. Sylvii (= fossa lateralis cerebri)
أَخْدُودُ سِيلْفِي. الحفرة المخية الوحشية.

vasalgia أَلَمٌ وَعَائِي. ألم الأوعية.

vasoneuropathy إِغْتِلَالٌ وَعَائِيٌّ عَصَبِيٌّ.
عيب وعائي وعصبي مشترك، وتنتج الآفة عن فعلين
وعائي وعصبي مترامين أو بتفاعل الجهازين مع
بعضهما.

vasoneurosis (= angioneuropathy)
عُصَابٌ وَعَائِيٌّ؛ إِغْتِلَالٌ وَعَائِيٌّ عَصَبِيٌّ.

vasopressin فَاَرْوَبْرِيسِين. 1. أحد الهرموني
الذين تولدهما الخلايا العصبية في نوى الوطاء
والذي يحفظ في الفص الخلفي للنخامية (النخامية
العصبية) وينبه هذا الهرمون النسيج العضلي
للشعيرات والشريينات ويرفع ضغط الدم كما أنه
ينبه تقلص عضلات الأمعاء ويزيد من حركاتها
التمعجية وله كذلك تأثير تقلصي على الرحم. ولهذا
الهرمون تأثير نوعي على الخلايا البطانية للنبيبات
البولية القصوية إذ إنه يحفز إعادة امتصاص الماء
منها من دون المذابات مما يزيد من تركيز البول
ويخفف تركيز مصل الدم. وتنظم أسمولية بلازما
الدم إفراز هذا الهرمون 2. مستحضر صناعي لهذا
الهرمون يستعمل في معالجة البواله التقهه الحادة
أو المزمنة كمضاد للتبول. كما يستعمل كمضيق
للأوعية في حالات النزف بتنبيه العضلات الملساء
للأوعية.

vein (= vena) وَرِيد. وعاء ينتقل الدم فيه
من مختلف أعضاء الجسم ليعود إلى القلب.

velum شِرَاع. غطاء أو حجاب أو شبهه بالحجاب.

**- v. interpositum cerebri (= tela
choroidea ventriculi tertii)** الشِرَاع
الدِّمَاغِيّ الْمُفَحَّم. النسيجة المشيمية للبطين الثالث.

**- v. medullare anterius (= v. medullare
rostralis)** الشِرَاعُ البَصْلِيّ الأَمَامِيّ؛ الشِرَاع
البَصْلِيّ العلوي. الشِرَاع البَصْلِيّ المنقاري.

- v. medullare - caudale الشِرَاعُ البَصْلِيّ

الدَّنْبِيّ؛ الشِرَاع البَصْلِيّ السُّفْلِيّ. إحدى الطبقتين
الرقبقتين من المادة البيضاء التي تقع على طرفي
عُقيدة الدودة وتكون طبقتها الباطنة الجدار السفلي
للردب الظهري الوحشي للبطين الرابع وتستمر على
الجانبين مع السويقة الندفية والشريطة وتندغم على
الجهة البطنية مع الضفيرة المشيمية.

- v. medullare rostralis الشِرَاعُ البَصْلِيّ
المنقاريّ. طبقة رقيقة من المادة البيضاء تكون سقف
القسم القحفي من البطين الرابع وتمتد من الصفيحة
السقفية من الأمام إلى البرحاء في الخلف وبين
السويقتين المخيخيتين القحفيّتين.

- v. transversum طِيَّة الشِرَاعِ المُسْتَعْرِض. طية
مستعرضة من النسيجة المشيمائية تعلم الحدود بين
الدماغ البيني والدماغ الانتهاهي في دماغ الجنين.

vena (= vein) وَرِيد. (ج: أَوْرِدَة).

- v. anastomatica inferior الْوَرِيدُ التَّفَاغُرِيّ
السُّفْلِيّ. وريد يوصل الوريد الدماغي السطحي
الوسطي مع الجيب المستعرض.

- v. anastomatica superior الْوَرِيدُ التَّفَاغُرِيّ
الْعُلَوِيّ. وريد يوصل الوريد الدماغي السطحي
الوسطي مع الجيب السهمي العلوي.


- venae anteriores cerebri الْأَوْرِدَةُ الدِّمَاغِيَّةُ
الْأَمَامِيَّةُ. أوردة ترافق الشريان الدماغي الأمامي
وتتصل بالوريد القاعدي.

- v. anterior septi pellucidi الْوَرِيدُ الْأَمَامِيّ
لِلْحَاجِزِ الشَّفَاف. وريد ينزح الحاجز الشفاف الأمامي
إلى الوريد السريري المخطط.

- v. basalis الْوَرِيدُ الْقَاعِدِيّ. وريد يبدأ من
المادة المثقبة الأمامية ويمر إلى الخلف حول سويق
المخيخ ويصب في الوريد الدماغي الباطن.


- venae cerebelli الْأَوْرِدَةُ الْمُخَيِّخِيَّةُ. الأوردة
التي توجد على سطح المخيخ، فالتى تبدأ من السطح
العلوي تصب في الجيب المستقيم وفي الوريد الدماغي
الأكبر أو إلى الجيبين الصخري المستعرض والعلوي،
أما تلك التي تبدأ من السطح السفلي فإنها تصب في
الجيب المستعرض والسبيني والصخري السفلي أو
في الجيب القذالي.

- venae cerebri الْأَوْرِدَةُ الْمُخَيِّخَةُ. أوردة تنزح
سطوح نصفي كرة المخ أو مناطقها الداخلية تنقسم
إلى مجموعتين سطحية وعميقة.



venae cerebri

منظر تشريحي لداخل المخ منظوراً من الأعلى يظهر بعض اورده: (1) الشق بين نصفي كرة المخ (2) الجسم الدفني (3) الحاجز الشفاف (4) وريد الحاجز الشفاف (5) رأس النواة المعنبة (6) اعمدة القبو (7) الوريد المهادي المخطط (8) الوريد المشيموي (9) الضفيرة المشيموية للبطين الجانبي الايمن (10) النسيجة المشيموية للبطين الثالث (11) الوريد المخي الباطن (12) الوريد القاعدي (13) الوريد المخي الكبير (14) الجيب السهمي السفلي (15) الجيب المستقيم (16) خيمة المخ (17) الجيب المستعرض (18) الجيب السهمي العلوي.



venae, cerebri

منظر تشريحي لداخل المخ منفلوفاً من الأسفل يظهر بعض أوعيته: (1) الوريد المخي الأمامي (2) الوريد المخي الوسطي العميق (3) الوريد المخي الوسطي السطحي (4) الوريد القاعدي (5) الشريان المشيموي الأمامي (6) الشريان المشيموي الخلفي (7) الوريد المخي الباطن (8) الوريد المخي الكبير (9) شريط الجسم النخاعي (10) الوريد الفقاري الصغير.

- **v. choroidea inferior** **الْوَرِيدُ الْمَشِيمَانِيُّ السُّفْلِيُّ**. وريد ينزح الصغيرة المشيمائية السفلية إلى الوريد القاعدي.
- **v. choroidea superior** **الْوَرِيدُ الْمَشِيمَانِيُّ الْفُلُويُّ**. الوريد الذي يجري على طول الصغيرة المشيمائية وينزحها والحصين والقبو والجسم الثقني ثم يتحد مع الوريد المهادي المخططي ليكونا الوريد المخي الباطن.
- **v. comitans nervi hypoglossi** **الْوَرِيدُ الْمُرَافِقُ لِتَحْتِ اللِّسَانِيِّ**. وريد يتكون من اتحاد الوريد اللساني العميق والوريد تحت اللساني ويرافق العصب تحت اللساني ويفرغ في الوريد الوجهي أو اللساني أو الوداجي الباطن.
- **v. dorsalis corporis callosi** **الْوَرِيدُ الظَّهْرِيُّ لِلْجِسْمِ الثَّقْنِيِّ**. وريد ينزح السطح العلوي للجسم الثقني إلى الوريد الدماغى الأكبر.
- **v. emissaria** **وَرِيدٌ مَشْبَرِيٌّ**. أحد الأوردة الصغيرة الخالية من الصمامات والتي تمر خلال ثقب القحف وتوصل الجيوب الوريدية للجافية مع أوردة فروة الرأس أو مع الأوردة العميقة تحت قاعدة القحف.
- **v. emissaria condylaris** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ اللَّقْمِيُّ**. وريد صغير يجري خلال القناة اللقمية للقحف ويربط الجيب السيني مع الوريد الفقري أو الوداجي الباطن.
- **v. emissaria mastoidea** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْخَشَائِيُّ**. وريد صغير يمر خلال الثقب الخشائية للقحف ويربط الجيب السيني مع الجيب القذالي أو مع الوريد الأذني الخلفي.
- **v. emissaria occipitalis** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْقَذَالِيُّ**. وريد صغير يوجد أحياناً ويجري خلال ثقب صغيرة في البارزة القذالية للقحف ويربط ارتفاع الجيوب مع الوريد القذالي.
- **v. emissaria parietalis** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْجَدَارِيُّ**. وريد صغير يمر خلال الثقب الجدارية للقحف ويربط الجيب السهمي العلوي مع الأوردة الصدغية السطحية.
- **venae frontales** **الأوردة الجَبْهِيَّةُ**. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح قشرة المخ الجبهية.
- **v. gyri olfactorii** **وَرِيدُ التَّلْفِيفِ الشَّمِيِّ**. وريد ينزح التليف الشمي إلى الوريد القاعدي.
- **venae inferiores cerebri** **الأوردةُ الْمُخَيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. أوردة سطحية مخية كبيرة نسبياً تتشابه على قاعدة المخ وعلى سطحه السفلي الوحشي وتنزح الأوردة الموجودة على السطح السفلي للفص الجبهي إلى الجيب السهمي السفلي والجيب الكهفي وتنزح الأوردة الموجودة على الفص الصدغي إلى الجيبين الصخري العلوي والمستعرض وتنزح تلك الموجودة على الفص القذالي إلى الجيب السهمي.
- **venae inferiores hemispheri cerebelli** **أوردةُ نِصْفِ كُرَةِ الْمُخَيخِ**. أوردة تنزح السطح السفلي للمخيخ إلى الجيوب المستعرض والسيني والصخري السفلي أو إلى الجيب القذالي.
- **v. inferior vermis** **وَرِيدُ الدَّوْدَةِ السُّفْلِيَّةِ**. وريد ينزح السطح السفلي للمخيخ وهو يجري على أسفل الدودة ليفرغ في الجيب المستقيم أو أحد الجيبين السنيين.
- **venae insulares** **أوردةُ الْجَزِيرَةِ**. أوردة تنزح الجزيرة وتتصل بالوريد الدماغى الوسطي العميق.
- **venae internae cerebri** **الأوردةُ الدِّمَاغِيَّةُ الْبَاطِنَةُ**. وريدان يبدآن عند الثقب بين البطينين باتحاد الوريدين المهادي المخطط والمشيماني ويسيران إلى الخلف خلال النسيجة المشيمائية وهما يجمعان الدم من النوى القاعدية ثم يتحدان عند ضمادة الجسم الثقني ليكونا الوريد المخي الأكبر.
- **v. magna cerebri** **الْوَرِيدُ الدِّمَاغِيُّ الْكَبِيرُ**. جذع ناصفي قصير يتكون من اتحاد الوريدين المخيين الباطنيين والذي يدور حول ضمادة الجسم الثقني ويصب في الجيب المستقيم أو يستمر كالجيب المستقيم نفسه.
- **v. media profunda cerebri** **الْوَرِيدُ الدِّمَاغِيُّ الْوَسْطِيُّ الْعَمِيقُ**. الوريد الذي يرافق الشريان الدماغى الوسطى في قاع التلم الوحشي ويتصل بالوريد القاعدي.
- **venae mediae superficiales cerebri** **الأوردةُ الْمُخَيَّةُ السَّطْحِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ**. أوردة تنزح السطح الوحشي للمخ وتتبع الشق المخي الوحشي وتفرغ في الجيب الكهفي.

- **venae medullae oblongatae** الأوردة البصلة. الأوردة التي تنزح البصلة (النخاع المستطيل) والتي تفرغ في أوردة النخاع الشوكي والجيوب الوريدية للجافية أو تسير على طول الأعصاب القحفية الأربعة الأخيرة إلى الجيب الصخري السفلي أو البصلة العلوية للوريد الوداجي.

- **venae meningae** الأوردة السحائية. الأوردة المرافقة للشرايين السحائية والتي تنزح الأم الجافية وتتصل بالجوبات الوحشية والتي تصب في الجيوب والأوردة الموضعية.

- **venae meningae mediae** الأوردة السحائية الوسطى. الأوردة المرافقة للشريان السحائي الوسطي والتي تنتهي في الضفيرة الوريدية الجناحية.

- **venae nuclei caudati** أوردة النواة المدنتبة. أوردة النواة المدنتبة التي تكون جزءاً من الجسم المخطط.

- **venae occipitales** الأوردة القذالية. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح القشرة المخية القذالية.

- **venae parietales** الأوردة الجدارية. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح القشرة المخية الجدارية.

- **v. petrosa** الوريد الصخري. جذع قصير يبدأ من اتحاد أربعة أو خمسة أوردة مخيخية وجسرية مقابل السويق المخيخي الوسطي وينتهي في الجيب الصخري العلوية.

- **venae pontis** الأوردة الجسرية. الأوردة التي تنزح الجسر وتفرغ في الوريد القاعدي أو الأوردة المخيخية أو الجيب الوريدي أو الصخري أو الضفيرة الوريدية للتقبة البيضوية.

- **v. pontomesencephalica anterior** الوريد الجسري الدماغى المتوسطى الامامى. وريد يقع على الناحيتين العلوية والامامية للجسر في الخط الوسطي للحفرة بين السويقتين ويتصل من الاعلى مع الوريد القاعدي ومن الاسفل مع الوريد الصخري.

- **v. posterior corporis callosi** الوريد الخلفى للجسم الثقبى. وريد ينزح السطح الخلفى للجسم الثقبى إلى الشريان الدماغى الاكبر.

- **v. posterior septi pellucidi** الوريد الخلفى

للحاجز الشفاف. وريد ينزح الحاجز الشفاف الخلفى إلى الوريد المهادى المخططى العلوى.

- **v. precentralis cerebelli** الوريد المركزى. وريد يبدأ في الشق المخيخي امام المركزى ويمر امام وفوق القنة وينتهي في الوريد الدماغى الاكبر.

- **venae prefrontales** الأوردة امام الجبهية. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح قشرة المخ امام الجبهية.

- **venae profundae cerebri** الأوردة المخية العميقة. الأوردة التي تنزح المناطق الداخلية لنصفي كرة المخ.

- **v. recessus lateralis ventriculi quarti** وريد الردب الوحشى للبطين الرابع. وريد صغير يبدأ من لوزة المخيخ ويمر في الردب الوحشى للبطين الرابع وينتهي في الوريد الصدغى.

- **venae spinales anteriores et posteriores** الأوردة النخاعية الامامية والخلفية. أوردة تنزح النخاع الشوكي إلى الضفائر الوريدية الفقارية الباطنة وتكون ضفائر ملتوية في الام الحنون وهي تتكون من وريدين طولانيين ناصفيين أحدهما امام الشق الناصف الامامى والثاني خلف الحاجز الناصف الخلفى للنخاع الشوكي ومن وريدين اماميين وحشيين يجريان خلف الجذور العصبية البطنية ومن وريدين خلفيين وحشيين يجريان خلف الجذور العصبية الظهرية.

- **venae spinales externae anteriores** الأوردة النخاعية الوحشية الامامية. أوردة صغيرة طولانية تنزح الدم من القسم الامامى للام الحنون للنخاع الشوكي.

- **venae spinales externae posteriores** الأوردة النخاعية الوحشية الخلفية. أوردة صغيرة طولانية تنزح الدم من القسم الخلفى للام الحنون للنخاع الشوكي.

- **venae spinales internae** الأوردة النخاعية الباطنة. أوردة دقيقة تنزح الدم من داخل النخاع الشوكي.

- **venae striatae (= venae thalamo-striatae inferiores)** الأوردة المخططة: الأوردة المهادية المخططة السفلية.

- **venae superficiales cerebri** **أَوْرِدَةُ الْمُخِّ السُّطْحِيَّةِ**. الأوردة التي تنزح الدم من سطح نصفي كرة المخ وتشمل الأوردة المخية السطحية العلوية والوسطى والسفلى وروافدها.

- **venae superiores cerebri** **الأَوْرِدَةُ الْمُخِيَّةُ الْغُلَوِيَّةُ**. الأوردة المخية السطحية الثانية أو الإثنا عشر (أمام الجبهية والجبهية والجدارية والقذالية) التي تنزح السطوح العلوية والوحشية والإنسية للمخ باتجاه الشق المخي الطولاني حيث تفتح في الجيب السهمي العلوي.

- **venae superiores hemispheri cerebelli** **الأَوْرِدَةُ الْغُلَوِيَّةُ لِنُصْفِي كُرَةِ الْمُخْنِخِ**. أوردة تنزح السطوح العلوية لنصفي كرة المخيخ وتفرغها في الجيوب المستعرضة أو الصخرية العلوية.

- **v. superior vermis** **الْوَرِيدُ الْغُلَوِيُّ لِلدُّوْدَةِ**. وريد ينزح السطح العلوي للمخيخ ويجري إلى الامام وإلى الجهة الإنسية عبر الدودة العلوية ليفرغ في الجيب المستقيم أو الوريد الدماغى الأكبر.

- **venae thalamostriatae inferiores** **الأَوْرِدَةُ الْمِهَادِيَّةُ الْمُخَطَّطَةُ السُّفْلِيَّةُ**. أوردة تمر خلال المادة المثقبة الامامية وتتصل بالوريدين المخيين الامامي والوسطى ليكونا الوريد القاعدي.

- **v. thalamostriata superior** **الْوَرِيدُ الْمِهَادِيَّ الْمُخَطَّطُ الْغُلَوِيُّ**. وريد يجمع الدم من الجسم المخطط والمهاد ويتصل بالوريد المشيماني ليكونا الوريد المخي الباطن.

- **venae trunci encephalici** **أَوْرِدَةُ جَذَعِ الدِّمَاغِ**. أوردة تنزح جذع الدماغ وتصب في الوريد القاعدي أو الدماغى الأكبر.

- **v. unci** **وَرِيدُ الشَّصْنِ**. وريد ينزح الشصن إلى الوريد الدماغى السفلى على نفس الجهة.

- **v. ventricularis inferior** **الْوَرِيدُ الْبُطِينِي السُّفْلِي**. وريد ينزح الفص الصدغى إلى الوريد القاعدي.

بُطِينٌ. (ج: بُطِينَاتُ). تجويف صغير **ventricle** كالتجاويف التي توجد في الدماغ أو القلب.

- **v's. of the brain** **بُطِينَاتُ الدِّمَاغِ**. بطينات داخل الدماغ ممتلئة بالسائل الدماغى النخاعي وتشمل البطينين الجانبيين والبطين الثالث والرابع وهي مبطنة بالبطانة العصبية وتغلف في بعض المناطق

بالاتدادات الوعائية من الأم الحنون لتكون الضفائر المشيمانية. أما تجويف الحاجز الشفاف الذي يسمى أحياناً بطيناً فهو ليس بالبطين الصحيح.

- **first v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الْأَوَّلُ؛ البُطِينُ الْمُخِي الْجَانِبِي**.

- **fourth v. of cerebrum (= ventriculus quartus cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الرَّابِعُ**.

- **lateral v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الْجَانِبِي**.

- **second v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الثَّانِي؛ البُطِينُ الْمُخِي الْجَانِبِي**.

- **v. of Sylvius (= cavitas septi pellucidi)** **تَجْوِيفُ الْحَاجِزِ الشَّافِافِ**.

- **terminal v. of spinal cord (= ventriculus terminalis medullaris)** **البُطِينُ النُّخَاعِيُّ الْإِنْتِهَائِي**.

- **third v. of cerebrum (= ventriculus tertius cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الثَّالِثُ**.

- **Vieussen's v. (= cavitas septi pellucidi)** **بُطِينٌ فَيُوس؛ تَجْوِيفُ الْحَاجِزِ الشَّافِافِ**.

بُطِينٌ. (ج: بُطِينَاتُ). **ventriculus (= ventricle)**.


- **v. dexter cerebri** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الْأَيْمَنُ**. البطين الجانبى لنصف كرة المخ الأيمن.

- **v. lateralis cerebri** **البُطِينُ الْمُخِيُّ الْجَانِبِي**. التجويف الذي يوجد في كل من نصفي كرة المخ الذي يتطور من الأنبوب العصبي الجنيني ويتألف من الجزء المركزى وثلاثة قرون - الجبهي (الامامي) والصدغى (السفلى) والقذالى (القذالى) في الفصوص الجبهية والصدغية والقذالية على التوالي ويفصل الحاجز الشفاف البطينين الجانبيين عن بعضهما ويتصل كل منهما بالبطين الثالث عبر الثقبة بين البطينين التي تتصل خلالها أيضاً الضفيرة المشيمانية للبطين الجانبى من ضفيرة البطين الثالث كما يجري خلالها السائل الدماغى النخاعي الذي يتولد في البطين الجانبى.



ventricles of the brain

مقطع في الدماغ يظهر التوسع المفرط للبطينين الجانبيين والبطين الثالث.



ventricles of the brain

مقطع جبهوي في الدماغ يبين بطيناته الثلاثة (الجانبين والثالث) والفتحات الموصلة لها والعسال الدماغى.

- v. quartus cerebri البَطِينُ الْمُخِيُّ الرَّابِعُ.

تجوف غير منتظم الشكل في الدماغ المؤخر بين البصلة والجسر والمسال من الامام والمخيخ من الخلف. وهو متواصل مع القناة المركزية للنخاع من الاسفل ومع المسال المخي من الأعلى ومن خلال فتحاته الجانبية والناصية مع الحيز تحت العنكبوتية.

- v. sinister cerebri البَطِينُ الْمُخِيُّ الْأَيْسَرُ.

البطين المخي الجانبي في النصف الايسر لكرة المخ.

- v. terminalis medullae spinalis البَطِينُ

النَّخَاعِي الْإِنْتِهَائِي. توسع كيسى الشكل للقناة المركزية للنخاع ضمن المخروط النخاعي.

- v. tertius cerebri البَطِينُ الْمُخِيُّ الثَّالِثُ.

فلج ضيق تحت الجسم الثفني ضمن الدماغ: تبنيني بين المهادين ويتكون قاعه من الوطاء وجداره الامامي من الصفيحة الانتهائية وسقفه من البطانة العصبية ويتصل بالبطينين الجانبيين خلال الثقبين بين البطينين ومع البطين الرابع خلال المسال المخي.

هَوَسُ الثَّرَثَرَةِ (= logorrhea)

دُودَة. دودة أو بنية دودية الشكل،
vermis وعادة ما يطلق على دودة المخيخ.

- v. cerebelli دُودَةُ الْمُخَيِّخِ. القسم الضيق

الناصي من المخيخ بين نصفي كرتي الجانبيين ويمتد جزؤه العلوي أو القحفي من اللسين إلى ورقة الدودة ويمتد جزؤه السفلي أو الذنبي من الحبة الدودية إلى العقيدة.

قَمَّةُ؛ قَمَّةُ الرَّأْسِ. القمة أو الذروة
vertex أو قَمَّةُ الرَّأْسِ أو تاجه.

1. دُورِي 2. مُصَابٌ بِالدُّوَارِ.
vertiginous منسوب للدوار أو مصاب به.

دُورَار. انخداع حركي، شعور الشخص
vertigo بدوران العالم الخارجي من حوله (الدوار الموضوعي) أو دورانه هو نفسه في محيطه (الدوار الشخصاني). وقد يستعمل المصطلح خطأ لوصف كل أنواع الدوام. وقد يتولد الدوار عن أمراض الأذن الوسطى أو عن اضطرابات المراكز الدهليزية أو يعطل في آفات سبل الجهاز العصبي المركزي.

- v. ab aure lauso (= Meniere's disease)

دوار أذني المنشأ.

- v. ab stomacho laeso (= stomachal v.)

دُورَارٌ مَعِدِّي المنشأ.

- alternobaric v. دُورَارٌ إِبْتِلَافِي الضَّغْطِ. دوار

دوراني حقيقي عابر يصيب أحياناً الأشخاص المعرضين لتغير الضغط (كالطيارين) عند تعرضهم لتغير كبير وسريع في الضغط الجوي.

- angiopathic v. دُورَارٌ الْإِعْتِلَالِ الْوِعَائِي. دوار

ينتج عن تصلب الشرياني لوعية الدماغ.

- apoplectic v. (= scotodinia) دُورَارٌ سَكَنِي؛

دُورَامٌ عُغْمِي.

- arteriosclerotic v. (= angiopathic v.)

دُورَارٌ الْإِعْتِلَالِ الْوِعَائِي.

- auditory v. (= aural v. = Meniere's

disease) دُورَارٌ أَذْنِي. داء مينير.

- benign paroxysmal positional

دُورَارٌ وَضْعِي إِنْتِبَاطِي حَمِيد.

دوار معاود مع رآة يحدث عند وضع الرأس في بعض الأوضاع ولا يترافق ذلك عادة مع آفات الجهاز العصبي المركزي.

- cardiac v. دُورَارٌ قَلْبِي. دوار ينتج عن بعض

أمراض القلب المزمنة.

- cardiovascular v. دُورَارٌ قَلْبِي وَعَائِي. دوار

يتولد عن تصلب الأوعية الدموية والقلب.

- central v. دُورَارٌ مَرْكَزِي. دوار ينتج عن

مرض في الجهاز العصبي المركزي.

- cerebral v. دُورَارٌ دِمَاعِي. دوار ينتج عن مرض

دماغي.

- disabling positional v. دُورَارٌ وَضْعِي مُعَوِّق.

دوار مستمر أو خلل التوازن مع الغثيان في الوضع القائم من دون أي اضطراب سمعي أو فقدان الوظائف الدهليزية.

- encephalic v. دُورَارٌ دِمَاعِي. حس حركة

الانسجة داخل القحف كان الدماغ يدور على نفسه.

- endemic paralytic v. (= vestibular

neuronitis disease) دُورَارٌ شَلَلِي مُتَوَطِّن؛

التهاب العصبون الدهليزي. مرض الاعصاب والمراكز العصبية الذي يصيب الفلاحين وعمال الاسطبلات ويتصف بالآلم والخلل والدوار والتدلي والتشنج العضلي.

- **epidemic v.** دَوَّارٌ وَبَائِيٌّ. حالة وبائية تتصف بصورة رئيسية بالدوار مع بعض الغثيان والقيء.
- **epileptic v.** دَوَّارٌ صَرْعِيٌّ. الدوار الذي يسبق أو يتلو نوبة الصرع.
- **essential v.** دَوَّارٌ إِسْأَسِيٌّ. دوار وعادة ما يكون شديداً ولكن من دون سبب معروف وقد يكون مسبباً عن آفة أو مرض لأحد المراكز العصبية.
- **galvanic (= voltaic v.)** دَوَّارٌ غَلْفَانِيٌّ.
- **gastric v.** دَوَّارٌ مَعِدِّي المنشاء. دوار يترافق مع مرض المعدة أو اضطرابها.
- **height v.** دَوَّارٌ المُرْتَفَعَات. دوام (وليس دواراً حقيقياً) يُحَسُّ به عند النظر إلى الأسفل من أحد المرتفعات.
- **horizontal v.** دَوَّارٌ إِسْتَلْقَائِيٌّ. دوار يتولد عند استقلال الشخص.
- **hysterical v.** دَوَّارٌ هِسْتِيرِيٌّ. دوار يترافق مع الأعراض الهستيرية.
- **labyrinthine v.** دَوَّارٌ تَيْهِيٌّ. دوار ينتج عن مرض تيه الأذن أو اضطرابه.
- **laryngeal v. (= tussive syncope)** دَوَّارٌ حَنَجْرِيٌّ. غَشِّي سعالِي.
- **lateral v.** دَوَّارٌ جَانِبِيٌّ. الدوار الذي يحدث عند المرور بجانب صف طويل من الأعمدة أو القضبان القائمة في سياج مثلاً.
- **lithemic v.** دَوَّارٌ التَّحْصِي؛ دَوَّارٌ زِيَادَةُ حَمَضِ اليُورِيك. دوار يترافق مع النقرس أو زيادة حمض اليوريك بالدم.
- **mechanical v.** دَوَّارٌ آليٌّ. دوار يتولد عن دوران الجسم المستمر لفترة طويلة أو اهتزازه المتواصل كما يحصل في دوار البحر.
- **neurasthenic v.** دَوَّارٌ الوهن العَصْبِي. حس دوازي شخصي يترافق مع الوهن العصبي.
- **nocturnal v.** دَوَّارٌ لَيْلِيٌّ. حس بالسقوط عندما يحاول الشخص النوم.
- **objective v.** دَوَّارٌ موضوعي. دوار بحس الشخص فيه بأن الأشياء تدور من حوله.
- **ocular v.** دَوَّارٌ بَصْرِيٌّ. دوار ينتج عن مرض العين وخصوصاً شلل عضلاتها أو عدم توازن حركاتها.
- **organic v.** دَوَّارٌ عُضْوِيٌّ. دوار يتولد عن مرض تيهي دماغي أو عن التابس الظهري.
- **paralysing v. (= Gerlier's disease)** دَوَّارٌ شَلْلِيٌّ.
- **peripheral v. (= vestibular v.)** دَوَّارٌ مُحِيطِيٌّ. دوار دهليزي.
- **positional v. (= postural v.)** دَوَّارٌ وَضْعِيٌّ. دوار يترافق مع وضع معين للرأس في الفضاء أو تغيير وضعه في محيطه.
- **pressure v. (= alternobaric v.)** دَوَّارٌ ضَغْطِيٌّ.
- **primary v.** دَوَّارٌ أَوَّلِيٌّ. دوار يتولد عن التنبيه مثلاً بمرض فعال في الجهاز الدهليزي للأذن ولا علاقة له بحركات الجسم.
- **residual v.** دَوَّارٌ مُعَالِيٌّ. دوار يترافق مع الحركة وينتج عن قصور أو غياب الأعضاء العصبية الحسية الدهليزية ويحصل في أحد المستويات الحركية فقط.
- **rider's v. (= motion sickness)** دَوَّارٌ الحَرَكَةِ. داء الحركة.
- **rotary v. (= rotatory v.)** دَوَّارٌ دَوَّرَانِيٌّ. دوار يشعر فيه المصاب بدوران حقيقي.
- **sham- movement v.** دَوَّارٌ الحَرَكَاتِ الكَاذِبَةِ. دوار يتصف بإحساس كاذب بوجود أشياء تدور حول جسمه.
- **special sense v.** دَوَّارٌ الحِسِّ الخَاص. دوار أذني أو بصري.
- **stomachal v.** دَوَّارٌ مَعِدِّي. دوار يترافق مع اضطرابات الجهاز الهضمي.
- **subjective v.** دَوَّارٌ شَخْصَانِيٌّ. دوار يشعر فيه الشخص بأنه يدور حول نفسه.
- **systematic v. (= rotary v.)** دَوَّارٌ جَهَازِيٌّ. دوار دوراني.
- **tenebrie v. (= scotodinia)** دَوَّارٌ العَتَمَةِ البصرية؛ دَوَّارٌ عُتْمِيٌّ.
- **toxemic v. (= toxic v.)** دَوَّارٌ تَسَمُّمِيٌّ. دوار يتسبب عن التسمم أو الكحولية أو اليوريمية أو بزيادة حمض اليوريك بالدم.

- vertical v.** دَوَارٌ عَمُودِيّ. دوار ينتج عن النظر للأعلى أو للأسفل إلى جسم بعيد.
- vestibular v.** دَوَارٌ دَهْلِيْزِيّ. دوار يتسبب عن اضطرابات المراكز الدهليزية أو طرقها العصبية المركزية.
- villous v.** دَوَارٌ زَغِيّ؛ دَوَارٌ كَبِيدِيّ المنشأ. دوار يتولد عن اضطرابات الكبد الوظيفية.
- voltaic v. (= galvanic v.)** دَوَارٌ غَلْفَانِيّ. انثناء الرأس نحو المنكب على جهة القطب الموجب عند وضع تيار غلفاني على الألياف الدهليزية للعصب الثامن.
- vesicle** حُويْصَلَة. (ج: حُويْصَلَات). كيس صغير يحوي سائلاً.
- brain v's.** الحُويْصَلَات الدُمَاغِيَّة. الأقسام الخمسة من الأنبوب العصبي المغلق في الجنين المتنامي والتي تشمل بالترتيب القحفي الذنبى الدماغ الانتهاشي، الدماغ البيني، الدماغ المتوسط، الدماغ التالي فالدماغ البصلي.
- brain v's., primary** الحُويْصَلَات الدُمَاغِيَّة. الأولى. الأقسام الثانوية الأولية للأنبوب العصبي والتي تشمل الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر.
- brain v's. secondary** الحُويْصَلَات الدُمَاغِيَّة. الثانوية. الحويصلات الدماغية الأربع التي تتكون من تخصص الدماغ المقدم (الدماغ الانتهاشي والدماغ البيني) والدماغ المؤخر (الدماغ التالي والدماغ البصلي) في ادوار التطور الجنيني المتأخرة.
- cephalic v's (= cerebral v's. = brain v's.)** الحُويْصَلَات الدُمَاغِيَّة.
- encephalic v's. (= brain v's.)** الحُويْصَلَات الدُمَاغِيَّة.
- synaptic v's.** الحُويْصَلَات المَشْبِكِيَّة. عدد كبير من بنيات مستديرة دقيقة في الأقدام الانتهاشية للعصبونات يعتقد أنها تحمل مواداً هرمونية انتقالية.
- vestibulocerebellum (= archeo-cerebellum)** المَخْنِخ الدهليزي؛ المَخْنِخُ البِدَائِيّ.
- vigilambulism** سَيْرٌ يَقْظِيّ. سير تلقائي شبيه بالسير النومي ولكنه يحدث أثناء اليقظة.

- vigilance** 1. سَهَادَة. 2. تَبَقُّظ.
- vigor** استِنشَاط؛ حَيَوِيَّة. مجموعة خواص مميزة للكائن الحي تعبر عن نفسها بالنمو السريع والخصوبة العالية والتلقيح والحجم الكبير والعمر الطويل.
- hybrid v. (= heterosis)** حَيَوِيَّة الأَنْسَال. الحالة التي يظهر فيها النسل الأول حيوية أكثر من أبويه في نموه وديمومته وخصوبته وحيويته، ويعزى ذلك إلى سيادة الأليلات الأفضل.
- vinbarbital** فَنْبَارِبِيْتَال. باريبتورات متوسطة الفعل تستعمل كمسكن ومنوم عن طريق الفم.
- vincamine** فِنْكَامِين. دواء يستعمل لتحسين القدرة الفكرية للمرضى المصابين باضطرابات دماغية وعائية.
- virile** 1. رُجُولِيّ. 2. فَحْل. 1. خاص بالرجال أو بجنس الذكر 2. يملك صفات ذكرية خصوصاً في مقدرته على الجماع.
- virilence** تَرَاجُل. تنامي الصفات الجنسية الذكرية الثانوية لدى الأنثى.
- virilia (= organa genitalia masculina)** الجِهَاز التَنَاسُلِي الذَكَرِي؛ الأَعْضَاءُ التَنَاسُلِيَّة الذَكَرِيَّة.
- virilism (= masculinity)** إِسْتِرْجَال؛ ذُكُورَة. تنامي الصفات الذكرية الجسدية والميزات العقلية الذكرية لدى الأنثى.
- adrenal v.** إِسْتِرْجَالٌ كُظْرِيّ. استرجال يتولد بسبب قصور توليد هرمون الاندروجين من قشرة الكظر ويتصف بظهور الصفات الذكرية الكاملة لدى البنت أو المرأة أو الولد قبل سن البلوغ.
- virility** 1. رُجُولِيَّة. 2. فَحُولَة. امتلاك رجل أو ذكر للصفات الجنسية الأولية.
- virilization** تَرْجِيل؛ تَرَاجُل؛ تَذْكِير. تحريض أو تطوير الصفات الجنسية الذكرية الثانوية في الأنثى وخاصة تحريض تضخم البظر وشعر الوجه والجسم وتطور خط نمو الشعر في الجبين الشبيه بذلك الذي ينمو فيه عند الذكور وتنبه إفراز وتكاثر الغدد الزهمية (وعادة مع الغُد) وتضخم الصوت.

- viripotent** نَاضِجُ الرُّجُولَةِ. صفة للمذكر تدل على نضوجه الجنسي.
- viscera** أَحْشَاءُ. جمع حشَى.
- visceral** حَشَوِيّ. منسوب للحشَى.
- visceralgia** أَلَمٌ حَشَوِيّ. ألم في الأحشاء أو في أحد أعضاء الجسم.
- viscerimotor** حَرَكَيّ حَشَوِيّ. ينقل دفعات حركية للحشَى.
- visceromotor** حَرَكَيّ حَشَوِيّ. ما يقوم بالحركات الرئيسية للحشَى أو ينقل دفعات حركية لها.
- visceroparietal** حَشَوِيّ جِدَارِيّ. متعلق بالأحشاء وبجدار البطن.
- viscerosensory** حَسِّيّ حَشَوِيّ. متعلق بالحس الحشوي.
- visceroskeletal** حَشَوِيّ هَيْكَلِيّ. متعلق بالهيكل الحشوي.
- viscerosomatic** حَشَوِيّ جَسَدِيّ. متعلق بالأحشاء والجسد.
- viscerotomy** بَضْعُ الحَشَى. بضع أحد الأحشاء وخصوصاً قطع جزء من الكبد بعد الموت.
- viscerotonia** رَخَاءُ الغَيْش. نمط مزاجي يتصف بحب الراحة الجسدية والاختلاط الاجتماعي والانفتاح للآخرين واحتمالهم ومجايلتهم.
- vision** رُؤْيَاةٌ؛ إِبْصَارٌ. الحس الخاص وهو الحس بالمرئيات بالنظر إليها.
- visuognosis** إدْرَاكٌ إِبْصَارِيّ. إدراك الانطباعات البصرية وتفهمها.
- visuopsychic** إِبْصَارِيّ نَفْسِيّ. باحة قشرة المخ المختصة في تقييم الانطباعات البصرية.
- visusensory** حَسِّيّ إِبْصَارِيّ. متعلق بإدراك المنبهات التي تولد الانطباعات البصرية.
- volition** إِرَادَةٌ. العمل أو القدرة الإرادية.
- volley** رَشْقَةٌ. تعاقب نظمي من النفضان العضلي الذي يحفز صناعياً أو مجموعة من الدفعات العصبية التي تتولد عن منبه واحد.
- antidromic v.** رَشْقَةٌ مُعَاكِسَةٌ المَسِيرَةِ. التهيج المعاكس الذي يسير نحو المركز خلال الجذر الأمامي في قوس المنعكس.
- voluntary** إِرَادِيّ. ما ينجز حسب إرادة الشخص.
- vomiting** قِيءٌ. القذف الشديد لمحتويات المعدة خلال الفم.
- cerebral v.** قِيءٌ دِمَاغِيّ. قِيءٌ تلقائي من دون أي غثيان يشاهد غالباً في أمراض داخل القحف.
- hysterical v.** قِيءٌ هِسْتِيرِيّ. قِيءٌ يترافق مع نوبة هستيرية.
- nervous v.** قِيءٌ عَصَبِيّ. قِيءٌ يظهر كعرض للعصاب المعدي.

W

wakefulness سَهَاد؛ يَقْظَة. حالة تتصف بعدم الرغبة أو المقدرة على النوم.

wave مَوْجَة. اضطراب تذبذبي منسق يظهر فيه القسم المتحرك ذبذبات مزدوجة.

- alpha w's. مَوْجَات ألفَا. موجات دماغية في المخطط الكهربائي للدماغ لها تردد 13-8 في الثانية وهي موجات نمطية للشخص اليقظ وفي حالة راحة فكرية وجسدية تامة وتتولد بصورة خاصة في المنطقة القذالية.

- beta w's. مَوْجَات بِيْتَا. موجات دماغية في المخطط الكهربائي للدماغ لها تردد 14-30 في الثانية وهي موجات نمطية عند الفعالية الشديدة للجهاز العصبي وتحدث بصورة خاصة في المنطقتين الجدارية والجبهية.

- brain w's. مَوْجَات دِمَاغِيَّة. تموج الجهود الكهربائية في الدماغ كما تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ومنها موجات ألفا وبيتا ودلتا وثيتا ومنهم من يصف ثلاثة أنواع من الموجات الدماغية (أ) السلاسل والتي تناسب موجات ألفا (ب) مغازل سلاسل قصيرة ذات تردد 14 موجة في الثانية (ج) موجات عشوائية وهي موجات غير منتظمة وليس لها تردد معين وتظهر في بداية النوم.

- contraction w. مَوْجَة التَقْلُّص. موجة تقدم التقلص في العضلة من نقطة تنبيهها أو المخطط البياني لموجة تقلص العضلة.

- delta w's. مَوْجَات دِلْتَا. موجات دماغية تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ذات تردد أقل من 3.5 في الثانية وهي نمطية في النوم العميق وفي الولدان وفي بعض اضطرابات الدماغ.

- electroencephalographic w's. (= brain w's.) مَوْجَات التَخْطِيط الكَهْرِبَائِي لِلدِّمَاغ.

- Erb's w's. مَوْجَات إِرْب. موجات تظهر في العضلة عند تنبيهها بمنبه كهربائي مستمر ومعتدل الشدة وتشاهد أحياناً في تأثر العضل الولادي.

- excitation w. مَوْجَة الإِنَارَة. موجة كهربائية تجري في العضلة مباشرة قبل تقلصها.

- theta w's. مَوْجَات ثِيْتَا. موجات دماغية تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ذات تردد 7-4 موجات في الثانية وتظهر بصورة خاصة في الأطفال وكذلك في البالغين خلال فترات الكرب العاطفي.

winking رَفَة. فتح العين واغلاقها بسرعة وخاصة إحدى العينين فقط.

- jaw w. رَفَة فَكِّيَّة. حركات غلق العين اللاإرادية التي تترافق أحياناً مع حركات الفك.

1. انزعال 2. إمتناع 3. عَزَل؛ سَحَب. **withdrawal**
1. الابتعاد المرضي عن العلاقات الشخصية مع الآخرين وعن الاتصالات الاجتماعية الذي يمكن أن يحصل في الفصام وفي الاكتئاب أو الاضطرابات الفصامانية أو الاجتناب الفصاماني 2. متلازمة دماغية عضوية تتلو الامتناع عن تناول مادة نوعية معينة أو التقليل من تناول تلك المادة الفعالة نفسياً وبانتظام وبالكميات التي تولد تأثيرها النفسي السمي الخاص وهناك متلازمات الامتناع عن تناول الكحول أو الأمفيتامين أو الأفيون أو الكوكايين أو النيكوتين وما شاكل ذلك من العقاقير المخدرة 3. سحب القضيبي من المهبل قبل القذف.

wristdrop دَلَلِي الرُّسْغ. حالة تتولد عن شلل العضلات الباسطة لليد والأصابع.

wryneck (= torticollis) صَغَر.

X

xanthochromia اصْفَرَّاز. أي تلون أصفر في الجلد أو في السائل الدماغي النخاعي أو في غيرهما.

Xanthoma وَرَمٌ اصْفَرُّ. ورم يتكون من خلايا رغوية مشبعة بالشحم وتحوي جيلة شحمية. وَرَمٌ اصْفَرٌّ قَحْفِيٌّ **x. - craniohypophyseal** نخامي. ترسبات استرات الكولستيرول في العظام القحفية حول النخامي.

xanthomatosis داء الأورام الصُّفْرِ المنتشرة. داء خزن الشحم وهو مرض وراثي ذو صفة

جسدية متنحية ويتصف بالورام والصفراء في الأوتار وفي المادة البيضاء للدماغ والرتتين مع التشنج والرنح والخزل الهرمي والتخلف العقلي والخرف والساد المبكر والتصلب العصيدي. وهو يترافق مع ارتفاع مستوى الكولستيرول وعيوب تركيب الصفراء مع ترسب الكولستيرول في الجهاز العصبي المركزي وميالين الاعصاب المحيطة، وتحوي آفات المرض الكولستيرول والكولستيرول منزوع الهيدروجين.

xiphodynia وَجَعُ الرِّهَابَةِ. وجع في ناتئ الرهابة.

Y

Yawning تَنَاطُوبٌ. شهيق عميق لا إرادي مع
فتح الفم وعادة ما يترافق مع بسط الأطراف
والجسم.

Z

zona (= 1.zone 2.herpès zoster)

1. مَنَاطِقَة. (ج: مَنَاطِق) 2. هَرَبِس نِطَاقِي. 1. منطقة محددة وذات حدود أو صفات خاصة مميزة 2. الهربس النطاقي.

- z. ganglionaris المِنَاطِقَة العَقْدِيَّة. كتلة من نسيج عقدي توجد على القسم القوقي من العصب الثامن.

- z. incerta المِنَاطِقَة المُبْهَمَة. طبقة ضيقة من المادة السنجابية تمتد على طول معظم الدماغ البيني على الجهة البطنية من المهاد ومفصولة عنه بالحزمة المهادية وتتواصل على الجهة الوحشية مع النواة الشبكية للمهاد.

- z. ophthalmica (= herpès zoster ophthalmica) الهربس النِطَاقِي العَيْنِي.

- z. rolandica المِنَاطِقَة الرُّولَانْدِيَّة. المنطقة الحركية لقشرة المخ.

zone مَنَاطِقَة. (ج: مَنَاطِق). منطقة محددة ومحوطة مع خواص معينة ومميزة.

- dolorogenic z. (= trigger z.) مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة لِلْأَلَم.

- dorsal z. of His مَنَاطِقَة هِيس الظَّهْرِيَّة. التشنج العلوي الأصفر للنخاع الشوكي الجنيني الذي يبرز إلى القناة المركزية للنخاع.

- epileptogenic z. (= epileptogenous z.) مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة الصَّرَع. منطقة صغيرة في الدماغ يؤدي تنبئها إلى حدوث نوبة صرعية.

- His z's. مَنَاطِق هِيس. أربعة تشنجات تجري على طول النخاع الشوكي في الجنين.

- hyperesthetic z. مَنَاطِقَة مُفْرِطَة الحِس.

منطقة على سطح الجسم تتصف بالتحسس الشاذ.

- hysterogenic z. (= hysterogenous z.)

منطقة الهستيريا؛ مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة الهِسْتِيرِيَا. منطقة في الجسم يؤدي الضغط عليها إلى توليد نوبة هستيرية.

- language z. مَنَاطِقَة اللُّغَة. مصطلح عام يدل على كل مناطق قشرة المخ المتخصصة في وظيفة اللغة وهي عادة في نصف كرة المخ السائد.

- Lissauer's marginal z. (= tractus dorsolateralis) مَنَاطِقَة لِيَسَاوَر الهَامِشِيَّة. السبيل الظهري الوحشي.

- motor z. المِنَاطِقَة الحَرَكِيَّة. منطقة في قشرة المخ يؤدي تنبئها إلى تقلص العضلات الإرادية.

- neutral z. of His مَنَاطِقَة هِيس المُخَايِذَة. تشنج في القسم الظهري لنخاع الجنين يبرز إلى قناته المركزية.

- Rolando's z. (= primary somatomotor area) مَنَاطِقَة رُولَانْدَو. المنطقة الحركية الجسدية في قشرة المخ.

- z. of round nuclei مَنَاطِقَة النُّوَى المُدَوَّرَة. شريط عريض من الخلايا الشمية ذات النوى المدورة توجد في الطبقة المخاطية الشمية.

- trigger z. (= dolorogenic z.) مَنَاطِقَة زَبَائِيَّة. منطقة مولدة للألم يؤدي تنبئها إلى الشعور بالألم أو إلى نوبة ألم عصبي.

- Westphal's z. مَنَاطِقَة وَيَسْتَفَال. منطقة في العمود السنجابي الظهري للنخاع الشوكي في المنطقة القطنية ويقال إنها تحوي الألياف الصادرة المختصة بالانعكاس الرضعي.

zonesthesia حِسُ التَمَنُّط. حس بوجود

تَضَيِّقٌ فِي إِحْدَى الْمَنَاطِقِ كَأَنَّهُ مَوْلَدٌ بِحَزَامٍ أَوْ نَظَاقٍ حَوْلِهَا.

الْوَلَعُ بِالْحَيَوَانَاتِ. 1. حُبُّ الْحَيَوَانَاتِ zoophilia
2. شَذُوذٌ جَنَسِيٌّ يَتَصَفُّ بِالْجَمَاعِ مَعَ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَلِيَّاتِ الْجَنَسِيَّةِ الْآخَرَى مَعَهَا.

الْيَفُّ بِالْحَيَوَانَاتِ؛ وَلَوْعٌ zoophilic
بِالْحَيَوَانَاتِ.

الْوَلَعُ zoophilism (= zoophilia)
بِالْحَيَوَانَاتِ.

وَلَعٌ شَبَقِيٌّ بِالْحَيَوَانَاتِ؛ شَبَقٌ - erotic z.
مُغَازَلَةٌ الْحَيَوَانَاتِ. اللَّذَّةُ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا الشَّخْصُ عِنْدَ تَدْلِيلِ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ مَغَازَلَتِهَا.

زُهَابُ الْحَيَوَانَاتِ. الْخَوْفُ غَيْرُ zoophobia
الْمُسَبَّبُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ.

سَادِيَّةٌ نَحْوَ الْحَيَوَانَاتِ. السَادِيَّةُ zoosadism
الْمَوْجَهَةُ ضَدَّ الْحَيَوَانَاتِ.

الْهَرَبَسُ zoster (= herpes zoster)
النُّطَاقِي.

زُوكْسَازُولَامِين. دَوَاءٌ zoxazolamine
يَسْتَعْمَلُ كَمَرَحٍ لِلْعَضَلَاتِ الْهَيْكَلِيَّةِ وَمَدْرٍ لِحَمَضِ الْيُورِيكِ فِي النُّقْرَسِ.

1. النَّاتِيءُ الْوَجْهِيُّ الصَّدْغِي zygoma
2. الْقَوْسُ الْوَجْنِيَّةُ 3. الْعَظْمُ الْوَجْنِي.

مسرد عربي - إنكليزي

(١)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| nostalgia | أبابة | agony; tortua | احتضار |
| anabolism | ابتناء | injection | احتقان |
| -acu | إبري (سابقة) | encephalemia | احتقان الدماغ |
| vision | إبصار | oneirogmus | احتلام |
| pseudopsia | إبصار كاذب | gibbous; kyphotic | أحدب |
| ■rephosymbolia | إبصار مقلوب | tuberositas; tuberosity | أحدوية |
| visuopsychic | إبصاري نفسي | cingula | أحزمة |
| anociassociation | إبطال التداعيات المؤدية | sensation; sensibility | احساس |
| alalic; deaf-mute | إبكم | pseudogeusesthesia | احساس ذوقي كاذب |
| imbecile | إبله | kakesthesia | احساس شاذ |
| lead | اتجاه | chromesthesia | احساس لوني |
| atropinism | اثروبينية | viscera | أحشاء |
| intercourse | اتصال | block; blocking | إحصار |
| consensual | اتفاقي | anodal block | إحصار مصعدي |
| anaclisis | اتكال | adjustment | إحكام |
| anaclisis | اتكال أمومي | fantasy; phantasia; phantasy | أحلام اليقظة |
| encephalotomy | اتلاف الدماغ | erythromelalgia | احمرار الأطراف المؤلم |
| compulsion | اجبار | nutatation | أحناء الرأس |
| obligate; obligatory | اجباري | cryptophthalmos | اختباء العين |
| rumination | اجترار | test | اختبار |
| avoidance | اجتناب | exencephalia | اختراج الدماغ |
| anaphrodisia | إجفار | biopsy | اختزاع |
| stress | إجهاد | neurobiologist | اختصاصي البيولوجيا العصبية |
| monaminergic | أحادي اميني الفعل | ablepharia | اختفاء العين |
| monosynaptic | أحادي التشابك | convulsion | اختلاج |
| monosexual | أحادي الجنس | convulsive | اختلاجي |
| mononeural | أحادي العصب | derangement | اختلال |
| mononeuric | أحادي العصبون | dysprosody | اختلال التصويت |
| monaxon | أحادي المحوار | disequilibrium | اختلال التوازن |
| frustration | إحباط | paratonia | اختلال التوتر |
| aphasiac; aphasic | أحبس | disesthesia | اختلال حسي |
| retention | احتباس | derangement | اختلال عقلي |
| infarction | احتشاء | parafunction | اختلال الوظيفة |
| microinfarct | احتشاء صغري | facultative | اختياري |
| | | groove; vallecule | أخدود |
| | | dumb; mute | أخرس |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| acromion | أخرم | defatigation | أرهاق |
| conception | إخصاب | spongioblast | أرومة إسفنجية |
| ethical | أخلاقي | ependymoblast | أرومة البطانة العصبية |
| ethics | أخلاقيات | glioblast | أرومة الدبقية |
| plantar | أخمصي | neuroblast | أرومة عصبية |
| ethics | آداب | myoblast; sarcoblast | أرومة عضلية |
| comprehension; conception; esthesia | إدراك | myofibroblast | أرومة الليفة العضلية |
| visuognosis | ادراك إبصاري | melanoblast | أرومة ملانينية |
| nociperception | ادراك الأذى | astroblast | أرومة نجمية |
| alterperception | ادراك تلوي | medulloblast | أرومة نخاعية |
| cheiromesthesia | ادراك حركة اليد | myeloblast | أرومة النخوية |
| cryptesthesia | ادراك الخفايا | obliteration | إزالة |
| chronognosis | ادراك الزمن | depolarization | إزالة الاستقطاب |
| apperception | ادراك شعوري | deconditioning | إزالة الإشرط |
| lalognosis | ادراك الكلام | deconditioning | إزالة التكيف |
| symbolia | ادراك لمسي | disinhibition | إزالة التثبيط |
| preperception | ادراك مسبق | desensitization | إزالة التحسس |
| barognosis | ادراك الوزن | spasmolysis | إزالة التشنج |
| percipient | ادراكي | denervation | إزالة التعصيب |
| gnosis; perceptivity | ادراكي | defibrillation | إزالة الرجفان |
| apperceptive | ادراكي شعوري | disectomy | إزالة القرص |
| adrenergic | ادريناليني الفعل | demyelination | إزالة الميالين |
| anamnesis | إدكار | dicephaly | ازدواج الرأس |
| addiction | إدمان | diplopia | ازدواج الرؤية |
| opiomania; opiumism | إدمان أفيون | diphallia | ازدواج القضيب |
| narcotism | إدمان المخدرات | amphotony | ازدواجية التوتر العصبي |
| neuroderm | أديم عصبي | amphithymia | ازدواجية المزاج |
| neuroectoderm | أديم عصبي ظاهر | paranoiac | أزور |
| masculation; masculinization | إذكاز | paraphrenia | أزورار |
| otic; aural | أذني | essential | أساسي |
| volition | إرادة | radiectomy | استئصال الجذر |
| voluntary | إرادي | laminectomy | استئصال الصفيحة |
| commotio; concussion | ارتجاج | pinelectomy | استئصال الصنوبري |
| feedback | ارتجاع | plexectomy | استئصال الضفيرة |
| fasciculation | ارتجاج حزمي | choroidectomy | استئصال الضفيرة المشيمية |
| chalsia | ارتخاء | angioneurectomy | استئصال عصبي وعائي |
| rebound | ارتداد | ganglionectomy | استئصال العقدة |
| projection | ارتسام | stelletomy | استئصال العقدة النجمية |
| infiltration | ارتشاح | gangliosympathectomy | استئصال العقدة الودية |
| eclampsia | ارتجاج | ophthalmectomy | استئصال العين |
| slows; tremens; trepidation | ارتعاش | myringectomy | استئصال غشاء الطبل |
| orgasm | إرجاز | lobectomy | استئصال الفص |
| allergic | أرجي | chemothalamectomy | استئصال كيميائي للمهاد |
| allergy | أرجية | topectomy | استئصال موضعي |
| neuroallergy | أرجية عصبية | medullectomy | استئصال النخاع |
| relaxation | إرخاء | hypophysectomy; pituitectomy | استئصال النخامية |
| infiltration | ارشاح | hemilaminectomy | استئصال نصف الصفيحة الفقرية |
| agrypnia; hyposomnia; insomnia | أرق | hemispherectomy | استئصال نصف الكرة |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|
| myomectomy | استئصال الورم العضلي | normalization | إسواء |
| precognition | استباق الحوادث | isotonic | إسوي التوتر |
| clairvoyance; cryptesthesia | استبصار | isopotential | إسوي الجهد |
| asemia | استبهاام | isometric | إسوي الطول |
| homeostasis | استتباب | choline acetylase | استيلاز كولين |
| excitation | استثارة | acetylcholine | استيل كولين |
| excitatory | استثاري | paroxysm | اشتداد |
| excitability | استثارية | sexuality | اشتواء الجنس |
| reaction; response | استجابة | heterosexuality | اشتواء المغاير |
| lengthening reaction | استجابة التحويل | homoeoticism | اشتواء المعائل |
| operant | استجابة ذاتية | conditioning | إشراف |
| myobradia | استجابة عضلية بطيئة | operant | إشراف فعال |
| exterofection | استجابة للمنبهات الخارجية | radiation | إشعاع |
| interofection | استجابة للمنبهات الداخلية | injury | إصابة |
| excerebration | استخراج الدماغ | liminal | أصغري |
| intellectualization | استذهال | xanthochromia | اصفرار |
| virilism | استرجال | deaf; dull | أصم |
| pneumoventriculi | استرواح البطينات | accessory | إضافي |
| pneumocephalus | استرواح الرأس | ambidexter | أضبط |
| pneumocrania; pneumoencephalos | استرواح القحف | disorder; disturbance | اضطراب |
| passivism | استسلام سلبي | heterotrophia | اضطراب التغذية |
| rage | استشادة | kinesia; kinetosis | اضطراب حركي المنشأ |
| olfactism | استشمام | parosphresia | اضطراب الشم |
| process | استطالة | parareflexia | اضطراب المنعكسات |
| dolichocephalia | استطالة الرأس | hypsarhythmia | اضطراب النظم المفرط |
| aptitude | استعداد | dysomnia | اضطراب النوم |
| exhibitionism | استعراض | parasomnia | اضطراب نومي |
| cognition; identification; noesis | استعراف | kakergasia; merergasia | اضطراب وظيفي |
| cognitive; noetic | استعرافي | tabescent; tabification | اضمحلال |
| anergia; anergy | استعطال | ataraxia | اطمئنان |
| photoreception | استقبال الضوء | reinnervation | إعادة التعصيب |
| chemoreception | استقبال كيميائي | sociopathy | اعتلال اجتماعي |
| exploration | استقصاء | acropathy | اعتلال الأطراف |
| exploratory | استقصائي | polyneuropathy | اعتلال الأعصاب |
| metabolism | استقلاب | leukoencephalopathy; leukoencephaly | اعتلال بيضاء الدماغ |
| sensorimetalism | استقلاب حسي | leukomyelopathy | اعتلال بيضاء النخاع |
| clinostatism; decubitus | استلقاء | pachymeningopathy | اعتلال الجافية |
| masturbation | استمناء | radiculopathy | اعتلال الجذور العصبية |
| vigor | استنشاد | radiculoneuropathy | اعتلال الجذور والأعصاب |
| cholinesterase | استيراز الكولين | polyradiculoneuropathy | اعتلال الجذور والأعصاب والنخاع |
| dysphylaxia | استيقاظ مبكر | radiculomyelopathy | اعتلال الجذور والنق الفقري |
| aid, first | إسفاف أولي | craniopathy | اعتلال الجمجمة |
| axospongium | إسفنجة المحوار | encephalosis | اعتلال الدماغ |
| neurospogium | إسفنج عصبي | meningoencephalopathy | اعتلال الدماغ والسحايا |
| myelospongium | إسفنج نخاعي | meningoencephalomyelopathy | اعتلال الدماغ والسحايا والنخاع |
| cuneus | إسفين | cerebroathy; cerebrosis; encephalopathy | اعتلال دماغي |
| projection | إسقاط | encephalomyelopathy | اعتلال دماغي نخاعي |
| sclic | أسكي | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| encephalomyeloradiculopathy | اعتلال دماغي نخاعي جذري | rachylisis | افتكاك سيسائي |
| encephalomyeloneuropathy | اعتلال دماغي نخاعي عصبي | neurolysis | افتكاك العصب |
| cephalopathy | اعتلال الرأس | cerebration | افتحام |
| meningopathy | اعتلال السحايا | neurosecretion | إفراز عصبي |
| leptomeningopathy | اعتلال السحايا الرقيقة | catharsis | إفراغ المكبوت |
| polioencephalopathy; | اعتلال سنجابية الدماغ | opium | أفيون |
| poliomyelopathy | | opiate | أفيوني |
| poliomyelopathy | اعتلال سنجابية النخاع | suggestion | اقتراح |
| rachipathy | اعتلال سيسائي | conjugal | اقتراضي |
| echopathy | اعتلال صدائي | cingulectomy | اقتطاع التليفين الحزاميين |
| pinealopathy | اعتلال الصنوبرية | neuropodia | أقدام عصبية |
| plexopathy | اعتلال الضفيرة | ischemia | إقفار |
| neurocristopathy | اعتلال عرقي عصبي | myoischemia | إقفار عضلي |
| neuronosis | اعتلال عصبي | depression | اكتئاب |
| mononeuropathy | اعتلال عصبي أحادي | dysthymia | اكتئاب جزئي |
| neuroglycopenia | اعتلال عصبي بنقص السكر | crispation | اكتزاز |
| neuroencephalomyelopathy | اعتلال عصبي دماغي نخاعي | oxytocin | أكسيتوسين |
| neuroarthropathy | اعتلال عصبي مفصلي | geophagia; geophagism | أكل التراب |
| neuropsychopathy | اعتلال عصبي نفسي | corona | إكليل |
| angioneuropathy | اعتلال عصبي وعائي | colliculus | أكيمة |
| polymyopathy | اعتلال العضلات | dolores | آلام |
| myocardopathy | اعتلال عضلة القلب | ego | الإناء |
| myonosis; myopathy | اعتلال عضلي | spondylosyndesis | النحام الفقار |
| neuroretinopathy | اعتلال القرص البصري والشبكية | adhesio interthalamica | الالتصاق بين المهادين |
| logopathy | اعتلال كلامي | ankylocheilia | التصاق الشفتين |
| arthropathy | اعتلال مفصلي | mysynizesis | التصاق العضل |
| myelinopathy | اعتلال مياليني | ankyloglossia | التصاق اللسان |
| myeloradiculopathy | اعتلال النخاع والجذور | inflammation | التهاب |
| myelo-opticneuropathy | اعتلال النخاع والعصب البصري | polyneuritis | التهاب الأعصاب |
| myelopathy | اعتلال نخاعي | neuroamebiasis | التهاب الأعصاب الأميبي |
| psychopathy | اعتلال نفسي | pseudoneuritis | التهاب الأعصاب الكاذب |
| sympathicopathy | اعتلال ودي | enteroneuritis | التهاب الأعصاب المعوية |
| vasoneuropathy; vasoneurosis | اعتلال وعائي عصبي | neuromyositis | التهاب الأعصاب والعضل |
| neuropathic | اعتلالي عصبي | polyneuromyositis | التهاب الأعصاب والعضلات |
| dependence | اعتماد | neuromyelitis | التهاب الأعصاب والنخاع |
| claudicant; claudicatory | أعرج | endarteritis | التهاب بطانة الشريان |
| sinistral; sinistromanual | أعسر | ependymitis | التهاب البطانة العصبية |
| sinistropedal | أعسر القدم | endocranitis | التهاب بطانة القحف |
| neural | أعصابي | leukencephalitis; leukoencephalitis | التهاب بيضاء الدماغ |
| virilia | الأعضاء التناسلية الذكرية | leukomyelitis | التهاب بيضاء نخاع |
| hemianopic | أعمى شقي | endolabyrinthitis | التهاب التيه الغشائي |
| arthrogryposis | اعوجاج المفصل | pachymeningitis; perimeningitis | التهاب الجافية |
| fainting; stun | إغماء | pachyleptomeningitis | التهاب الجافية والحنون |
| lesion | آفة | radiculitis | التهاب الجذر |
| hemileision | آفة شقية | polyradiculitis | التهاب الجذور |
| dissociation | افتراق | polyneuroradiculitis; | التهاب الجذور والأعصاب |
| ideation | افتكار | radiculoneuritis | |
| ideational | افتكاري | polyradiculoneuritis | التهاب الجذور والأعصاب والنخاع |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| radiculoganglionitis | التهاب الجذور والعقد | myitis; myositis | التهاب العضل |
| neurodermatitis | التهاب الجلد العصبي | polymyositis | التهاب العضلات |
| funiculitis | التهاب الحبل | myochochorditis | التهاب عضلات الحبال |
| neuropapillitis | التهاب الحليمة العصبية | stethomyositis | التهاب عضلات الصدر |
| meningitis; pia-arachnitis; | التهاب الحنون والعنكبوتية | myocelitis | التهاب عضل البطن |
| piarachnitis | | monomyositis | التهاب العضلة الأحادي |
| paraphrenitis | التهاب حوالي الحجاب | myocarditis | التهاب عضلة القلب |
| cephalitis; cerebritis | التهاب الدماغ | myofascitis | التهاب العضلة واللفافة |
| otocerebritis; otoencephalitis | التهاب الدماغ الأذني المنشأ | myometritis | التهاب عضل الرحم |
| panencephalitis | التهاب الدماغ الشامل | myocellulitis | التهاب العضل والهلال |
| mesencephalitis | التهاب الدماغ المتوسط | inomyositis | التهاب عضلي ليفي |
| herpesencephalitis | التهاب الدماغ الهربسي | myotenositis | التهاب عضلي وتري |
| encephaloradiculitis | التهاب الدماغ والجذور | ganglionitis | التهاب العقدة |
| meningocephalitis; | التهاب الدماغ والسحايا | neuroganglitis | التهاب العقدة العصبية |
| encephalomeningitis; meningocerebritis | | uveomeningoencephalitis | التهاب العننية والسحايا والدماغ |
| encephalomyocarditis | التهاب الدماغ والعضل والقلب | arachnitis; arachnoiditis | التهاب العنكبوتية |
| encephalomyelitis; myeloencephalitis | التهاب الدماغ والنخاع | basiarachnitis | التهاب العنكبوتية القاعدية |
| encephalomyeloradiculitis; | التهاب الدماغ والنخاع والجذور | myringitis | التهاب غشاء الطبل |
| encephalomyeloradiculoneuritis | | perineuritis | التهاب غمد الحزمة العصبية |
| meningitides; meningitis | التهاب السحايا | myofibrositis | التهاب غمد العضل |
| leptomeningitis | التهاب السحايا الرقيقة | endoneuritis; neurilemmitis | التهاب غمد الليف العصبي |
| hydromeningitis | التهاب السحايا الموهي | ramitis | التهاب الفرع |
| perimyelitis | التهاب السحايا النخاعية | spondylitis | التهاب الفقار |
| meningoradiculitis | التهاب السحايا والجذور | cranitis | التهاب القحف |
| cerebromeningitis | التهاب السحايا والدماغ | psoriasis | التهاب القطنية |
| chorioomeningitis | التهاب السحايا والمشيميات | periencephalitis | التهاب محيط الدماغ |
| meningomyeloradiculitis | التهاب السحايا والنخاع والجذور | cerebellitis | التهاب المخيخ |
| meningomyeloencephalitis | التهاب السحايا والنخاع والدماغ | acrostealgia | التهاب نزوات الأطراف المؤلم |
| meningo-osteophlebitis | التهاب السمحاق وأوردة العظم | myelitis; notomyelitis; rachiomyelitis | التهاب النخاع |
| poliencephalitis; polioencephalitis | التهاب سنجابية الدماغ | syringomyelitis | التهاب النخاع التكفهي |
| pseudopolyomyelitis | التهاب سنجابية الدماغ الكاذب | hematomyelitis | التهاب النخاع الدموي |
| polioencephalomeningomyelitis; | التهاب سنجابية | myeloneuritis | التهاب النخاع والأعصاب |
| poliomyelencephalitis; | الدماغ والنخاع | myeloradiculitis | التهاب النخاع والجذور |
| poliomyeloencephalitis; poliencephalomyelitis | | myelencephalitis | التهاب النخاع والدماغ |
| poliomyelitis; tephromyelitis | التهاب سنجابية النخاع | myelomeningitis | التهاب النخاع والسحايا |
| rachitis | التهاب السيساء | hypophysitis | التهاب النخامية |
| meningoarteritis | التهاب شرايين السحايا | tortipelvis | التواء الحوض |
| plexitis | التهاب الضفيرة | embolalia | التيات |
| neuritis | التهاب العصب | affinity | ألفة |
| mononeuritis | التهاب العصب الأحادي | vagotropism | ألفة المبهم |
| neuroretinitis | التهاب العصب البصري والشبكية | dolor; pain | ألم |
| neurochoroiditis | التهاب العصب البصري والمشيمة | enteralgia | ألم الأمعاء |
| neurochorioretinitis | التهاب العصب البصري والمشيمية والشبكية | pygalgia | ألم الآلية |
| neuritis | التهاب عصبوني | earache | ألم الأذن |
| radioneuritis | التهاب عصبي إشعاعي | otagra; otalgia | ألم أذني |
| neurolabyrinthitis | التهاب عصبي تيهي | eparsalgia | ألم الأرهاق |
| | | dentalgia | ألم الأسنان |
| | | digitalgia | ألم الأصابع |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| costalgia | ألم الأضلاع | myoneuralgia | ألم عصبي عضلي |
| melalgia | ألم الأطراف | osteoneuralgia | ألم عصبي عظمي |
| melosalgia | ألم الأطراف السفلية | angioneuralgia | ألم عصبي وعائي |
| rhinalgia | ألم الأنف | coccyalgia; coccydynia; coccygodynia | ألم المصعصع |
| psychroalgia | ألم البرد | brachialgia | ألم عضدي |
| precordialgia | ألم البرك | myalgia | ألم العضل |
| pancrealgia; pancreatalgia | ألم البنكرياس | polymyalgia | ألم العضلات |
| mittelschmerz | ألم بين الحيضين | melagra | ألم عضلات الأطراف |
| cryalgia; crymodynia | ألم التبريد | myocelialgia | ألم عضل البطن |
| mammalgia | ألم الثدي | cinesalgia | ألم العضلة التحركي |
| radiculargia | ألم الجذر | myosalgia | ألم عضلي |
| somatalgia | ألم جسدي | ostealgia | ألم عظمي |
| diaphragmalgia; phrenalgia; phrenodynia | ألم الحجاب | talalgia | ألم العقب |
| thermalgia | ألم حراري | opsialgia | ألم العقدة الركبية |
| kinesalgia; kinesialgia; oxycinesia | ألم الحركة | ophthalmalgia | ألم العين |
| visceralgia | ألم حشوي | hemiopalgia | ألم عيني شقي |
| encelialgia | ألم حشوي بطني | ophthalmagra | ألم عيني مفاجيء |
| thelalgia | ألم الحلمة | antralgia | ألم الغار |
| laryngalgia | ألم الحنجرة | adenalgia | ألم الغدة |
| menalgia | ألم الحيض | dacryadenalgia | ألم الغدة الدمعية |
| mastoidalgia | ألم الخشاء | cardialgia | ألم الفؤاد |
| orchidalgia; testalgia | ألم الخصية | meralgia | ألم الفخذ |
| encephalgia; cephalalgia; cephalgia | ألم الرأس | merocoxalgia | ألم الفخذ والورك |
| telalgia | ألم رجيع | spondylalgia | ألم الفقرات |
| metralgia; hysteralgia | ألم الرحم | gnathalgia; gnathodynia | ألم الفك |
| cervicobrachialgia | ألم رقبي عضدي | stomalgia; stomatalgia; stomatodynia | ألم الفم |
| gonalgia | ألم الركبة | pedialgia; podalgia | ألم القدم |
| scelalgia; skelalgia | ألم الساق | mittelschmerz | ألم القراء |
| odontalgia | ألم السن | iridalgia | ألم القرنية |
| spinalgia; rachialgia | ألم السيساء | lumbago | ألم القطن |
| neurodealgia | ألم الشبكية | cardialgia | ألم قلبي |
| panniculalgia | ألم الشحم الجلدي | colonalgia | ألم القولون |
| adiposalgia | ألم شحمي | talalgia | ألم الكاحل |
| agony | ألم شديد | heptalgia | ألم كبدي |
| arteralgia | ألم شرياني المنشأ | omalgia; omodynia; scapulargia | ألم الكتف |
| hemalgia; hemialgia | ألم شقي | nephralgia | ألم الكلى |
| thoracalgia | ألم الصدر | dacryocystalgia | ألم كيس الدمع |
| peritonealgia | ألم الصفاق | ulalgia | ألم اللثة |
| plexalgia | ألم ضفيري | glossalgia; glossodynia | ألم اللسان |
| photalgia; photodynia | ألم ضوئي | epicondylalgia | ألم اللقيمة |
| splinalgia | ألم الطحال | haphalgia | ألم لمسي |
| tibialgia | ألم الظنوب | oophoralgia; ovarialgia | ألم المبيض |
| notalgia; backache; backalgia; dorsalgia | ألم الظهر | topalgia | ألم متوضع |
| sacralgia | ألم العجز | cystalgia | ألم المثانة |
| neurodynia | ألم العصب | synalgia; telalgia | ألم محول |
| prosopalgia | ألم العصب الثلاثي التوائم | dacryocystalgia | ألم الدمع |
| polyneuralgia; neuralgia | ألم عصبي | esophalgia | ألم المريء |
| otoneuralgia | ألم عصبي أذني المنشأ | proctalgia; rectalgia | ألم المستقيم |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| megalgalia | الم مفرط | pronation | انبطاح |
| arthralgia | الم مفصلي | ectopia | انتباز |
| scapulodynia | الم الكتف | myectopia | انتباز عضلي |
| colpalgia | الم المهبل | alertness; attention | انتباه |
| topoalgia | الم موضع | neurobiotaxis | انتحاء حيائي عصبي |
| myelalgia | الم النخاع | thought broadcasting | انتشار الأفكار |
| algopsychalia | الم نفسي | orthostatism | انتصاب الجسم |
| psychalgia; psyschalgia | الم نفسي المنشأ | orthostatic | انتصابي |
| hypnalgia; nyctalgalia | الم نومي | metastasis; transmission | انتقال |
| bends | الم مربوط الضغط | neurotransmission | انتقال عصبي |
| teinodynia; tenalgia | الم الوتر | paroxysm | انتياب |
| faciocephalgia | الم الوجه والرقبة | paroxysmal | انتيابي |
| ischialgia; ischiodynia | الم الورك | flexion | انثناء |
| phlebalgia | الم وريدي | lateroflexion | انثناء جانبي |
| angialgia | الم الوعاء | dorsiflexion | انثناء ظهري |
| vasalgia | الم وعائي | flexibility; flexibility | انثائية |
| cheiralgia | الم اليد | stereotaxis; thigmotaxis | انجذاب لمسي |
| cheiromachialgia; chirobrachialgia | الم اليد والذراع | deviation | انحراف |
| cheiropodalgalia; chiropodalgalia | الم اليد والقدم | laterodeviation | انحراف جانبي |
| neuromechanism | آلية عصبية | retrodeviation | انحراف خلفي |
| zoophilic | أليف الحيوانات | myocytolysis | انحلال الخلايا العضلية |
| cephalotropic | أليف الدماغ | myolysis; rhabdomyolysis | انحلال العضل |
| polioencephalotropic | أليف سنجابية الدماغ | myocardiolysis | انحلال عضلة القلب |
| neuronotropic | أليف العصبونات | spondylolysis | انحلال الفقرة |
| sympathicotropic | أليف الودي | myelinolysis | انحلال الميالين |
| allele | أليل | myelolysis | انحلال النخاع |
| dura mater; pachymeninx | الأم الجافية | rachiocampsis | انحناء السيساء |
| pia; pia mater | الأم الحنون | illusion | انخداع |
| meningina | الأم الحنون والعنكبوتية | illusional | انخداعي |
| aneurysm | أم الدم | depression | انخساف |
| pretectal | أمام السقف | impulsion; propulsion | اندفاع |
| rostral | أمامي | appetitive | اندفاعي |
| ampulla | أنبولة | dysphoria | انزعاج |
| withdrawl | امتناع | spondylolisthesis | انزلاق الفقار |
| aphagia algera | امتناع ألمي عن الطعام | myectopia | انزياح العضلة |
| aphgia | امتناع عن الطعام | nicotinism | انسمام نيكوتيني |
| optimal | أمثل | lateropulsion | انسياق جانبي |
| optimum | الأمثل | diastematocrania | انشطار القحف |
| anagoge; anagogy | أمثلة النفس | diastematomyelia | انشطار النخاع |
| neuropathogenesis | إمراض عصبية | autosynnoia | انشغال بالذات |
| neuropathogenicity | إمراضية عصبية | schizogryia | انشقاق التلافيف |
| leptocephalic | أفق الرأس | schizocephalia | انشقاق الرأس |
| unstriated | أملس | rachischisis | انشقاق السيساء |
| superego | الإناء العليا | mesorachischisis | انشقاق السيساء الجزئي |
| egotropic; idiotropic; introvert | أناني | hemirachischisis | انشقاق السيساء الشقي |
| egoism | أنانية | spondyloschisis | انشقاق الفقار |
| egocentric | أناني التركيز | cranioschisis | انشقاق القحف |
| extroversion | انبساط نفسي | craniorachischisis | انشقاق القحف والسيساء |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| myelochschisis | انشقاق النخاع | emotion | انفعال |
| merorachischsis | انشقاق النخاع الجزئي | emotional | انفعالي |
| holorachischsis | انشقاق النخاع الكامل | nasal | أنفي |
| insenescence | انشياخ | hyposensitization | انقاص التحسس |
| embolism | انصمام | iniencephaly | انقذال الدماغ |
| compression | انضغاط | anhidrosis | انقطاع التعرق |
| encephalothisis | انضغاط الدماغ | conversion | انقلاب |
| engram; impression | انطباع | denial | إنكار |
| autism | انطواء على الذات | enkephalinergic | انكيفاليني الفعل |
| autistic; introvert | انطوائي | exhaustion; lassitude | انهاك |
| autism | انطوائية | axonotmesis | انهتاك المحوار |
| anodynia | انعدام الألم | collapse | انهيار |
| agyria; lissencephalia | انعدام التلافيف | diathesis | أهبة |
| athymia | انعدام التوتة | ament | أهبل |
| asexuality | انعدام الجنس | orientation | اهتداء |
| acorea | انعدام الحديقة | involution | أوب |
| anaphia; anaphia | انعدام حس اللمس | oedipism | أوديبية |
| anencephalia | انعدام الدماغ | aura | أورة |
| arthrinencephalia | انعدام الدماغ الشمي | aural | أوري |
| pantanencephaly | انعدام الدماغ في الجنين | menopause | إياس |
| amyelencephalia | انعدام الدماغ والنخاع | menopausal | إياسى |
| ageusia; ageustia | انعدام الذائقة | suggestion | إحاء |
| aceplalia | انعدام الرأس | autosuggestion; self suggestion | إحساء ذاتي |
| acephalobrachia | انعدام الرأس والذراعين | sympathism | إيحائية |
| deranencephalia | انعدام الرأس والعنق | conductance | إيصالية |
| acephalopodia | انعدام الرأس والقدمين | orgasm | إيقاف |
| acephalochiria | انعدام الرأس واليدين | algogenesis; tenderness | إيلام |
| anodmia | انعدام الشم | dyspragia | إيلام الأداء |
| anepithymia; inappetence | انعدام الشهية | thermalgesia | إيلام حراري |
| athymia | انعدام العاطفة | carotidynia | إيلام سباتي |
| aphakia | انعدام العدسة | gesture | إيماءة |
| inoccipitia | انعدام الفص القذالي | dextropedal | أيمن القدم |
| aniridia | انعدام القرزجية | dextrmanual | أيمن اليد |
| notancephalia | انعدام مؤخر الرأس | | |
| inappetence | انعدام المبادرة | | (ب) |
| hemicephalia | انعدام المخ | | |
| notanencephalia | انعدام المخيخ | hypophysiportal | بابي نخامي |
| amyelia | انعدام النخاع | dorsad | باتجاه الظهر |
| withdrawal | انعزال | neuropathology | باطولوجيا عصبية |
| nutation | انفضاض | area | باحة |
| hemiation | انفتاق | parapsychology | باراسيكولوجيا |
| distortion; torsion | انقتال | barbital | باربيتال |
| tortipelvis | انقتال الحوض | eminence; eminentia | بارزة |
| diaschisis | انفراق عصبي | parkinsonian | باركنسوني |
| ablatio retinae | انفصال الشبكية | parkinsonism | باركنسونية |
| myodiastasis | انفصال العضلة | hemiparkinsonism | باركنسونية شقية |
| schizokinesis | انقسام الاستجابات | sthenia | باس |
| schizotonia | انقسام التوتر | ambilateral; bilateral | الجانبين |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| binocular | بالعينين | uncotomy | بضع الشص |
| aphrodisia | باه | neurotomy | بضع العصب |
| aphrodisiac | باهي | splanchnicotomy | بضع العصب الحشوي |
| neuropeptide | ببتيد عصبي | lobotomy | بضع الفص |
| neurography | بحث عصبي | leucotomy; leukotomy | بضع الفص الجبهي |
| coprolalia; coprophrasia | بذاء | thalamectomy; thalamotomy | بضع المهاد |
| end-feet | براعم انتهائية | cordotomy; myelotomy | بضع النخاع |
| exencephalia; exencephaly | برائية الدماغ | myototomy | بضع وتر العضلة |
| exencephalous | براني الدماغ | myomotomy | بضع الورم العضلي |
| fastigium | برحاء | hypothalamotomy | بضع الوطاء |
| isthmus | برزخ | bradyesthesia | بطء الإدراك |
| bud | برعم | myobradia | بطء الإستجابة العضلية |
| dysphoria | برم | bradyphrasia | بطء التلفظ |
| frigidity | برودة | bradyteleocinesia | بطء التنسيق الحركي |
| hillock | بروز | bradycinesia | بطء الحركة |
| prostaglandin | بروستغلندين | bradylexia | بطء القراءة |
| procaine | بروكاين | bradylogia; bradyphemia | بطء الكلام |
| beriberi | بري بري | bradyglossia | بطء النطق |
| puncture | بزل | putamen | بطانة |
| encephalopuncture | بزل الدماغ | endyma; ependyma | بطانة عصبية |
| cephalocentesis | بزل الرأس | endocranium | بطانة القحف |
| craniopuncture | بزل القحف | abdomen | بطن |
| rachicentesis | بزل قطني | rostral | بطني |
| tapetum | بساط | ventricle; ventriculus | بطين |
| extension | بسط | postganglionic | بعد العقدة |
| oscillopsia | بصر مذبذب | asilia | بغض الطعام |
| optical | بصري | macula; spot; tache | بقعة |
| optics | بصريات | maculocerebral | بقعي دماغي |
| opticociasmatic; optochiasmtic | بصري تصالبي | diaphemetric | بقياس حس اللمس |
| opticopupillary | بصري حدقي | alalia | بكامة |
| optiociliary | بصري هدي | alalia cophica; deaf-mutism | بكم |
| bulb; bulbus | البصلة | audimutitas | بكم سميع |
| bulbopontine | بصلي جسري | hypothymia | بلاد الانفعالات |
| pseudobulbar | بصلي كاذب | hyponoia | بلاد عقلية |
| fingerprint | بصمة | gliophagia | بلعمة الدبق |
| Insight | بصيرة | myophagism | بلعمة عضلية |
| cingulotomy; cingulumotomy | بضع التلفيفين الحزاميين | odynophagia | بلع مؤلم |
| foraminotomy | بضع الثقبة | aerophagia | بلع الهواء |
| rhizotomy | بضع الجذور | neuronophage | بلعم العصبونات |
| chordotomy | بضع الحبل | myophage | بلعم العضل |
| viscerotomy | بضع الحشى | axophage | بلعم المحوار |
| cerebrotomy; encephalotomy | بضع الدماغ | pellagra | بلغرة |
| mesencephalotomy | بضع الدماغ المتوسط | imbecility | بله |
| cephalotomy | بضع الرأس | puberty | بلوغ |
| stereoccephalotomy | بضع الرأس المجسم | ephebogenesis | بلوغية |
| rachiotomy; spondylotomy | بضع السيساء | dull | بليد |
| pallidotomy | بضع الشاحبة | hypoaffective | بليد العاطفة |
| pallidoanatomy | بضع الشاحبة والعروة | anesthetic | بنج |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| ipsilateral | بنفس الجانب | saccade | تتبع |
| constitution; habitus | بنية | saccadic | تتبعية |
| constitutional | بنوي | oscitation; yawning | تناؤب |
| nocturia; nycturia | بوال ليلي | inhibition | تنظيم |
| focus | بؤرة | perencephaly | ثقوب الدماغ |
| nidus | بؤرة مرضية | trisomy | ثلاث صبغي |
| nidal | بؤرية مرضية | ego-syntonic | تجانس الذات |
| positron | بورترون | regeneration | تجدد |
| enuresis | بول الفراش | neuranagenesis; neurotization | تجدد الأعصاب |
| environment | بيئة | eructatio nervosa | تجشؤ عصبي |
| pyrrocaïne | بيروكائين | prosocele; prosocoele | تجويف الدماغ المقدم |
| flush | بيغ | granulation | تجنب |
| phenylketonuria | بيلة الفينيل كيتون | subdural | تحت الجافية |
| interpial | بين طبقتي الحنون | subpial | تحت الحنون |
| internode | بين العقدتين | subthalamus | تحت المهاد |
| interictal | بين النوبات | locomotion; motility; mobility | تحرك |
| neurobiology | بيولوجيا عصبية | autokinesis | تحرك إرادي |

(ت)

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| erratic | تائه | distortion | تحريف |
| tabes | تابيس | mobilization | تحريك |
| taboparalysis; taboparesis | تابيس شللي | fasciculation | تخزم |
| pseudotabes | تابيس كاذب | sensibility | تحسس |
| tabetic | تابيسي | dysesthesia | تحسس شاذ |
| battarismus; mogilalia; psellism; stuttering | تاتاة | metallesthesia | تحسس الفلزات |
| dysphemia | تاتاة نفسية المنشأ | sensibilization | تحسيس |
| myotonia | تأتر العضل | neurarchy | تحكم عصبي |
| pseudomyotonia | تأتر عضلي كاذب | myelinoclasia; myelinolysis | تحلل الميالين |
| myotonic | تأتر عضلي | analysis | تحليل |
| noci-influence | تأثير مؤذ | narcoanalysis | تحليل تخديري |
| corona | تاج | hypnoanalysis | تحليل تنويمي |
| body rocking | تارجح الجسم | graphoanalysis | تحليل الشخصية من الكتابة |
| synergism | تآزر | psychoanalysis; psychoanalysis | تحليل نفسي |
| synergetic | تآزري | afterloading | تحميل تلوي |
| synergy | تآزرية | dysphoria | تحوز |
| algasia; algesia | تالم | conversion | تحويل |
| introspection | تأمل الباطن | hyposympathicotonus | تخاذل الودي |
| bradyecia | تباطؤ السمع | dactylophasia | تخاطب إصبعي |
| heteresthesia | تباين الحس | telepathy | تخاطر |
| depersonalization | تبديد الشخصية | narcosis; narcotism | تخدر |
| metonymy | تبديل الكلمات | encephalonarcosis | تخدر دماغي المنشأ |
| prolepsis | تبكير الانتياب | electronarcosis | تخدر كهربوي |
| oblusion | تبلد الحس | anesthesia; narcosis | تخدير |
| bradyphrenia | تبلد الذهن | monoanesthesia | تخدير أحادي |
| anesthesia | تبنيج | neuroleptanesthesia | تخدير تسكينوي |
| crymoanesthesia | تبنيج قري | hypnoanesthesia | تخدير تنويمي |
| bedwetting | التبول في الفراش | rhizanesthesia | تخدير جذري |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|
| pseudonarcotism | تخدير كاذب | mating | تزاوج |
| rachianalgesia | تخدير نخاعي | tectocephaly; cymbocephalia | تذروق الرأس |
| phlebanesthesia | تخدير وريدي | acceleration | تسارع |
| narcotic | تخديري | isopotential | تساوي الجهد |
| thalamectomy | تخريب المهاد | tachyphagia | تسرع الأكل |
| confabulation; fabrication | تخريف | tachyphrenia | تسرع التفكير |
| echoencephalography | تخطيط صدى الدماغ | tachypragia | تسرع العمل |
| myography | تخطيط العضل | tachylalia | تسرع الكلام |
| electroretinography | تخطيط كهربية الشبكية | tachyphrasia | تسرع النطق |
| electroneuromyography | تخطيط كهربية العضلة
المكهربة العصب | clinocephalism; clinocephaly; tapeinocephaly | تسطيح الرأس |
| radioencephalography | تخطيط لاسلكي للدماغ | platybasia | تسطيح القاعدة |
| decompression | تخفيف الضغط | platycrania | تسطيح القحف |
| retardation | تخلف | sphenocephaly | تسفن الرأس |
| feeble-mindedness; hypophrenia; oligophrenia | تخلف عقلي | alganesthesia; analgesia | تسكين |
| confusion | تخليط | paranalgesia | تسكين الأطراف السفلية |
| confusional | تخليطي | amnalgesia | تسكين انساني |
| dyspepsia | تخمة | ataralgesia; neuroleptanalgesia | تسكين طعامي |
| phantasy; fantasy | تخيل | audionalgesia | تسكين سمعي |
| association | تداعي | hemianalgesia | تسكين شقي |
| noctissociation | تداعي الإصابة | cryoanalgesia | تسكين قري |
| treppe | تدرج | electroanalgesia | تسكين كهربائي |
| drop | تدلي | lathyrism | تسمم بالجلبان |
| wristdrop | تدلي الرسغ | neuronymy | تسمية عصبية |
| spondyloptosis | تدلي الفقار | myonymy | تسمية العضلات |
| glossoptosis | تدلي اللسان | acrocephalia; hypsicephaly; oxycephalia; | تسمن الرأس |
| encephalization | تدمع | oxycephaly; stenocephaly | |
| hematomyelia; myelapoplexy; myelorrhagia | تدمي النخاع | synapsis | تشابك |
| oscillation | تذبذب | appersonification | تشخيص |
| recall | تذكر | empathy | تشاعر |
| cryptanamnesia; cryptomnesia | تذكر الخفايا | arborization | تشجر |
| palinmnesia | تذكر القديم | neurodiagnosis | تشخيص عصبي |
| recall | تذكير | psychodiagnosis | تشخيص نفسي |
| hemigeusia | تذوق نصفي | neuroanatomy | تشریح عصبي |
| association; coherence | ترابط | formation | تشكل |
| synreflexia | ترابط المنعكسات | myelinization | تشكل الميالين |
| virilence; virilization | تراجل | formation | تشكيل |
| summation | تراكم | spasm; spasmus | تشنج |
| trabecula | تربيب | dactylospasm | تشنج الإصبع |
| neurotagma | ترتيب عصبي | orthotonus | تشنج انتصابي |
| neurotransducer | ترجم عصبي | protospasm | تشنج أولي |
| sedation | تركين | pharyngism; pharyngismus | تشنج البلعوم |
| clonism | ترمع | arthrogryposis | تشنج تكززي |
| staggers; titubation | ترنح | laryngismus; laryngospasm | تشنج الحنجرة |
| hypsochinesia | ترنح خلفي قياسي | cantus galli | تشنج الحنجرة الصريري |
| graphocatharsis | ترويح بالكتابة | anesthetospasm | تشنج خدري |
| antitoxin | ترياق | gyrospasm | تشنج دوراني |
| synchronism | تزامن | retrocollis | تشنج الرقبة المنكفي |
| | | clonospasm | تشنج رمعي |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| hemispasm | تشنج شقي | epidurography | تصوير فوق الجافية |
| opisthotonos | تشنج ظهري | periencephalography | تصوير محيط الدماغ |
| neurospasm | تشنج عصبي | tomography | تصوير مقطعي |
| myspasm | تشنج عضلي | neurotomography | تصوير مقطعي عصبي |
| myotonus; paramyotonus | تشنج عضلي توتري | myelography | تصوير النخاع |
| palmus | تشنج قفزي | pneumomyelography | تصوير النخاع الغازي |
| graphospasm | تشنج الكتّاب | control | تضبط |
| logospasm | تشنج الكلام | neurosarcocleisis | تضمين عصلي للعصب |
| glossospasm | تشنج اللسان | stenocortaphia | تضييق الصدغ |
| paraspasm | تشنج متناظر | craniosclerosis | تضييق القحف |
| myostospasm | تشنج المثانة | lemostenosis | تضييق المريء |
| entasia | تشنج مُضَيّق | constriction | تضييق |
| idiospasm | تشنج موضّع | iatric | طبيبي |
| algospasm | تشنج مؤلم | iatrogenic | طبيبي المنشأ |
| myelospasm | تشنج نخاعي | development | تطور |
| prosopospasm | تشنج الوجه | mnemonics | تطوير الذاكرة |
| spasmodic; spastic | تشنجي | fatigue | تعب |
| cheirospasm | تشنج اليد | expression | تعبير |
| abnormality; deformity; dysmorphosis; malformation | تشوه | acceleration | تسجيل |
| polydyspondylism | تشوه الفقرات المتعدد | polyalgnesia | تعدد التآلم |
| senescence | تشيخُن | polyesthesia; polysensitivity | تعدد التحسس |
| decussation | تصالب | microgyria; micropolygyria | تعدد التلافيف الصغرية |
| chiasm; chiasma | تصالبة | apraxia; parectropia | تعدّر الاداء |
| conduct | تصرف | hemipraxis | تعدّر الاداء الشقي |
| cyclocephaly; cyclopia | تصقلب الرأس | neurapraxis | تعدّر الاداء العصبي |
| sclerosis | تصلب | achalasia | تعدّر الارتخاء |
| cerebrosclerosis; encephalosclerosis | تصلب دماغي | adiaphoria | تعدّر الاستجابة |
| neuroclerosis | تصلب عصبي | parasomnia | تعدّر الاستجابية |
| atherosclerosis | تصلب عصيدى | amimia | تعدّر الإيماء |
| mysclerosis | تصلب عضلي | asynergy | تعدّر التآزر |
| craniosclerosis | تصلب القحف | alexithymia | تعدّر التعبير العاطفي |
| myelosclerosis | تصلب النخاع | adiadochocinesia; adiadochokinesia | تعدّر تناوب الحركات |
| acrosclerosis | تصلب النهايات | akathisia; cathisophobia | تعدّر الجلوس |
| mannerism | تصنع | akinesia; akinesis | تعدّر الحركة |
| phonation | تصويت | akinesia algera | تعدّر الحركة الالسي |
| angiography | تصوير الاوعية | akinesia amnestica | تعدّر الحركة النساوي |
| pneumoventriculography | تصوير البطينات الغازي | acalculia | تعدّر الحساب |
| scanography | تصوير تقريسي | acoria | تعدّر الشبع |
| peridurography | تصوير حول الجافية | acrasia | تعدّر ضبط النفس |
| perimyelography | تصوير حول النخاع | akatamathesia | تعدّر الفهم |
| encephalography | تصوير الدماغ | akatanoesis | تعدّر فهم الذات |
| pneumencephalography | تصوير الدماغ الغازي | alexia; aphemesthesia; typhlolexia | تعدّر القراءة |
| pneumoencephalomyelography | تصوير الدماغ والنخاع الغازي | aphonogelia | تعدّر القهقهة |
| acrocephalography | تصوير سنام الرأس | agraphia | تعدّر الكتابة |
| neuroroentgenography | تصوير شعاعي عصبي | abasia | تعدّر المشي |
| cisternography | تصوير الصهريج | anarthria | تعدّر النطق |
| pneumography | تصوير غازي | ananastasia; astasia | تعدّر الوقوف |
| | | ephidrosis | تعرق |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| diaphoresis | تعرق غزير | psychocatharsis | تفريغ فكري |
| reinforcement | تعزير | psychocatharsis | تفريغ نفسي |
| innervation | تعصيب | oneiroscopy | تفسير الأحلام |
| organization | تعضي | activation | تفعيل |
| deafferentation | تعطيل الوارد | telergy | تفعيل بعادي |
| craniosynostosis | تعظم الدروز الباكر | decomposition | تفكك |
| craniosstosis | تعظم الدروز الخلقي | intellectualization; thinking | تفكير |
| sarcostosis | تعظم العضل | miosis; myosis | تقبض الحدقة |
| mentation | تعقل | progression | تقدم |
| learning | تعلم | progressive | تقدمي |
| hypnopedia | تعلم نومي | dosage | تقدير الجرعات |
| abeyance | تعلق | occipitalization | تقذل |
| insenescence | تعمير | etat vermouthu | تقرح سطح الدماغ |
| handicap | تعوق | myogelosis | تقس عضلي |
| retardation | تعويق | decortication | تقشير |
| identification | تعيين الهوية | hemidecortication | تقشير نصف المخ |
| neurotrophic | تغذوي عصبي | sectio | تقطيعة |
| myotrophic | تغذوي عضلي | contracture | تقفع |
| biofeedback | تغذية حيوية راجعة | acrocontracture | تقفع الطرف |
| feedback | تغذية راجعة | acromyotonia | تقفع نهايات الأطراف |
| neurotrophy | تغذية عصبية | pessimum | تقلص ثلوي |
| feed-forward | تغذية مسيرة | myoseism | تقلص عضلي نفسي |
| myotrophy | تغذي العضل | anodal closure contraction | تقلص الفلق المصعدي |
| alienation | تغرب | anodal opening contraction | تقلص الفتح المصعدي |
| dendrite; dendron; neurodendrite; neurodendron | تغصن | electrocontractility | تقلصية كهربية |
| dendric; dendritic | تغصني | lability | تقلقل |
| hypnolepsy; narcolepsy | تغفيق | empathy | تقمص عاطفي |
| sympatheticotonia; sympathicotonia | تغلب الودي | psychotechnics | تقنيات نفسية |
| poikilothermy | تغير الحرارة | hematomyelopore | تقني النخاع النزفي |
| paraphonia | تغير الصوت | emprosthotos | تقوس امامي |
| poikilothymia | تغير المزاج | catabolism | تقويض |
| clouding | تغييم | maturation | تقيح |
| obnubilation | تغييم الرعي | encephalopyosis | تقيح الدماغ |
| dissociation | تفارق | spondylopyosis | تقيح الفقار |
| ego-dystonic | تفارق الذات | integration | تكامل |
| reaction | تفاعل | gliomatosis | تكثر الدبق |
| anisopia | تفاوت الإبصار | aggregation | تكسس |
| anisometropia | تفاوت الانكسار | paliknesia | تكرارية الحركة |
| anisoaccommodation | تفاوت التكيف | palingraphia | تكرارية الكتابة |
| anisocoria | تفاوت الحدقتين | palinphrasia | تكرارية الكلام |
| aniseikonia | تفاوت الصورتين | catalogia | تكرارية اللفظ |
| neurocladism; odogenesis | تفرع عصبي | tetanus; tetany | تكزز |
| neuromodulation | تفريغ عصبي | pseudotetanus | تكزز كاذب |
| scanning | تفريس | tetanzation | تكزير |
| scan | تفريسة | risus | تكشيرة |
| scintiscan | تفريسة ومضانة | sardonic | تكشيرة تشنجية |
| discharge | تفريغ | sleep talking; somniloquism | تكلم نومي |
| afterdischarge | تفريغ تلوي | agitallalia; agitophasia | تكلم هرولي |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| cavitation; porosis | تكهف | myomalacia | تلين العضل |
| syringobulbia | تكهف البصلة | spondylomalacia | تلين الفقار |
| pontobulbia | تكهف البصلة والجسر | craniomalacia | تلين القحف |
| syringopontia | تكهف الجسر | myelomalacia | تلين النخاع |
| porencephaly; syringoencephalia | تكهف الدماغ | malinger; pathomimesis; pathomimia; | تعارض |
| porencephalitis | تكهف الدماغ الالتهابي | pathomimicry | |
| syringoencephalomyelia | تكهف الدماغ والنخاع | mussitation | تمتمة |
| syringomyelus | تكهف قناة النخاع | psychodrama | تمثيل نفسي |
| syringomyelia | تكهف النخاع | myotasis | تمدد العضل |
| gestalt | تكون إدراكي | extension | تمديد |
| neurogenesis | تكون العصب | neurectasia | تمديد العصب |
| neurulation | تكون العصبية | laceration | تمزق |
| myelination | تكون الميالين | neurotmesis | تمزق الأعصاب |
| myelinogeny | تكون الميالين العصبي | neuragmia | تمزق الجذع العصبي |
| myelination | تكون النخاعين | myorrhexis | تمزق العضل |
| myomagenesis | تكون الورم العضلي | endoneurolysis | تمشيط ألياف العصب |
| gestaltism | تكونية إدراكية | hersage | تمشيط العصب |
| action-formation | تكوين الاستجابة | restlessness; unrest | تعلل |
| accommodation | تكيف | myokymia; neuromyotonia | تموج عضلي |
| conditioning | تكييف | discrimination | تمييز |
| bathmotropism | تكييف الاستثارية | coordination | تناسق |
| disintegration | تلاشي | dissonance | تناقض |
| adaptation | تلاؤم | myelogeny | تناضح الميالين |
| scopophilia | تلذذ جنسي بالمراقبة | antipathy | تناكر |
| pyrolagnia | تلذذ جنسي بالنيران | development | تنامي |
| psycholagny | تلذذ جنسي نفسي | myelogenesis | تنامي الجهاز العصبي |
| choreophrasia | تلفظ رقصي | psychogenesis | تنامي نفسي |
| idioglossia | تلفظ معيب | diadochokinesia | تناوبية الحركات |
| convclution; gyrus | تلفيف | olfactism | تنبه شمعي |
| microgyrus | تلفيف صغير | stimulation | تنبيه |
| fabrication | تلفيق | myelinogenesis | تنخع |
| automatic; spontaneous | تلقائي | ulegyria | تندب التلافيف |
| automatism; telergy | تلقائية | coordination | تنسيق |
| biofeedkack | تلقين حيوي راجع | activation | تنشيط |
| lag | تلكؤ | remotivation | تنشيط الحوافز |
| groove; streak; sulcus | تم | encephaloscopy | تنظير الدماغ |
| stain | تلون | retinoscopy | تنظير الشبكية |
| afterloaded | تلوية التحميل | ophthalmoscopy | تنظير العين |
| staining | تلوين | funduscopy | تنظير قاع العين |
| myofibrosis | تليف عضلي | cranoscopy | تنظير القحف |
| neuromalacia; neuromalakia | تلين الأعصاب | craniotomocopy | تنظير القحف التسمعي |
| softening | تلين بفقر الدم | organization; regulation | تنظيم |
| cerebromalacia; encephalodialysis; | تلين الدماغ | abreaction | تنقيس |
| encephalomalacia; necrencephalus | | autocatharsis | تنقيس ذاتي |
| meningomalacia | تلين السحايا | degeneration | تنكس |
| tephromalacia | تلين السنجابية | myodemia | تنكس شحمي عضلي |
| | | myocerosis; myokerosis | تنكس عضلي شمعي |
| | | myeleterosis | تنكس النخاع |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| heredodegeneration | تنكس وراثي | disorientation | توهان |
| degenerative | تنكسي | chronotaxis | توهان زمني |
| degeneracy | تنكسية | delusion | توهم |
| formication; numbness | تنمل | autosomatognosis | توهم بقاء المبتور |
| narcohypnia | تنمل الاستيقاظ | necromimesis | توهم الموت |
| acroparesthesia | تنمل الأطراف المؤلم | current | تيار |
| hypnosis; hypnotization | تنويم | aftercurrent | تيار تلاوي |
| hypnotism; mesmerism | تنويم إيحائي | facilitation | تيسير |
| narcohypnosis | تنويم تخديري | arousal; vigilance | تيقظ |
| autohypnosis | تنويم الذات | labyrinth | تبه |
| idiotypism | تنويم ذاتي | | |
| parahypnosis | تنويم شاذ | | |
| electrosleep | تنويم كهربائي | mecystasis | ثبات التوتر |
| laceration | تهتك | homeothermy | ثبات الحرارة |
| sedation | تهدئة | metrostasis | ثبات الطول |
| psychoseparation | تهدئة نفسية | pachycephalia | ثخن الرأس |
| cytoarchitecture | تهندس خلوي | baryphonia | ثخن الصوت |
| irritation | تهيج | pachycephalic | ثخين الرأس |
| arousal | تهيج جنسي | dysplasia | ثدن |
| meningism; meningismus | تهيج سحائي | mastoid | ثدي |
| Irritation | تهيج | rhinorrhea | ثر أنفي |
| sympathy | تواد | catallgia; lalorrhea; logorrhea | ثرثرة |
| equilibrium | توازن | meningorrhea | ثر سحائي |
| dactylogy | تواصل بإشارات اليد | graphorrhea | ثر كتابي |
| tension; tone; tonus | توتر | clavus hystericus | ثفن هستيري |
| orthotonos | توتر انتصابي | callosal | ثفني |
| myotone | توتر عضلي | puncture | ثقب |
| anelectrotonus | توتر مصعدي | foramen | الثقب |
| catelectrotonus | توتر مهبطي | helicotrema | ثقب القوقعة |
| holotonia | توترية شاملة | barylalia | ثقل التلفظ |
| tonoclonic | توتري رمعي | bradyacusia | ثقل السمع |
| apprehension | توجس | baryglossia | ثقل الكلام |
| neurotropism; neurotropy | توجه عصبي | bradyarthria; bradylalia; bradyphasia | ثقل النطق |
| stereotropism | توجه لمسي | trineural | ثلاثي الأعصاب |
| vagotropism | توجه مبهمي | trifacial; trigeminal | ثلاثي التوائم |
| dromotropism | توجيه التوصيل | incisura; notch | ثمة |
| blush | تورد | lallation | ثمثة |
| oncoma | تورم | bicoronal | ثنائي الإكليل |
| mydriasis | توسع الحدقة | dualism | ثنائية |
| cheirognosis | توسم اليد | bisexuality | ثنائية الصفات الجنسية |
| craniography | توصيف القحف | ambisexual; ambosexual; bisexual | ثنائي صفات جنسية |
| conduction | توصيل | dualism | ثنوية |
| localization | توضع | flexion; flexion | ثني |
| lateroposition | توضع جانبي | dactylocampsodynia | ثني الأصابع المؤلم |
| heterotopia | توضع مغاير | flexure; fold; plica | ثنية |
| myogenesis | تولد عضلي | | |
| algogenesis | تولد الألم | | |
| erotogenesis | تولد الشبق | | |

(ث)

(ج)

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| dura | جافية | dermoid | جلداني |
| catatonia | جامود | psychocutaneous | جلدي نفسي |
| laterality | جانبية | coition; copulation; coitus | جماع |
| delinquent | جانيح | esthetic | جمالي |
| spongioplasm | جيلة إسفنجية | cranium; skull | الجمجمة |
| neuroplasm | جيلة عصبية | catalepsy; cataplexi | جمدة |
| axoplasm | جيلة المحوار | cataplectic | جمدي |
| forehead | جبهة | cataleptiform | جمدي الشكل |
| exophthalmos; proptosis | جحوظ | summation | جمع |
| ophthalmocoele; ophthalmoptosis | جحوظ العين | system | جملة |
| parietal | جداري | ala | الجناح |
| leprosy | جذام | sexuality | جنسانية |
| radix; root | جذر | psychosexual | جنسي نفسي |
| radiculomedullary | جذري نخاعي | scoliosis | جنف |
| truncus; trunk | الجذع | kyphoscoliosis | جنف حداثي |
| brainstem | جذع الدماغ | rachioscoliosis | جنف السيشاء |
| neurosurgeon | جراح الاعصاب | homosexual | جنوسي |
| surgery | جراحة | homoeroticism; homosexuality | جنوسية |
| neurosurgery | جراحة الاعصاب | insanity; lunacy; madness | جنون |
| microneurosurgery | جراحة الاعصاب المجهرية | paraneural | جنيب العصب |
| stereotaxy | جراحة توضعية | system; systema | جهاز |
| cryosurgery | جراحة قارية | sympathicus | الجهاز العصبي الودي |
| psychosurgery | جراحة نفسية | orthosympathetic | الجهاز الودي |
| dose; dosis | جرعة | potential | جهد |
| pars | جزء | afterpotential | جهد تلوي |
| insula | الجزيرة | neuropotential | جهد عصبي |
| somatic | جسدي | action potential | جهد الفعل |
| somaticovisceral | جسدي حشوي | lacuna | الجوبة |
| somatopsychic | جسدي نفسي | carina | جؤجؤ |
| pons | الجسر | cavitas; cavity | الجوف |
| pons- oblongata | الجسر والبصلة | pseudocoele; pseudocoele | جوف الحاجز الشفاف |
| pontile; pontine | جسري | encephalocoele | جوف الدماغ |
| pontobulbar; pontomedullary | جسري بصلي | encephalocoele | جوف القحف |
| pontomesencephalic | جسري دماغي متوسطي | thalamococle | جوف المهاد |
| pontopeduncular | جسري سويقي | principle | جوهر |
| pontocerebellar | جسري مخيخي | sinus | جيب |
| body; corpus | جسم | | |
| corpora bigemina | الجسمان التوأمين | | |
| callosum | الجسم الثفني | barrier | حائل |
| epiphysis cerebri | الجسم الصنوبري | blood-brainbarrier | حائل دموي دماغي |
| neurosoma; perikaryon | جسم العصبون | septum | حاجز |
| striatum | الجسم المخطط | acute | حاد |
| neostriatum | الجسم المخطط الحديث | accident | حادثة |
| antibody | جسم مضاد | hypermnestic | حاد الذاكرة |
| corpuscle; corpusculum | جسيم | sense | حاسة |
| gliosome | جسيم دقيقي | quotient | حاصل |
| neurosoma | جسيم عصبي | intelligencequotient | حاصل الذكاء |
| neurodermatitis | جلاد عصبي | margo | حافة |

(ح)

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| motive | حافز | leiodystonia | حثل العضلات الملساء |
| stale; status | حالة | myodystrophy | حثل عضلي |
| etadysmyeliniq | حالة اختلال تكون الميالين | leukodystrophy | حثل المادة البيضاء |
| spasmodysant | حالة التشنج | facioscapuiohumerealdystrophy | حثل وجهي كتفي عضدي |
| pinealism | حالة صنوبرية | diaphragmasellae | حجاب السرج |
| myautonomy | حالة عضلية ذاتية | phrenic | حجابي |
| pituitarism | حالة نخامية | orbit | حجاج |
| neurocytolysin | حالة الخلايا العصبية | orbitotemporal | حجاجي صدغي |
| neurolysin; neurolytic | حالة العصب | cranioclasty; craniotomy | حج القحف |
| cholinolytic | حالة الكولين | kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosis | حداب |
| parasympatholytic | حالة لاودي | gibbus; tuber | حدبة |
| nicotinolytic | حالة النيكوتين | hypermnnesia | حدة الذاكرة |
| sympathicolytic; sympatholytic | حالة الودي | hypergeusethesia; hypergeusia | حدة الذوق |
| pedophilia | حب الأطفال | hyperacusis | حدة السمع |
| claustromania | حب الانغلاق | juvenile | حدث |
| aphasia | حبسة | process | حدث |
| logamnesia | حبسة إدراكية | declive | حدرة |
| lethologica | حبسة اسمية | liminal | حذي |
| asyndesis | حبسة الترابط | clava; tuberculum | حدبية |
| dysnomia; paranomia; paraphasia; | حبسة التسمية | clava | حدبية النواة الناحلة |
| paraphrasia | | myothermic | حراري عضلي |
| aphthongia | حبسة تصويتية | causalgia; thermalgesia | حراق |
| logaphasia | حبسة تعبيرية | mobility | حراك |
| ataxaphasia; ataxiaphasia | حبسة تكوين الجمل | cinclisis | حركات ترددية سريعة |
| aphrasia | حبسة الجمل | movement | حركة |
| alliteration | حبسة جناسية | aftermovement | حركة تلاوية |
| asemasia | حبسة دلالية | nervimotion | حركة عصبية التنبيه |
| jargonaphasia | حبسة راطنة | ideomotion | حركة فكرية التحفيز |
| logokoposis | حبسة سمعية | synkinesia; synkinesis | حركة مترابطة |
| aculalia; agrammaphasia | حبسة عبارية | allokinesia; allokinesis | حركة مرآتية |
| logasthenia | حبسة الفهم | centrocinesia; kentrokinesis | حركة مركزية التنبيه |
| alexia | حبسة القراءة | motor | حركي |
| logagraphia | حبسة كتابية | optokinetic | حركي بصري |
| logagnosia; paraphemia | حبسة كلامية | archeokinetic | حركية بدائية |
| agrammatism; agrammatologia | حبسة لغوية | neokinetic | حركية حديثة |
| asyllabia | حبسة المقاطع | sensomobility | حركية حسية |
| tonaphasia | حبسة موسيقية | psychokinesis | حركية نفسية |
| agrammatica; agrammatism | حبسة نحوية | psychokinesia | حركية نفسية المنشأ |
| acataphasia | حبسة نطقية | viscerimotor | حركي حشوي |
| tonaphasia | حبسة نغمية | oculocephalogyric | حركي رأسي بصري |
| gerophilia | حب الشيوخ | ideokinetic; ideomotor | حركي فكري التحفيز |
| cord; funiculus | حبل | paleokinetic | حركي قديم |
| cephalocho | حبل ظهري رأسي | algiomotor | حركي مؤلم |
| granulation | حببية | deprivation | حرمان |
| determinism | حتمية | cingulum | حزام |
| dystrophy | حثل | bundle; fascicle; fasciculus | حزمة |
| poliodystrophy; poliodystrophy | حثل السنجابية | fascicular | حزمي |
| hemidystrophy | حثل شقي | esthesia; sensation; sensibility | حس |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| optesthesia | حس الإبصار | baresthesia; baryesthesia | حس الوزن |
| graphesthesia | حس الأخطيط | esthetic; esthetic; sensory | حسي |
| sensible; sensitive | حساس | visuosensory | حسي إبصاري |
| rachisensible | حساس للتخدير النخاعي | sensorimotor | حسي حركي |
| pressoreceptive; pressosensitive | حساس للضغط | myotactic | حسي عضلي عميق |
| sensibility; sensitivity | حساسية | psychosensory | حسي نفسي |
| rachisensibility | حساسية للتخدير النخاعي | sensorivascular | حسي وعائي |
| cenesthesiopathy | حس الاعتلال | visceral | حشوي |
| algesthesia; algesthesia | حس الألم | visceroparietal | حشوي جداري |
| pallesthesia; palmaresthesia | حس الاهتزاز | viscerosomatic | حشوي جسدي |
| psychroesthesia | حس البرد | visceroskeletal | حشوي هيكلية |
| telesthesia | حس بعمادي | cannabis; marijuana | حشيش |
| acanthesthesia | حس التشوك | encephalolith | حصاة الدماغ |
| macroesthesia | حس تضخيمي | blockade | حصار |
| dedolation | حس التكم | hippocampus | الحصين |
| afterimpression; altersensation | حس تلوي | fossa | حفرة |
| zonesthesia | حس التمنطق | field | حقن |
| topesthesia; topognosis | حس توضيع اللمس | injection | حقن |
| somatesthesia; somesthesia | حس الجسد | itching | حكة |
| thermesthesia; thermoesthesia | حس الحرارة | herpes | حلا |
| isothermognosis | حس حراري إسوي | spasmodic | حلّ التشنج |
| graphokinesia | حس حركات الكتابة | neurolysis | حلّ العصب |
| glossokinesia | حس حركة اللسان | dream | حلم |
| kinesthesia; kinesthesia | حس حركي | papilla | حلمة |
| splanchnesthesia; viscerosensory | حس حشوي | papilla | حليمة |
| anacatesia | حس الحوم | neurothele | حليمة عصبية |
| gargalesia | حس الدغدة | fever | حمى |
| panesthesia | حس شامل | rubrothalamic | حمراوي مهادي |
| trichesthesia; trichosthesia | حس شعري | rubrospinal | حمراوي نخاعي |
| osmesthesia; rhinesthesia | حس الشم | gaze | حملقة |
| baresthesia; pieesthesia | حس الضغط | talipes | حنف |
| pseudophotoesthesia | حس ضوئي كاذب | clubfoot | حنف القدم |
| synchiria | حس عيوري | clubhand | حنف اليد |
| myesthesia | حس عضلي | pial | حنون |
| simesthesia | حس عظمي | pia-glia | الحنون الدبقية |
| bathesthesia; bathyesthesia; proprioception | حس عميق | pia-arachnoid | الحنون العنكبوتية |
| paleosensation | حس قديم | limbic | حوفي |
| pseudesthesia; pseudoesthesia | حس كاذب | perimedullary | خَوَل البصلة |
| graphesthesia | حس الكتابة على الجلد | pericallosal | حول الثلثي |
| pselaphesia; thigmesthesia | حس اللمس | peridural | حول الجافية |
| psychochromesthesia | حس لوني نفسي | perigial | حول الدبقي |
| cenesthesia | حس مشترك | pericephalic | حول الرأس |
| synesthesialgia | حس مشترك مؤلم | perineural | حول العصب |
| arthresthesia | حس مفصلي | anisophoria | خَوَل متفاوت |
| allochiria | حس مقابل للتوضع | periaxonal | خَوَل المحوار |
| synesthesia | حس مواكب | periaqueductal | خَوَل المسال |
| allesthesia; alloesthesia; alloesthesia | حس نازح | vesicle | حويصلة |
| pseudopolymelia | حس النهايات الكاذب | space | حين |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| spatiumsubdurale | الحيز تحت الجافية | paretic | خزلي |
| myelomenia | حيض نخاعي | mastoid | خشاء |
| vigor | حيوية | anodmia; anosmia; anosophrasia | خشام |
| | | hemianosmia | خشام شقي |
| | | psychograph | خط بياني نفسي |
| extradural | خارج الجافية | parapraxia | خطل الاداء |
| extrameningeal | خارج السحايا | parablepsia | خطل البصر |
| extracranial | خارج القحف | paramimia | خطل التاثير |
| extramedullary | خارج النخاع | paralalia | خطل التلفظ |
| extraphychic | خارج النفس | paracinesia; paracinesis; parakinesia | خطل الحركة |
| extrapyramidal | خارج الهرمي | paracenesesthesia | خطل حس الراحة |
| preconscious | خارج الوعي | parageusia | خطل الذوق |
| cephalogyric | خاص بتدوير الرأس | paracusia | خطل السمع |
| character | خاصة | parosmia | خطل الشم |
| depressor | خافض | paralexia | خطل القراءة |
| apathetic; apathic | خامل | paragraphia | خطل الكتابة |
| malignancy | خبائث | paragrammatism | خطل الكلام |
| abalienation | خُبال | pseudaphia | خطل اللمس |
| propulsion | خبب | parathymia | خطل المزاج |
| cryptic | خبيثي | paralogia | خطل المنطق |
| malignant | خبيث | paragrammatism | خطل نحوي |
| thrombosis | خُثار | parahypnosis | خطل النوم |
| microthrombosis | خُثار صغيري | abatement | خفة الاعراض |
| microthrombus | خثرة صفوية | palmus | خفقان |
| anesthesia | خَدَر | hypohypnotic | خفيف النوم |
| narcotize | خَدَر | cryptogenic | خفي المنشأ |
| para-anesthesia; paranesthesia | خدر أسفل الجسم | trait | خلّة |
| acroanesthesia | خدر الاطراف | neurohumor | خلط عصبي |
| trichoanesthesia | خدر شعري | neurohumoralism | خلطية عصبية |
| hemianesthesia | خدر شقي | spondylaxarthrosis | خلع الفقرة |
| hemiparaneesthesia | خدر شقي سفلي | postbulbar; retrobulbar | خلف البصلة |
| toponarcosis | خدر موضعي | postganglionic | خلف العقدة |
| abscess | خُرّاج | postcentral | خلف المركزي |
| dumbness; mutism | خَرَس | retrobulbar | خلف العقلة |
| aphrenia; aphronesia | خَرَف | habitus | خلقة |
| dement; dementia | خَرَف | congenital; innate | خلقي |
| presbyophrenia | خرف شيخوخي | derangement | خلل |
| pseudodementia | خرف كاذب | hemidysesthesia | خلل الإحساس الشقي |
| discharge | خروج | dyspraxia | خلل الاداء |
| biopsy | خزعة | dysboulia | خلل الإرادة |
| paresis | خَزَل | arrhaphia | خلل الارتقاء |
| monoparesis | خزل احادي | dysmimia | خلل الإيماء |
| paresonalgesia | خزل خدري | dyssynergia | خلل التأزر |
| tetraparesis | خزل رباعي | dyschronism | خلل التزامن |
| paraparesis | خزل سفلي | dysphonia | خلل التصويت |
| hemiparesis | خزل شقي | atelencephalia; ateloencephalia | خلل تطور الدماغ |
| myoparesis | خزل عضلي | dysymbolia | خلل التفكير |
| pseudoparesis | خزل كاذب | dysarthria | خلل التلفظ |

(خ)

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| dysautonomia | خلل التلقائية | astrocyte | خلية نجمية |
| dysergia | خلل التناسق الحركي | pituicyte | خلية نخامية |
| dysymmetry | خلل التناظر | fimbria | خمل |
| myelatelalia | خلل تنامي النخاع | depression | خمود |
| disdiadochokinesia; | خلل تناوبية الحركات | apathism; apathy | خمول |
| dysdiadochokinesia | | hermaphrodite; intersex | خنثى |
| dysplasia | خلل التنسج | rhinolalia | خنخنة |
| encephalodysplasia | خلل تنسج الدماغ | gynandria; gynandrisim; hermaphroditism | خنوثة |
| myeloradiculodysplasia | خلل تنسج النخاع والجذور | enophthalmos | خوص |
| myelodysplasia | خلل التنسج النخاعي | fear | خوف |
| disequilibrium | خلل التوازن | suture | خياطة |
| dystonia | خلل التوتر | phantasm | خيال |
| dysmyotonia; myodystonia | خلل التوتر العضلي | frustration | خيبة |
| dystopia | خلل التوضع | filament; filum; suture | خيط |
| dyschiasia | خلل توضع الإحساس | neurofilament | خيط عصبي |
| dyschiria | خلل توضع المنبه | myofilament | خيط عضلي |
| dyskinesia | خلل الحركة | tentorium | خيمة |
| dyscalculia | خلل الحسابية | | |
| dysmnnesia | خلل الذاكرة | | |
| dysgeusia | خلل الذوق | disease; sickness | داء |
| dysraphia | خلل الرقاء | xanthomatosis | داء الأورام الصفرة المنتشرة |
| dysacusia | خلل السمع | paramyotonia | داء التشنج العضلي التوتري |
| dysosmia | خلل الشم | sarcoidosis | داء ساركويد |
| dysorexia | خلل الشهية | gargoylism | داء عديد السكريد المخاطي |
| paraphora | خلل عقلي | hydrophobia | داء الكلب |
| dystectia | خلل غلق السقف | paralyssa | داء الكلب الشللي |
| dysanagnosia; dyslexia | خلل القراءة | cysticercosis | داء الكيساتيات المذنبة |
| dysmetria | خلل القياس | meningococcosis | داء المكورات السحائية |
| dysgraphia | خلل الكتابة | analgesia; panaris | داحس مخدر |
| dysphasia | خلل الكلام | intradural | داخل الجافية |
| dysaphia | خلل اللمس | interoceptive | دخلي الاستقبال |
| dysgnosia | خلل معرفي | interofective | دخلي التنبيه |
| dyslogia | خلل المنطق | circuit | دارة |
| dysreflexia | خلل المنعكسات | motivation; motive | دافع |
| allolalia; dyslalia; dysphrasia; lalopathy | خلل النطق | circle | دائرة |
| dysrhythmia | خلل النظم | gliosis | دُباق |
| dysfunction; malfunction | خلل وظيفي | microgliomatosis | دُباق صفري |
| cell; cellula | خلية | telogia | دُبِق انتهائي |
| spongocyte | خلية اسفنجية | microglia | دُبِق صفري |
| ependymocyte | خلية البطانة العصبية | glia; neuroglia | دُبِق عصبي |
| microgliocyte | خلية دقيقة | macroglia | دُبِق عصبي كبدي |
| microgliocyte | خلية دقيقة صفرية | myoglia; sarcoglia | دُبِق عضلي |
| gliocyte; gliocyte; neurogliocyte | خلية دقيقة عصبية | inoglia | دُبِق ليفي |
| meningocyte | خلية سحائية | astroglia | دُبِق النجميات |
| myophage | خلية عائية عضلية | oligodendroglia; oligoglia | دُبقيات قليلة التغصن |
| neurocyte | خلية عصبية | mesoglia | دُبقية صفرية |
| myocyte | خلية عضلية | mesoglia | دُبقية قليلة التغصن |
| amacrinecell | خلية لا محوارية | neuroglial | دُبقي عصبي |

(د)

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------|------------------|
| empyema | دبيلة | cycle | دورة |
| sutura | درز | cycloid; cyclothymic | دوروي المزاج |
| decibel | دسيبل | periodic | دوري |
| lickling | دغدغة | subconscious | دون الشعور |
| impulse | دفعة | myodynamics | ديناميكا العضلات |
| ejaculation | دقق | psychodynamics | ديناميكا نفسية |
| epicritic | دقيق التعيين | neurodynamic | ديناميكي عصبي |
| brain; cerebrum; encephalon | دماغ | | |
| encephalosis | دُمَاغ | (ذ) | |
| endbrain; telencephalon | دماغ انتهائي | autistic | ذاتوي |
| cerebroid; encephaloid | دماغاني | autism | ذاتوية |
| marrowbrain; metencephalon; | دماغ بصلي | autonomic | ذاتي |
| myelencephalon | | idiotropic | ذاتي التركيز |
| betweenbrain; diencephalon; tween-brain | دماغ بيني | idiotrophic | ذاتي التغذية |
| alterbrain; ependecephalon; metapsyche; | دماغ تال | memory | ذاكرة |
| metencephalon | | mnemic; mnemonic | ذاكري |
| neencephalon; neoencephalon | دماغ حديث | narcose | ذاهل |
| nosebrain; rhinencephalon | دماغ شعبي | oscillation | ذبذبة |
| oligoencephalon | دماغ صغير | tabification | ذبول |
| megalecephalon | دماغ ضخم | fastigium | ذروة البطين |
| ophthalmencephalon | دماغ عيني | terror | ذعر |
| paleencephalon; paleoencephalon | دماغ قديم | mental | ذهني |
| hindbrain | دماغ مؤخر | intelligence | ذكاء |
| mesencephal; mesocephalon; midbrain | دماغ متوسط | masculinity | ذكورة |
| forebrain; proencephalon; prosencephalon | دماغ مقدم | cauda | ذنب |
| thalamencephalon | دماغ مهادي | neuropsychosis; psychosis | ذهان |
| cerebral; encephalic | دماغي | psychoses | ذهانات |
| myelencephalospiral | دماغي بصلي نخاعي | alopsychosis | ذهان إدراكي |
| cerebromacular | دماغي بقعي | pharmacopsychosis | ذهان الادوية |
| cerebromeningeal | دماغي سحائي | paraphrenia | ذهان تخيلي |
| cerebriform | دماغي الشكل | somatopsychosis | ذهان جسدي |
| cerebrocardiac | دماغي قلبي | parergasia | ذهان فصامي |
| mesencephalohypophyseal | دماغي متوسطي نخاعي | pseudopsychosis | ذهان كاذب |
| cerebromedullary; cerebroschidial; | دماغي نخاعي | paranoia | ذهان كبريائي |
| cerebrospinal; encephalorachidian; encephalospinal | | pathopsychosis | ذهان مرضي |
| plagioccephaly | دنج | psychotic | ذهاني |
| cachexia | دنف | psychedelic | ذهاني الاعراض |
| drug | دواء | psychedelic; psychodelic | ذهاني التأثير |
| psychopharmacology | الدوائيات النفسية | intellect | ذهن |
| vertigo | دوار | apsychosis; stupor | ذهول |
| vertiginous | دواري | dicephalous | ذو راسين |
| neurovaricose | دوالي عصبية | ganglionated | ذو عقد |
| dizziness; giddiness | دولم | binocular | ذو عينيّتين |
| scotodinia | دولم عتمي | gustation; taste | ذوق |
| dizziness; giddiness | دوخة | bipolar | ذو قطبين |
| vermis | دودة | pseudogeusesthesia | ذوق كاذب |
| period | دور | parageusia | ذوق كره |
| oculogyration | دوران العقلة | gustatism | ذوق محرض |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| pseudogeusia | ذوق مغلوط | flaccid; pia | رخو |
| phantogeusia | ذوق وهمي | recess; recessus | ردب |
| gustatory | ذوقي | culdesac | ردبة |
| neurotoxin | ذيفان عصبي | reaction | رد الفعل |
| | | carpopedal | رسمي قدمي |
| | | maturity | رشد |
| | | volley | رشقة |
| | | lead | رصاص |
| kakosmia | رائحة كريهة | neurogram | رصيد الخبرة العصبية |
| duraplasty | رأب الجافية | contusion | رض |
| heteroganglionic | رابط العقد | trauma | رضح |
| neuroplasty | رأب العصب | neurotrauma; neurotrosis | رضح عصبي |
| myoplasty | رأب عضلي | patella | رضفة |
| myotendonoplasty | رأب عضلي وتري | tremble; tremor | رعاش |
| myringoplasty | رأب غشاء الطبل | hemitremor | رعاش شقي |
| cranioplasty | رأب القحف | amyostasia | رعاش العضل |
| internode | راجبة | tremulous | رعاشي |
| recurrent | راجع | pavor; terror | رعب |
| collateral | رايف | rigor; shiver | رعدة |
| nystagmus; nystaxis; talantropia | رأرأة | sunstroke | رعن |
| pseudonystagmus | رأرأة الوضع الأخير | nosophilia | رغبة بالمرض |
| nystagmic | رأري | aphrodisia; libido | رغبة جنسية |
| caput | رأس | raphe | رفاء |
| scaphocephaly; tectocephaly | رأس زورقي | palpebration | رف الأجفان |
| plagiocephaly | رأس وارب | winking | رفة |
| cephalic | رأسي | ciliosis; nictation; nictitation | رف الجفن |
| cephalad | رأسيا | meningeorrhaphy | رفو السحايا |
| cephalocaudal | رأسي ذنبي | neurorrhaphy; neurosuture | رفو العصب |
| tremulous | راعش | myorrhaphy; myosuture | رفو العضل |
| lancinating | رامح | myocardiorrhaphy | رفو عضلة القلب |
| code | راموز | collum; neck | رقبة |
| vision | رؤية | cervical | رقبي |
| aftervision | رؤية ثانوية | chorea | رقص |
| chromatopsia | رؤية ملونة | monochorea | رقص أحادي |
| aprosody; hypoprosody | رتابة الكلام | choreoid | رقصاني |
| dysarthria | رتبة | hemichorea | رقص شقي |
| mogiarthria | رتة عضلية المنشا | pseudochorea | رقص كاذب |
| atresia | رتق | chorea; choreatic; choreic | رقصي |
| recurrence | رجعة | choreiform | رقصي الشكل |
| meningorecurrence | رجعة سحائية | choreoathetosis | رقصي كنعني |
| contrecoup | رجع الضربة | genu; knee | ركبة |
| fibrillation | رجفان | geniculum | ركيبة |
| retrograde | رجوعي | symbolism | رمزية |
| virile | رجولي | nictation; saccade | رمش |
| virility | رجولية | saccadic | رمشية |
| viscerotonia | رخاء العيش | clonus | رمع |
| flaccidity | رخاوة | polymyoclonus | رمع العضلات |
| rachitis | رخد | myoclonia; myoclonus | رمع عضلي |
| rachitic | رخدي | | |

| | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|
| myospasia; paramyoclonus | رمع عضلي متعدد | genophobia | رهاب الجنس |
| ankleclonus | رمع الكاحل | acarophobia | رهاب الحلم |
| pseudoclonus | رمع كاذب | zoophobia | رهاب الحيوانات |
| logclonia; logoklony | رمع الكلام | amychophobia | رهاب الخدش |
| clonic | رمعي | hematophobia | رهاب الدم |
| clonicotonic | رمعي توتري | atephobia | رهاب الدمار |
| acervulus | رمل الدماغ | androphobia | رهاب الذكور |
| amyotaxia; ataxia; ataxy | رنح | brontophobia | رهاب الرعد |
| dystaxia | رنح جزئي | phobophobia | رهاب الرهاب |
| proximoataxia | رنح دان | anemophobia | رهاب الريح |
| hemiataxia | رنح شقي | chronophobia | رهاب الزمن |
| ataxiophemia; ataxophemia | رنح عضلات النطق | syphilophobia | رهاب الزهري |
| diataxia | رنح مزدوج | anthophobia | رهاب الزهور |
| psychataxia | رنح نفسي | herpetophobia | رهاب الزواحف |
| heredoataxia | رنح وراثي | agoraphobia; agyophobia | رهاب الساح |
| ataxiodynamia; ataxodynamia | رنح وراثي | carcinomatophobia; carcinophobia | رهاب السرطان |
| atactic; ataxic | رنحي | cleptophobia | رهاب السرقة |
| atactiform | رنحي الشكل | climacophobia | رهاب السلالم |
| ataxiamnesic | رنحي نساوي | onomatophobia | رهاب سماع الكلمات |
| phobia | رهاب | basiphobia; basophobia | رهاب السير |
| erythrophobia | رهاب الاحمر | panophobia; panphobia; pantophobia | رهاب شامل |
| pharmacophobia | رهاب الادوية | dipsophobia | رهاب الشراب |
| ochlophobia | رهاب الازدحام | demonophobia | رهاب الشياطين |
| odontophobia | رهاب الاسنان | gerophobia | رهاب الشيخوخة |
| radiophobia | رهاب الاشعاع | gerophobia | رهاب الشيخوخ |
| phonophobia | رهاب الاصوات | astraphobia | رهاب الصواعق |
| ataxiophobia; ataxophobia | رهاب الاضطراب | acousticophobia | رهاب الصوت |
| pedophobia | رهاب الأطفال | phengophobia; photophobia | رهاب الضوء |
| phagophobia; sitophobia | رهاب الأكل | cibophobia | رهاب الطعام |
| carriophobia | رهاب أكل اللحم | achluophobia; noctiphobia; nyctophobia; | رهاب الظلام |
| alophobia | رهاب الألم | scotophobia | |
| coprostasophobia | رهاب الإمساك | dromophobia | رهاب العبور |
| cherophobia | رهاب الانتشراح | amaxophobia | رهاب العريبات |
| claustrophobia; cleisiophobia; clithrophobia | رهاب الانغلاق | erotophobia | رهاب المشق |
| autophobia | رهاب الانفراد | bathophobia | رهاب العمق |
| coprophobia | رهاب البراز | ergasiophobia | رهاب العمل |
| paraphobia | رهاب بسيط | arachnophobia; arachnophobia | رهاب العناكب |
| parthenophobia | رهاب البنات | amathophobia | رهاب الفبار |
| urophobia | رهاب التبول | ballistophobia | رهاب القذائف |
| toxicophobia | رهاب التسمم | automysophobia; mysophobia | رهاب القذارة |
| dysmorphophobia | رهاب التشوه | ankylophobia | رهاب القسط |
| scopophobia | رهاب التعرض | graphophobia | رهاب الكتابة |
| nudophobia | رهاب التعري | dipsophobia | رهاب الكحول |
| ideophobia | رهاب التفكير | mythophobia | رهاب الكذب |
| mythophobia | رهاب التهويل | cynophobia | رهاب الكلاب |
| dermatophobia | رهاب الجلد | lalophobia | رهاب الكلام |
| kathisophobia | رهاب الجلوس | lyssophobia | رهاب الكلب |
| coitophobia | رهاب الجماع | aphophobia; haphophobia; algophobia | رهاب اللمس |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------|
| aquaphobia; hydrophobia | رهاب الماء | somnambulist | سائر نومي |
| polyphobia | رهاب متعدد | neurolymph | سائل دماغي نخاعي |
| anthrophobia | رهاب المجتمعات | field | ساحة |
| tocophobia | رهاب المخاض | sadist | سادى |
| acrophobia | رهاب المرتفعات | sadism | سادية |
| nosophobia; pathophobia | رهاب المرض | sadomasochism | سادية مازوخية |
| aichmophobia | رهاب المستنقات | necrosadism | سادية الموتى |
| cremnophobia | رهاب المهوى | zoosadism | سادية نحو الحيوانات |
| thanatophobia | رهاب الموت | sarcoma | ساركومة |
| necrophobia | رهاب الميت | gliosarcoma; spongioblastoma; | ساركومة دبقية |
| astrophobia | رهاب النجوم | spongiocytoma | |
| gynophobia | رهاب النساء | neurosarcoma | ساركومة عصبية |
| hypnophobia | رهاب النوم | rhabdomyosarcoma | ساركومة العضل المخطط |
| pyrophobia | رهاب النيران | myosarcoma | ساركومة عضلية |
| aelurophobia; ailurophobia; elurophobia; | رهاب الهررة | leiomyosarcoma | ساركومة عضلية لمساء |
| galeophobia | | crus | ساق |
| aerophobia | رهاب الهواء | neurotoxic | سام للعصب |
| eremophobia | رهاب الوحدة | myelinotoxic | سام للنخاعين |
| asthenophobia | رهاب الوهن | index | سبابة |
| photaugiaphobia | رهاب الوهج | coma; exanimation | سبات |
| phobic | رهابي | narcoma | سبات تخدري |
| mantle | ريطة | agrypnocoma | سبات سهري |

(ز)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| aberrant | زائغ | hypnolepsy; narcolepsy | سبح |
| angle | زاوية | pathway; tract; tractus | سبيل |
| hirsutism | زيب | sodomy | سنة |
| knob | زر | sodomist | سنة |
| grafting | زرع الطعم | meninx | سحاة |
| ballism | زفن | leptomeninx | سحاة رقيقة |
| hemiballism | زفن شقي | meningeal | سحائي |
| chronaxie; chronaxy | زمنة | meningoradicular | سحائي جذري |
| syphilis | زهري | meningocortical | سحائي قشري |
| neurosyphilis | زهري عصبي | meningogenic | سحائي المنشأ |
| myelosityphilis | زهري نخاعي | meningorachidian | سحائي نخاعي |
| alterdepolarization | زوال الاستقطاب التلوي | myelophthisis | سحاف النخاع |
| desynchronization | زوال التزامن | lesbianism; sapphism; tribadism | سحاق |
| myelinoclasia | زوال النخاعين | lesbian | سحاقية |
| paranoia | زور | meninges | سحايا |
| paranoid | زوراني | leptomeninges | سحايا رقيقة |
| navicular | زورقي | complexion | سحناء |
| olive | الزيتونة | facies | سحنة |
| olivopontocerebellar | زيتوني جسري مخيخي | indifference | سدر |
| aberration | زيغ | sodomist | سدومي |
| | | sodomy | سدومية |
| | | stroma | سدى |
| | | myostroma | سدى العضل |
| | | transmission | سراية |
| | | navel | سرة |

(س)

| | | | |
|----------------------|------|--|--|
| dominant | سائد | | |
| ambulant; ambulatory | سائر | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|
| ephippium; sellaturcica | سرج تركي | dystopia | سوء التوضع |
| encephaloid | سرطانة نخاعية | araphia | سوء الرفاء |
| cephaloma | سرطانة نخاعينية | normality | سواء |
| apokamnosis | سرعة التعب | orthophony | سواء النطق |
| stria | سطر | eupraxia | سوائية الاداء |
| amuck | سعار القتل | eugnosia | سوائية الإدراك |
| marasmus | سقل | eukinesia | سوائية الحركة |
| marasmatic | سقلي | eusitia | سوائية الشهية |
| scala | السقالة | eunoia | سوائية العقل |
| sickness | سقام | eusthenia | سوائية القوة |
| tectum | سقف | atrabiliary | سوداوي |
| tectospinal | سقفي نخاعي | melancholia; tristimania | سوداوية |
| tegmen | سقيف | hypomelancholia | سوداوية خفيفة |
| tegmenum | سقيفة | acedia | سوداوية خمولية |
| apoplexy; stroke | سكتة | nigrostriatal | سوداوي مخططي |
| pseudoapoplexy | سكتة كاذبة | exacerbation | سورة |
| apoplectic | سكتي | normal | سوي |
| drunkenness | شكر | eupractic; eupraxis | سوي الاداء |
| sanity | سلامة العقل | eugnostic | سوي الإدراك |
| passivity | سلبية | orthodromic | سوي التوصيل |
| Incontinence; Incontinentia; overflow | سلس | eukinetic | سوي الحركة |
| enuresis | سلس البول | normergic | سوي العمل |
| chain | سلسلة | peduncle; stalk | سويقة |
| behavior | سلوك | caudexcerebri | سويقة المخ |
| behaviorism | سلوكية | pontibrachium | سويقة مخيخة متوسطة |
| neurobehavioral | سلوكي عصبي | orthochromatic | سوي اللون |
| sarcoplast | سليفة عضلية | dominance | سيادة |
| sympathogonia | سليفة ودية | ambulation | سير |
| clairaudience | سماع غيبي | noctambulation; sleepwalking; | سير نومي |
| sympathin | سمبائين | somnambulance; somnambulation; somnambulism | سير نومي |
| stigma | سمة | serotoninerbic | سيرتونيني الفعل |
| pericranium | سمحاق القحف | ambulatory | سير |
| hearing | سمع | vigilambulism | سير يقظي |
| psychoauditory | سمعي نفسي | noctambule | سير نومي |
| adiposity; obesity | سمنة | rachis; spine | السيشاء |
| neurotoxicity | سمية عصبية | rachial; rachidial; rachidian | سيساشي |
| myelinotoxicity | سمية ميالينية | cyclobarbital | سيكلوباربيتال |
| age | سن | psychopathology | سيكوباتولوجيا |
| cinereal | سنجابي | | |
| ectocinerea | سنجابية خارجية | | |
| Incus | السندان | | |
| egersis; vigilance; wakefulness | سهاد | abnormal; acatastatic; deviant; erratic | شاذ |
| ahypnosis | سهار | gangliolytic; ganglionoplegic | شال عقدي |
| sagittal | سهمي | prominentia | شامخة |
| dystrophoneurosis | سوء التغذية العصابي | phantom | شبحي |
| dyscephaly | سوء تكون الجمجمة | satiety | شبع |
| maladjustment | سوء التلاؤم | eroticism; erotism; gynecomania; gynephilia; | شبق |
| maldevelopment | سوء التنامي | lagnesis; lagnosis; libido; satyriasis; satyromania | |

(ش)

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| algolagnia | شبق المي | uncinate | شخصي |
| alloeroticism; alloerolism | شبق خلافي | ecstasy | شطح |
| autoeroticism | شبق ذاتي | radiation | شع |
| psycholagny | شبق نفسي | hirsutism | شعرانية |
| erotic | شبعي | consciousness; esthesia | شعور |
| net; network | شبكة | ambliopia; diplopia | شفع |
| optomeninx | شبكة | fissure | شق |
| neuralgiform | شبيه الألم العصبي | postcentralis | شق خلف المركزي |
| tabetiform | شبيه التابس | hemicrania; megrim; migraine | شقيقة |
| myotonoid | شبيه التائر العضلي | form | شكل |
| parapoplexy | شبيهة السكتة | alveushippocampi | شكوة الحصين |
| hypnoid | شبيه التنويم | palsy; paralysis | شلل |
| nystagmoid | شبيه الرأفة | monoplegia | شلل أحادي |
| apoplectiform | شبيه السكتة | acroparalysis | شلل الأطراف |
| paraplegiform | شبيه الشلل السفلي | pharyngoplegia | شلل البلعوم |
| neuroid | شبيه العصب | triplegia | شلل ثلاثي |
| myoid | شبيه العضل | phrenoplegia | شلل الحجاب |
| schizophreniform | شبيه الفصام | thermoplegia | شلل حراري |
| curariform | شبيه الكوراري | akinesia | شلل الحركة |
| arboromedullarisvermis; | شجرة الحياة المخيخية | laryngoplegia | شلل الحنجرة |
| arborvitaeacerebelli | | palatoplegia; uranoplegia | شلل الحنك |
| adiposis; adiposity | شحامة | cephaloplegia | شلل الرأس |
| adiposidolorosa | شحامة مؤلمة | quadriplegia; tetraplegia | شلل رباعي |
| adiposogenital | شحامي تناسلي | paraplegia | شلل سفلي |
| myelocone | شحام مياليني | pseudoparaplegia | شلل سفلي كاذب |
| subjective | شخصاني | pampegia; panplegia | شلل شامل |
| personality | شخصية | hemiparalysis; hemiplegia | شلل شقي |
| hyperarousal | شدة اليقظة | hemiparaplegia | شلل شقي سفلي |
| cranioclasia | شدخ القحف | abepithymia | شلل الضفيرة الشمسية |
| neurotony | شد العصب | neuroparalysis | شلل عصبي |
| segmentum | شدقة | stethoparalysis | شلل عضلات الصدر |
| neurosegmental | شدقي عصبي | myoparalysis; myoplegia | شلل عضلي |
| abnormality; acatastasia; anomaly | شدوذ | monomyoplegia | شلل عضلي أحادي |
| topodyesthesia | شدوذ توضع للمس | ophthalmoplegia | شلل العين |
| paraphilia; parasexuality | شدوذ جنسي | indoparalysis; indoplegia | شلل القزحية |
| parorexia; pica | شدوذ الشهية | pseudoparalysis; pseudoplegia | شلل كاذب |
| abalienation | شدوذ عقلي | logoplegia | شلل كلامي |
| parapsia | شدوذ للمس | glossoplegia | شلل اللسان |
| fugue | شراد | polyplegia | شلل متعدد |
| velum | شراف | cystoplegia | شلل المثانة |
| anality | شرجية | iemoparalysis | شلل المريء |
| distraction | شرد | diplegia | شلل مزدوج |
| paramnesia | شرد الذاكرة | myeloplegia | شلل نخاعي |
| absentmindedness | شرد الذهن | laloplegia | شلل النطق |
| distractibility | شردية | psychoplegia | شلل نفسي |
| arteria; artery | شريان | facioplegia; prosopoplegia | شلل الوجه |
| band | شريط | prosopodiplegia | شلل الوجه والطرف السفلي |
| uncus | شخص | paraplectic; paraplegic | شللي سفلي |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| sympatheticoparalytic | شللي ودي | petitmal | صرع صغير |
| olfaction | شم | pyknoepilepsy | صرع غيبوبي |
| euphoretic | شُمَق | grandmal; haut-mal | صرع كبير |
| euphoria | شُمَق | epileptic | صرعي |
| euphoriant; euphoric | شُمَق | epileptiform; epileptoid | صرعي الشكل |
| olfactism | شم لا شمعي التنبيه | bruxism; clenching; odontoprisis | صريف الأسنان |
| heterosomia | شم مغاير | torticollis; wryneck | صعر |
| olfactory | شمي | retrocollis | صعر خلفي |
| spasticity | شجاج | nanomelia | صغر الأطراف |
| myospasms | شجاج عضلي | nanocormia | صغر الجذع |
| spastic | شجاجي | nanocormia | صغر الجسم |
| spasmophilia | شَنَج | micrencephalia; microencephaly | صغر الدماغ |
| spasmophilic | شَنَج | microcephalia; nanocephaly | صغر رأس |
| alloeroticism | شهوانية الغير | hydromicrocephaly | صغر الرأس الموهي |
| appetite | شهية | microcrania | صغر القحف |
| epicranium | الشواة | micromyelia | صغر النخاع |
| spina; spine | شوكة | microcephalous | صغير الرأس |
| malformation | شوه | lamella | صفاحة |
| progeria | شياخ | lamina | صفيحة |
| geratic; senility; senium | شيخوخة | end-flake; endplate | صفيحة انتهائية |
| senile | شيخوخي | spine | صلب |
| | | alogia; anandia; aphemia; mutism | صمات |
| | | akinetismutism | صمات تعذر الحركة |
| | | nyctaphonia | صمات ليلي |
| | | nyctophonia | صمات نهاري |
| | | neurocrine | صماوي عصبي |
| | | embolus | صمة |
| | | rigidity; rigor | ضمل |
| | | earwax | صملاخ |
| | | deafness | صمم |
| | | hemianacusia | صمم احادي |
| | | hemianacusia | صمم شقي |
| | | presbyacusia; presbycusis | صمم شيخوخي |
| | | pineal | صنوبري |
| | | cistern | صهريج |
| | | cisternamagna | صهريج كبير |
| | | postcisterna | صهريج مخيخي نخاعي بصلي |
| | | commissure | صرار |
| | | psalterium | صوار القبو |
| | | apastia | صوام |
| | | myocrismus | صوت العضلة |
| | | acoustic | صوتي |
| | | image | صورة |
| | | pneumoangiogram | صورة الاوعية الغازية |
| | | afterimage; aftervision | صورة تلوية |
| | | peridurogram | صورة حول الجافية |
| | | encephalogram | صورة الدماغ |
| | | positrocephalogram | صورة الدماغ البورتروني |

(ص)

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| efferent; efferential | صادر | | |
| cerebrifugal | صادر من الدماغ | | |
| corticifugal; corticoefferent | صادر من القشرة | | |
| cerebellifugal; cerebellofugal | صادر من المخيخ | | |
| matutinal | صباحي | | |
| chromosome | صبغي | | |
| petropharyngeus | صخرية بلعومية | | |
| echokinesis; echomatism; echomimia; | صداء حركي | | |
| echopraxia | | | |
| echographia | صداء كتابي | | |
| echolalia; echophrasia | صداء لفظي | | |
| cephalalgia; cephalgia; cephalodynia; headache | صداع | | |
| metopodynia | صداع جبهي | | |
| hemicrania | صداع نصفي | | |
| temporal | صدغي | | |
| shock | صدمة | | |
| electroplexy; electroshock | صدمة كهربية | | |
| conflict | صراع | | |
| cry | صرخة | | |
| epilepsia; epilepsy | صرع | | |
| epileptoid | صرعاني | | |
| jacksonianepilepsy | صرع جاكسوني | | |
| hemiepilepsy | صرع شقي | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| pneumoencephalogram | صورة الدماغ الغازية | hyposthenic | ضعيف |
| cephalogram | صورة الرأس المقاسية | plexus | ضفيرة |
| myelogram | صورة النخاع | metaplexus | ضفيرة البطين الرابع |
| | | neuroplexus | ضفيرة عصبية |
| | | plexal | ضفيري |
| | | parabulia | ضلال الإرادة |
| | | rib | ضلع |
| | | costocervicalis | ضلع رقبية |
| | | pervert | ضلول |
| | | splenium of corpus callosum | ضمادة الجسم الثفني |
| | | endoneural | ضمن العصب |
| | | atrophy | ضمور |
| | | encephalatrophy | ضمور الدماغ |
| | | neurodeatrophia | ضمور الشبكية |
| | | hemiatrophy | ضمور شقي |
| | | neuronatrophy | ضمور العصبونات |
| | | neuratrophia; neuratrophy; neurophthisis; | ضمور عصبي |
| | | amyotrophy | |
| | | myatrophy; myoatrophy; myophagism | ضمور عضلي |
| | | ophthalmatrophia | ضمور العين |
| | | craniotabes | ضمور القحف |
| | | myelatrophy; myelatrophy | ضمور النخاع |
| | | prosopodysmorphia | ضمور الوجه الشقي |
| | | anagoge | ضمير |
| | | amenorrhea | ضهي |
| | | stenobregmatic | ضيق الهامة |
| | | | (لهي) |
| | | accident | طارىء |
| | | set | طاقم |
| | | aseptic | طاهر |
| | | neurotology | طب الأذن العصبي |
| | | neuro-otology; otoneurology | طب الأعصاب الأذنية |
| | | neuriatry | طب الأعصاب السريري |
| | | neuro-ophthalmology | طب الأعصاب العينية |
| | | neurologia; neurology | طب الجهاز العصبي |
| | | geriatrics | طب الشيخوخ |
| | | layer; stratum | طبقة |
| | | psychiatrics; psychiatry | طب نفسي |
| | | orthopsychiatry | طب نفسي إسوائي |
| | | psychogeriatrics | طب نفسي شيخوخي |
| | | neuropsychiatry | طب نفسي عصبي |
| | | chemopsychiatry | طب نفسي كيميائي |
| | | neurologist | طبيب الأعصاب |
| | | psychiatrist | طبيب نفسياني |
| | | natural; normal | طبيعي |
| | | pattern | طراز |
| | | blinking | طرُف |
| | (ض) | | |
| distress | ضائقة | | |
| neuratrophic | ضامر الأعصاب | | |
| laughter | ضحك | | |
| gelasmus | ضحك هستيري | | |
| enlargement | ضخامة | | |
| macrogyria; pachygyria | ضخامة التلافيف | | |
| macrogenitosomia | ضخامة تناسلية جسدية | | |
| encephalaxe; macrencephalia; | ضخامة الدماغ | | |
| macroencephaly; megalencephaly | | | |
| macrocephalia; macrocephaly; | ضخامة الرأس | | |
| megacephaly; megalcephaly | | | |
| cephalonia | ضخامة الرأس والدماغ | | |
| schwannosis | ضخامة شفانية | | |
| myohypertrophia; myopachynsis | ضخامة عضلية | | |
| schwannitis | ضخامة غمد شفان | | |
| pseudohypertrophy | ضخامة كاذبة | | |
| myelaxe | ضخامة النخاع | | |
| acromegaly | ضخامة النهايات | | |
| macrocephalous; megalcephalic | ضخم الرأس | | |
| antibody | ضد | | |
| coup; stroke | ضربة | | |
| sunstroke | ضربة الشمس | | |
| essential | ضروري | | |
| lockjaw; trismus | ضزز | | |
| antitrimus | ضزز عكسي | | |
| debility; hyposthenia | ضعف | | |
| hypoboulia | ضعف الإرادة | | |
| hyporeflexia | ضعف الانعكاسية | | |
| hypophonia | ضعف التصويت | | |
| hyposphresia | ضعف التنشُّ الجسمي | | |
| dysesthesia | ضعف الحس | | |
| dyserethesia | ضعف الحساسية | | |
| apselaphesia; hypopselaphesia | ضعف حس اللمس | | |
| cathæresis | ضعف دوائي المنشا | | |
| amblygeusia | ضعف الذائقة | | |
| hypomnesia | ضعف الذاكرة | | |
| hypogeusia | ضعف الذوق | | |
| hyposexuality | ضعف الرغبة الجنسية | | |
| hypacusia; hypacusis; hypoacusis | ضعف السمع | | |
| hyposmia | ضعف الشم | | |
| neurotonia | ضعف القوة العصبية | | |
| amblyaphia | ضعف اللمس | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| limb | طَرْف | anoia; idiocy | عته |
| process | طريقة | disability | عجز |
| graft | طُغْم | acatamathesia | عجز إدراكي |
| taste | طُغْم | aprosexia | عجز التركيز |
| acidtaste | طُغْم حامض | acatamathesia | عجز لغوي |
| autograft | طُغْم ذاتي | hydatid | عداري |
| allograft | طُغْم متلي | lenticular | عدسي |
| catathymia | طفيان العوامل النفسية | lenticulostriate | عدسي مخططي |
| infantilism | طفالة | lenticulo-optic; lenticulothalamic | عدسي مهادي |
| afterpains | طلق تلوي | lability | عدم الاستقرار |
| precoma | طلعة السبات | subconsciousness | عدم اكتمال الوعي |
| obliteration | طمس | holoprosencephaly | عدم انشطار الدماغ المقدم |
| tinnitus | طنين | agenesia; agenesis | عدم التخلُّق |
| flexibility | طواعية | neuronagenesis | عدم تكون العصبونات |
| ■raniotopography | طوبوغرافية القحف | imbalance | عدم التوازن |
| dolichocephalic; mecocephalic | طويل الرأس | clumsiness | عدم الرشاقة |
| dolichocranial | طويل القحف | inadequacy | عدم الكفاية |
| fold | طية | alethia | عدم النسيان |
| flexible | طيع | nihilism | عدمية |
| | | aggression | عدوان |
| | | aggressive | عدواني |
| | | infection | عدوى |
| | | meningococcemia | عدوى الدم بالسحائيات |
| | | multisynaptic; polysynaptic | عديد التشابكات |
| | | aneurogenic | عديم التحصيب |
| | | lissencephalic | عديم التلافيف |
| | | incallosal | عديم الثفني |
| | | apesthetic | عديم الحواس |
| | | anencephalus | عديم الدماغ |
| | | amyelencephalus | عديم الدماغ والنخاع |
| | | acephalus | عديم الرأس |
| | | aconative | عديم العزم |
| | | non-neuronal | عديم العصبونات |
| | | amyelinic | عديم الغمد النخاعيني |
| | | inadequate | عديم الكفاية |
| | | nonmedullated; nonmyelinated; | عديم الميالين |
| | | unmedullated; unmyelinated | |
| | | amyelic; amyelonic | عديم النخاع |
| | | amyelonic | عديم النقي |
| | | tortua | عذاب |
| | | precognition | عرافة |
| | | tic | عرة |
| | | krauomania | عرة نظمية |
| | | claudication | عرج |
| | | pseudoclaudication | عرج كاذب |
| | | claudicatory | عرجي |
| | | symptom | عرض |
| | | acromegaly | عرطلة |

(ظ)

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|
| phenomenon | ظاهرة | | |
| backache; backalgia | ظَهَار | | |
| neurepithelium; neuroepithelium | ظهارة عصبية | | |
| neuroepithelial | ظهاري عصبي | | |
| dorsum | ظهر | | |
| dorsal; dorsalis | ظهري | | |

(ع)

| | | | |
|----------------------|----------------|--|--|
| claustrum | عائق | | |
| claustral | عائقي | | |
| familial | عائلي | | |
| neurophage | عائية عصبونية | | |
| myelophage | عائية ميالينية | | |
| habit | عادة | | |
| episode | عارضة | | |
| emotion | عاطفة | | |
| affective; emotional | عاطفي | | |
| affectivity | عاطفية | | |
| anergic | عاطل | | |
| sane | عاقل | | |
| agent | عامل | | |
| transdural | عبر الجافية | | |
| transcortical | عبر القشرة | | |
| limen; threshold | عتبة | | |
| scotoma | عتمة | | |

| | | | |
|--|--------------------|---|----------------------------|
| crest; crista | عرف | neure; neurocyte; neuron; neurone | عَصَبُون |
| gnosis | عرفانية | interneuron | عصبون بيني |
| cognition | عرفة | motoneuron | عصبون حركي |
| sciatica | عرق النسا | dynamoneure | عصبون حركي نخاعي |
| ansa; loop | عروة | esthesioneure | عصبون حسي |
| platycephalic | عريض الرأس | myoneure | عصبون عضلي |
| withdrawal | عزل | ganglioneure | عصبون عقدي |
| thoughtwithdrawal | عزل الأفكار | interneuron; internuncial | عصبون متوسط |
| sinistrality | عسر | neuronal; neuronic | عصبوني |
| dysantigraphia | عسر الانتساخ | nerval; nervous; neural | عصبي |
| aphagopraxia | عسر البلع | neurotropic | عصبي الالفة |
| dysgrammatism | عسر ترتيب الكلام | neurovegetative | عصبي إنباتي |
| mogiphonia | عسر التصويت | neuroepidermal | عصبي بشروي |
| dyschesia | عسر التفوط | pathetic | عصبي بكري |
| barbaralalia | عسر التلفظ الأجنبي | nervousness | عصبية |
| dyspareunia | عسر الجماع | neurocutaneous | عصبي جلدي |
| copodyskinesia | عسر الحركة الكللي | neuromotor | عصبي حركي |
| menalgia | عسر الحيض | neurosensory; sensorineural | عصبي حسي |
| dysbasia | عسر الخطو | neurosplanchic | عصبي حشوي |
| dysdipsia | عسر الشرب | neuroclonic | عصبي رمعي |
| dyskoimesis | عسر النوم | neuromeningeal | عصبي سحائي |
| dyspepsia | عسر الهضم | neuroendocrine | عصبي صماري |
| dysstasia; dystasia | عسر الوقوف | neurepithelial | عصبي ظهاري |
| sinistrality | عسروية | nervimuscular; neuromuscular; neuromyic | عصبي عضلي |
| yctalopias | عشاوة | neurgic | عصبي الفعل |
| autophilia | عشق الذات | neurocranial | عصبي قحفي |
| nyctalopia | عشى | neurocardiac | عصبي قلبي |
| rod | عصا | neuronephric | عصبي كلوي |
| meroergasia; neuronosis; neurosis; neuroticism | نُصاب | neuroeffector | عصبي مستفعلي |
| neuroses | عصابات | neurovegetative | عصبي مستقلي |
| acroneurosis | عصاب الأطراف | neurogastric | عصبي معدي |
| trophoneurosis | عصاب اغذائي | neurenteric; neuroenteric | عصبي معري |
| dystrophoneurosis | عصاب حثي | neurogenous | عصبي المنشأ |
| thermoneurosis | عصاب حراري | neuropsychic | عصبي نفسي |
| kinesioneurosis | عصاب حركي | neuroskeletal | عصبي هيكلية |
| esthesioneurosis; esthesionosis | عصاب حسي | neurotendinous | عصبي وترية |
| panneurosis | عصاب شامل | neurovascular | عصبي وعائي |
| neurophonia | عصاب صراخي | expression | عصر |
| aerasthenia; aeroneurosis | عصاب الطيارين | neurula | النُصبية |
| pathoneurosis | عصاب مرضي | atheroma | عصيدة |
| vasoneurosis | عصاب وعائي | brachium | عضد |
| neurotic | عصابي | brachial | عضدي |
| angioneurotic | عصابي وعائي | myoid | عضلاني |
| nerve; nervus | عصب | muscle | عضلة |
| neuroid | عصباتي | petrosalpingostaphylinus; | العضلة الرافعة لشراع الحنك |
| nonus | عصب تحت اللسان | petrostaphylinus | |
| neuromyon | عصب عضلي | myometrium | عضل الرحم |
| oculomotorius | العصب المحرك للعين | odaxesmus | عض اللسان |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| algiomuscular | عضلي ألمي | personology | علم الشخصية |
| myoidism | عضلية | gereology; gerontology | علم الشيخوخة |
| idiomuscular | عضلي تلقائي | neuroendocrinology | علم الصماريات العصبي |
| sensorimascular | عضلي حسي | myology | علم العضل |
| myoneural | عضلي عصبي | biopsychology | علم النفس البيولوجي |
| myocardiac; myocardial | عضلي قلبي | pathopsychology | علم النفس المرضي |
| myovascular | عضلي وعائي | neuroscience | علوم عصبية |
| organ; organon | عضو | rostral | علوي |
| end-organ | عضو انتهائي | age | عمر |
| odaxetic | عضوض | gigantism | عملقة |
| polydipsia | عطاش | operation | عملية |
| hydrodipsia | عطش للماء | agnea; agnosia | عمه |
| inactivate | عطّل | fingeragnosia | عمه إصبعي |
| lability | عطوبية | acroagnosis | عمه الأطراف |
| os | عظم | asomatognosia | عمه أقسام الجسم |
| zygoma | عظم وجني | astereognosis; stereoaesthesia | عمه التجسيم |
| spontaneous | عفوي | simultagnosia | عمه التكامل |
| drug | عقار | simultanagnosia | عمه التكامل البصري |
| ganglion; node; tangle | عقدة | atopognosis; atopognosis | عمه توضيع الإحساس |
| neuroganglion | عقدة عصبية | topagnosis; topoanesthesia | عمه توضيع اللمس |
| pseudoganglion | عقدة كاذبة | bodyagnosia | عمه الجسم |
| ganglionic; nodal | عقدي | athalposis | عمه الدفء |
| ganglioform | عقدي الشكل | apsychognosis | عمه الذات |
| intellect; mind | عقل | tasteblindness | عمه الذوق |
| anarithria | عقلة | asymbolia | عمه الرموز |
| mental; phrenic | عقلي | amorphognosis; amorphosynthesis | عمه الشكل |
| mentality | عقلية | anosognosis | عمه العاهة |
| infecundity | عقم | ahylognosia | عمه اللمس |
| nodule; nodulus | عقيدة | amusia | عمه الموسيقى |
| aseptic | عقيم | derealization | عمه الواقع |
| adversive | عكسي الالتفاف | prosopagnosia | عمه الوجوه |
| cerebrospinal | علاج دماغي نخاعي | abarognosis; baragnosis | عمه الوزن |
| iatric | علاجي | autotopagnosia | عمه وضع الجسم |
| iatrogenic | علاجي المنشأ | column | عمود |
| sign | علامة | rachis | عمود فقاري |
| affection | علة | spine | عمود فقري |
| unrest | عز | blindness | عمى |
| psychology | علم النفس | hemichromatopsia | عمى الألوان الشقي |
| neuropharmacology | علم أدوية الجهاز العصبي | hemianopia; hemianopsia; hemiopia; | عمى شقي |
| neuropsychopharmacology | علم الأدوية النفسية | hemiscotosis | |
| neuroradiology | علم الأشعة العصبية | agent | عميل |
| paleoneurology | علم أعصاب المتحجرات | habenula | عنان |
| algology | علم الآلام | cervix; neck | عنق |
| biocybernetics | علم التحكم الحيوي | cervical | عنقي |
| kinesiology | علم الحركة | arachnoid | عنكبوتي |
| neurobiology | علم الحياة العصبية | arachnoid | العنكبوتية |
| neurocytology | علم الخلايا العصبية | arachnopia | العنكبوتية الحنونة |
| cerebrology; encephalology | علم الدماغ | remyelination | عودة تشكل الميالين |

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| deficiency | عوز | palpebration | غماز |
| enervation | عوز الطاقة العصبية | sheath | غمد |
| aid | عون | telolemma | غمد انتهائي |
| normal | عيارى | perineurium | غمد الحزمة العصبية |
| normality | عيارية | epineurium | غمد العصب |
| defect | عيب | epineurium | غمد عصبي |
| parencephalia | عيب دماغي خلقي | endoneurium; epilemma; neurilemma; | غمد الليف العصبي |
| oculus | عين | neurolemma | |
| lagophthalmos | عين أرنبية | myolemma; sarcolemma | غمد الليف العضلي |
| ocular; optic | عيني | amblyopia | غمش |
| ocular | عينية | argamblyopia | غمش الإهمال |
| oculospinal | عيني نخاعي | gangrene | غنغرينة |
| | | absence | غياب |
| | (غ) | arrhinencephalia | غياب الدماغ الشمي |
| nausea | غشيان | trance | غيبية |
| nauseant | غشيانى | coma, absence; exanimatio | غيبوبة |
| gland; glandula | غدة | absentiaepileptica | غيبوبة صرعية |
| sensoriglandular | غدية حسية | insensible | غير حساس |
| nutrient | غذى | inadequate | غير كاف |
| allotriogeusia | غرابة المذاق | unstriated | غير مخطط |
| pattern | غرار | subconscious | غير مكتمل الوعي |
| alienation | غربة | mood-incongruent | غير منسجم مع المزاج |
| insertion | غرز | rage | غبط |
| thoughtinsertion | غرز الأفكار | blackout | غيمومة |
| suture | غرزة | | |
| graft | غرس | | (ف) |
| implantation | غرس | apathetic | فاتر الشعور |
| chamber | غرفة | psychopharmacology | فارماكولوجيا نفسية |
| gargoylism | غرقلية | vasopressin | فازوبريسين |
| egotism | غرور | active | فاعل |
| instinct | غريزة | anaptic | فاقد حس اللمس |
| instinctive | غريزي | amnesiac | فاقد الذاكرة |
| isotransplant | غريسة إسوية | aphonic | فاقد الصوت |
| brainwashing | غسل الدماغ | amyous | فاقد العضل |
| membrane | غشاء | unconscious | فاقد الوعي |
| myringa | غشاء طبلة الاذن | hemiplegia | فالج |
| axilemma; axolemma | غشاء المحوار | apertura | فتحة |
| fainting; syncop | غشي | hernia | فتق |
| incest | غشيان المحارم | pneumatocele | فتق رئوي |
| faint | غشية | malaise; torpor | فتور |
| eclysis | غشي خفيف | apathy | فتور الشعور |
| neurochondrite | غضروف عصبي | lemniscus | فتيل |
| idioglossia | غضغضة | virility | فحولة |
| placebo | غفل | cretinism | فدامة |
| epineurium | غلاف العصب | phrenology | فراصة الدماغ |
| hemivagotomy | غلبة أحد المبهمين | hiatus | فرجة |
| parasympathicotonia; vagotonia; vagotomy | غلبة المبهم | overstress | فرط الإجهاد |
| andromania; nymphomania | غلمة | oxyesthesia | فرط الإحساس |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| hypergnosis | فرط الإدراك | hypermetria | فرط القياس |
| hyperstrain | فرط الإرهاق | hemihypermetria | فرط القياس الشقي |
| surexcitation | فرط الاستثارة | hyperactivity; hyperergasia | فرط النشاط |
| hyperprosexia | فرط الاستفراق | hyperdynamia | فرط النشاط العضلي |
| hyperpolarization | فرط الاستقطاب | hyperphrenia | فرط النشاط العقلي |
| afterhyperpolarization | فرط الاستقطاب التلوي | hypersomnia | فرط النوم |
| hypercenesthesia | فرط الانشراح | hypererethism; hyperirritability | فرط الهيجية |
| hyperreflexia | فرط الانعكاسية | hypertarachia | فرط هيجية الجهاز العصبي |
| hypermia | فرط الإيلاء | hypersomnolence | فرط الوسن |
| hyperalgesia; hyperalgia; hyperpathia | فرط التآلم | hypergenitalism | فرط وظيفة الغدة التناسلية |
| thermohyperalgesia | فرط التآلم بالحرارة | ramus | فرع |
| hypermotility | فرط التحرك | pavor; terror | فزع |
| hypersensitivity | فرط التحسس | cacogeusia | فساد التذوق |
| hyperthermalgesia | فرط التحسس الحراري | cacosmia | فساد الشم |
| ephidrosis | فرط التعرق | lobe; lobus | فص |
| hemihyperidrosis | فرط التعرق الشقي | schizophrenia | فصام |
| hyperostosis | فرط التعمظ | oneirophrenia | فصام احلامي |
| hemicaniosis | فرط تعظم نصف القحف | hebephrenia | فصام ساذج |
| hyperhedonia | فرط التلذذ | schizoaffective | فصامي عاطفي |
| hypermyotrophy | فرط التنامي العضلي | decerebration | فصل المخ |
| hypertonia | فرط التوتر | decerebellation | فصل المخيخ |
| hemihypertonia; hemitonia | فرط التوتر الشقي | lobule; lobulus | فصيص |
| hypermyotonia | فرط التوتر العضلي | space | فضاء |
| hypersympathicotonus | فرط التوتر الودي | instinct | فطرة |
| hypersthenia | فرط التوترية | instinctive | فطري |
| hypersexuality | فرط الجنسية | active | فعل |
| hyperkinesia | فرط الحراك | act; action | فعل |
| acrocinesis; acrokinesia; hyperanacinesia; | فرط الحركة | alteraction | فعل تلوي |
| hypercinesis | | cerebrostomy | فغر الدماغ |
| hyperesthesia | فرط الحس | spondylosis | فقار |
| hypersensitivity; supersensitivity | فرط الحساسية | spondylous | فقاري |
| cryesthesia | فرط حساسية البرد | aboulia; abulia | فقد الإرادة |
| hyperthermesthesia | فرط الحساسية الحرارية | para-analgesia | فقدان حس الألم أسفل الجسم |
| hypercryalgia | فرط الحساسية للبرد | apallesthesia; palmanesthesia | فقدان حس الامتزاز |
| algia | فرط حس الألم | anigosis | فقدان حس البرد |
| caumesthesia; thermhyperesthesia; | فرط حس الحرارة | cryanesthesia | فقدان حس البرودة |
| thermohyperesthesia | | hemithermoanesthesia | فقدان حس الحرارة الشقي |
| hypergeusia | فرط حس الذوق | gargalanesthesia | فقدان حس الدغدة |
| hemihyperesthesia | فرط الحس الشقي | amyoeesthesia | فقدان الحس العضلي |
| hyperosmia; hyperosphresia | فرط حس الشم | bathyanesthesia | فقدان الحس العميق |
| bathyhyperesthesia | فرط الحس العميق | paramusia | فقدان الحس الموسيقي |
| hyperaphia | فرط حس اللمس | anesthecnesia | فقدان الحس والحركة |
| hyperorexia | فرط الشهية | hemiageusia | فقدان الذوق الشقي |
| natremia | فرط صوديوم الدم | merosmia | فقدان الشم الجزئي |
| hyperenergia | فرط الطاقة | anorexia | فقدان الشهية للطعام |
| hyperaffectivity | فرط العاطفية | hemiasynergia; hemidysergia | فقد التأزر الشقي |
| hyperpraxia | فرط الفعالية العقلية | anomia | فقد التسمية |
| hypergenitalism; hypergonadism | فرط القندية | palanesthesia | فقد حس الامتزاز |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ardanalgesia; thermanalgesia; | فقد حس الحرارة | base; basis | قاعدة |
| thermanesthesia | | basioccipital | قاعدتي قذالي |
| akinesia | فقد حس الحركة | fundusoculi | قاع العين |
| hemianosmia | فقد حس الشم الشقي | act; law | قانون |
| acoenesthesia | فقد حس العاقبة | allornonelaw | قانون الكل أو العدم |
| acenesthesia | فقد حس الوجود | calvaria | قبعة |
| amnesia | فقد الذاكرة | presynaptic | قبل تشابكي |
| aphonia | فقد الصوت | pregenital | قبل تناسلي |
| anarithmia | فقد مقدرة العد | preganglionic | قبل العقدة |
| areflexia | فقد المنعكسات | fornix | تقرب |
| jaw | فك | euthanasia | قتل المرحمة |
| intellect | فكر | cranium; skull | قحف |
| idea | فكرة | otocranium | قحف أذني |
| noematic; noetic | فكري | neurocranium | قحف عصبي |
| ideomuscular | فكري عضلي | cranial | قحفي |
| ideogenetic | فكري المنشأ | craniosacral | قحفي عجزى |
| neurolisis | فك العصب | pes | قدم |
| electroneurolisis | فك العصب كهربياً | flatfoot | قدم رخاء |
| cleft | فلج | footdrop | قدم ساقطة |
| os | فم | neuropodium | قدم عصبية |
| hebephrenia | فند | footdrop | قدم مندلية |
| atlas | الفهقة | clawfoot | قدم مخلبية |
| atlantoaxial | فهقي محوري | ballism | قذائفية |
| apprehension; comprehension | فهم | occiput | قذال |
| hiccough; hiccup; spasmolygmus | فواق | occipital | قذالي |
| neuróvirulence | فوعة عصبية | occipitalis | قذالية |
| epidural | فوق الجافية | occipitofrontal | قذالي جبهي |
| epipial | فوق الحنون | occipitoparietal | قذالي جداري |
| episinal | فوق العمود الفقري | occipitomastoid | قذالي خشائي |
| epineural | فوق القوس العصبية | occipitomenal | قذالي ذقني |
| episinal | فوق النخاع | occipitocervical | قذالي رقبتي |
| poliovirus | فيروس السنجابية | occipitotemporal | قذالي صدغي |
| neurovirus | فيروس عصبي | occipitoatloid | قذالي فهقي |
| physostigmine | فيزوستغمين | occipitobasilar | قذالي قاعدتي |
| psychophysics | فيزياء نفسية | occipitoaxoid | قذالي محوري |
| neurophysiology | فيزيولوجيا الجهاز العصبي | occipitothalamic | قذالي مهادي |
| esthesiophysiology | فيزيولوجيا الحواس | occipitobregmatic | قذالي هامتي |
| cerebrophysiology | فيزيولوجيا الدماغ | occipitofacial | قذالي وجهي |
| electrophysiology | فيزيولوجيا كهربية | theca | قرايب |
| psychophysiology | فيزيولوجيا نفسية | neurokeratin | قراتين عصبي |
| (ق) | | rheobase | قراءة التيار |
| suggestible | قابل الإيهاء | disc; discus; disk | قرص |
| flexible | قابل الثني | comu; horn | قرن |
| suggestibility | قابلية الإيهاء | cornea | قرنية |
| autosuggestibility | قابلية الإيهاء الذاتي | dwarfism; nanism; nanosoma; nanosomia | قزامة |
| hypoaactive | قاصر النشاط | nanomeia | قزامة الأطراف |
| distal; distalis | قاصي | spondylosis | قسط فقاري |
| | | portio | قسم |

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------------|
| priapism | قسوح | tractotomy | قطع السبيل |
| encephalomere | قسيم دماغي | pallidectomy | قطع الشاحبة |
| polioneuromere | قسيم سنجابي نخاعي | pallidoansection | قطع الشاحبة والعروة |
| neuromere | قسيم عصبي | ■minotomy | قطع الصفيحة |
| hodoneuromere | قسيم عصبي جنيني | enervation; neurectomy | قطع العصب |
| myomere; sarcomere | قسيم عضلي | phrenicectomy; phreniconeurectomy | قطع العصب الحجابي |
| myelomere | قسيم نخاعي | phrenicotomy | |
| cortex | قشرة | splanchnicectomy | قطع العصب الحشوي |
| archaeocortex | قشرة بدائية | myomectomy; myotomy | قطع العضل |
| isocortex; neocortex | قشرة حديثة | myectomy | قطع العضلة |
| putamen | قشرة عدسية | ramicotomy; ramisection; ramisectomy | قطع الفروع |
| allocortex | قشرة عريفة | craniectomy | قطع القحف |
| phronema | قشرة عقلية | vagotomy; vagotomy | قطع المبهم |
| palaeocortex; paleocortex; paleopallium | قشرة قديمة | craniamphitomy | قطع محاط القحف |
| pallium | قشرة المخ | cryothalamectomy | قطع المهاد القري |
| cortical | قشري | hemicraniectomy; hemicraniotomy | قطع نصف القحف |
| corticobulbar | قشري بصلي | hemicorticectomy | قطع نصف كرة المخ |
| corticopontine | قشري جسري | pyramidotomy | قطع الهرم |
| corticodiencephalic | قشري دماغي بيني | sympathectomy; sympathicectomy | قطع الودي |
| psychocortical | قشري عقلي | sedentary | قعدة |
| corticocerebral; pallial | قشري مخي | lordosis | قعرس |
| shivër | قشعريرة | sedentary | قعيدة |
| brachybasia | قصر الخطوية | saltation | قفز |
| brachycephalla | قصر الرأس | saltatory | قفزي |
| inadequacy | قصور | hypomydionia | قلة التوتر العضلي |
| amyoplasia | قصور التعضل | aphotesthesia | قلة حس الضوء |
| hypothymism | قصور التوتة | aliquorrhea | قلة السائل الدماغي النخاعي |
| hyposympathicotonus | قصور التوتر الودي | oligoposia | قلة الشرب |
| hypothyroidism | قصور الدرقية | oligodipsia | قلة العطش |
| hypoadrenocorticism | قصور قشرة الكظر | acatalepsy | قلة الفهم |
| hypometria | قصور القياس | anorethisia | قلة الهوجية |
| hypoadrenalism | قصور الكظر | odontectomy | قلع السن |
| hypopituitarism | قصور النخامية | neurexeresis | قلع العصب |
| panhypopituitarism | قصور النخامية الشامل | phrenicoexeresis | قلع العصب الحجابي |
| hypofunction | قصور وظيفي | ophthalmectomy | قلع العين |
| apsychia | قصور الوعي | anxiety | قلق |
| onychophagia | قضم الأظفار | anxious; restlessness | قلق |
| chellophagia | قضم الشفة | pananxiety | قلق شامل |
| tentum | قضيبي | trepidation | قلق عصبي |
| diphallous | قضيبي مزدوج | alysmus | قلق المرض |
| lumbago | قطان | contractile | قلوص |
| polus | قطب | contractility | قلوصية |
| drop | قطرة | myotility | قلوصية العضل |
| sectio | قطع | indolent | قليل الإيلام |
| segment; segmentum | قطعة | oligosynaptic | قليل التشابكات |
| gyrectomy | قطع التليف | acataleptic | قليل الفهم |
| radiculectomy; radisection | قطع الجذر | acathisia; akathisia; cathisophobia; kathisophobia | قماص |
| cordotomy | قطع الحبل الصوتي | vertex | قمة الرأس |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| infundibulum | قمع | pneumatocele | قبيلة موائية |
| canal; canalis; channel; duct; ductus | قناة | | |
| neurocanal | قناة فقرية | (ك) | |
| syringocoele | قناة النخاع المركزية | organism | كائن حي |
| culmen | قنّة | nightmare; oneirodynia; paroniria | كابوس |
| canaliculus | قنية | ankle | كاحل |
| anorexia | قهم | latent; potential | كامن |
| anorexianervosa | قهم عصابي | caliculus | كؤيسة |
| psychonomy | قوانين نفسية | pronation | كب |
| arc | قوس | suppression | كبت |
| zygoma | قوس وجنية | anticathexias | كبت الأفكار |
| cochlea | قوقعة | hepatolenticular | كبدى عدسي |
| emesis; vomiting | قيء | agitographia | كتابة هرولية |
| lead | قياد | myeloblastosis | كثرة الأرومات النخوية |
| dolorimetry | قياس الألم | polygyria | كثرة التلافيف |
| aigesimetry | قياس التألم | polymicrogyria | كثرة التلافيف الصغيرة |
| palpatometry | قياس الجس | pleocytosis | كثرة خلايا السائل الدماغى النخاعى |
| craniometry | قياس الجمجمة | myomelanosis | كثرة الميلانين العضلى |
| diaphemetry | قياس حس اللمس | astrocytosis | كثرة النجميات |
| audiometry | قياس السمع | myelemla | كثرة النقيويات |
| sthenometry | قياس النشاط | myelocythemia; myelocytosis; myelosis | كثرة النقيويات بالدم |
| psychodometry; psychometries; psychometry | قياس نفسى | alcoholism | كحولية |
| orthostatism | قيام الجسم | aggregate | كداسة |
| orthostatic | قيامى | osmodysphoria | كراهية الرائحة |
| encephalomyelocele | قبيلة الدماغ والنخاع والسحايا | stress | كرب |
| encephalocele | قبيلة دماغية | globuspallidus; pallidum | الكرة الشاحبة |
| notencephalocele | قبيلة دماغية خلفية | libido | كرع |
| derencephalocele | قبيلة دماغية رقبية | misanthropia | كره البشر |
| encephalomeningocele; | قبيلة دماغية سحائية | misogamy | كره الزواج |
| meningoencephalocele | | misogyny | كره النساء |
| hydrencephalomeningocele | قبيلة دماغية سحائية مائية | pallidal | كروى شاحبى |
| pseudocephalocele | قبيلة دماغية كاذبة | corpuscle | كرية |
| encephalocystocele; | قبيلة دماغية كيسية | tetanus | كزاز |
| hydrencephalocele; hydrocephalocele; | | tetanic | كزازى |
| hydroencephalocele | | tetaniorm | كزازى الشكل |
| cephalohematocele | قبيلة دموية رأسية | fracture | كسر |
| cephalocele | قبيلة رأسية | amiculumotivare | كسوة الزيتونة |
| meningocele | قبيلة سحائية | anaplasia | كشم |
| syringomeningocele | قبيلة سحائية تكهفية | radioulnar | كعبرى زندي |
| craniomeningocele | قبيلة سحائية قحفية | radiomuscular | كعبرى عضلى |
| meningomyelocele | قبيلة سحائية نخاعية | speech | كلام |
| myocele | قبيلة عضلية | embolalia; embololalia | كلام انصمامى |
| pneumatormachis | قبيلة غازية فقارية | paralogism | كلام خاطيء |
| pneumatoccephalus | قبيلة غازية قحفية | schizophasia | كلام فصامى |
| cranioccele | قبيلة قحفية | heterolalia; heterophasia; heterophemia | كلام مغاير |
| myelocystomeningocele | قبيلة ميالينية سحائية | cynocephalic | كلبي الرأس |
| syringomyelocele | قبيلة النخاع التكهفية | dull | كليل |
| myelocele; syringocele | قبيلة نخاعية | perfectionism | كمالية |

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| amaurosis | كمئة | medulla | لب |
| athetosis | كنح | neuropil | لبد عصبي |
| hippus | كنح الحدقة | ataxiophemia; palilalia | لجلة |
| hemiathetosis | كنح شقي | fallation | لجلة الاطفال |
| athelotic | كنعي | canthus | لحاذ |
| neuroelectricity | كهربائية عصبية | lingula | لسين |
| isoelectric | كهرساوي | tache | لطة |
| kwashiorkor | كواشركور | idiolalia | لغة ذاتية |
| curarization | كوررة | psycholinguistics | لغويات نفسية |
| kuru | كورو | bradyarthria; bradylalia; bradyphasia | لف |
| cholesterol | كولستيرول | neurovaccine; neurovariola | لقاح عصبي |
| cholinoceptive | كولينني الاستقبال | globushystericus | لقمة هستيرية |
| cholinergic | كولينني الفعل | ephapse; tactor | لماس |
| neurochitin | كيتين عصبي | ephaptic | لماسي |
| cyst | كيسة | taction; tactus; touch | لمس |
| dermoid | كيسة جلدانية | tactile; tactual | لمسي |
| myelocyst | كيسة ميالينية | endolymph | لمف الباطن |
| neurochemistry | كيمياء عصبية | homoeroticism | لواط |
| psychochemistry | كيمياء نفسية | amygdala; tonsil | لوزة |

(J)

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| apraxia | لا اداية | tonsillacerebelli | لوزة المخيخ |
| involuntary | لا ارادي | psychochrome | لون نفسي |
| astigmatism | لا بؤرية | torsion | لوي |
| asynergy | لا تآزرية | plaque | لويحة |
| asynchronism; asynchrony | لا تزامن | aptitude | لياقة |
| anhedonia | لا تلهذ | fibra; fibre | ليف |
| incoordination | لا تناسق | neurofiber; neurofibra | ليف عصبي |
| asymmetry | لا تناظر | pia | لين |
| asexual | لا جنسي | fibril | ليف |
| hemianecephaly | لا دماغية شقية | myofibril; sarcostyle | ليف عضلية |
| akoria | لا شبيعية | neurofibril | ليف عصبي |

(M)

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| unconscious | لا شعور | aqueous | مائي |
| infrapsychic | لا شعوري | psychoactive; psychotropic | مؤثر نفسي |
| apapalytic | لا شللي | occiput | مؤخر الرأس |
| anilingus | لا علق الشرج | matter; substance; substantia | مادة |
| irreversible | لا عكوس | cinerea | مادة السنجابية |
| irreversibility | لا عكسية | intercalatum; nigra | المادة السوداء |
| alemnal | لا غمدي | vagusstoff | مادة المبهم |
| passive | لا فاعل | noxious | مؤذ |
| apathy | لا ميالة | masochist | مازوخي |
| agranular | لا محبب | algophilla; algophily; masochism | مازوخية |
| insensible | لا محسوس | craniophore | ماسك القحف |
| decompensation | لا معاوضة | moron | مافون |
| parasympathetic | لاودي | mimmatlon | ماماة |
| | | anticoagulant | مانع التخثر |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| antihypnotic | مانع النوم | perineurial | متعلق بشهد الحزمة العصبية |
| antihysterjc | مانع الهستيريا | centrencephalic | متعلق بمركز الدماغ |
| asylum | ماوى | dendric; dendriform; dendritic | متفصن |
| olivifugal | مبتعد عن الزيتون | insheathed | متفعد |
| pallidofugal | مبتعد عن الشاحبة | poikilothermic | متغير الحرارة |
| axofugal | مبتعد عن المحوار | ceptor | متقبل |
| myologia | مبحث العضل | neuroceptor | متقبل عصبي |
| principle | مبدأ | intermittent | متقطع |
| encephalotome | مبضع الدماغ | auxotonic | متقلص ضد المقاومة |
| cephalotome | مبضع الرأس | ambivert | متكافئ المزاج |
| rachiotome | مبضع السيساء | meningococci | المتكورات السحائية |
| neurotome | مبضع العصب | syndrome | متلازمة |
| myotome | مبضع العضل | phakomatosis | متلازمة عدسية |
| leukotome | مبضع الفص الجبهي | malingerer | متمارض |
| analgia | مبطل الألم | degenerate | متنكس |
| abducens | مبغذ | neurodegenerative | متنكس عصبي |
| abductor | مبغدة | compatible | متوافق |
| proleptic | مبكر الانتياب | anagogic; ideal | مثالي |
| vagus | مبهم | bladder | مثانة |
| vagoaccessorius | مبهم إضافي | abaptiston | متقب لا مخترق |
| vagoglossopharyngeal | مبهمي لسانى بلعومي | trigon; trigonum | مثلث |
| vagosplanchnic; vagosympathetic | مبهمي ودي | flexor | مثنية |
| poliomyeliticidal | مبيد فيروس التهاب سنجابية النخاع | excitant | مثير |
| synergetic | متآزر | odaxetic | مثير الحك |
| innate | متاصل | confrontation | مجاهبة |
| tabetic | متبوس | necrophilia; necrophily | مجامعة الميت |
| homogenous | متجانس | juxtaspinal | مجاور السيساء |
| myelopetal | متجه للنخاع | parafalx | مجاور المنجل |
| olivipetal | متجه نحو الزيتون | abient | مجتنب العنبه |
| autokinetic | متحرك إراديا | abstract | مجرد |
| anagogic | متدين | palpable | مجبسوس |
| remittent | متردد | anterotic | مجبفر |
| progressive | مترق | anaphrodisiac | مجبفرة |
| titubant | مترنح | system | مجموع |
| floppy | مترهل | set | مجموعة |
| isoelectric | متساوي التكهرب | insane; lunatic | مجنون |
| ambisexual | متصلب الجنسين | essential | مجهول السبب |
| polyesthetic | متعدد الإحساسات | mimesis; mimosi | محاكاة |
| polysensory | متعدد التحسس | neuromimesis | محاكاة مستيرية عصبية |
| polyneural | متعدد التمعصب | mimetic; mimic | محاكي |
| monesthetic | متعلق بإحدى الحواس | psychosomimetic; psychotomimetic | محاكي الذهان |
| neuralgic | متعلق بالألم العصبي | neuromimetic | محاكي الفعل العصبي |
| electroconvulsive | متعلق بالتخليج الكهربى | curaremimetic | محاكي الفعل الكوراري |
| metapsychology: | متعلق بالنخاع التالي والنخاع | cholinomimetic | محاكي الكولين |
| metencephalospinal | | parasympathomimetic | محاكي الأوردي |
| neuromatous | متعلق بالورم العصبي | vagomimetic | محاكي المبهم |
| akineti | متعلق بتعذر الحركة | sympatheticomimetic; sympatheticomimetic | محاكي الودي |
| abasic | متعلق بتعذر المشي | androphile | محب البشر |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| cranioclast; craniotome | محجاج | psychogram | مخطط الشخصية |
| encephalogen | محدث التهاب الدماغ | echoencephalogram | مخطط صدى الدماغ |
| epileptogenic | محدث الصرع | myogram | مخطط العضل |
| clivus | محرر | myocardiogram | مخطط عضلة القلب |
| motofacient; mover | محرك | paleostriatum | مخطط قديم |
| oculomotor | محرك العين | electroencephalogram | مخطط كهربية الدماغ |
| cephalomotor | محرك للرأس | electronystagmogram | مخطط كهربية הראة |
| fasciculated | محزم | electro-oculogram | مخطط كهربية العين |
| perceptorium; sensorium | محس | electrocorticogram | مخطط كهربية القشرة |
| sensible | محسوس | electrospinogram | مخطط كهربية النخاع |
| blocker | مُحصر | psychogram | مخطط نفسي |
| adrenolytic | محصر الأدرينالين | strionigral | مخططي أسودي |
| capsula; capsule | محفظة | convulsant; convulsivant | مخلج |
| analyst | محلل | depressant | مخمد |
| psychoanalyst | محلل نفسي | depressomotor | مخمد الحركة |
| oneirogenic | محمل | psychodysleptic | مخمد نفسي |
| obliteration | محو | cerebral | مخي |
| axon; neuraxis; neuraxon; neurite | محوار | cerebropontile | مخي جسري |
| axodendritic | محواري تفصني | cerebellum; epencephalon; opisthencephalon | مخيخ |
| axosomatic | محواري جسدي | archaeocerebellum | مخيخ بدائي |
| axoaxonic | محواري محواري | neocerebellum | مخيخ حديث |
| axis | محور | vestibulocerebellum | مخيخ دهليزي |
| neuraxis | محور عصبي | palaeocerebellum; paleocerebellum | مخيخ قديم |
| peripheral | محيطي | cerebellar | مخيخي |
| peripherocentral | محيطي مركزي | cerebellopontine; cerebellopontile | مخيخي جسري |
| cerebrum | مخ | cerebellorubral | مخيخي حمراوي |
| deranged | مختل | cerebellorubrospinal | مخيخي حمراوي نخاعي |
| noncomposmentis | مختل العقل | cerebello-olivary | مخيخي زيتوني |
| narcotic; stupefactive | مخدر | cerebellospinal | مخيخي نخاعي |
| neuroleptanesthetic | مخدر تطميني | paracerebellar | مخيخي وحشي |
| pseudonarcotic | مخدر كاذب | fantasy; phantasia; phantasy | مخيلة |
| narcostimulant | مخدر منبه | cerebrocerebellar | مخي مخيخي |
| polioclastic | مخرب السنجابية | sinistrocerebral | مخي يساري |
| cone | مخروط | therapy | مداواة |
| conus | مخروط النخاع | percept; percipient | مدرك |
| tremograph | مخطاط الرعاش | photoperceptive | مدرك للضوء |
| ataxiagraph | مخطاط الرنح | gradient | مدروج |
| echoencephalograph | مخطاط صدى الدماغ | knismogenic | مدغدغ |
| myograph | مخطاط العضل | addict | مدمن |
| myocardiograph | مخطاط عضلة القلب | morphinist | مدمن المورفين |
| reflexograph | مخطاط المنعكسات | taste | مذاق |
| myeloscintogram | مخطاط ومضائي نخاعي | aftertaste | مذاق تلوي |
| striatum | مخطط | pseudogeusia | مذاق كاذب |
| archistriatum | مخطط بدائي | masculine | مذكر |
| radioencephalogram | مخطط الدماغ الإشعاعي | paresthesia | مذل |
| nystagmograph | مخطط הראة | monoparessthesia | مذل أحادي |
| ataxiagram | مخطط الرنح | acroparessthesia | مذل الأطراف |
| audiogram | مخطط السمع | hemiparessthesia | مذل شقي |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| paralgesia; paralgia | مذل مؤلم | proprioceptor | مستقبلة الحس العميق |
| topoparesthesia | مذل موضعي | osmoceptor; osmoreceptor | مستقبلة الراححة |
| caudatolenticular | مذني عذسي | baroceptor; baroreceptor; pressoreceptor | مستقبلة الضغط |
| stupeficient; stupefactive | مذهل | photoreceptor | مستقبلة ضوئية |
| bitter | مر | epithelioceptor | مستقبلة ظاهرية |
| hypochondria; hypochondriasis | مراق | myoceptor; myoreceptor | مستقبلة عضلية |
| control | مراقبة | cholinoceptor | مستقبلة كولينية |
| adolescence | مراهقة | chemoceptor; chemoreceptor | مستقبلة كيميائية |
| amyostalic | مرتعض العضل | tangoceptor | مستقبل تلامسي |
| relaxant | مرخ | peripheroceptor | مستقبلة محيطية |
| lissive | مرخ إسوائي | somatoceptor | مستقبل جسدي |
| rachigraph | مرسام السيساء | motoceptor | مستقبل حركي |
| disease; illness; malady; sickness | مرض | proprioceptive | مستقبل حسي عميق |
| neuropathology | مرضيات عصبية | interoceptor | مستقبل داخلي |
| cubitus; elbow | المرفق | paraganglion | مستقبل |
| complex | مركب | autonomic | مستقل |
| center, centre | مركز | supine | مستلق |
| sensorium | مركز حسي | level | مستوى |
| egotropic | مركزي الذات | noematachograph | مسجل سرعة التفكير |
| calmative; sedative | مركن | electrode | مسرى كهربى |
| temperantia | مركئات | homalocephalus | مسطح الرأس |
| mood; temperament | مزاج | sphenocephalus | مسطح الرأس |
| synchronous | مزامن | alleviant; analgesic; anodyne; antalgic; antalgic | مسكن |
| obex | مزلاج | neuroleptanalgesic | مسكن تطميني |
| spasmodysant | مزيل التشنج | pathway | مسلك |
| anxiolytic | مزيل القلق | incontinent | مسلس |
| touch | مس | myophone | مسماع العضل |
| accessory | مساع | mesmerism | مسمرية |
| aqueduct | مسال | neuropore | مسمة عصبي |
| porencephalia | مسامية الدماغ | myelopore | مسمة نخاعي |
| dromic | مماير | acrocephalic; oxycephalic; stenocephalous | مسنم الرأس |
| cryoprobe | مسبار قري | dentothalamic | مسنني مهادي |
| comatose; soporous | مسيوت | association | مشاركة |
| narcoleptic | مسيوخ | synapse | مشبك |
| allergen | مستأرج | cranioclast | مشداخ |
| antalgic | مستبعد الألم | radiatio | مشع |
| oblongata | مستطيل | paralytogenic; paralyzer | مشل |
| exhibitionist | مستعري | paralytic | مشلول |
| effector | مستفعل | paraplectic; paraplegic | مشلول الأسفل |
| ceptor | مستقبل | subparalytic | مشلول جزئياً |
| nociceptive | مستقبل الألم | prosopoplegic | مشلول الوجه |
| teleceptor; teloreceptor | مستقبل بعادي | euphorogenic | مشمق |
| receptor | مستقبلة | spasmogen | مشنج |
| nociceptor | مستقبلة الآلام | tetanospasmin | مشنج كزازي |
| mechanoreceptor | مستقبلة آلية | gait | مشية |
| dendriceptor | مستقبلة التفصن | festination | مشية تسارعية |
| proximoceptor | مستقبلة تلامسية | marcheapetitspas | مشية الخطوات القصيرة |
| osmoceptor; osmoreceptor | مستقبلة التناضح | chorial | مشيمائي |

| | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| choroid | مشيمية | orthotherapy | معالجة تقويمية |
| vertiginous | مصاب بالدوار | cryotherapy; frigotherapy | معالجة قارية |
| apractic | مصاب بتعذر الأداء | electrotherapy | معالجة كهربية |
| sphincter | مصرة | psychotherapeutics; psychotherapy | معالجة نفسية |
| epileptogenic | مصرع | negativism | معاندة |
| anode | مصعد | expressive; iter | معبر |
| cyclocephalus | مصقلب الرأس | antisocial | معتل اجتماعيا |
| anticonvulsant | مضاد الاختلاج | cacesthenic | معتل الحواس |
| antidepressant | مضاد الاكتئاب | neuromyopathic | معتل عصبي عضلي |
| antineuritic | مضاد التهاب العصب | psychopath | معتل النفس |
| antineuralgic | مضاد الألم العصبي | idiot | معتوه |
| antiparkinsonian | مضاد الباركنسونية | idio-imbecile | معتوه أبله |
| antipsychomotor | مضاد التحراك النفساني | thymoleptic | معدّل المزاج |
| antispastic | مضاد التشنج | gnosis | معرفة |
| contrastimulant | مضاد التنبيه | acrognesia | معرفة الأطراف |
| antibiotic | مضاد حيوي | stereognosis | معرفة التجسيم |
| antinarcotic | مضاد الخدار | autognosis | معرفة الذات |
| antipsychotic | مضاد الذهان | cramp | معص |
| antineurotoxin | مضاد ذيفان العصب | complex; gangliated | معقد |
| antifibrillatory | مضاد الرجفان | aseptic | معقم |
| antiapoplectic | مضاد السكتة | myeloarchitecture | معمارية السبل الميالينية |
| antiparalytic | مضاد الشلل | myoarchitectonic | معماري عضلي |
| anticephalgic | مضاد الصداع | amyous | معوز العضل |
| antiepileptic | مضاد الصرع | parencephalous | معيب الدماغ |
| antiadrenergic | مضاد الفعل الأدريناليني | nutrient | مغذي |
| anticholinergic | مضاد الفعل الكولينيني | insertion | مغرز |
| antianxiety | مضاد القلق | spindle | مغزل |
| antiemetic | مضاد القيء | tormina | مفص |
| thymoleptic | مضاد الكآبة | mongolism | مغولية |
| anteptialtic | مضاد الكابوس | anastomosis | مفاغرة |
| neuroleptic | مضاد للذهان | neuroanastomosis | مفاغرة عصبية |
| antiparasymphathomimetic | مضاد محاكي اللاودي | hypersensitive | مفرط الإحساس |
| antihallucinatory | مضاد الهلاس | acrocineitic | مفرط الحركة |
| antisymphathetic | مضاد الودي | hyperesthetic | مفرط الحس |
| antasthenic | مضاد الزهن | hyperpragic | مفرط النشاط العقلي |
| hypostheniant | مضعف | lethral | مفقد الذاكرة |
| neurokinet | مطرقة العصب | concept; conception | مفهوم |
| neurotony | مط العصب | distad | مقاصي |
| absolute | مطلق | nocifensor | مقاوم الأذى |
| ataractic | مطمئن | gegenhalten | مقاومة التحريك |
| antidromic | معاكس المسيرة | antikinesis | مقاومة التدوير |
| therapy | معالجة | rachiresistance | مقاومة سيسانية |
| clinothrapy | معالجة بالاستلقاء | rachiresistant | مقاوم سيساني |
| hypnothrapy | معالجة بالتنويم | drug-fast; drug-resistant | مقاوم للدواء |
| kinesiatrics; kinesiotherapy; kinetotherapy | معالجة بالحركة | myotic | مقبض الحدقة |
| bibliotherapy | معالجة بالكتب | aula | مقدم البطين الثالث |
| musicotherapy | معالجة بالموسيقى | preanesthesia; prenarcois; preanesthetic | مقدمة التخدير |
| crenothrapy | معالجة بالمياه المعدنية | preictal | مقدمة السكتة |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| prefrontal | مقدم جبهي | tetanic | مكثّر |
| metopon | مقدم جبهي مقطب | athelotic | مكتنح |
| foreconscious | مقدم الوعي | neurogenic | مكّن العصب |
| pilomotor | مققة الشعر | myelinogenetic | مكّن الميالين |
| arrectorpilli | مققة الشعرة | bathmotropic | مكيف الاستجابة |
| leptoccephaly | مقق الرأس | malaria | ملاريا |
| emetic | مقيء | mesaxon | ملتصق غشائي المحوار |
| dolorimeter | مقياس الألم | commissure | ملتقى |
| torsionometer | مقياس الانفعال | encephalitic | ملتهب الدماغ |
| algessimeter; algesiometer; algometer | مقياس التالم | neuritic | ملتهب العصب |
| anesthesimeter | مقياس التنبيج | abstract | ملخص |
| myoknesimeter | مقياس التقلص العضلي | palliate; palliative | ملطف |
| myotonometer | مقياس التوتر العضلي | abirritant | ملطف التهيج |
| craniometer | مقياس الجمجمة | forceps | ملقط |
| potentiometer | مقياس الجهد | faculty | مَلَكَة |
| knesimeter; kinesiometer | مقياس الحركة | ephapse | لمس |
| sensimeter | مقياس الحس | stain | ملوّّن |
| biothesiometer | مقياس حس الاهتزاز | myotatic | ممدّد العضل |
| thermesthesiometer | مقياس حس الحرارة | hypochondriac | ممرّوق |
| topothermesthesiometer | مقياس الحس الحراري | demoniac | ممسوس |
| kinesi-esthesiometer; | مقياس الحس الحركي | lethal | مميّت |
| kinesesthesiometer | | adient | مناحي العنبه |
| knesimeter; kinesiometer | مقياس الحس السطحي | neuroimmunology | مناعة عصبية |
| trichoesesthesiometer | مقياس الحس الشعري | neuroimmunologic | مناعي عصبي |
| piesimeter | مقياس حس الضغط | dream | منام |
| esthesiometer | مقياس حس اللمس | antagonist | مناهضة |
| anesthesimeter | مقياس الخدر | stimulator | منباه |
| ataxiometer | مقياس الرنح | extrovert | منبسط النفس |
| algessichronometer | مقياس زمن التالم | stimulant; stimulus | منبّه |
| chronomyometer | مقياس الزمنة العضلية | contrastimulus | منبّه المضاد |
| noemalochometer | مقياس سرعة التفكير | psychostimulant | منبّه نفسي |
| audiometer | مقياس السمع | adequatestimulus | منبّه واف |
| rachimeter | مقياس السيساء | alert | منبّه |
| olfactometer | مقياس الشم | disseminated | منتثر |
| liminometer | مقياس العتبة | adient | منجذب للمنبّه |
| myometer | مقياس عضلي | falx | المنجل |
| myosthenometer | مقياس قوة العضل | gradient | منحدر |
| myodynamometer | مقياس قوة العضلات | deviant; invert; pervert | منحرف |
| tactometer | مقياس اللمس | curve | منحني |
| reflexometer | مقياس المنعكسات | naris; nostril | المنخر |
| sthenometer | مقياس النشاط | nares | المنخران |
| psychodometer; psychometer | مقياس نفسي | depressed | منخفض |
| odynometer | مقياس الوجع | depressed | منخفض |
| depressant; depressive | مكثب | index | منسب |
| control | مكافحة | mood-congruent | منسجم مع المزاج |
| depressed | مكتئب | activator; energizer | منشط |
| acquired | مكتسب | neurotonic | منشط عصبي |
| aversive | مكره | zona; zone | منطقة |

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| tachistoscope | منظار تومضي | coconscious | مواكب للشعور |
| encephaloscope | منظار الدماغ | death | موت |
| oscilloscope | منظار الذبذبة | wave | موجة |
| retinoscope | منظار الشبكية | neurophilic; neurotropic | موجّه للعصب |
| myoscope | منظار العضل | vagotropic | موجّه للمبهم |
| ophthalmoscope | منظار العين | sympathicotropic | موجّه الودي |
| organization | منظمة | morphism | مورفينية |
| analeptic; exhilarant; thymoleptic | منعش | innate | موروث |
| psychoanaleptic | منعش نفسي | junction | موصل |
| reflex | منعكس | locus | موضع |
| idioreflex | منعكس ذاتي الإحداث | canthus | موق |
| stellreflex | منعكس وضعي | agrypnod; agrypnotic | موقف |
| denarcotize | منع المخدر | attitude | موقف |
| aversive | منفر | algisiogenic | مولّد الألم |
| rostrum | منقار | esthesiogenic; sensigenous | مولّد الحس |
| rostral | منقاري | oscillator | مولّد الذبذبات |
| degenerative | منكس | psychotogenic | مولّد الذهان |
| myotrophic | منحي العضل | paralytogenic | مولّد الشلل |
| hypnagogic; hypnagogue; hypnogenic; | منوم | epileptogenic | مولّد الصرع |
| hypnogenous; hypnotic; soporiferous; soporific | | neurotogenic | مولّد العصاب |
| narcoleptic | منوم انتيابي | neurogen | مولّد العصب |
| thalamus | مهاد | reflexogenic; reflexogenous | مولّد المنعكس |
| subthalamus | مهاد بطني | algetic; dolorific; dolorigenic | مؤلم |
| metathalamus | مهاد تال | hydranencephaly | موه انعدام المخ |
| neothalamus | مهاد حديث | hydrencephalus; hydrocephalus | موه الرأس |
| epithalamus | مهاد فوقي | scaphohydrocephaly | موه الرأس الزورقي |
| paleothalamus | مهاد قديم | pseudohydrocephalus | موه الرأس الكاذب |
| thalamomamillary | مهادي حلمي | hydranencephaly | موه الرأس اللامخي |
| thalamotegmental | مهادي سقيفي | rachiochysis | موه السيساء |
| thalamolenticular | مهادي عدسي | neurasthenic | موهون عصبي |
| thalamocortical | مهادي قشري | myelin | ميالين |
| cathode | مهبط | medullated | مياليني |
| temperantia | مهذئات | field | ميدان |
| ataractic; tranquilizer | مهديء | groove | ميزابة |
| psychosedative | مهديء نفسي | craniograph | ميصاف القحف |
| hysteric | مهستر | myosin | ميوزين |
| hallucinogen | مهلوس | myoglobulin | ميوغلوبلين |
| calcar | مهماز | myoglobin; myohemoglobin | ميوغلوبين |
| calcaravis | مهماز الطير | myotin | ميولين |
| calcarine | مهمازي | | |
| maniac; maniacal | مهروس | | |
| megalomaniac; grandiose | مهروس بالمظمة | episode | ناثبة |
| irritant | مهيج | centrifugal | ناذب |
| psychogogic | مهيج نفسي | myelofugal | ناذب الخاخ |
| epithalamus | مهيد | process | ناتيء |
| gangrene | موات | paraphysis | ناتيء جانبي |
| neurocommunications | مواصلات عصبية | monticuluscerebelli | ناتيء مخيخي |
| bestiality | مواقعة البهائم | zygoma | ناتيء وجهي صدغي |

(ن)

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| regio | ناحية | prehypophysis | نخامية أمامية |
| descendens | نازل | posthypophysis | نخامية خلفية |
| fistula | ناسور | neurohypophysis | نخامية عصبية |
| mature | ناضج | adenohypophysis | نخامية غدية |
| viripotent | ناضج الرجولة | hypophysiotropic | نخامي التوجه |
| pacemaker | ناظمة | neurohypophyseal | نخامي عصبي |
| neuropacemaker | ناظمة عصبية | necrosis | نخر |
| appetate | ناظم الشهية | myonecrosis | نخر عضلي |
| fenestra | نافذة | myelinosis | نخر مياليني |
| chill; rigor | نافض | tingling | نخز |
| bedsore | ناقبة | uraniscolalia | نخيف |
| hypophysioprivic | ناقص الإفراز النخامي | cicatrix | ندبة |
| hyposensitive | ناقص التحسس | flocculus | ندفة |
| hypoergic; hyporeactive | ناقص التفاعلية | paraflocculus | ندفة إضافية |
| atelocephalous | ناقص تكون الرأس | narcissistic | نرجسي |
| hypotonic | ناقص التوتر | autophilia; narcism | نرجسية |
| hypokinetic | ناقص الحراك | agony | نزع |
| hypoesthetic | ناقص الحس | set; trend | نزعة |
| myeloclast | ناقضة الميالين | cerebrotonia | نزعة فكرية |
| cholineacetyltransferase | ناقلة الأسيتيل كولين | enervation | نزاع العصب |
| esthesodic | ناقل الحس | hemorrhage; staxis | نزف |
| kinesodic | ناقل الدفعات الحركية | encephalorrhagia; hematoencephalon | نزف دماغي |
| neuromittor; neurotransmitter | ناقل عصبي | meningorrhagia | نزف سحائي |
| sensiferous | ناقل للحس | conation | نزوع |
| nunnation | نائة | amnesia | نساوة |
| agonist | ناهضة | ecmnesia | نساوة الجديد |
| rod | نبت | acousmatamnesia | نساوة صوتية |
| neurotubule | نبيب عصبي | chemansea | نساوة علاجية |
| myotubule | نبيب عضلي | anterogradeamnesia | نساوة اللاحق |
| ozostomia | نتانة النفس | amnemonic; amnesic; amnesic; lethral | نساي |
| discharge | نحيج | sciatica | النسي |
| neurad | نحو العصب | tela | نسيجة |
| distad | نحو القاصي | amyloidosis | نشاء |
| craniad | نحو القحف | sthenia | نشاط |
| axopetal | نحو المحوار | neurosthenia | نشاط عصبي |
| medulla | نخاع | activate | نشط |
| medullary; myeloid | نخاعي | development | نشوء |
| spinocollicular | نخاعي أكيمي | amyloid | نشواني |
| spinobulbar | نخاعي بصلي | active | نشط |
| propriospinal | نخاعية عميقة | hemiseptum | نصف الحاجز |
| spinotectal | نخاعي سقفي | hemisphere | نصف الكرة |
| spinocortical | نخاعي قشري | hemicerebrum | نصف كرة المخ |
| spinocerebellar | نخاعي مخيخي | hemilateral | نصفي جانبي |
| myelin | نخاعين | maturation | نضج |
| medullated; myelinated; myelinic | نخاعيني | mature; maturity | نضج |
| hypophyseal; pituitary | نخامي | monophasia | نطق احادي |
| prehypophyseal | نخامي أمامي | idiologism | نطق ذاتي المعاني |
| hypophysis; pituitarium; pituitary | نخامية | angophrasia | نطق متقطع |

| | | |
|--|---------------------|---|
| staccato | نطلق مفكك | thermhypesthesia; thermohypesthesia; نقص حس الحرارة |
| regulation; system | نظام | thermohypoesthesia |
| rhythm | نظم | hypoequilibrium نقص حس الدوار والتوازن |
| biorhythm | نظم حيوي | hemihypesthesia; hemihypoesthesia نقص الحس الشقي |
| paraepilepsy | نظير الصرع | bathyhypesthesia; bathyhypoesthesia نقص الحس العميق |
| paracoxalgia | نظير الورك | meroencephaly نقص الدماغ الجزئي |
| drowsiness | نعاس | oxyachresia نقص غلوكوز الدماغ |
| hypnosia | نعاس مستحكم | hypodynamia نقص القوة |
| tone | نفمة | hypopotentia نقص القوى |
| physocephaly | نفاخ الرأس | hemihypometria نقص القياس الشقي |
| psyche | نفس | hypergia; hypoergasia نقص النشاط |
| mental; psychiatric; psychic; psychologic; psychological | نفسي | medullary نقوي |
| psychosocial | نفسي اجتماعي | myelocyte نقوية |
| mentality | نفسية | myeloid نقياني |
| psychosomatic | نفسي جسمي | hilum تقير |
| psychomotor | نفسي حركي | atelocephalous نقص الرأس |
| biopsychic | نفسي حيوي | metastasis نقيلة |
| autopsychic | نفسي ذاتي | appersonification تكران الذات |
| psychoneural | نفسي عصبي | type نمط |
| twitching | نفضان | phenotype نمط ظاهري |
| myopalmus | نفضان عضلي | homotype نمط مراتي |
| malleation | نفضان اليد | stereotypy نمطية |
| jerk; twitch | نفضة | formication نملان |
| anklejerk | نفضة الكاحل | diurnal نهاري |
| canal; canalis | نفق | acoria نهام |
| canaliculus | نفق | ending; terminatio نهاية |
| atelencephalia; ateloencephalia | نقص الدماغ | peripheromittor نهاية تنبيهية محيطية |
| atelocephaly | نقص الرأس | tactor نهاية حسية لمسية |
| atelomyelia | نقص النخاع | neuroterminal; teloneuron نهاية عصبية |
| craniotrypsis | نقب القحف | mittor نهاية منبهة |
| fovea | نقرة | nihilism نهلسنتية |
| hypopraxia | نقص الأدائية | akoria; polyphagia نهم |
| hyposynergia | نقص التآزورية | nidus; nucleus نواة |
| hyposensitivity | نقص التحسس | trophonucleus نواة كبرية |
| neuroinidia | نقص التغذية العصبية | dentatum نواة مسننة |
| hypoergy | نقص التفاعلية | lethargy نوام |
| atelocephaly | نقص تكون الرأس | crisis; fit; seizure نوبة |
| atelomyelia | نقص تكون النخاع | rachisagra نوبة سيسائية |
| hypotonia | نقص التوتر | paralepsy; psycholepsy نوبة نفسية |
| hemihypotonia | نقص التوتر الشقي | ictal نوبي |
| hypocinesia; hypokinesia | نقص الحراك | norepinephrine نورابينفرين |
| hypanakinesia; hypomotility | نقص الحركة | noradrenergic نورادريناليني الفعل |
| hypesthesia; hypoesesthesia | نقص الحس | hypnotize نؤم |
| hypoalgesia; hypoalgesia | نقص حس الألم | sleep نوم |
| hemihypoalgesia | نقص حس الألم الشقي | hypnolepsy; narcolepsy نوم انتيابي |
| hypopallesthesia; pallhypesthesia | نقص حس الامتزاز | hypnic نومي |
| | | narcoleptic نومي انتيابي |
| | | end-nuclei نوى انتهائية |
| | | somnolence; somnolentia نيمومة |

(هـ)

| | | | |
|--|-------------------|------------------------------|----------------------|
| dormant | هاجع | cheromania | هوس الانتشراح |
| margin | هامش | agromania | هوس الانفراء |
| amentia; anoia | هيل | coprolomania | هوس البذاء |
| attack | هجمة | coprophilia | هوس البراز |
| remission | هداة | dromomania | هوس التجوال |
| ciliary | هديي | ponomania | هوس الترحال |
| allophasia; logomania; logorrhea; onomatopoesis; | هذر | onomatomania | هوس ترديد الكلمات |
| paralogism | | ecdysiasm; nudomania | هوس التعري |
| allophasia; delirium; ideophrenia | هذيان | pleonexia | هوس التملك |
| tromomania | هذيان ارتعاشي | mythomania | هوس التهويل |
| subdelirium | هذيان بسيط | verbomania | هوس الثرثرة |
| hysteria | هراع | arithmomania | هوس الحساب |
| herpes | هريس | hypomania | هوس خفيف |
| herpeszoster; zoster | هريس نطاقي | choreomania | هوس رقصي |
| phreniclasia; phrenicotripsy | هرس العصب الحجابي | hydrargyromania | هوس زئبقي المنشا |
| sympathicotripsy | هرس الودي | syphilomania | هوس زهري |
| pyramid; pyramis; senium | هرم | peotillomania | هوس سحب الفضيب |
| neurohormone | هرمون عصبي | cleptomania; kleptomania | هوس السرقة |
| graphocatharsis | هرور كتابي | ecomania | هوس السيادة العائلية |
| festination | هرولة | erotomania | هوس شبيقي |
| oxylalia | هرولة الكلام | dipsomania | هوس الشرب |
| thrill | هرير | hydrodipsomania | هوس شرب الماء |
| emaciation | هزال | cacodemonomania; demonomania | هوس الشياطين |
| orgasm | هزة الجماع | bruxomnia | هوس الصريف |
| hysteric | هستيري | micromania | هوس الصفارة |
| hysteria | هستيريا | opsomania | هوس الطعام |
| hysteroepilepsy | هستيريا صرعية | grandiosity; megalomania | هوس العظمة |
| hysterics | هستيرية | ablutomania | هوس الغسل |
| drop | هطول | aphrodisiomania | هوس الفلحة |
| hallucinosi | هلاس | graphomania | هوس الكتابة |
| hallucination | هلس | bibliomania | هوس الكتب |
| acoasma | هلس سمعي | alcoholomania; methomania | هوس الكحول |
| hallucinative; hallucinatory | هلسي | mythomania | هوس الكذب |
| panic | هلع | amenomania | هوس مرحي |
| hallucination | هلوسة | nosomania | هوس المرض |
| pseudohallucination | هلوسة كاذبة | hypermania | هوس مفرط |
| hormone | هورمون | trichomania | هوس النتف |
| mania | هوس | pyromania | هوس النيران |
| nostomania | هوس الإبابة | ailurophilia; galeophilia | هوس الهررة |
| monomania | هوس أحادي | phrenetic | هوسي |
| sophomania | هوس إدعاء الحكمة | manic-depressive | هوسي اكتئابي |
| pharmacophilia | هوس الادوية | identity | هوية |
| clinomania | هوس الاستلقاء | agitation | هياج |
| phagomania; sitomania | هوس الاكل | neuroskeleton | هيكل داخلي |
| necromania | هوس الاموات | myohematin | هيماتين عضلي |
| egomania | هوس الانانية | erethism; irritable | هيدج |
| | | irritability | هيوجية |
| | | myoplasm; sarcoplasm | هيرلي عضلية |

(و)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| afferent | وارد |
| cerebripetal | وارد للدماغ |
| corticopetal; corticoafferent | وارد للقشرة |
| cerebellipetal | وارد للمخيخ |
| subconscious | واع جزئيا |
| conscious | واعي |
| atonic | واني |
| adynamic | واهن |
| neurasthenic | واهن الأعصاب |
| amyasthenic | واهن العضل |
| microsthenic | واهن العضلات |
| epidemic | وباء |
| epidemic | وبائي |
| affect | وجدان |
| acrotrophodynia | وجع الأطراف الاغتنائي |
| odynophagia; odynphagia | وجع البلع |
| pharyngodynia | وجع البلعوم |
| urodynia | وجع التبول |
| mastodynia; mazodynia | وجع الثدي |
| pleurodynia | وجع الجنبه |
| allodynia | وجع خلافي |
| cephalodynia | وجع الرأس |
| hysterodynia; metrodynia | وجع الرحم |
| uterodynia | وجع رحمي |
| cervicodynia | وجع الرقية |
| xiphodynia | وجع الرهابة |
| rachiodynia | وجع سيسائي |
| proctodynia | وجع الشرج |
| thoracodynia | وجع الصدر |
| splenodynia | وجع الطحال |
| achillodynia | وجع العرقوب |
| myodynia | وجع عضلي |
| osteocope; osteodynia | وجع عظمي |
| antrodynia | وجع الفار |
| cricoidynia | وجع الغضروف الحلقى |
| spondylodynia | وجع الفقار |
| cardiodynia | وجع قلبي |
| arthrodynia | وجع المفصل |
| arthroneuralgia | وجع مفصلي |
| vaginodynia | وجع المهبل |
| acrodynia | وجع النهايات |
| tenodynia | وجع الوتر |
| facies | وجه |
| epinephrinemia | وجود الاينفرين بالدم |
| myeloblastemia | وجود الارومات النقيوية بالدم |
| alcoholemia | وجود الكحول في الدم |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| parorexia; pica | وحم |
| neuronevus | رحمة عصبية |
| puncture | وخز |
| acupuncture | وخز إبري |
| electroacupuncture | وخز إبري كهربى |
| sympathetic; sympathic | ودي |
| sympathism | ودية |
| sympathoadrenal | ودي كظري |
| papilledema | وذمة الحليلة البصرية |
| pseudopapilledema | وذمة الحليلة البصرية الكاذبة |
| cephaledema | وذمة الرأس |
| myoedema; myoidema | وذمة عضلية |
| myxedema | وذمة مخاطية |
| heredity; inheritance | وراثه |
| hereditary | وراثي |
| coxalgia; coxodynia | وراك |
| myeloblastomatosis | ورام ارومة النقيوية |
| neurogliomatosis; neurogliosis | ورام دبقى عصبى |
| meningiomas | ورام سحائي |
| neurolipomatosis | ورام شحمى عصبى |
| neuromatosis | ورام عصبى |
| myomatosis | ورام عضلي |
| neurolymphomatosis | ورام لمفى عصبى |
| neurofibromatosis | ورام ليفى عصبى |
| myelocytomatosis | ورام النقيويات |
| folium | ورقة |
| sciatic | وركي |
| neoplasm; oncoma | ورم |
| ependymoblastoma | ورم ارومة البطانة العصبية |
| neuroblastoma | ورم الارومة العصبية |
| ganglioneuroblastoma | ورم الارومة العصبية العقدية |
| myoblastoma; myoblastomyoma | ورم الارومة العضلية |
| fibroblastoma | ورم الارومة الليفية |
| astroblastoma | ورم الارومة النجمية |
| medulloblastoma | ورم الارومة النخاعية |
| myeloblastoma | ورم الارومة النقيوية |
| sympathicoblastoma; | ورم الارومة الودية |
| sympathicogonioma; sympathoblastoma; | |
| sympathogonioma | |
| spongioblastoma | ورم ارومى اسفنجي |
| glioblastoma | ورم ارومى دبقى |
| pinealoblastoma; pineoblastoma | ورم ارومى صنوبرى |
| esthesioneuroblastoma | ورم ارومى عصبى حسى |
| meningofibroblastoma | ورم ارومى ليفى |
| xanthoma | ورم اصفر |
| ependymocytoma; ependymoma | ورم البطانة العصبية |
| chordoma | ورم حبلية |
| neurocytoma; neuroepithelioma | ورم الخلايا العصبية |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| myocytoma | ورم الخلايا العضلية | myelocytoma | ورم النقيويات |
| gliocytoma; glioma; neurospongioma | ورم دقيقي | vein; vena | وريد |
| mesoglioma | ورم الدبقيات الصغيرة | emissarium | وريد مشعري |
| oligodendroblastoma; | ورم الدبقيات القليلات التنصن | pulvinar | وسادة |
| oligodendroglioma | | milieu | وسط |
| glioneuroma; neurogliocytoma | ورم دقيقي عصبي | midfrontal | وسط الجبهة |
| ganglioglioma | ورم دقيقي عقدي | milieuexterieur | وسط خارجي |
| fibroglioma | ورم دقيقي ليفي | milieuinterieur | وسط داخلي |
| cerebroma; encephaloma | ورم الدماغ | lethargy; somnolence; somnolentia | وسن |
| hematoma | ورم دموي | cataphora | وسن منقطع |
| cephalohematoma | ورم دموي رأسي | obsession | وسواس |
| meningematoma; meninghematoma | ورم دموي سحائي | obsessive | وسواسي |
| meningeoma; meningioma; meningoma | ورم سحائي | anancastic; obsessive-compulsive | وسواسي قسري |
| leptomeningioma | ورم سحائي رقيق | operculum | وصاد |
| meningothelioma | ورم سحائي ظهاري | position | وضع |
| neurilemma; neurilemoma; | ورم شفاني | attitude; habitus; posture | وضعة |
| schwannoglioma; schwannoma | | postural | وضعي |
| pinealocytoma; pinealoma; pinealoma; | ورم صنوبري | hypothalamus | وطاء |
| pineocytoma | | hypothalamic | وطائي |
| neurocytoma; neuroepithelioma | ورم ظهاري عصبي | palinopsia | وظوب الرؤية |
| medulloepithelioma | ورم ظهاري نخاعي | algiovascular | وعائي ألمي |
| phakoma | ورم عداسي | cerebrovascular | وعائي دماغي |
| neuroma | ورم عصبي | meningovascular | وعائي سحائي |
| gangliocytoma; ganglioglioma; | ورم عصبي عقدي | cerebrovascular | وعائي مخي |
| ganglioma; ganglioneuroma | | malaise | وعكة |
| pseudoneuroma | ورم عصبي كاذب | awareness; consciousness | وعي |
| leiomyoma | ورم العضلات الملساء | oneirism | وعي أحلامي |
| myoma | ورم عضلي | subconsciousness | وعي جزئي |
| myolipoma | ورم عضلي شحمي | selfconsciousness | وعي الذات |
| myoschwannoma | ورم عضلي شفاني | anacusia; anakusia | وقر |
| myxomyoma | ورم عضلي مخاطي | zoophilia; zoophilism | الولع بالحيوانات |
| rhabdomyoma | ورم عضلي مخطط | nyctophilia; scotophilia | الولع بالليل |
| adenoma | ورم غدي | mysophilia | ولع القذارة |
| neurilemma; neurolemmoma | ورم غمد الليف العصبي | alcoholophilia | ولع الكحول |
| craniopharyngioma | ورم قحفي بلعومي | zoophilic | ولوع بالحيوانات |
| infundibuloma | ورم القمع | myatonia | وناء عضلي |
| pseudotumor | ورم كاذب | tonia; atonicity; atony | ونى |
| fibroneuroma; neurofibroma | ورم ليفي عصبي | amytonia | ونى عضلي |
| ganglioneurofibroma | ورم ليفي عصبي عقدي | collapse | وهط |
| myofibroma | ورم ليفي عضلي | derism | وهل |
| paranglioma | ورم المستقيمات | derelism; derism; phantasm | وهم |
| melanoma | ورم ملاني | adynamia; asthenia; hyposthenia | وهن |
| melanoblastoma | ورم ملاني خبيث | neurotrophasthenia | وهن التغذية العصبية |
| meningoblastoma | ورم ملاني سحائي | somasthenia; somatasthenia | وهن جسدي |
| melanoameloblastoma | ورم مينائي ملاني | minuthesis | وهن حسي |
| astrocytoma; astroma | ورم النجميات | skelasthenia | وهن الساق |
| neuroastrocytoma | ورم نجمي عصبي | phonasthenia | وهن الصوت |
| myeloma | ورم نقوي | aerasthenia | وهن الطيارين |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| neurasthenia | وهن عصبي | fontanelle | يافوخ |
| otoneurasthenia | وهن عصبي أذني المنشأ | hand | يد |
| traumasthenia | وهن عصبي رضحي | clawhand | يد مخلبية |
| hemineurasthenia | وهن عصبي شقي | handedness | يدوية |
| leioasthenia | وهن العضلات الملساء | masculinize | يذكر |
| amyasthenia; amyosthenia; myasthenia; | وهن عضلي | kernicterus | يرقان نووي |
| myoasthenia; myoneurasthenia | | sinistral | يساري |
| hemiamyosthenia | وهن عضلي شقي | excitable | يستثار |
| neuromyasthenia | وهن عضلي عصبي | bradypragia | بطء العمل |
| cataphrenia | وهن عقلي | adolescence | يفح |
| ergasthenia | وهن العمل | juvenile | يفعي |
| myelasthenia | وهن النخاع | alert | يقظ |
| psychasthenia | وهن نفسي | alertness; wakefulness | يقظة |
| miopragia | وهن وظيفي | subwaking | يقظة جزئية |
| | | invert | يقلب |
| | | dextrocerebral | يمينية المخ |
| | (ي) | | |
| juvenile | يافع | | |

المعاجم الأكاديمية المتخصصة




معجم طب الأعصاب

منشور من قبل

www.iqra.ahlamontada.com

انكليزي - عربي

الاسناد الدكتور صادق الهلالي



أكاديميا

مَنْظَرُ الصَّحْتِ الْعَامِلِيَّةِ
الكتاب لاقت يني اشرق المتوسط